

Institut für Pflanzenschutzforschung (BZA)
der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR zu Berlin
Zweigstelle Eberswalde
Abteilung Taxonomie der Insekten (ehem. DEI)
Eberswalde

HELGA DÖBLER

Katalog der in den Sammlungen des ehemaligen Deutschen Entomologischen Institutes¹ aufbewahrten Typen — IX

COLEOPTERA

Cicindelidae

Nach dem Muster der bisher erschienenen Bearbeitungen erfolgt im vorliegenden Beitrag die Darstellung der Cicindelidae-Typen, die sich in der Sammlung des Instituts befinden. Angaben über Synonyme wurden nur gemacht, wenn diese in der Bearbeitung von HORN (Coleopterorum Catalogus 86, Vol. 1; 1926) vermerkt wurden. Der Status der zahlreichen Taxa, die in der Sammlung HORN mit einem Typus-Etikett versehen waren, wurde ebenfalls nur auf der Grundlage der obengenannten Bearbeitung bestimmt. Nicht aufgenommen wurden die im Coleopterorum Catalogus mit der Bezeichnung 1), 2), alb-F, dlc-F, cc-F usw. versehenen Taxa, da es sich hierbei um infrasubspezifische Kategorien handelt. Da die überwiegende Mehrzahl der Cicindeliden seit HORNs Tod nicht mehr bearbeitet wurden, werden sich vor allem in bezug auf die Einstufung dieser Taxa sicherlich Änderungen ergeben; dies zu entscheiden bleibt den Spezialisten vorbehalten. Eine Bearbeitung dieses Materials wäre sehr wünschenswert.

Für zahlreiche Hinweise auf fehlende Zitate sei hiermit den Herren Dr. BASILEWSKY, TERVUREN, Prof. MANDL, Wien und BROUERIUS VAN NIDEK, Voorburg herzlich gedankt.

abruptesculpta HORN, 1914 (*Dromica*)

(Rev. Zool. Afr. 3, 423)

Syntypen, Belg. Congo: 1 ♀, Mufungwa Sampwe, 1.—16. XII. 1911, leg. BEQUAERT; 1 ♂, 2 ♀♀, IX.—XII. 1912.
DEI: Syntypen: 1 ♀, Mufungwa Sampwe, 1.—16. XII. 1911, leg. BEQUAERT; 1 Ex. Kapiri, IX. 1912, Miss. Agric.

acumiai MUTHLER, 1924 (*Cicindela*)

(Amer. Mus. Novit. nr. 106, 1—3, Fig. 1, 2)

Cuba, Camaguey, Puerto Principe Province, leg. ACUÑA; ♂ Holotypus, No. 28051, 1 ♀, No. 28052, 7 ♀♀, No. 28054, 1 ♀, No. 28055, im Amer. Mus. Nat. Hist.; 1 ♀, in Estacion Experimental Agronomica, Santiago de las Vegas, Cuba; Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, Cuba, Camaguey, 20.—23. VIII., No. 28053 [Nummer in der Beschreibung nicht genannt!], leg. ACUÑA, ex Amer. Mus. Nat. Hist. Dept. Invert. Zool.

acuteapicalis HORN, 1914 (*Collyris*)

(Arch. Naturg. 79, A 11 (1913), 4)

♀ Holotypus, Chandkhira, Sylhet, ex Coll. v. DE POLL; im DEI.

affine HORN, 1892 (*Megalomma*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 74)

♂ Holotypus, Madagascar, ex Coll. RICHTER; im DEI.
Syn. zu *rugicollis* FAIRMAIRE, 1871.

¹ Jetzt: Institut für Pflanzenschutzforschung (BZA) der AL der DDR zu Berlin, Zweigstelle Eberswalde, Abteilung Taxonomie der Insekten.

affine HORN, 1893 (*Pogonostoma*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 14)

2 ♂♂, Syntypen, Madagascar, im Museum Berlin und in Coll. HORN.

DEI: 1 ♂, Syntypus, Madagascar, Annanarivo, leg. SIKORA.

affinis HORN, 1892 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 77)

Mehrere Syntypen, Venezuela.

DEI: 3 Syntypen, Venezuela, leg. SCHLÜTER.

Syn. zu *argentata* FABRICIUS, 1801.**affinis** HORN, 1892 (*Collyris*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 363)

♂♂ Syntypen, Luzon, ex Coll. RICHTER und Coll. MEYER.

DEI: 1 ♂ Syntypus, ohne Fundort, ex. Coll. RICHTER.

affinis HORN, 1900 (*Oxychila*)(Dtsch. Ent. Ztschr., 365; nom. praecoc., = *affinior* HORN, 1905, Syst. Ind. Cic., 49)

♂ Holotypus, Ecuador; im DEI.

agnes HORN, 1905 (*Tricondyla*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 64)

♂ Holotypus, Ceylon; im DEI.

alata LILJEBLAD, 1932 (*Cicindela*)

(Canad. Ent. 64, 215)

♂ Holotypus, Chicago, Illinois, 13. VI. 1932, leg. GERHARD; 15 ♂♂, 17 ♀♀, Paratypen, dto., 24. VI., 13. VI. – 11. VII. 1932; im Field Museum.

DEI: 1 ♂ Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, 29. VI. 1932.

alba HORN, 1894 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 112, Taf. 3, Fig. 8)

Mehrere Syntypen, Africa orient., Quilimane.

DEI: 3 Syntypen, D. O. Africa, Quilimane, durch STAUDINGER.

albens HORN, 1895 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 361)

♀ Holotypus, Afr. occid., Brazzaville; im DEI.

albitarsis THOMSON, 1857 (*Collyris*)(Arch. Ent. 1, 132; nom. praecoc., = *leucodactyla* CHAUDOIR, 1860, Bull. Moscou 33, 2, 297)

♀ Holotypus, Borneo, Sarawak.

DEI: ♀ Holotypus, Borneo, ex cab. THOMSON — ex cab. BROWN — Coll. v. DE POLL.

alboclavata DOKHTOUROFF, 1883 (*Dromica*)

(Rev. mens. Ent. 1, 8)

2 Syntypen, Natal, in Coll. DOKHTOUROFF.

DEI: 1 Syntypus, Natal.

albocyanescens HORN, 1912 (*Collyris*)

(Ent. Mitt., 132)

♀ Holotypus, Formosa, Tainan, leg. SAUTER, in Coll. HORN; im DEI.

alboguttata viridinitida MANDL, 1959 (*Cicindela*)

(Bonn. Zool. Beitr. 10, Nr. 1–2, 101–102)

♂ Holotypus, Djibouti; 14 Paratypen, Djibouti und Berbera; leg. MARTIN; im Museum ALEXANDER KOENIG und in Coll. MANDL.

DEI: 1 Paratypus, Djibouti, 1901, leg. MARTIN.

albopilosa DOKHTOUROFF, 1885 (*Cicindela*)

(Horae Soc. Ent. Ross. 19, 248)

10 Syntypen, Fergana, Narynopol, VIII., leg. WILKINS.

DEI: 1 Syntypus, Hpukn. (?), 12. VIII.

Syn. zu *hybrida* LINNÉ, 1758.**alleni** HORN, 1908 (*Cicindela*)

(Rec. Ind. Mus. 2, 409)

♂ Holotypus, Borneo, Betong, leg. ALLEN, via HEWITT an HORN; im DEI.

alluaudi HORN, 1911 (*Cicindela*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. 55, 27)

3 ♀♀, Syntypen, Afrika, Mont Kénia (O. et N. O. et S. O.), Zone inférieure, Prairie, 2000 m, XI. 1908, leg. ALLUAUD.

DEI: 1 ♀ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

***amabilis rectipennis* HORN, 1932 (*Odontochila*)**

(Rev. Ent. 2, 406—407)

♂ Holotypus, Rio Madeira, Manicoré, Mitte II. 1932, leg. WUCHERPFENNIG; im DEI.

***ambitiosa* PÉRINGUEY, 1893 (*Cosmema*)**

(Trans. S. Afr. Phil. Soc. 7, 84)

Mehrere Syntypen, South Africa, Transvaal, Barberton.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, ex Coll. PÉRINGUEY.

***ampullacea* HORN, 1901 (*Neocollyris*)**

(Rev. Cic., 60—61)

Mehrere Syntypen, Basilan, Ins. Philippin., II.—III. 1898, leg. DOHERTY.

DEI: 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, ex Coll. FRUHSTORFER.

***ampullicollis* HORN, 1914 (*Collyris*)**

(Arch. Naturg. (1913), 79, A 11, 5)

3 ♀♀, Syntypen, Travancore, Wallardi, leg. LE MOULT; im DEI.

***analis nigrosericea* HORN, 1930 (*Odontochila*)**

(Wien. Ent. Ztg. 47, 9—10)

2 ♀♀, Syntypen, Insel Philippinen, Columbogan, VII.—VIII. 1917, Coll. HASLAM, im Museum Carnegie (Pittsburgh) und in Coll. HORN.

DEI: 1 ♀ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

***ancorifera* HORN, 1896—1897 (*Cicindela*)**

(Ann. Mus. Genova (2), 17, 271)

Mehrere Syntypen, Nov. Guinea, Hatam, VI. 1875, leg. BECCARI, im Museum Genua.

DEI: 3 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, VI.—VII. 1875, ex Museum Genua.

***andersonii* GESTRO, 1889 (*Cicindela*)**

(Ann. Mus. Genova (2), 7, 83)

Mehrere Syntypen, Hochland von Birmania, Teinzò, V., leg. FEA, in der Coll. in Genua.

DEI: 2 Syntypen, Birmania, Teinzò, 1886, leg. FEA.

***andrewesi* HORN, 1894 (*Calochroa*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 171, Taf. 3, Fig. 1)

Mehrere Syntypen, Vorder-Indien, Nord-Canara, leg. ANDREWES.

DEI: 4 Syntypen, Canara, 94, leg. ANDREWES.

***andrewesi* HORN, 1894 (*Collyris*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 170)

Mehrere Syntypen; Vorder-Indien, Nord-Canara; 1 Ex. Ceylon; im Museum Berlin.

DEI: 2 Syntypen, Canara.

***andriana* ALLUAUD, 1900 (*Cicindela*)**

(Bull. Soc. Ent. Fr., 18—19, Fig. 2)

Mehrere Syntypen, südwestl. Madagascar Gebiet, Mahafaly.

DEI: 1 Syntypus, Madagascar (Süd), Bassin du Mandraré, 1900, leg. ALLUAUD, Nr. 48.

***angularis* HORN, 1892 (*Collyris*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 358)

♂ Holotypus, Luçon, ex Coll. RICHTER; im DEI.

***angulicollis* HORN, 1900 (*Cicindela*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 209)

♀ Holotypus, India orient., Dacca; im DEI.

***angulihumerosa* HORN, 1929 (*Cicindela*)**

(Ent. Nachrichtenbl. 3, 8)

1 ♂, 1 ♀, Philippinen, ex Coll. v. DE POLL; mehrere ♀♀, Insel Samar, leg. BAKER; im National Museum Washington und in Coll. HORN; Syntypen:

DEI: 1 ♂, 1 ♀, Ins. Philippinen, ex Coll. v. DE POLL; 1 ♀, Island Samar, leg. BAKER; Syntypen.

***angulipenis* HORN, 1932 (*Odontochila*)**

(Rev. Ent. 2, 407—408)

2 ♂♂, Syntypen, Columbia orient., Rio Negro, 500 m, leg. FASSL.

DEI: 1 ♂ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

***angustatus* HORN, 1902 (*Therates*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 72)

2 ♀♀, Syntypen, Tonkin, Montes Mauson, IV.—V. 1900, 2—3000', leg. FRUHSTORFER; im DEI.

***angusticollis* PÉRINGUEY, 1894 (*Myrmecoptera*)**

(Trans. Ent. Soc. Lond., 448)

Mehrere Syntypen, Mashunaland, Salisbury, leg. MARSHALL.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort.

***angusticollis* HORN, 1896 (*Tetracha*)**

(Bull. Mus. Paris 2, 328)

♀ Holotypus, 1 ♀, Venezuela, in Coll. HORN; 3 Ex. Haut-Orénoque, 1368—1887, leg. GAILLARD; im Museum d'Histoire Naturelle de Paris; Paratypen.

DEI: ♀ Holotypus, 1 ♀, mit den Angaben der Beschreibung; 1 Ex. Ht-Orénoque, 1368—1887, leg. GAILLARD; Paratypen.

***angustoobliquatum* HORN, 1925 (*Ctenostoma*)**

(Ent. Bl. 21, 132)

Mehrere Syntypen, Costa Rica, Turrialba, 400 Fuß, Coll. SCHILD.

DEI: 10 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, 15. IX. 1922.

***annuligera prolongata* HORN, 1932 (*Megacephala*)**

(Rev. Soc. Ent. Argent. 22, 103—104)

♀ Holotypus, Argentina borealis, an der Bolivian-Grenze; im DEI.

***antatsima* ALLUAUD, 1902 (*Cicindela*)**

(Ann. Soc. Ent. Fr. 71, 639—640)

Mehrere Syntypen, Madagascar, am unteren Fluß Mandraré, Ampasimpolaka, IX., leg. ALLUAUD.

DEI: 2 Syntypen, Madagascar (Sud), Bassin du Mandraré, 1900, leg. ALLUAUD, Nr. 44.

***antennalis* HORN, 1909 (*Collyris*)**

(Rec. Ind. Mus., 259)

2 ♀♀, Syntypen, S. E. Borneo, Martapura, 1891, leg. DOHERTY, im Britischen Museum und in Coll. HORN.

DEI: 1 ♀ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

***anulipes* HORN, 1897 (*Cicindela*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 255)

♂ Holotypus, Minas Geraes; im DEI, durch STAUDINGER.

***aphrodisia* BAUDI, 1864 (*Cicindela*)**

(Berl. Ent. Ztschr. 8, 195)

Über 60 Syntypen, Insel Cypro und Asia minor, leg. TRUQUI.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, leg. TRUQUI, Coll. KRAATZ.

***apicatis* HORN, 1897 (*Cicindela*)**

(Ent. Nachr. 23, 17)

Syntypen: 1 ♀, Nebraska, durch STAUDINGER; mehrere Ex. Kansas, Kakley, leg. SRNKA.

DEI: 1 ♀, Neb., LUETGENS, durch STAUDINGER; 2 Ex. Kansas, Kakley, Salt Marsh, ex Coll. SRNKA: Syntypen. Syn. zu *togata* LAFERTÉ, 1841.***apicatis* KRAATZ, 1890 (*Cicindela*)**

(Ent. Nachr. 16, 136)

Holotypus, ohne Fundort, in Coll. KRAATZ; im DEI.

Syn. zu *maura* LINNÉ, 1758.***apicatis* HORN, 1903 (*Dromica*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 317)

Mehrere Syntypen, Mashonaland, Salisbury, 1900, leg. MARSHALL.

DEI: 5 Syntypen, Salisbury, leg. MARSHALL.

***apicatis contracta* HORN, 1905 (*Collyris*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 295)

♂ Holotypus, Siam; im DEI.

***aptera pseudocontracta* HORN, 1937 (*Collyris*)**

(Ent. Bl. 33, 55—56)

2 ♀♀, Syntypen, Annam, Prov. Haut Donai, „Agr. Stat. of Blao“, 800 m, leg. POILANE, im National Museum Washington und in Coll. HORN.

DEI: 1 ♀ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 2. VII. 1933.

***apteroides* HORN, 1901 (*Neocollyris*)**

(Rev. Cic., 59)

♀ Holotypus, Manipur, [India or.]² leg. DOHERTY; im DEI.² In [] wurden die Angaben gesetzt, die sich auf den Etiketten befanden, in der Originalbeschreibung aber fehlten.

***argentata semicircumscripta* MANDL, 1958 (*Cicindela*)**

(Ent. Nachr. Österr. Schweiz. Ent. 10, Nr. 2, 23, Fig. 1)

♂ Holotypus, Santiago del Estero, El Pinto, XI. 1956, leg. FLEISS; Paratypen: 7 Ex. dto.; 4 Ex. Paraguay, Chaco, XI. 1956; 1 Ex. Paraguay, Asuncion; in Coll. MANDL und Coll. HASSENTEUFEL.
 DEI: 2 Paratypen, Argentina, Santiago del Estero, El Pinto, XI. 1956, leg. FLEISS.

***arida* DAVIS, 1928 (*Cicindela*)**

(Pan-Pacific Ent. 5, 65)

♂ Holotypus, 8 Ex. California, Death Valley Junction, 31. III. 1928, leg. GUNDER, in Coll. DAVIS; mehrere Ex. dto., in Coll. FALL, Coll. HADDEN und in der California Academy of Sciences; Paratypen.
 DEI: 1 ♂ Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

***armandi* FAIRMAIRE, 1886 (*Cicindela*)**

(Le Natural. 8, 223)

Mehrere Syntypen, Yunnan.

DEI: Syntypen: 1 Ex. Yunnan, leg. FAIRMAIRE; 2 Ex. dto. Bourgeois.

***armigera* DOKHTOUROFF, 1883 (*Dromica*)**

(Rev. mens. Ent. 1, 8)

Mehrere Syntypen, ohne Fundort.

DEI: 1 Syntypus, Kuriman, ex Coll. DOKHTOUROFF.

Syn. zu *furcata* BOHEMAN, 1848.***arnoldi* HORN, 1904 (*Cicindela*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 430)

2 ♀♀, Syntypen, Kamerun, Benue sup., 11. — 14. IV. 1903, leg. SCHULTZE; im DEI.

***arrowi* HORN, 1900 (*Heptodonta*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 362)

♂ Holotypus, Burma, N. Chin. Hills, [IV. 1894] via ARROW an HORN; im DEI.

***aspera* DOKHTOUROFF, 1883 (*Dromica*)**

(Rev. mens. Ent. 1, 8)

Mehrere Syntypen, ohne Fundort.

DEI: 1 Syntypus, Cap. bon. Spei, ex Coll. DOKHTOUROFF.

***asperata breviformis* HORN, 1913 (*Megacephala*)**

(Rev. Zool. Afr. 2, 278)

Belg. Congo, Syntypen: mehrere Ex. Kambove, IX. 1906/III., XI. 1907, leg. SHEFFIELD NEAVE; mehrere Ex. N.-E.-Rhodésie, Serenge Distr., 4500', 19. XII., S.-E.-Katanga, 4000', 24. XI., Kambove, 4000', 10. XI., im Britischen Museum; 1 ♂, Kapoya, 12. XI. 1912; 1 ♀, Mufungwa, 1. — 16. XI. 1911; leg. BEQUAERT; im Musée du Congo.
 DEI: 1 Syntypus, Kambove, IX. 1906 — III. 1907, leg. SHEFFIELD NEAVE.

***asperata dodsi* PÉRINGUEY, 1904 (*Tetracha*)**

(Ann. S. Afr. Mus. 3, 167)

2 ♂♂, 3 ♀♀, Syntypen, Southern Rhodesia, Sebakwe, leg. DODS, in Coll. PÉRINGUEY.

DEI: 1 ♀ Syntypus, S.-Rhodesia, Sebakwe, ex Coll. DODS.

***asperata gratiosa* HORN, 1904 (*Megacephala*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 95)

Mehrere Syntypen, Deutsch Ost-Afrika, Lindi, Lukuledi.

DEI: Syntypen: 3 Ex. Lukuledi, leg. ERTL; 1 Ex. Lindi, SALOMON.

***asperata kigonserana* BASILEWSKY, 1966 (*Megacephala*)**

(Ann. Mus. Afr. centr. (Sér. 8°) Sci. zool. no 152, 69, Fig. 15c)

Afrique, Tanganyika: ♂ Holotypus, Kigonsera im MRAC; 5 Ex. Manow, im ZMB, im DEI und in Coll. MANDL; 2 Ex. Madibira, im ZSM und in Coll. MANDL; 2 Ex. Uhehe, im DEI; 20 Ex. Kigonsera, im MRAC, im ZSM, im NMF, im SMD, im MCZ und im Museum Hamburg; 1 Ex. dto., 1952, leg. HARTL, im Museum FREY; 2 Ex. dto. 1929, im Museum Praha; 3 Ex. Ugano, 1500 — 17000 m, Matengo Hochland, WSW Songea, XII. 1935, leg. ZERNY, im NMW, im MRAC und in Coll. MANDL; 2 Ex. Langiro, 1500 m, Matengo Hochland, WSW Songea, dto., im NMW und im MRAC; 1 Ex. Nyassa S., in Coll. MANDL; 1 Ex. Nyassa, im MCZ; 3 Ex. Tanganyika, im MRAC, im MCZ und im Museum Hamburg; Paratypen.
 DEI: Paratypen: 2 Ex. D. O. Afrika, Manow; 2 Ex. Uhehe, 1905.

***asperata occidentalis* HORN, 1921 (*Megacephala*)**

(Ent. Bl. 17, 183)

1 ♂, 2 ♀♀, Oubangui-Territ, Fort Crampel, Fort Sibut, Coll. LE MOULT; 2 ♀♀, Neu-Kamerun, 28. V. 1914, leg. TESSMAN; im Museum Berlin und in Coll. HORN; Syntypen.

DEI: 1 ♂, 1 ♀, Franz. Congo, Fort-Crampel; 1 ♀, dto. Fort-Sibut, Haut Chari, Coll. LE MOULT; 1 ♀, Kamerun, Bosum, 28. V. 1914, leg. TESSMAN, ex Museum Berlin: Syntypen.

***aulicoides* SAHLBERG, 1913 (*Cicindela*)**

(Öf. Finska Vet. Soc. Förh. 55, A, nr. 19 (1912—1913), 3)

Mehrere Syntypen, Palaestina, zwischen dem Fluß Jordan und dem Fluß Vadi, Nawâime, 14. III., Exped. 1903 bis 1904, leg. SAHLBERG und SAALAS.

DEI: 1 Syntypus, Jordan, leg. SAHLBERG.

Syn. zu *tumulata* FABRICIUS, 1781.***aureofusca grandisubtilis* HORN, 1935 (*Collyris*)**

(Koleopt. Rundsch. 21, 50)

♂ Holotypus, „Hongkong 1864“; im DEI.

***aureofusca grandicadosa* HORN, 1935 (*Collyris*)**

(Koleopt. Rundsch. 21, 50—51)

♀ Holotypus, Tonkin, Montes Mauson, 2—3000', IV.—V., Coll. FRUHSTORFER; im DEI.

***auripennis* DOKHTOUROFF, 1887 (*Cicindela*)**

(Ann. Soc. Ent. Belg. 31, 154)

Mehrere Syntypen, Paraguay.

DEI: 5 Syntypen, Paraguay, leg. DRAKE, 188 (2 Ex. ex Coll. RICHTER).

Syn. zu *auripennis* LUCAS, 1857.***auripennis* HORN, 1902 (*Collyris*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 67)

♀ Holotypus, Tonkin, Montes Mauson, IV.—V. 1900, 2—3000', leg. FRUHSTORFER; im DEI.

***auromarginata* KRAATZ, 1887 (*Cicindela*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 150)

Syntypen: 1 Ex. Tecce-Turmenien; 1 Ex. Turmenien, 1 Ex. ohne Fundort; leg. LEDER.

DEI: 1 Syntypus, Tecce, Coll. KRAATZ.

Syn. zu *decempustulata* MÉNÉTRIÉS, 1848.***aurosternatis* HORN, 1894 (*Cratohaerea*)**

(Ent. Nachr. 20, 245)

Mehrere Syntypen, Togo, leg. CONRADT.

DEI: 5 Syntypen, Togo, 1892—1893, leg. CONRADT.

***aurothoracica* HORN, 1897 (*Cicindela*)**

(Not. Leyd. Mus. 19, 239)

Mehrere Syntypen, Celebes mer., Patunnuang, I. 1896, leg. FRUHSTORFER, in Coll. HORN.

DEI: 2 Ex., mit den Angaben der Beschreibung; 1 Ex. ohne Fundort; leg. FRUHSTORFER: Syntypen.

***baeri* FLEUTIAUX, 1903 (*Odontochila*)**

(Bull. Soc. Ent. Fr., 109)

Mehrere Syntypen, Pérou, Prov. Huallaga, Rio Mixiollo, 1.200 m, VII.—VIII. 1900, leg. BAER, in Coll. MAINDRON und Coll. HORN.

DEI: 1 ♂ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

***baliensis* BRANCSIK, 1892 (*Cicindela*)**

(Jahrb. Nat. Ver. Trencs. Com., 210, Taf. 10, Fig. 8c)

Mehrere Syntypen, Bali-Bay bei Sualala, leg. FREY.

DEI: 3 Syntypen, Bali-Bay, durch BRANCSIK.

Syn. zu *abbreviata* KLUG, 1832.***balzani* HORN, 1899 (*Cicindela*)**

(Ann. Mus. Genova, (2) 19, 502)

1 ♀, Ecuador, in Coll. HORN; 1 ♀, Bolivia, Rio Beni, La Paz-Reyes, 1891, leg. BALZAN, im Museum Civ. Genuae; Syntypen.

DEI: 1 ♀, Syntypus, Ecuador.

***banghaasi* HORN, 1907 (*Cicindela*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 24)

Mehrere Syntypen, Cuyaba, Matto-Grosso, leg. STAUDINGER und BANG-HAAS, in Coll. HORN.

DEI: 6 Syntypen, Cuyaba, Matt. Gr.

***banksi* HORN, 1923 (*Prothyma*)**

(Philipp. Journ. Sc. 22, 360—362)

2 ♀♀, Syntypen, Insula Panay, Antique, Culasi, leg. GREGOR, in Coll. HORN und Coll. SCHULTZE.

DEI: 1 ♀ Syntypus, I. Panay, Culasi, leg. GREGOR.

***basalis duploflavescens* HORN, 1930 (*Therates*)**

(Wien. Ent. Ztg. 47, 3)

Mehrere Syntypen, Salomon Insel.

DEI: 2 Syntypen, Salomon I.

basalis simpliflavescens HORN, 1930 (*Therates*)

(Wien. Ent. Ztg. 47, 3)

Mehrere Syntypen, Salomon Insel.

DEI: 2 Ex. Salomon Is., VII. – VIII. 1909, leg. FROGGATT; 1 Ex. Guadalupe I., Sol. Is., 1–21; Syntypen.

basidilatatum HORN, 1909 (*Pogonostoma*)

(Soc. Ent. Zürich 24, nr. 12, 89)

♀♀ Syntypen, Madagascar, Majunga.

DEI: 3 ♀♀, Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, leg. DONCKIER.

batesi HORN, 1894 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 111)

Mehrere Syntypen, Oaxaca, Salina Cruz; Chiapas, Tonala; leg. HÖGE.

DEI: Syntypen: 2 Ex. Chiapas, Tonala; 3 Ex. Oaxaca, Salina Cruz; leg. HÖGE.

Syn. zu *macrocnema* CHAUDOIR, 1852.**batesi** HORN, 1892 (*Collyris*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 355)

♀ Holotypus, Ind. or., ex Coll. RICHTER; im DEI.

Syn. zu *bonellii* GUÉRIN, 1834.**batesi** HORN, 1900 (*Myrmecoptera*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 363)

Syntypen: 1 ♂, Africa orient. Britann., Stony Athi, leg. LE GROS; 2 Ex. dto. durch BATES, in Coll. HORN.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, durch BATES.

batesi HORN, 1892 (*Oxychila*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 89, 143)

♀ Holotypus, Sao Paulo; (durch STAUDINGER) im DEI.

Syn. zu *opacipennis* WATERHOUSE, 1889.**batesi** HORN, 1893 (*Oxygonia*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 195)

♀ Holotypus, Peru; im DEI.

Syn. zu *prodiga* ERICHSON, 1847.**beccarii** GESTRO, 1874 (*Tricondyla*)

(Ann. Mus. Genova, 6, 306)

Mehrere Syntypen, Borneo, Batang, Lupa, Sarawak, 1865–67, leg. DORIA und BECCARI.

DEI: 1 ♀ Syntypus, Borneo, Sarawak, 1865–66, ex Coll. DORIA.

Syn. zu *cyanipes* ESCHSCHOLTZ, 1829.**bellana** HORN, 1905 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 63)

Mehrere Syntypen, Vorder-Indien, Curachee, leg. BELL.

DEI: 2 Syntypen, Karachi, leg. BELL, ex Coll. ANDREWES. Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Curachee“ steht auf dem Etikett „Karachi“.

belli HORN, 1894 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 174)

Mehrere Syntypen, Vorder-Indien, Nord-Canara, Belgaum, leg. ANDREWES.

DEI: 3 Syntypen, Canara, 94, leg. ANDREWES (1 Ex. ohne Caput).

belloides HORN, 1907 (*Prothyma*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. 51, 311)

3 ♂♂, Syntypen, Ind. or., Kanara bor., Basti, 11. – 13. VI. 1907, leg. ANDREWES, in Coll. BELL, ANDREWES und HORN.

DEI: 1 ♂ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

beneshi VARAS ARANGUA, 1929 (*Cicindela*)

(Rev. chil. Hist. nat. 33, 504)

2 ♀♀, Syntypen, Mexico, Rocky Point, Estado de Sonora, VII. 1929, leg. BENESH, in Coll. VARAS ARANGUA.

DEI: 1 ♀ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

bennigseni HORN, 1897 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 61)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Deutsch-Ost-Afrika, Usaramo, leg. v. BENNIGSEN.

DEI: 1 ♀ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

bennigseni HORN, 1896 (*Myrmecoptera*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 58)

1 ♀, Ost-Afrika, leg. v. BENNIGSEN; 1 ♂, dto., durch STAUDINGER; im DEI: Syntypen.

***bennigsenia* HORN, 1901 (*Cicindela*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 357)

Mehrere Syntypen, Nova Guinea, am Fluß Herculis, 1901, leg. v. BENNIGSEN.

DEI: Syntypen: 3 Ex. Herculis Fl., leg. v. BENNIGSEN; 1 Ex. ohne Fundort, Coll. v. BENNIGSEN.

***bertolonii* (CHAUDOIR in litt.) HORN, 1899 (*Cicindela*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 52)

Mehrere Syntypen, Deutsch-Ost-Africa, Mozambique, Khutu, leg. v. BENNIGSEN.

DEI: 1 Ex. Mozambique; 5 Ex. Khutu; leg. v. BENNIGSEN; Syntypen.

Syn. zu *brevicollis* WIEDEMANN, 1823.***bianconi* BERTOLONI, 1858 (*Odontochelia*)**

(Mem. Acc. Sc. Inst. Bologna 8, 301, Taf. 23, Fig. 1)

Mehrere Syntypen; Mozambici, am Fluß Magnárria, Prov. Inhambanensis; Bononiae, 1848; in Coll. BERTOLONI.

DEI: 1 Syntypus, Mozambique.

***bicolor* HORN, 1902 (*Collyris*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 70)

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Tonkin, Mauson-Gebirge, 2000–3000 ft., IV. – V. 1900, leg. FRUHSTORFER; im DEI.

***bicostata* HORN, 1914 (*Dromica*)**

(Arch. Naturg. 79, A 11 (1913), 8)

♂ Holotypus, Süd Angola, leg. ERTL; im DEI.

***bicostulata* HORN, 1914 (*Dromica*)**

(Arch. Naturg. 79, A 11 (1913), 9)

♀ Holotypus, Angola, Bailundo, leg. ERTL; im DEI.

***bidentatum* HORN, 1892 (*Pogonostoma*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 65)

♂ Holotypus, Madagascar, ex Coll. RICHTER; im DEI.

Syn. zu *chalybaeum* KLUG, 1835.***bidentilabris* HORN 1934 (*Prothyma*)**

(Natur. Maandblad 23, 144, Fig.)

♂ Holotypus, Samoa, ex Coll. CASTELNAU-EDW., BROWN-EHLERS-V. DE POLL; im DEI.

***bigranifera* DOKHTOOROFF, 1882 (*Dilatotarsa*)**

(Rev. Ent. I, 114)

2 Syntypen, venant de l'île Mindoro.

DEI: 2 Syntypen, Ins. Maluques, ex Coll. DOKHTOOROFF.

Syn. zu *patricia* SCHAUM, 1861.***biguttula* ? *marginemaculata* HORN, 1934 (*Prothyma*)**

(Mém. Acad. Malgache 20, 25–26)

♂ Holotypus, Madagascar borealis, Reg. Nossibe, Diégo-Suarez, Vohémar; im DEI.

DEI: ♂ Holotypus, zwischen Nossi-be und Dagna Suarez, Volamar, JANSON.

Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Diégo-Suarez, Vohémar“, steht auf dem Etikett „Dagna Suarez, Volamar“.

***biguttula tricolorata* HORN, 1934 (*Prothyma*)**

(Mém. Acad. Malgache 20, 25, Fig. 22)

Mehrere Syntypen, Madagascar Sud, Ampandrandava, Bekily, I. 1933, Betroka, I. 1934, leg. SEYRIG, im Museum Paris und in Coll. HORN.

DEI: Syntypen: 12 Ex. S. Madagascar, Bekily, I. 1933, 2 ♂♂ Genitalien dto.; 1 Ex. Ampandrandava; leg. SEYRIG; 1 ♂, Betroka, südl. von Fianavantzoa, I. 1931, leg. OLSUFIEW, Coll. SEYRIG.

Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Betroka, I. 1934“, steht auf dem Etikett „Batroka, I. 1931“.

***biimpressa* HORN, 1937 (*Collyris*)**

(Ent. Bl. 33, 56–57)

2 ♀♀, Syntypen, Annam, Prov. Haut Donai, „Agr. Stat. of Blao“, 800 m, leg. POILANE, im National Museum Washington und in Coll. HORN.

DEI: 1 ♀ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 2. VII. 1933.

***biimpressicollis* MANDL, 1960 (*Megacephala*)**

(Beitr. Ent. 10, Nr. 1–2, 187–188)

♂ Holotypus, Brasilien, in Coll. HORN; 1 ♂ Paratypus, Bolivien, Guaranigebiet, leg. PELOTAS, in Coll. MANDL.

DEI: ♂ Holotypus, Brasilia.

bipunctata KRAATZ, 1890 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 368)

Mehrere Syntypen, ohne Fundort.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, Coll. KRAATZ.
Syn. zu *atrata* PALLAS, 1776.

bispinosum HORN, 1892 (*Pogonostoma*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 65)

♂ Holotypus, Madagascar, ex Coll. RICHTER; im DEI.
Syn. zu *chalybaeum* KLUG, 1835.

blackburni SLOANE, 1906 (*Cicindela*)
(Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 31, 342, Taf. 28, Fig. 27)

Mehrere Syntypen, S. W. Australia, Norseman District, leg. FRENCH, in Coll. FRENCH und Coll. SLOANE.
DEI: 1 Syntypus, S. W. Australia, Norseman.

blanchardi FAIRMAIRE, 1882 (*Cicindela*)
(In: RÉVOIL, Faune & Flore Comalis, Col., 4, Taf. 1, Fig. 2)

Mehrere Syntypen, meridionale-orientale Afrique.
DEI: 1 Syntypus, Somali, Quarsanguéllis, RÉVOIL, 1881.

bocandei GUÉRIN, 1848 (*Megacephala*)
(Rev. Zool. 11, 347)

Mehrere Syntypen, Port. Guinea, zwischen Rio Casamance und Rio San Domingo, 16° westl. Länge — 12°, 25 Min. nördl. Breite, 1837–1848, leg. BOCANDÉ.
DEI: Syntypen: 1 Ex. ohne Fundort, ex Coll. DOKHTOUROFF; 1 Ex. Casamance, ex Coll. V. DE POLL.

bocandei levisquamosa HORN, 1932 (*Megacephala*)
(Tijdschr. Ent. 75, 22–23)

♀ Holotypus, Katanga, Kinda, durch STAUDINGER & BANG-HAAS; im DEI.

bocandei overlaeti BURGEON, 1937 (*Megacephala*)
(Ann. Mus. Congo Belge Zool. (3) Sect. II 6, 12)

Holotypus, 25 Paratypen, Kafakumba, XII. 1930/I, XII. 1931/XII. 1932/XI. 1933/I. 1934, leg. OVERLAET, im Musée du Congo.
DEI: Kafakumba, leg. OVERLAET, XI. — XII. 1930/XI. 1933, ex Musée du Congo, 2 Paratypen.

bodongi HORN, 1914 (*Cicindela*)
(Ent. Mitt. 3, 316)

Mehrere Syntypen, Africa orientalis Portugalensis, Namibia, Inhambane, 29. II. — 11. V. 1914, leg. BODONG.
DEI: 11 Syntypen, Namibia, Inhambane, 29. II., 10., 11., 18. IV. 1914, leg. BODONG.

boisduvali HORN, 1896 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 152)

Holotypus, mehrere Paratypen, Nov. Guinea, Humboldt-Bay, IX. — X. 1893, leg. DOHERTY, in Coll. ROTHSCILD und Coll. HORN.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

bolivari HORN, 1897 (*Oxychila*)
(Not. Leyd. Mus. 19, 239)

2 ♂♂, Syntypen, Bolivia, Songo, in Coll. HORN [durch STAUDINGER]; im DEI.

borneana DOKHTOUROFF, 1883 (*Cicindela*)
(Rev. mens. Ent. 1, 11)

Mehrere Syntypen, Borneo, in Coll. DOKHTOUROFF.
DEI: 2 Syntypen, Borneo.
Syn. zu *crepignyi* BATES, 1871.

bostockii CASTELNAU, 1867 (*Tetracha*)
(Trans. Roy. Soc. Vict. 8, 36)

Mehrere Syntypen, Australien, Nickol Bay, leg. BOSTOCK.
DEI: 2 Syntypen, Nickol Bay, ex Coll. V. DE POLL.

bouchardi HORN, 1900 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 204)

♀ Holotypus, Sumatra, via BOUCHARD an HORN; im DEI.

boussingaultii GUÉRIN, 1843 (*Callidema*)
(Rev. Zool., 14)

Mehrere Syntypen, Cordilleren, Prov. Nouvelle-Grenade, am Paß Quindui, leg. GOUDOT.
DEI: 1 Syntypus, Columbien, leg. GOUDOT, ex Coll. V. DE POLL.

***brachycephala* HORN, 1893 (*Collyris*)**

(Ann. Mus. Genova, (2) 13, 379)

Mehrere ♀♀, Syntypen, Birmania, Bhamò, Carin-Chebà, Rangoon, leg. FEA, in Coll. FEA.

DEI: Syntypen, Birmania: 1 Ex. Carin-Chebà, 900–1100 m, 5. XII. 1888; 1 Ex. Bhamò, VIII. 1885; leg. FEA. Syn. zu *varitarsis* CHAUDOIR, 1860.***brachycephala* HORN, 1893 (*Collyris*)**

(Ann. Mus. Genova, (2) 13, 378)

1 ♂, 3 ♀♀, Syntypen, Birmania, Carin-Chebà, leg. FEA, in Coll. FEA.

DEI: 2 Syntypen, Carin-Chebà, 900–1100 m, 5. XII. 1888, leg. FEA.

Syn. zu *subtilis* CHAUDOIR, 1863.***brazzai* FLEUTIAUX, 1893 (*Cicindela*)**

(Bull. Soc. Ent. Fr., 32, Fig.)

Mehrere Syntypen, Congo.

DEI: 1 Syntypus, Congo, ex Coll. FLEUTIAUX.

***brevicollis* HORN, 1914 (*Collyris*)**

(Arch. Naturg. 79, A 11 (1913), 3)

Syntypen, N. Borneo: 1 ♂, Kini Balu; 1 ♂, Palembang, Muara-Doea, III. 1890, leg. KANNEGIER; ex Coll. v. DE POLL.

DEI: 1 ♂, Kini Balu, WATERSTRADT (Ex. sehr schlecht erhalten); 1 ♂, mit den Angaben der Beschreibung.

Fälschlicherweise als *brevithoracica* bezeichnet.***brevicollis* HORN, 1905 (*Tricondyla*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 152)

Holotypus, Vorder-Indien, Trichinopolis, leg. CASTETS.

DEI: Holotypus, Hindoustan merid., Trichinopolis, leg. CASTETS.

***brevicollis boreodilatata* HORN, 1929 (*Cicindela*)**

(Ent. Nachrichtenbl. 3, 7)

Mehrere Syntypen, Galla-Länder, Galana, Gandjule, leg. NEUMANN; Britisch-Ost-Afrika, Lombwua, leg. SANDBERG; im Museum Stockholm und in Coll. HORN.

DEI: 2 Ex. Britisch Ost-Afrika, Lombwua, leg. SANDBERG, ex Museum Stockholm; 4 Ex. Gandjule, II., 1 Ex. Galana; leg. NEUMANN: Syntypen.

***brevicollis herero* PÉRINGUEY, 1893 (*Cicindela*)**

(Trans. S. Afr. Phil. Soc. 7, 34)

Mehrere Syntypen, South Africa, Damaraland.

DEI: 1 Syntypus, Damara, durch DE VILDER, ex. Coll. PÉRINGUEY.

***brevicollis obliquigraciliaenea* HORN, 1920 (*Cicindela*)**

(Ark. Zool. 13, no. 11, 13, 14, 16)

Mehrere Syntypen, Australien, Kassai-Land, Kondue, leg. LUJA, im schwedischen Reichsmuseum.

DEI: 5 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

***brevicollis peezi* MANDL, 1956 (*Cicindela*)**

(Ent. Arb. Mus. FREY 7, 395–396)

♂ Holotypus, S. Afrika, Cape-Prov. False-Bay, 6. XI. 1953, leg. PEEZ; 4 Paratypen, dto. 29. X./26. XI. 1953.

DEI: 2 Paratypen, S. Afrika, Cape, Fish-Hoek, 26. X. 1953 (nicht 26. XI.), leg. PEEZ.

***brevicollis persicola* HORN, 1934 (*Cicindela*)**

(Vereinschr. Ges. Lux. Naturf. Nr. 6, 7, 8, 9, 10, 71, Separat Abdruck)

♀ Holotypus, Ost-Persien, 7 km nordöstl. von Kirman (Kerman), 20. VIII. 1931, leg. BECKER; im DEI.

***brevicollis pseudodistans* HORN, 1939 (*Cicindela*)**

(Journ. East Afr. Uganda Nat. Hist. Soc. 14, 152–153)

1 ♂, 3 ♀♀, Syntypen, Lake Magadi, III. 1938, leg. v. SOMEREN, im Coryndon Museum und in Coll. HORN.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

***brevicorne* HORN, 1898 (*Ctenostoma*)**

(Rev. Cic., 29)

♀ Holotypus, Brasil. (?), leg. HÖGE, Coll. BRAUNS; im DEI.

***brevicorne* HORN, 1898 (*Pogonostoma*)**

(Rev. Cic., 21)

2 ♀♀, Syntypen, Madagascar, Nossi-Bé.

DEI: 1 ♀ Syntypus, Madagascar, Nossi-Bé, leg. DONCKIER.

***breviformis* HORN, 1904 (*Euryoda*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 85)

Mehrere Syntypen, Antongil-Bay, leg. MOCQUERYS, in den Sammlungen von Paris und London.

DEI: 8 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

brevilabre HORN, 1931 (*Ctenostoma*)

(Rev. Chil. Hist. Nat. 35, 101—102, Fig.)

Holotypus, Prov. Brasiliensi Sao Paulo, Est. S. Paulo, Matto do Governo, 16. XII. 1928, leg. MELZER; im DEI.

brevilabris HORN, 1893 (*Collyris*)

(Ann. Mus. Genova (2) 13, 381)

2 Syntypen, Birmania, Carin Chebà, leg. FEA, in Coll. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Carin Chebà, 900—1100 m, 5. XII. 1888, leg. FEA.

brevilunata HORN, 1926 (*Cicindela*)

(Ent. Bl. 22, 168—169)

Syntypen; 1 ♀, N. Zealand, ex Coll. SHARP, im Britischen Museum; 1 ♂, Honkianga, ex Coll. Mus. Britann., in Coll. HORN; 1 ♀, N-Seeland, in Coll. HORN.

DEI: 1 ♂, 1 ♀, Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, ex BROWN Coll. Brit. Mus. 1922—482.

brevinuda HORN, 1907 (*Dromica*)

(Stett. Ent. Ztg. 68, 332)

Mehrere Syntypen, D. O. Afrika, Kigonsera, 1904—05, leg. ERLT.

DEI: 1 Syntypus, Kigonsera, 1904, leg. ERLT.

Syn. zu *egregia* GERMAR, 1843.**brevipalpis** HORN, 1926 (*Cicindela*)

(Ent. Mitt. 15, 77)

2 ♂♂, 1 ♀, Syntypen, Süd-Matto Grosso, Grasfelder der „Vacarias“, XII. 1922, durch JOHN, HORACE, LANE entdeckt; in Coll. HORN.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Matto Grosso, Vacaria, XII. 1922.

brevipennis HORN, 1901 (*Archicollyris*)

(Rev. Cic., 44)

♀ Holotypus, Prov. Bombay merid.; im DEI.

brevipennis HORN, 1907 (*Odontochila*)

(Stett. Ent. Ztg. 68, 327)

♂ Holotypus, Brasilia, Matto Grosso, Cuyaba; (durch STAUDINGER) im DEI.

brevipilosa HORN, 1908 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 33)

2 ♂♂, Syntypen, China bor., Chantung, Fang-tse, Coll. SPLICHAL.

DEI: 1 ♂ Syntypus, China, Fang-tse, Coll. SPLICHAL.

brevipilosa kaiyaensis KANO & CHO, 1933 (*Cicindela*)

(Chosen n. H. Soc. 15, 11)

♂ Holotypus, Central Korea, Kaiya nahe Kosengun, 25. VII. 1931, leg. CHO; 1 ♀, dto.; in Coll. TADAO KANO; 5 ♂♂, 2 ♀♀, dto. 1. VIII. 1931, in Coll. CHO: Paratypen.

DEI: 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung, 1. VIII. 1931.

brevipilosa klapperichi MANDL, 1942 (*Cicindela*)

(Mitt. Münch. Ent. Ges. 32, Nr. 1, 87—89)

35 Syntypen, Südchina, Fukien, am Fluß Shaowu und Kwangtse, 500 m, V.—VIII., im Museum ALEXANDER KOENIG und in Coll. MANDL.

DEI: Syntypen: 1 Ex. Fukien, Kwangtse, 1. VIII. 1937; 1 Ex. Fukien, Shaowu, 500 m, 15. V. 1937; leg. KLAPPERICH.

brevipronotalis HORN, 1929 (*Collyris*)

(Ztschr. Insbiol. 24, 18—19)

♀ Holotypus, Tonkin, Chapa, 8. V. 1918, leg. JEANVOINE; im DEI.

brevisexstriata HORN, 1922 (*Cicindela*)

(Zool. Meded. 7, 105)

♀ Holotypus, Ganale inferior, Africa bor. or.; im DEI.

browni HORN, 1893 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 336)

Mehrere Syntypen, Neu-Seeland.

DEI: 1 Syntypus, Neu-Seeland, 1891, leg. REISCH, ex Coll. Wien. Museum.

Syn. zu *campbelli* BROWN, 1886.Diese Art wurde von HORN (D. E. Z., 97; 1892) irrtümlich für *perphisvida* BROWN gehalten.**browni** SLOANE, 1913 (*Cicindela*)

(Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 38, 401)

Mehrere Syntypen, West Australia, Lake Austin, nahe Cue, 5., 11. IV., leg. BROWN.

DEI: 1 Syntypus, West Australia, Lake Austin, leg. BROWN.

bryanti HORN, 1922 (*Collyris*)
(Treubia 3, 114)

♂ Holotypus, occid. Sarawak, Quop, 10. III. 1914, leg. BRYANT, in Coll. HORN; im DEI.

bryanti HORN, 1922 (*Therates*)
(Zool. Meded. 7, 97–98)

2 ♀♀, Syntypen, Borneo occid., Quop, 6.–8. IV. 1914, leg. BRYANT, in Coll. BRYANT und in Coll. HORN.
DEI: 1 ♀ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, W. Sarawak, 8. IV. 1914.

bucephala HORN, 1900 (*Euryoda*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 199)

Mehrere ♀♀, Syntypen, Madagascar, Antongil-Bay, leg. MOCQUERYS.
DEI: 2 ♀♀, Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

bucephala HORN, 1909 (*Megacephala*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 284)

Mehrere Syntypen, Argentinien, Tukiman, 28. I. 1899, leg. GIRARD, Santiago del Estero, leg. STEINBACH.
DEI: Syntypen, Argentinien: 2 Ex. Santiago del Estero, leg. STEINBACH und MOSER; 1 Ex. Tukiman, 28. XI. 1899 (nicht 28. I. 1899), leg. GIRARD, ex Coll. DONCKIER.

californica mojavi CAZIER, 1937 (*Cicindela*)
(Pan-Pacific Ent. 13, 116)

♂ Holotypus, 8 Ex. California, Saltdale, Mojave, 19. VI. 1932, leg. MCCLAY und SLOOP, in Coll. CAZIER; 2 Ex. dto. in der California Academy of Sciences und 7 Ex. in Coll. MCCLAY; Paratypen.
DEI: 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

campestris calabrica MANDL, 1944 (*Cicindela*)
(Koleopt. Rundsch. 30, Nr. 1–3, 8–9)

Holotypus, mehrere Paratypen, Aspromonte, Kalabrien, leg. PAGANETTI, in Coll. MANDL und im DEI.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

campestris corsicana ROESCHKE, 1891 (*Cicindela*)

(In: HORN & ROESCHKE, Mon. pal. Cic., 67, 74, Taf. 2, Fig. 9b)

Mehrere Syntypen, Nizza, Korsika, Sardinien und die kleineren nahe gelegenen Inseln, wie San Pietro, „Fern vom Meer“, IV., V.

DEI: Syntypen: 1 Ex. Korsika, Damry, ex Coll. SRNKA; 1 Ex. ohne Fundort.

campestris pseudomaroccana ROESCHKE, 1891 (*Cicindela*)

(In: HORN & ROESCHKE, Mon. pal. Cic., 70, Taf. 2, Fig. 6f)

Mehrere Syntypen, Süd-Ost Frankreich, nicht fern vom Meere, zwischen Marseille und Nizza und bis in die französischen Alpen, hart an der Schweizergrenze im Thale der Duranee bei Briançon und Sisteron.

DEI: Syntypen: 1 Ex. St. Martin, Lautosc (nicht lesbar!); 1 Ex. Marseille, leg. PERRET.

camposi HORN, 1925 (*Odontochila*)

(Rev. Chil. Hist. Nat. 29, 183)

♂ Holotypus, Ecuador occidentalis, San Rafael, Barvaganetal, 200 m, leg. CAMPOS; im DEI.

camposi HORN, 1900 (*Tetracha*)

(Ent. Nachr. 26, 54)

Mehrere Syntypen, Ecuador, Posorja, leg. CAMPOS.

DEI: 7 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

carinifrons HORN, 1901 (*Neocollyris*)

(Rev. Cic., 47)

♀ Holotypus, China, Ho-chan; im DEI.

carissima FLEUTIAUX, 1919 (*Cicindela*)

(Bull. Soc. Ent. Fr., 127)

Mehrere Syntypen, Laos, Pak Lay, Mékong, Luang-Prabang, VIII. 1918, leg. VITALIS DE SALVAZA.

DEI: 1 Syntypus, Laos, Pak Lay, 10. VIII. 1918, leg. VITALIS DE SALVAZA.

catoptroides HORN, 1892 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 78)

♀ Holotypus, Sumatra, ex Coll. RICHTER; im DEI.

celeripedestris HORN, 1896 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 357)

♂ Holotypus, Minas Geraes; (ex Coll. RUGGE) im DEI.

***centropunctata* HORN, 1934 (*Prothyma*)**

(Mém. Acad. Malgache 20, 23)

Mehrere Syntypen, N.-W. Madagascar, Ramena, Sambirano, Antsera-Ambobaka, III. 1933/I. — II. 1934, leg. MELLIS.
 DEI: Syntypen, N.-W. Madagascar; 2 Ex. I. — II. 1933, 24 Ex. Ramena, Sambirano, Antsera-Ambobaka, leg. MELLIS.

***ceylonensis* HORN, 1892 (*Cicindela*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 87)

Mehrere Syntypen, Ceylon.
 DEI: 3 Syntypen, Ceylon, leg. SCHLÜTER.

***chamaelon* HORN, 1892 (*Oxygoniola*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 71)

1 ♂, 1 ♀, Celebes, leg. RIBBE, ex Coll. RICHTER; 1 ♂, im DEI: Syntypen.
 DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, BÖNTHAIN, 1882.

***championi* BATES, 1881 (*Odontocheila*)**

(Biol. Centr. Amer. Col. 1, 16)

Mehrere Syntypen, Guatemala, Zapote, leg. CHAMPION.
 DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

***chaudoiri* BALLIÖN, 1870 (*Cicindela*)**

(Bull. Moscou 46, 322)

Mehrere Syntypen, Umgebung von Kapal, unweit der chinesischen Grenze.
 DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
 Syn. zu *granulata* GEBLER, 1843.

***chaudoiri* HORN, 1892 (*Collyris*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 362)

Holotypus, Mindanao; (durch STAUDINGER) im DEI.

***chaudoiri* DOKHTOUROFF, 1887 (*Odontocheila*)**

(Ann. Soc. Ent. Belg. 31, 157)

♂ Holotypus, Brésil, Petropolis, via SAHLBERG an HORN.
 DEI: ♀ Holotypus, ohne Fundort.
 Syn. zu *procera* CHAUOIR, 1860.

***chaudoiri* HORN, 1894 (*Oxychila*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 111)

♂ Holotypus, Chiriqui; (durch STAUDINGER) im DEI.

***chaudoiri* HORN, 1895 (*Procephalus*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 353)

♀ Holotypus, Brasilia; im DEI.

***chaudoiri* DOKHTOUROFF, 1882 (*Pseudoxychila*)**

(Spec. Cic. 1, 89)

2 Syntypen, Equateur, in Coll. DOKHTOUROFF.
 DEI: 1 Syntypus, Equator.
 Syn. zu *bipustulata* LATREILLE, 1811.

***chaudoiri rariussculpta* HORN, 1929 (*Collyris*)**

(Ent. Nachrichtenbl. 3, 4)

Mehrere Syntypen, Insel Samar, 23. V. 1921/25. V. 1924, leg. BAKER und GREGOR, im National-Museum Washington und in Coll. HORN.
 DEI: 2 Syntypen, Island Samar, leg. BAKER.

***chevolati* HORN, 1892 (*Cicindela*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 371)

♂ Holotypus, Yucalan, ex Coll. FLEUTHAUX; im DEI.
 Syn. zu *cyaniventris* CHEVOLAT, 1834.

***chevolati* HORN, 1894 (*Collyris*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 16)

♀ Holotypus, Insel Andaman [leg. DONKIER]; im DEI.
 Syn. zu *schaumi* HORN, 1892.

***chevolati* GUÉRIN, 1838 (*Collyris*)**

(Mag. Zool., 225, Taf. 225, Fig. 1a—c)

Mehrere Syntypen, Java.
 DEI: 1 Syntypus, Java, ex Coll. v. DE POLL.
 Syn. zu *tuberculata* M'LEAY, 1825.

chiapana BATES, 1890 (*Cicindela*)

(Trans. Ent. Soc. London, 505)

Mehrere Syntypen, Mexico: Tapachula in Chiapas, La Noria in Sinaloa, leg. HÖGE; Guatemala, leg. CHAMPION; near the city, leg. SALVIN.

DEI: 2 Syntypen, Tapachula, Chiapas, leg. HÖGE.

Syn. zu *flavopunctata* CHEVROLAT, 1834.

chilensis THOMSON, 1857 (*Tetracha*)

(Mon. Cic. 1, 34, Taf. 6, Fig. 1)

30 Syntypen, Pérou und Chili, in Coll. THOMSON.

DEI: 1 Syntypus, Lima, Coll. FLEUTHAUX.

Syn. zu *carolina* LINNÉ, 1766.

chiriquina excisipenis HORN, 1932 (*Odontochila*)

(Rev. Ent. 2, 408–409)

Mehrere Syntypen: Ecuador, Cachabé, XII. 1896, Queredo, 100 m, leg. CAMPOS; West-Columbia, Juntas, Rio Dagua, 400 m, leg. FASSL; Columbia, Rio Dagua, leg. ROSENBERG; Bolivia, Santos Marcos, 2000 m.

DEI: Syntypen: Ecuador occid., 3 Ex. Cachabé, 1896, leg. ROSENBERG, 1 Ex. dto., low c. XII. 1896, 1 Ex. Queredo, 100 m, leg. CAMPOS; 1 Ex. Columbian, Rio Dagua, leg. ROSENBERG, 2 Ex. Juntas, Rio Dagua, 400 m, leg. FASSL, 1 Ex. ex Coll. BADEN, RUGE, 2000 m.

chloe DOKHTOUROFF, 1887 (*Cicindela*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. 31, 156)

Holotypus, Indes orientales; im DEI.

Syn. zu *chloropleura* CHAUDOIR, 1865.

chrysochroa DOKHTOUROFF, 1882 (*Tetracha*)

(Spec. Cic. 1, 41)

3 Syntypen, Pérou, in Coll. DOKHTOUROFF.

DEI: 2 Syntypen, Peru, ex Coll. DOKHTOUROFF.

Syn. zu *carolina* LINNÉ, 1766.

chrysopyga HORN, 1892 (*Odontochila*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 70)

♂ Holotypus, West-Afrika?, ex Coll. RICHTER.

DEI: ♂ Holotypus, ohne Fundort, ex Coll. RICHTER.

cicindeloides HORN, 1905 (*Odontochila*)

(Stett. Ent. Ztg. 66, 279)

♂ Holotypus, bor. Madagascar, Montes Ambre, leg. HEYNE; im DEI.

cinctula BATES, 1881 (*Odontochila*)

(Biol. Centr. Amer. Col. 1, 16)

Mehrere Syntypen, Guatemala, Zapote, leg. CHAMPION.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, ex Museum Berlin.

Syn. zu *ignita* CHAUDOIR, 1860.

circumcincta CASTELNAU, 1867 (*Cicindela*)

(Trans. Roy. Soc. Victoria 8, 34)

Mehrere Syntypen, Australien, Brisbane, Clarence River, Eastern Creek, Queensland, New Caledonia; leg. THOUZET.

DEI: Syntypen: 1 Ex. Queensland; 1 Ex. Brisbane; 1 Ex. Clarence River; ex cab. CASTELNAU.

Syn. zu *semicincta* BRULLÉ, 1834.

circumpictoides HORN, 1900 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 207)

♂ Holotypus, „Oceania“ [leg. WITTE]; im DEI.

clavicornis HORN, 1902 (*Therates*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 73)

Mehrere Syntypen, Tonkin, Montes Mauson, IV. – V. 1900, 2–3000', leg. FRUHSTORFER.

DEI: 5 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

clavipalpis HORN, 1901 (*Neocollyris*)

(Rev. Cic., 50)

♂ Holotypus, Borneo, ex Coll. RICHTER; im DEI.

cochinchinensis HORN, 1914 (*Collyris*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. 58, 137)

♀ Holotypus, Cochinchine, Stieng, ex Coll. CASTELNAU-Coll. BROWN-Coll. V. DE POLL; im DEI.

coerulea LUCAS, 1857 (*Tetracha*)

(Voy. Cast., 28, Taf. 1, Fig. 5b, c)

Mehrere Syntypen, Amérique mérid.

DEI: 1 Syntypus, Amérique mérid., durch CASTELNAU, 1845, ex Museum Paris.

***coerulea selengensis* MANDL, 1936 (*Cicindela*)**

(Arb. morph. tax. Ent. 3, Nr. 1, 12—13)

Mehrere Syntypen, Selengatal, Selengafe, Aksu Musart, Thian Schan, in Coll. HORN und Coll. MANDL.
 DEI: 6 Ex. Transbaicalia, Selengatal, V.—VI. 1908, ex Coll. LEONHARD; 1 Ex. Transbaic., Selengafe; 2 Ex. Thian Schan, Aksu Musart, ex Coll. WINKLER: Syntypen.

***colmanti* HORN, 1899 (*Cicindela*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 381)

Mehrere Syntypen, Africa centr., nahe Surango, non procul a flumine Uellé, V., VI., X., leg. COLMANT.
 DEI: 1 ♂, Syntypus, Surango, rive gauche d l'Uellé, leg. COLMANT.

***compressicollis* HORN, 1909 (*Collyris*)**

(Ann. Soc. Ent. Belg. 53, 445)

♂ Holotypus, Assam; im DEI.

***concinna* CHAUDOIR, 1860 (*Derocrania*)**

(Bull. Moscou 33, 2, 298)

Mehrere Syntypen, Ceylon, im Museum Berlin.
 DEI: 1 Syntypus, Ceylon, durch NIETNER, ex Museum Berlin.

***confluens* KRAATZ, 1890 (*Cicindela*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 368)

Mehrere Syntypen, ohne Fundort.
 DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, Coll. KRAATZ.
 Syn. zu *atrata* PALLAS, 1776.

***confluens* HORN, 1893 (*Cicindela*)**(Dtsch. Ent. Ztschr., 197; nom. praeocc., = *confluensignata* HORN, 1915, Gen. Ins. Cic., 407)

♀ Holotypus, Minas Geraes [durch STAUDINGER]; im DEI.

***confluentsculpta* HORN, 1913 (*Dromica*)**

(Rev. Zool. Afr. 2, 275)

Syntypen, Belg. Congo: 1 ♂, Kapoya, 12. XI. 1911; 1 ♀, Tekanini, 16. XI. 1911; leg. BEQUAERT; im Musée du Congo.
 DEI: 1 ♀ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

***confusa* BASILEWSKY, 1954 (*Cratohaerea*)**

(Rev. Zool. Bot. Afr. 50, 345—355)

♂ Holotypus, Lualaba, Tshibalaka, Region Lulua, 9. XI. 1933, leg. OVERLAET, im Musée Royal du Congo Belge; mehrere Paratypen, Lualaba, Maniema, Tanganika, im Musée Royal du Congo Belge und im Institut Royal des Sciences naturelles à Bruxelles.
 DEI: 1 Paratypus, Lulua, Kapanga, X. 1933, leg. OVERLAET.

***congoana* MANDL, 1964 (*Neochila*)**

(Rev. Zool. Bot. Afr. 69, 304)

♂ Holotypus, (No 535), Lualaba, Kakanda (Mutaka), XII. 1953, leg. DE CATER, im Musée Royal de l'Afrique Centrale, Tervuren; Paratypen: 1 ♂ (No 537), 1 ♀ (No 541), N. Rhodesia, Abercon, X.—XI. 1946, 1 ♂ (No 536), Katanga, La Kipushi, XI. 1931, 1 ♂ (No 538), P.N.U. Kakanda (Mutaka), XII. 1953; leg. CATER; 1 ♂ (No 540), Lubudi, X. 1931, leg. SEYDEL; 1 ♀ (No 542), Kipiri, IX. 1912, Miss. Agric; im Musée Royal de l'Afrique Centrale; 1 ♀ (No 554), Elisabethville, VI. 1948, leg. PANTOS, in Coll. MANDL; 1 ♂ (No 555), Mufungwa, 1.—16. XII. 1911, leg. BEQUAERT, im DEI.
 DEI: 1 ♂ Paratypus (No 555) Belg. Congo, mit den Angaben der Beschreibung.

***conjuncta* KRAATZ, 1890 (*Cicindela*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 368)

Mehrere Syntypen, ohne Fundort.
 DEI: Syntypen: 1 Ex. Astrachan, leg. HENKE; 1 Ex. ohne Fundort, Coll. KRAATZ.
 Syn. zu *atrata* PALLAS, 1776.

***connexa* PÉRINGUEY, 1893 (*Cosmema*)**

(Trans. S. Afr. Phil. Soc. 7, 90)

Mehrere Syntypen, South Africa, Natal, Frere.
 DEI: Syntypen, Natal: 3 Ex. Escourt; 2 Ex. Frere; 1 Ex. ohne Fundort, Nr. 29; ex Coll. PÉRINGUEY.
 Syn. zu *alboclavata* DOKHTOUROFF, 1883.

***conradti* HORN, 1894 (*Cratohaerea*)**

(Ent. Nachr. 20, 246)

♀ Holotypus, Togo, leg. CONRADT; im DEI.
 Syn. zu *chrysopyga* HORN, 1892.

***constricticollis* HORN, 1914 (*Cicindela*)**

(Arch. Naturg. 79, A 11 (1913), 18)

1 ♂, 2 ♀♀, Syntypen, Madagascar, Ambositra, Coll. LE MOULT; im DEI.

24 Beitr. Ent. 23, H. 5/8

***constricticollis* HORN, 1909 (*Collyris*)**

(Rec. Ind. Mus. 3, 259)

2 ♀♀, Syntypen, Borneo, Martapura, 1891, leg. DOHERTY, ex. Coll. SHARP; in Coll. HORN und im Britischen Museum.
 DEI: 1 ♀ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

***convergentefrontalis* HORN, 1923 (*Collyris*)**

(Zool. Jahrb. 47, Abt. Syst., 316)

♀ Holotypus, Tonkin, prov. Laokay, Chapo, leg. LE MOULT; im DEI.

***convexoabrupticollis* HORN, 1931 (*Cicindela*)**

(Ver. Ges. Lux. Naturf., 1–2 [Separat-Abdruck])

♂ Holotypus, Afrika, Oubangui, Yalinga, leg. LE TESTU; [Montblanc, 1930] im DEI.

***cophognatoides* HORN, 1914 (*Oxychila*)**

(Arch. Naturg. 79, A 11 (1913), 6)

♂ Holotypus, Santo Catharina, Piraly, II. 1910, leg. SCHMALZ; im DEI.

***corbetti* HORN, 1899 (*Cicindela*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 53)

2 ♂♂, Syntypen, Birma, Tharrawaddy, leg. ANDREWES und CORBETT.
 DEI: 1 ♂, Syntypus, Tharrawaddy, Thrudy, leg. ANDREWES.

***cosmemoides* HORN, 1914 (*Cicindela*)**

(Arch. Naturg. 79, A 11 (1913), 20)

♂ Holotypus, Südost Angola; im DEI.

***crassipalpis* HORN, 1908 (*Cicindela*)**

(Rec. Ind. Mus. 2, 410)

1 ♂, 2 ♀♀, Syntypen, Oriental Region, Coimbatore distr., Potanur, X. 1907, 1.000 ft., leg. Capt. WELT DOWNING
 in Coll. ANDREWES, Capt. DOWNING und in Coll. HORN.
 DEI: 1 Syntypus, Potanur, Akhela, leg. DOWNING, ex Coll. ANDREWES.

***crebrepunctatus* HORN, 1923 (*Therates*)**

(Ent. Meddel. 14, 215)

♂ Holotypus, Birma superior, Namtu, V. 1905; im DEI.

***crebrepunctatus* HORN, 1923 (*Therates*)**

(Zool. Jahrb. 47, Abt. Syst., 317)

♂ Holotypus, Borneo; im DEI.
 Syn. zu *erinyes* BATES, 1874.

***cribrata* BRULLÉ, 1837 (*Cicindela*)**

(Voyage Orbigny, Ins. Col., 9)

Mehrere Syntypen, Bolivia, am Fluß Mamore, Prov. Moxos, leg. ORBIGNY.
 DEI: Syntypen: 1 Ex. Bolivia, ex cab. THOMSON-Coll. V. DE POLL; 1 Ex. Bolivia, Coll. FLEUTIAUX (sehr schlecht erhalten).

***cribripennis* THOMSON, 1857 (*Collyris*)**

(Arch. Ent. 1, 133)

2 Syntypen, Borneo, Sarawak, ex Coll. BATES, im DEI.
 DEI: 1 Syntypus, Borneo, ex cab. THOMSON-Coll. BROWN-Coll. V. DE POLL.
 Syn. zu *diardi* LATREILLE, 1822.

***crista-galli* HORN, 1935 (*Cosmema*)**

(Natur. Maandbl. 24, 101)

♀ Holotypus, Südost-Kap-Kolonie, Port Grosvenor; im DEI.

***crucifrons* HORN, 1911 (*Ctenostoma*)**

(Ent. Bl. 7, 154)

♂ Holotypus, Peru, Tarapoto, IV. – V. 1885, leg. MATHAN; im DEI.

***cruentata* HORN, 1894 (*Collyris*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 224)

2 ♀♀, Syntypen, Borneo und Java.
 DEI: 1 ♀, Borneo; 1 ♀ Java-Tisolack, Preanger; durch STAUDINGER: Syntypen.
 Syn. zu *bonellii* GUÉRIN, 1834.

***curacaoica* VAN DE POLL, 1886 (*Tetracha*)**

(Not. Leyd. Mus. 8, 225)

Mehrere Syntypen, Indes occident., Curaçao, Brievengat, 1885, leg. JANVIER und FÉRRIER.
 DEI: 3 Syntypen, Curaçao, Brievengat, 1885, ex Coll. V. DE POLL.
 Syn. zu *affinis* DEJEAN, 1825.

***curvicolis* SLOANE, 1905 (*Cicindela*)**

(Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 30, 233)

Mehrere Syntypen, N. W. Australia, via FRENCH an SLOANE, in Coll. SLOANE.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, in Coll. SLOANE.

Syn. zu *mastersi* CASTELNAU, 1867.***curvipenis* HORN, 1905 (*Odontochila*)**

(Not. Leyd. Mus. 25, 220)

Mehrere ♂♂ Syntypen, Amazon, Maices, in Coll. HORN.

DEI: 1 ♂, Amaz. Str., 1 ♂, Maices, durch STAUDINGER, 2 ♂♂, ohne Fundort: Syntypen.

***cyanea brunnea* DOKHTOUROFF, 1883 (*Tricondyla*)**

(Rev. mens. Ent. 1, 13)

Mehrere Syntypen, Sumatra, in Coll. DOKHTOUROFF.

DEI: 1 Syntypus, Sumatra.

***cyanea paradoxa* HORN, 1892 (*Tricondyla*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 371)

♀ Holotypus, Borneo, ex Coll. RICHTER; (WAHNES) im DEI.

***cyaneipalpis* HORN, 1923 (*Collyris*)**

(Zool. Jahrb. 47, Abt. Syst., 315)

♀ Holotypus, Nilgiri Hills, via ANDREWES an HORN, 1921; im DEI.

***cyanella pseudomargineguttata* HORN, 1930 (*Odontochila*)**

(Rev. Chil. Hist. Nat. 34, 310—311)

2 ♀♀, Syntypen, Brasilia, Cayenne; im DEI.

***cyaneomarginata* HORN, 1900 (*Odontochila*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 203)

Mehrere Syntypen, Espirito Santo, Rio Janeiro (San Fidelis), Minas Geraës (Philadelphia).

DEI: Syntypen: 1 ♀, St. Espirito; 1 ♂, 1 ♀, Brasil, Minas Geraës, 1897, ex Coll. FRUHSTORFER; 1 Ex. Philadelphia, leg. HAENSCH; 1 ♂, S^o. Antonio dos Brotos, Districto de San Fidelis, Prov. Rio de Janeiro, Brésil, 1876—1882, leg. DE LYON.***cyanescens* DOKHTOUROFF, 1882 (*Megacephala*)**

(Spec. Cic. 1, 29)

2 Syntypen, Sénégal, in Coll. DOKHTOUROFF.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, ex Coll. DOKHTOUROFF.

Syn. zu *megacephala* OLIVIER, 1790.***cyanipes elongata* HORN, 1906 (*Tricondyla*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 32)

Mehrere Syntypen, Mindanao, Mindoro.

DEI: 2 Syntypen, Mindanao, durch STAUDINGER, ex Coll. RUGE.

***cyndricoflavescens* HORN, 1922 (*Odontochila*)**

(Zool. Meded. 7, 101)

Mehrere Syntypen, Bolivia, Mapiri, durch STAUDINGER, in Coll. HORN.

DEI: 6 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

***cyndrifformis* HORN, 1912 (*Cicindela*)**

(Ent. Mitt. 1, 135)

Mehrere Syntypen, Formosa, Kosempo, 1.—31. V. 1908, Taihanroku, 7.—15. VI. 1908; leg. SAUTER.

DEI: 3 Syntypen, Taihanroku, 7.—15. VI. 1908, leg. SAUTER.

***damarensis* PÉRINGUEY, 1893 (*Mantichora*)**

(Trans. S. Afr. Phil. Soc. 7, 13)

Mehrere Syntypen, South Africa, Damaraland, nahe Lake N'Gami.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, Nr. 14.

Syn. zu *latipennis* WATERHOUSE, 1837.***darwini* SLOANE, 1909 (*Cicindela*)**

(Proc. Linn. Soc. N.S. Wales 34, 299)

Mehrere Syntypen, Australia, Port Darwin, leg. DODD, in Coll. SLOANE und Coll. HORN.

DEI: 1 Syntypus, Port Darwin, leg. DODD.

***daurica* MOTSCHULSKY, 1844—1845 (*Cicindela*)**

(Ins. Sib., 33)

40 Syntypen, Gebiet von Baical-Mongolei, bei Selenguinsk.

DEI: 1 Syntypus, Kjachta, ex cab. BROWN-Coll. v. DE POLL.

dauidis FAIRMAIRE, 1887 (*Cicindela*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. 31, 88 (nec HORN, Dtsch. Ent. Ztschr., 94; 1895))
 Mehrere Syntypen, China, Moupin, durch DAVID.
 DEI: 2 Syntypen, Mou-pin, 1870, durch DAVID.

debilis BATES, 1890 (*Cicindela*)

(Trans. Ent. Soc. London, 504, Taf. 16, Fig. 12)
 Mexico, Ciudad in Durango, leg. HÖGE, mehrere Syntypen.
 DEI: 3 Syntypen, Mexico, Durango city, leg. HÖGE.

decemmaculata DOKHTOUROFF, 1885 (*Cicindela*)

(Horae Soc. Ent. Ross. 19, 277)
 Holotypus, Turkestan, Tschaar-tasch; im DEI.
 Syn. zu *granulata* GEBLER, 1843.

declivis HORN, 1900 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 364)
 2 ♂♂, 1 ♀, Nov. Guinea, Bismarck Archip., Gazelle, Montes Baining, leg. v. BENNIGSEN, in Coll. HORN und Coll. v. BENNIGSEN; Syntypen; im DEI.

dejeani HORN, 1895 (*Collyris*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 82)
 ♂ Holotypus, China; im DEI.
 Syn. zu *crassicornis* DEJEAN, 1825.

delavayi FAIRMAIRE, 1886 (*Cicindela*)

(Le Natural. 8, 223)
 Mehrere Syntypen, Yunnan.
 DEI: 1 Syntypus, Yunnan, ex Coll. FLEUTIAUX.

densepunctata HORN, 1909 (*Dromica*)

(Ent. Rundsch. 26, 101)
 2 ♀♀, Syntypen, N. O.-Rhodesia, S. O. Katanga, Serenje District, 4000'', 4500'', 11., 25. XII. 1907, leg. NEAVE.
 DEI: 1 ♀ Syntypus, N. E. Rhodesia, Serenje Distr., about 4.500 ft, 24. u. 25. XII. 1907, Coll. NEAVE, Nr. 230, ex Britischen Museum.

denticollis HORN, 1895 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 88)
 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Nov.-Guinea; im DEI.

dentifrons HORN, 1901 (*Ctenostoma*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 353)
 ♂ Holotypus, Brasil., Espirito Santo, MICHAELIS; im DEI.

denudata HORN, 1935 (*Cicindela*)

(Nov. Guinea, Leide, 17, Zool., 301)
 1 ♂, 2 ♀♀, Syntypen, Neu-Guinea, Kokoda, 1200 Fuß hoch, IV., V. 1933, leg. CHEESMAN; im Britischen Museum und in Coll. HORN.
 DEI: 1 Syntypus, Papua, Kokoda, 1200 ft., IV. 1933, leg. CHEESMAN, ex Britischen Museum, 1933—427.

deserticoloides CODINA, 1931 (*Cicindela*)

(Bol. Soc. ent. Esp. 14, 161)
 3 ♂♂, 2 ♀♀, Holotypus und Paratypen, Spanien, Albatera (Alicante), 24. VIII. 1931, im Museo de Ciencias Naturales de Barcelona und im DEI.
 DEI: 2 ♂♂, 2 ♀♀, Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

desgodinsii FAIRMAIRE, 1887 (*Cicindela*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. 31, 87)
 Mehrere Syntypen, China, Yunnan, Thibet, leg. DELAVAY und CHASLE.
 DEI: 1 Syntypus, Thibet, ex Coll. OBERTHÜR-Coll. FLEUTIAUX-Coll. DONCKIER.

despectata HORN, 1892 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 86)
 Mehrere Syntypen, Insel Philippinen, zum Teil Luzon, ex Coll. RICHTER.
 DEI: Syntypen: 2 Ex. Insel Philippinen; 1 Ex. Insel Luzon; ex Coll. RICHTER.

destituta SRNKA, 1890 (*Cicindela*)

(Ent. Nachr. 16, 249)
 2 ♀♀, Syntypen, Podolien, in Coll. SRNKA.
 DEI: 1 ♀ Syntypus, Podolia, FRIČ, ex Coll. SRNKA.
 Syn. zu *campestris* LINNÉ, 1758.

deyrollei GUÉRIN, 1849 (*Cicindela*)

(Rev. Mag. Zool. (2) 1, 82)

Mehrere Syntypen, Port. Guinée, bei Bagnous und Cassangues, zwischen den Flüssen Rio-San-Domingo und Casamance, leg. BOCANDÉ.

DEI: 1 Syntypus, Senegal.

deyrollei pseudomechovi HORN, 1919 (*Cicindela*)

(Stett. Ent. Ztg. 90, 321)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Nordost Congo-Staat, leg. GRAUER; im DEI.

differens HORN, 1892 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 82)

♀ Holotypus, Zansibar, ex Coll. RICHTER.

DEI: ♀ Holotypus, ohne Fundort, ex Coll. RICHTER.

digueti HORN, 1897 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 186)

♀ (?) Holotypus, California inf., DIGUET 1892, durch MAINDRON; im DEI.

dilatotarsa HORN, 1924 (*Cicindela*)

(Philipp. Journ. Sc. 24, 87)

♂ Holotypus, Philippine, Luzon bor., Coll. v. DE POLL; im DEI.

discoidalis HORN, 1897 (*Cosmema*)

(Not. Leyd. Mus. 19, 237)

♀ Holotypus, Transvaal, in Coll. HORN [Komatipoort, HARTMANN-KRAATZ]; im DEI.

discoscripta HORN, 1914 (*Cicindela*)

(Arch. Naturg. 79, A 11 (1913), 23)

Mehrere Syntypen, Nordwest Rhodesia, ex Coll. PLASON.

DEI: 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, 1913, durch STAUDINGER.

discovelutinosa HORN, 1931 (*Cicindela*)

(Journ. Fed. Malay Mus. 16, 288—289)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, N. Borneo, Mt. Kinabalu, nahe Lumu Lumu, alt 5.500 ft., im Museum F. M. S. und in Coll. HORN.

DEI: 1 ♀ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

discrepans HORN, 1893 (*Odontochila*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 197)

♂ Holotypus, Brasilia; im DEI.

discreta longimarginalis MANDL, 1970 (*Cicindela*)

(Ztschr. Arb. Österr. Ent. 22, 3, 71, Abb. 2, Fig. 7)

♂ Holotypus, D. N. Guinea, Pionierlager, V.—VI. 1912, Kais. Augustafl.-Exp. BÜRGERS S. G. und mehrere Paratypen dto.

DEI: 1 Paratypus, Pionierlager, 30. IV.—14. VI. 1912, leg. LEDEMANN, S. G.

discretapunctata HORN, 1924 (*Prothyma*)

(Philipp. Journ. 24, 88)

Mehrere Syntypen, Philippinen, Sibuyan, leg. BAKER.

DEI: 9 Syntypen, Island Sibuyan, leg. BAKER.

dissimilis PÉRINGLEY, 1893 (*Cicindela*)

(Trans. S. Afr. Phil. Soc. 7, 50)

Mehrere Syntypen, South Africa, Delagoa Bay, Rikatla.

DEI: 4 Syntypen, Delagoa Bay, Rikatla, ex Coll. PÉRINGLEY.

dissimilis HORN, 1896 (*Oxychila*)

(Ent. Nachr. 22, 338)

2 ♀♀, Syntypen, Brasilia.

DEI: 1 ♀, Brasilia, 1 ♀, ohne Fundort; Syntypen.

Syn. zu *similis* HORN, 1892.

dissimilis singalensis HORN, 1911 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Nat. Bibl. 2, 53)

♀ Holotypus, Ceylon, Hambantola, XI., durch WICKHAM; im DEI.

distinguenda biprolongata HORN, 1937 (*Tetracha*)

(Rev. Chil. Hist. Nat. 41, 141)

♀ Holotypus, Argentine, Rosario, 10. II. 1935, via NICOLAY an HORN, [2. I. 1935, nicht 10. II. 1935!]; im DEI.

***distypsideroides* HORN, 1899 (*Nickerlea*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 136)

♀ (?) Holotypus, Australia bor. (ODEWAHN); im DEI.

***divergente-hamulata* HORN, 1929 (*Odontochila*)**

(Rev. Chil. Hist. Nat. 33, 154)

2 ♂♂, Syntypen, Bolivia, Rurrenabague, nahe Rio Beni, X. 1921/22, Mulford Biol. Exp., Coll. MANN, in Coll. HORN und im National Museum Washington.

DEI: 1 ♂ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, X.

***divina* HORN, 1893 (*Cicindela*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 200)

♂ Holotypus, Insel Timor; im DEI.

***dohertyi* HORN, 1895 (*Collyris*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 83)

1 ♂, 2 ♀♀, Syntypen, S. O. Sumatra, Malacca und Marang, 1890, leg. DOHERTY, in Coll. FLEUTIAUX und Coll. HORN. DEI: Syntypen: 1 Ex. Malacca, ex. Coll. FLEUTIAUX; 1 Ex. ohne Fundort.

***dohertyi* HORN, 1905 (*Therates*)**

(Stett. Ent. Ztg. 66, 277)

♀ Holotypus, Assam, Patkai Mts., leg. DOHERTY; im DEI.

***dokhturowi* HORN, 1898 (*Ctenostoma*)**

(Rev. Cic., 32)

♂ Holotypus, Rio de Janeiro, ex Coll. DOKHTOUROFF; im DEI.

***dolorosa* HORN, 1896 (*Cicindela*)**

(Stett. Ent. Ztg. 57, 170)

Holotypus, Chili, durch FAIRMAIRE; im DEI.

Syn. zu *gormazi* REED, 1871.***dolosa* PÉRINGUEY, 1894 (*Cosmema*)**

(Trans. Ent. Soc. Lond., 452)

Mehrere Syntypen, Mashunaland, Salisbury, leg. MARSHALL.

DEI: 1 Syntypus, Mashunaland, Zambezia, ex Coll. PÉRINGUEY.

***doriae* HORN, 1896—1897 (*Cicindela*)**

(Ann. Mus. Genova (2) 17, 273; l. c. (2) 14, 681; 1895)

♀ Holotypus, Sumatra; im DEI (Ex. sehr schlecht erhalten).

***dormeri* HORN, 1898 (*Cicindela*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 198)

Mehrere Syntypen, Ceylon, Kandy, ex Coll. DORMER.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

***dormeri* HORN, 1898 (*Collyris*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 196)

♂ Holotypus, Ind. or., ex Coll. DORMER; im DEI.

Syn. zu *mniszewski* CHAUDOIR, 1864.***dormeri* HORN, 1898 (*Ctenostoma*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 196)

♂ Holotypus, Brasilia, ex Coll. DORMER; im DEI.

***dorotheae* MANDL, 1957 (*Megacephala*)**

(Ent. Nachr. Österr. u. Schweiz. Ent. 9, Nr. 2, 29—30, Fig. 3—4)

♂ Holotypus, Paraguay, Asuncion, leg. SCHADE; 20 Paratypen: dto.; Argentinien, Corrientes, Santa Fé; in Coll. MANDL, im Zoologischen Institut, im DEI, im Museum ALEXANDER KOENIG und im Museum Budapest.

DEI: 7 Paratypen, Paraguay, Asuncion, ex Coll. MANDL.

***drakei* HORN, 1892 (*Cicindela*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 85)

Mehrere Syntypen; Mendoza, Drake, ex Coll. RICHTER; Argentinisches Hochgebirge, leg. KLÄGER.

DEI: 2 Ex. Mendoza, Drake, ex Coll. RICHTER; 2 Ex. Argentinisches Hochgebirge, leg. KLÄGER: Syntypen.

***dromicaria* KOLBE, 1894 (*Euryoda*)**

(Stett. Ent. Ztg. 55, 164)

Mehrere Syntypen, Ober-Guinea, Togo, Station Bismarckburg und Umgebung, Ende III. 1893, leg. CONRADT.

DEI: 2 Syntypen, Togo, Bismarckburg, 21. III.—30. IV. 1893, leg. CONRADT.

***duplosetosa* HORN, 1929 (*Cicindela*)**

(Stett. Ent. Ztg. 90, 323)

Mehrere Syntypen, Katanga, Kinda, via STAUDINGER & BANG-HAAS an HORN.

DEI: 7 Syntypen, Belg. Congo, Katanga, Kinda.

***eburatum* BATES, 1872 (*Ctenostoma*)**

(Ent. Monthly Mag. 9, 49)

Mehrere ♀♀, Syntypen, S. Brazil, leg. ROGERS, in Coll. SAUNDER und Coll. BATES.

DEI: 1 ♀ Syntypus, Brazil.

***egregius* PÉRINGUEY, 1896 (*Bostricophorus*)**

(Trans. S. Afr. Phil. Soc. 7, 103)

Mehrere Syntypen, South Africa, Zambesia, Salisbury, Buluwayo.

DEI: 1 Syntypus, Buluwayo, Zambesia, ex Coll. PÉRINGUEY.

Syn. zu *rusticana* PÉRINGUEY, 1893.***ehlersi* HORN, 1914 (*Cicindela*)**

(Arch. Naturg. 89, A 11 (1913), 31)

♀ Holotypus, Insel Timor, ex Coll. WALLACE-Coll. EHLERS-Coll. v. DE POLL; im DEI.

***elaphroides* DOKHTOUROFF, 1882 (*Cicindela*)**

(Rev. Ent. 1, 276)

Mehrere Syntypen, Manille, in Coll. DOKHTOUROFF.

DEI: 1 Syntypus, Manille.

Syn. zu *discreta* SCHAUM, 1863.***elegans atrorotundata* HORN, 1934 (*Pogonostoma*)**

(Arb. morph. tax. Ent. 1, 28—29)

Mehrere Syntypen, Madagascar centr. occident., Tananarivo, Miandrivazo, im Museum Paris und in Coll. HORN.

DEI: Syntypen: 3 Ex. C. W. Madagascar; 1 Ex. Tananarivo; 2 Ex. Madagascar, dto., ex Museum Paris.

***elegans externospinosa* HORN, 1927 (*Pogonostoma*)**

(Wien. Ent. Ztg. 44, 36—37)

2 ♀♀, Syntypen, Madagascar, Mt. d'Ambre, leg. SICARD, in Coll. SICARD und Coll. HORN.

DEI: 1 ♀ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

***elegans hamulipennis* HORN, 1934 (*Pogonostoma*)**

(Arb. morph. tax. Ent. 1, 26—27)

5 ♂♂, 8 ♀♀, Syntypen, in silvis Analamazotra-Perinet, 4.—20. XII. 1930/5. I. 1931, leg. Familie OLSUFIEFF.

DEI: 11 Syntypen, Forêt Analamazotra-Perinet, Anfang XII., 4.—6., 5.—10., 10.—12., 12.—13., 15.—18., 16. bis 18., 18.—20. XII. 1930/5. I. 1931, leg. OLSUFIEFF.

***elegans subtiligrossa* HORN, 1934 (*Pogonostoma*)**

(Arb. morph. tax. Ent. 1, 25—26)

2 ♂♂, 1 ♀ Syntypen, Madagascar occid., Baly-Bay; im DEI.

***elegans violaceolevigata* HORN, 1927 (*Pogonostoma*)**

(Wien. Ent. Ztg. 44, 35—36)

Syntypen, Madagascar borealis; 3 ♂♂, Mt d'Ambre, in Coll. HORN und Coll. SICARD; 1 ♀, „Tamatave“, leg. SICARD, in Coll. HORN.

DEI: Syntypen: 2 ♂♂, 1 ♀, mit den Angaben der Beschreibung.

***elegantissima* HORN, 1892 (*Cicindela*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 77)

Mehrere Syntypen, Ile Bodjo, ex Coll. RICHTER.

DEI: 1 Ex. Sumatra, Bodjo; 1 Ex. dto. Acut 84, durch WEYERS, ex Coll. RICHTER; Syntypen.

***elongata* HORN, 1892 (*Cicindela*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 81)

Syntypen; 1 ♂, Celebes, 1 ♂, im Museum Berlin.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Celebes.

Syn. zu *wallacei* BATES, 1874.***elongata* STURM, in litt. 1843 (*Cicindela*)**

(Cat. Käfersamml., 3)

Mehrere Syntypen, Hispanica.

DEI: 1 Syntypus, Elonguisa, ex Coll. STURM.

Syn. zu *hispanica* GORY, 1833.***eo* HORN, 1898 (*Cicindela*)**

(Not. Leyd. Mus. 20, 105)

2 ♂♂, Syntypen, Luçon, 5—6000', leg. WHITEHEAD, via HEYNE an HORN, ex Coll. JANSON; im DEI.

epipleuralis HORN, 1923 (*Phaeoxantha*)
(Ent. Meddel. 14, 212)

Mehrere Syntypen, Rio San Francisco, Bahia, leg. GARBE und MELZER, in Coll. HORN.
DEI: 9 Syntypen, Rio San Francisco, Bahia, Villa Nova b. Donzeiro, leg. GARBE und MELZER.

erichsoni HORN, 1898 (*Oxygcnia*)
(Not. Leyd. Mus. 20, 103)

Mehrere Syntypen, Bolivia, Songo, Yungan.
DEI: 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, durch STAUDINGER.

erikssoni PÉRINGUEY, 1893 (*Myrmecoptera*)
(Trans. S. Afr. Phil. Soc. 7 (1892), 66)

Mehrere Syntypen, Northern Ovampoland.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, ex Coll. PÉRINGUEY.

erlangeri HORN, 1904 (*Drcmica*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 426)

♀ Holotypus, zwischen Gurgura und Gololoda, 17. VI. 1900, leg. NEUMANN und v. ERLANGER, Exped. vom Roten Meer zum Nil; im DEI.

erlangeri deflexicollis HORN, 1932 (*Drcmica*)
(Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 15, 201)

2 ♀♀, Syntypen, Prov. Kenya, Marsabit, X.—XI. 1927, Kutal, XI.—XII. 1927, leg. v. SOMEREN, via MARSHALL an HORN.
DEI: 1 ♀ Syntypus, Kutal, XI.—XII. 1927, leg. v. SOMEREN.

euphratica LATREILLE & DEJEAN, 1822 (*Megacephala*)
(Hist. Nat. Col. 1, 37, Taf. 1, Fig. 4)

Mehrere Syntypen, am Ufer des Euphrat, leg. OLIVIER.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, ex Coll. SCHAUM.

euphratica aida MANDL, 1959 (*Megacephala*)
(Bonn. Zool. Beitr. 10, Nr. 1—2, 103—104)

♂ Holotypus, 9 Paratypen, Djibouti, leg. MARTIN; im Museum ALEXANDER KOENIG und in Coll. MANDL.
DEI: 1 Paratypus, Djibouti, leg. MARTIN.

euprosopides HORN, 1901 (*Langea*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 354)

♀ Holotypus, Peru, Chanchamayo, durch LANGE; im DEI.

euryoides HORN, 1922 (*Odontochila*)
(Zool. Meded. 7, 100—101, Fig. 9)

♂ Holotypus, Brasília, ex cabin. DIECK, Coll. EHLERS-V. DE POLL; im DEI.

euryscopa BATES, 1890 (*Cincidela*)
(Trans. Ent. Soc. London, 506, Taf. 16, Fig. 9)

Mexico, mehrere Syntypen, Mazatlan in Sinaloa, leg. HÖGE.
DEI: 2 Syntypen, Mazatlan, Sinaloa, leg. HÖGE.

eurytarsipennis HORN, 1905 (*Odontochila*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 148)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Peru, Ucuyali, durch STAUDINGER; im DEI.

excisilabris HORN, 1905 (*Cincidela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 160)

♂ Holotypus, Neu Guinea; im DEI.

exciso-clavipenis HORN, 1934 (*Pogonostoma*)
(Arb. morph. tax. Ent. 1, 31—32)

2 ♂♂, 2 ♀♀, Syntypen, Forêt Analamazotra-Perinet, 4.—16. XII. 1930, leg. Familie OLSUFIEFF.
DEI: 3 Syntypen, Forêt Analamazotra-Perinet, 10., 15.—16. XII. 1930, leg. OLSUFIEFF.

fabricii HORN, 1894 (*Calochra*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 171)

Mehrere Syntypen, Vorder-Indien, Nord-Canara, leg. ANDREWES.
DEI: 5 Syntypen, Canara, 94, leg. ANDREWES.
Syn. zu *octogramma* CHAUDOIR, 1852.

fairmairei HORN, 1899 (*Euryoda*)
(Ent. Nachr. 25, 81)

Mehrere Syntypen, St. Marie de Madagascar, Perrot frères, X.—XII. 1896.
DEI: 3 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

***fasciatus pseudolatreillei* HORN, 1928 (*Therates*)**

(Koleopt. Rundsch. 14, 170)

Syntypen, Mindanao: 2 ♂♂, 2 ♀♀, Pt. Bango, Coll. BÖTTCHER; 1 ♂, Zamboangan, Coll. BAKER; im DEI.

***fasciatus pseudosemperi* HORN, 1928 (*Therates*)**

(Koleopt. Rundsch. 14, 171)

4 ♀♀, Syntypen, Philippinen, Subaan, Coll. BÖTTCHER; im DEI.

***fasciatus punctatoviridis* HORN, 1933 (*Therates*)**

(Natuur. Maandbl. 22, 124)

Syntypen, Celebes: 1 ♂, Mt. Tangke Salokko auf der Insel merid. orient., 2000 m, 20. XII. 1931; 1 ♀, Mt. Latimodjong, 1500—1800 m, VII. 1930; leg. HEINRICH; 1 ♂ (in Kopal eingebettet), X. 1932, ex Firma MAINTZ & Cie. Producten Handel te Makassar, via SCHMITZ an HORN.

DEI: 1 ♀ Syntypus, Celebes, Latimodjonggeb., 1500—1800 m, E. VII. 1930, leg. HEINRICH, B. M. 1933—117.

***fauveli* DOKHTOUROFF, 1882 (*Cicindela*)**

(Rev. Ent. 1, 275)

Mehrere Syntypen, Malacca, in Coll. DOKHTOUROFF.

DEI: 1 Syntypus, Malacca.

Syn. zu *mandibularis* SCHAUUM, 1860.***faeae* HORN, 1893 (*Collyris*)**

(Ann. Mus. Genova (2), 13, 373)

Mehrere Syntypen, Birmanie, Berg Carin Chebà, leg. FEA, in Coll. FEA.

DEI: 6 Syntypen, Carin Chebà, 900—1100 m, 5. XII. 1888, leg. FEA.

***ferox* PÉRINGUEY, 1893 (*Mantichora*)**

(Trans. S. Afr. Phil. Soc. 7, 17, Taf. 1, Fig. 1)

Mehrere Syntypen, South-Damaraland, Grea Namaqualand (Goagas).

DEI: 5 Ex. Damara L., Ganab, 26. II, II. 1889; 1 Ex. ohne Fundort; ex Coll. PÉRINGUEY: Syntypen.

Syn. zu *gruti* BOUCARD, 1892.***ferriei* FLEUTIAUX, 1894 (*Cicindela*)**

(Bull. Soc. Ent. Fr., 281)

Mehrere Syntypen, Il d'Oschima, Nájé, Japon méridional, leg. FERRIÉ, in Coll. FLEUTIAUX und Coll. OBERTHÜR.

DEI: 8 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

***festiva babaulti* HORN, 1926 (*Prothyma*)**

(Ent. Bl. 22, 166—167)

Syntypen, 2 ♂♂, Carnot, Ht. Sangha, leg. BABAULT und leg. LE MOULT, in Coll. HORN; 2 ♀♀, Buar, Camerun, 10.—29. V. 1914, im Britischen Museum und in Coll. HORN.

DEI: 2 ♂♂, 1 ♀ Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

***filicornis* HORN, 1895 (*Collyris*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 356)

♀ Holotypus, Patria verisimiliter Ins., Philippin; (ohne Fundort, GEILENKENSER) im DEI.

***filicornis* HORN, 1898 (*Myrmecoptera*)**

(Ent. Nachr. 24, 348)

♀ Holotypus, S. Africa, Transvaal, Komatipoort, leg. HARTMANN; im DEI.

***flagellicornis* HORN, 1897 (*Megalomma*)**

(Not. Leyd. Mus. 19, 235)

♂ Holotypus, S^{te} Marie de Madagascar, X.—XII. 1896, leg. PERROT FRÈRES, via OBERTHÜR an HORN; im DEI.***flagellicornisrectipenis* HORN, 1934 (*Prothyma*)**

(Mém. Acad. Malgache 20, 21—22)

Mehrere Syntypen, N.-W. Madagascar, Antseva-Ambobaka, Ramena, Sambirano, I.—II. 1933—34, leg. MELLIS.

DEI: 26 Syntypen, N.-W. Madagascar, Antseva-Ambobaka, Ramena, leg. MELLIS.

***flavicornis* HORN, 1892 (*Derocrania*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 92)

1 ♀, 1 Ex., Syntypen, Ceylon, leg. FELDER, in Mus. Vienn. und in Coll. HORN.

DEI: 1 ♀ Syntypus, Ceylon, VIII. 1860, leg. FELDER, ex Coll. Wien. Museum.

***flavoguttata* HORN, 1895 (*Calochroa*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 359)

♀ Holotypus, Süd-West Küste von Vorderindien; im DEI.

Syn. zu *andrewesi* HORN, 1894.

flavomaculatum HORN, 1892 (*Pogonostoma*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 372)

♂ Holotypus, Madagascar.
DEI: ♂ Holotypus, Madagascar, Annanarivo, leg. SIKORA.

flavovittata HORN, 1896 (*Dromica*)
(Ent. Nachr. 22, 339)

♂ Holotypus, Region interior. Mosambic; im DEI.

fleissi MANDL, 1956 (*Megacephala*)
(Koleopt. Rundsch. 34, Nr. 1—3, 42)

Argentinien: ♂ Holotypus, Prov. Neuquén, Rio Negro, Villa Regina, 5. III. 1956, leg. FLEISS, via HASSENTEUFEL an MANDL; 1 ♀, dto.; 4 ♂♂, 3 ♀♀, Rio Negro, San Juan, 1957, Jänner; Paratypen.
DEI: 1 ♂ Paratypus, Argentina, Rio Negro, I. 1957.

fleutiauxi HORN, 1892 (*Collyris*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 364)

♂ Holotypus, Borneo, ex Coll. RICHTER; im DEI.

fleutiauxi HORN, 1915 (*Langea*)
(In: WYTSMAN, Gen. Ins. Cic., 438)

♀ Holotypus, ohne Fundort [durch FLEUTIAUX]; im DEI.

fleutiauxi HORN, 1898 (*Oxychila*)
(Not. Leyd. Mus. 20, 107)

♂ Holotypus, Brazil, Caraça, II. Sem. 1884, via GERMAIN an HORN, ex Coll. FLEUTIAUX; im DEI.

fleutiauxi HORN, 1896 (*Oxygonia*)
(Ent. Nachr. 22, 340)

2 ♂♂, Peru, Moyobamba, 1887—1888, durch DONCKIER; mehrere Ex. in Coll. FLEUTIAUX und Coll. OBERTHÜR: Syntypen.
DEI: 3 Syntypen, Peru, Moyobamba, 1er. Sem. 1887—1888, leg. MATHAN, durch DONCKIER, ex Coll. OBERTHÜR.

fleutiauxi HORN, 1905 (*Pogonostoma*)
(Stett. Ent. Ztg. 66, 276)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, bor. Madagascar, Diego Suarez, Montes Ambre; im DEI.

fleutiauxi HORN, 1898 (*Therates*)
(Not. Leyd. Mus. 20, 106)

♂ Holotypus, Malacca merid.; im DEI.

floridula ♂ BATES, 1872 (*Oxygonia*)

(Ent. Monthly Mag. 8, 241; nom. praeocc. = *uncifera* HORN, 1901, Dtsch. Ent. Ztschr., 124)

Mehrere Syntypen, Ecuador, leg. BUCKLEY.
DEI: 2 Syntypen, Ecuador, ex cab. BUCKLEY-Coll. v. DE POLL.

fluctuosa DOKHTOUROFF, 1888 (*Cicindela*)
(Horae Soc. Ent. Ross. 22, 141)

Mehrere Syntypen, Mongolei centr., Ssu-van-nò, VII.
DEI: 3 Syntypen, Mongolei centr., 1886, leg. POTANIN.
Syn. zu *dokhtourowi* JAKOVLEFF & DOKHTOUROFF, 1885.

formosa PÉRINGUEY, 1894 (*Myrmecoptera*)
(Trans. Ent. Soc. London, 451)

Mehrere Syntypen, Mashunaland, Salisbury.
DEI: Syntypen, Mashunaland: 1 ♂, 1 ♀, Salisbury, 1 ♀, Zambezia, ex Coll. PÉRINGUEY.

formosa fletcheri CRIDDLE, 1925 (*Cicindela*)
(Canad. Ent. 57, 127)

♂ Holotypus, Montana, Marias River, Sunshine Road, 5. IX. 1924, leg. CRIDDLE und 2 ♂♂, 6 ♀♀ Ex. dto.; 1 ♀ von McLeol, Alberta, 1 Ex. von Medicine Hat. Alberta, 1898; leg. FLETCHER; in der Coll. Canadian National' Ottawa, No. 1418; Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, Montana, Marias River, 5. IX. 1924, leg. CRIDDLE.

formosa pigmentisignata HORN, 1930 (*Cicindela*)
(Trans. Amer. Ent. Soc. 56, 76)

Mehrere ♀♀, Texas, Mineola, 2. X. 1906, leg. BISHOPP; mehrere ♂♂, Texas, Rosser, 23. IX. 1905, leg. JONES; im U. S. National Museum und in Coll. HORN: Syntypen.
DEI: 3 Syntypen, Texas, Rosser, 23. IX. 1905, leg. JONES, Mineola, 2. X., leg. BISHOPP.

formosana MINOVA, 1932 (*Cicindela*)

(Trans. nat. Hist. Soc. Formosa 22, 293)

Syntypen, Formosa: 2 ♂♂, 1 ♀, Akô, 28. VI. 1906, ?; 1 ♀, ?, leg. SHIRAKI, im Entomological Museum, Government Research Institute, Tainoku.
 DEI: 1 Syntypus, Akô, 28. VI. 1906.

formosanus obscurifemoratus MANDL, 1970 (*Neocollyris*)

(Ztschr. Arb. österr. Ent. 22, 3, 65–66)

♂ Holotypus, Formosa, Taihorin, III. 1910, leg. SAUTER und 1 ♀, dto., mehrere Ex. Taihorin, Taihorinsho, III., IV., VI., VIII. 1910; im Museum Berlin und in Coll. MANDL: Paratypen.
 DEI: 2 Paratypen, Formosa, Taihorin, III. 1910, leg. SAUTER.

foveicollis HORN, 1914 (*Dromica*)

(Arch. Naturg. 79, A 11 (1913), 11)

♂ Holotypus, Zentral-Afrika, Katanga; im DEI.

foveifrons HORN, 1901 (*Neocollyris*)

(Rev. Cic., 60)

♂ Holotypus, Assam, Khasis, Nat. Coll.; im DEI.

foveolata PÉRINGUEY, 1886 (*Dromica*)

(Trans. S. Afr. Phil. Soc. 4, 71)

♂ Holotypus, Lake N'Gami Region (wahrscheinlich der Fundort), Coll. ANDERSSON, in Coll. PÉRINGUEY.
 DEI: ♂ Holotypus, ohne Fundort, 62.
 Syn. zu *aspera* DOKHTOUROFF, 1883.

fruhstorferi HORN, 1902 (*Collyris*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 68)

Mehrere Syntypen, Tonkin, Montes Mauson, IV. – V. 1900, 2–3000', leg. FRUHSTORFER.
 DEI: 3 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

fruhstorferi HORN, 1902 (*Therates*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 72)

Mehrere Syntypen, Tonkin, Montes Mauson, IV. – V. 1900, 2–3000', leg. FRUHSTORFER.
 DEI: 10 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

fulgida parowana WICKHAM, 1905 (*Cicindela*)

(Canad. Ent. 37, 165)

Mehrere Syntypen, Western United States, little Salt Lake, nahe Parowan Utah, VIII., leg. WICKHAM.
 DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 11. VIII.

fulgida pilosipennis MANDL, 1956 (*Megacephala*)

(Opusc. Zool. München 11, 2–3)

♂ Holotypus, tropisch. Bolivien, Region Chapare, ca. 400 m Meereshöhe, leg. ZISCHKA; mehrere Paratypen, dto.; in Coll. ZISCHKA und Coll. MANDL.
 DEI: 3 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

fulgida pseudowillistoni HORN, 1938 (*Cicindela*)

(Ent. Beih. 5, 13, Taf. 75, Fig. 7)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Süd-Wyoming, Como-See, 8000 ft., Yale College Scientific Expedition, leg. WILLISTON; via REINECKE an HORN; im DEI.

fundoplanata HORN, 1909 (*Dromica*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 90)

♀ Holotypus, Portug. Ostafrika, Busi-Tal, XII. 1907, leg. SWYNNERTON [Busi Valley, XII. 1906], nicht 1907!; im DEI.

funerea genetica HORN, 1926 (*Cicindela*)

(Ent. Bl. 22, 169)

♀ Holotypus, Annam, Quang-Tri, durch THÉRY an HORN; im DEI.

funerea nigrocolorata MANDL, 1969 (*Heptodonta*)

(Reichenbachia 12, Nr. 15, 153–154, Fig. 2)

♂ Holotypus, Laos, Umg. Vientiane, III. – VI. 1963, 7 Paratypen, dto.; in der Zoologischen Sammlung des Bayerischen Staates und in Coll. MANDL.
 DEI: 3 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

fusiformis HORN, 1904 (*Tricondyla*)

(Spol. Zeyl. 2, 5, 35, Taf. 7, Fig. 1)

Holotypus, Ceylon; im DEI.

***gabonensis* DOKHTOUROFF, 1882 (*Cicindela*)**

(Rev. Ent. 1, 216)

Mehrere Syntypen, Gabon, in Coll. DOKHTOUROFF.

DEI: 1 Syntypus, Gabon.

Syn. zu *interrupta* FABRICIUS, 1775.***galapagoensis* HORN, 1915 (*Cicindela*)**

(In: WYTSMAN, Gen. Ins. Cic., 402)

Mehrere Syntypen, Galapagos-Inseln.

DEI: 2 Syntypen, Calif.-Exped., Galapagos Ins., Banks Bay, Achermale I, durch WILLIAMS.

***galathea* THIEME, 1881 (*Cicindela*)**

(Berl. Ent. Ztschr. 25, 97)

Mehrere Syntypen, Turkestan, Hochgebirge bei Margelan, durch STAUDINGER.

DEI: 2 Syntypen, Turkestan, durch STAUDINGER, ex Coll. RICHTER.

***ganglbaueri* HORN, 1892 (*Cicindela*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 95)

2 ♀♀, Syntypen, Ceylon, leg. FELDER, im Museum Wien und in Coll. HORN.

DEI: 1 ♀ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

***gemina* HORN, 1927 (*Cicindela*)**

(Rev. Zool. Afr. 15, 333—334)

Syntypen; 1 ♂, 2 ♀♀, Kamerun merid., Tukan, Prov. Joko, VI. 1911, leg. COLIN, in Coll. HORN; 1 ♂, Haut-Uelé, Moto, 28. III. 1926, leg. BURGEON, im Congo Museum.

DEI: 1 ♂, 1 ♀, Kamerun merid., Tukan, Jokoby, VI. 1911, Ismine Jokoby, III. 1913 (Funddatum in der Beschreibung nicht genannt); leg. COLIN; 1 ♀, Kamerun, Joko: Syntypen.

***germaini* FLEUTIAUX, 1893 (*Oxychila*)**

(Bull. Soc. Ent. Fr. 62, 315)

Mehrere Syntypen, Bolivien, Prov. Cochabamba, 1889, leg. GERMAIN.

DEI: 1 ♂ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

***germaini pseudonigroaenea* HORN, 1938 (*Oxychila*)**

(Ent. Beih. 5, 25, Fig.)

Mehrere Syntypen, Peru, Chanchamayo, 1500 m, leg. HEYNE, Cuzco, 2—3000 m, Pozuzo, leg. ROLLE und FASSL, Quiroz am Rio Pancartambu, 10. XI. 1933, leg. WARD.

DEI: Syntypen, Peru: 2 Ex. Quiroz, Rio Pancartambu, 10. XI. 1933, leg. WARD; 3 Ex. Chanchamayo, 1500 m, leg. HEYNE; 1 Ex. Pozuzo, 2 Ex. Cuzco, 2—3000 m, leg. ROLLE.

***germanica ferganensis* DOKHTOUROFF, 1885 (*Cicindela*)**

(Horae Soc. Ent. Ross. 19, 256, Taf. 11, Fig. 5)

Holotypus, Umgebung v. Marghelan, leg. WILKINS; im DEI.

***germanica umbratulusa* HORN, 1930 (*Cicindela*)**

(Ling. Science Journ. 9, 403—404)

2 ♂♂, Syntypen, Hwa Yin Shan Sz'Tschwan, Hochow-Chung King, S. Ymsha, v. 1927, ex Coll. FRIEDRICH; im DEI.

***gerstaeckeri* HORN, 1898 (*Myrmecoptera*)**

(Ent. Nachr. 24, 347)

♂ Holotypus, S. Africa, Nyassa; im DEI.

***gibbicollis* HORN, 1913 (*Dromica*)**

(Rev. Zool. Afr. 2, 274)

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Belg. Congo, Elisabethville, Miss. Agric. Leplae; im Musée du Congo.

DEI: 1 ♀ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, XI. 1911.

***gibbosa* HORN, 1894 (*Euryoda*)**

(Ent. Nachr. 20, 247)

♀ Holotypus, Togo, leg. CONRADT.

DEI: ♀ Holotypus, Togoland, 1892—1893, leg. CONRADT, durch DONCKIER.

***gigantea* HORN, 1914 (*Prothyma*)**

(Arch. Naturg. 79, A 11 (1913), 14)

♀ Holotypus, Madagaskar, Fenerive, leg. PERROT, ex Coll. V. DE POLL; im DEI.

***glabrogibbosa* HORN, 1929 (*Collyris*)**

(Journ. F. M. S. Mus. 14, 466)

Syntypen, British North Borneo; 1 ♂, Sandakan, via BAKER an HORN; 1 ♀, Bettotan, 29. VII. 1927.

DEI: 1 ♂, Syntypus, Borneo, Sandakan, durch BAKER.

gladiator HORN, 1934 (*Pogonostoma*)

(Mém. Acad. Malgache 20, 21, Fig. 19)

♂ Holotypus, Madagascar, Mt d'Ambre, I. 1934, leg. ROBINSON; im DEI.

globifrons HORN, 1898 (*Ctenostoma*)

(Rev. Cic., 31)

♀ Holotypus, Pernambuco, Pery Pery, leg. GOUNELLE, V.—VI. 1892; im DEI.

gloriola ♂ BATES, 1872 (*Oxygonia*)(Ent. Monthly Mag. 8, 240; nom. praeocc., = *simplipenis* HORN, 1901, Dtsch. Ent. Ztschr., 124)

Mehrere Syntypen, Equador, leg. BUCKLEY.

DEI: Syntypen; 2 ♂♂, ohne Fundort, ex Coll. RICHTER; 1 ♂, ohne Fundort, ex cab. BUCKLEY-Coll. v. DE POLL.

gloriola ♀ BATES, 1872 (*Oxygonia*)(Ent. Monthly Mag. 8, 240; nom. praeocc., = *uncifera* HORN, 1901, Dtsch. Ent. Ztschr., 124)

Mehrere Syntypen, Equador, leg. BUCKLEY.

DEI: 1 ♀, Equador, ex cab. BUCKLEY-Coll. v. DE POLL; 1 ♀, ohne Fundort, ex cab. BUCKLEY: Syntypen.

glorioparadoxa HORN, 1914 (*Cicindela*)

(Arch. Naturg. 79, A 11 (1913), 26)

♀ Holotypus, Nord-Celebes, Toli-Toli, XI.—XII. 1895, leg. FRUHSTORFER; im DEI.

gloriosula HORN, 1914 (*Cicindela*)

(Arch. Naturg. 79, A 11 (1913), 25)

♀ Holotypus, Nord-Celebes, Toli-Toli, XI.—XII. 1895, leg. FRUHSTORFER, ex Coll. v. DE POLL; im DEI.

gounelli HORN, 1900 (*Tricondyla*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 361)

♀ Holotypus, Hindustania, Ramnad, 1883—1884, leg. FABRE; im DEI.

gracileguttatum MANDL, 1966 (*Hipparidium*)

(Beitr. Ent. 16, Nr. 1—2, 179—181, Fig. 5—8)

♂ Holotypus, N. W. Kamerun, Bascho, 16.—22. II. 1906, leg. SCHULTZE, vend. 16. XI. 1918, ex Museum Hamburg; 1 ♂, 1 ♀, Paratypen, dto. 28. II. 1906; in Coll. HORN und Coll. MANDL.

DEI: ♂ Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung, 15.—22. II. 1906 [nicht 16.—22. II.!!]; 1 ♀, Paratypus, Bascho, 28. II. 1906, leg. SCHULTZE.

gracilicornis HORN, 1895 (*Collyris*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 85)

♀ Holotypus, Java.

DEI: ♀ Holotypus, Java merid., Palabuan, 1892, leg. FRUHSTORFER.

gracilipalpis HORN, 1909 (*Vata*)

(Not. Leyd. Mus. 31, 187)

♀ Holotypus, New Caledonia, Plum, VII. 1908, via FLEUTIAUX an HORN; [LE RAX] im DEI.

gracilis HORN, 1894 (*Collyris*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 13)

♀ Holotypus, Manila, im DEI.

gracilis HORN, 1909 (*Dromica*)

(Ent. Rundsch. 26, 101)

Mehrere Syntypen, N. O.-Rhodesia, S. O.-Katanga, Serenje District, 4000'', 4500'', 28. XI., 13., 28. XII. 1907, leg. NEAVE.

DEI: 1 Syntypus, N. E. Rhodesia, Serenje District, about 4.500 ft., 28. XI. 1907, ex Coll. NEAVE.

gracilis intermediopunctata HORN, 1925 (*Dromica*)

(Stett. Ent. Ztg. 90, 315)

1 ♂, 3 ♀♀, Syntypen, Katanga, Kigonsera, NO-Nyassa-See, via STAUDINGER & BANG-HAAS an HORN; im DEI.

gracilis laterodeclivis HORN, 1929 (*Dromica*)

(Stett. Ent. Ztg. 90, 315)

2 ♀♀, Syntypen, Deutsch-Ostafrika, Upangwa, via STAUDINGER & BANG-HAAS an HORN; im DEI.

gracilis punctatissima HORN, 1929 (*Dromica*)

(Stett. Ent. Ztg. 90, 316)

♂ Holotypus, Katanga; im DEI.

gracilis spinipennis HORN, 1929 (*Dromica*)

(Stett. Ent. Ztg. 90, 317)

1 ♀, Katanga, 1 ♂, Kapiri, IX. 1912, Miss. Agric., im Congo-Museum: Syntypen.

DEI: 1 ♀ Syntypus, Katanga.

grandis HORN, 1897 (*Cicindela*)

(Ent. Nachr. 23, 239)

♀ Holotypus, Afrika, Benguela; (DEYROLLE, HEYNE) im DEI.

grandopronotalia browni HORN, 1936 (*Prothyma*)

(Ent. Bl. 32, 22–23, Fig.)

1 ♂, 4 ♀♀, Syntypen, Nordwest-Australien, Carnarvon, leg. BROWN, in Coll. BROWN und Coll. HORN.
DEI: 1 ♂, 2 ♀♀, Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung (1 ♀ sehr schlecht erhalten).**granulata** DOKHTOUROFF, 1883 (*Dromica*)

(Rev. mens. Ent. 1, 9)

Mehrere Syntypen, Cafrerie (?), in Coll. DOKHTOUROFF.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort.

Syn. zu *aspera* DOKHTOUROFF, 1883.**grossepunctata** HORN, 1914 (*Cicindela*)

(Arch. Naturg. 79, A 11 (1913), 17)

♀ Holotypus, Abessinien; im DEI.

grossula HORN, 1925 (*Cicindela*)

(Ent. Bl. 21, 137)

♀ Holotypus, Madras meridionalis, Maniyachi, X. 1905; im DEI.

grossula HORN, 1914 (*Dromica*)

(Arch. Naturg. 79, A 11 (1913), 12)

2 ♀♀, ♂♂, Syntypen, Angola, ex Coll. PLASON.

DEI: 3 Syntypen, W. Afrika, Angola, ex Coll. PLASON, 1913, durch STAUDINGER.

guineensis HORN, 1892 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 77)

♀ Holotypus, Neu-Guinea; im DEI.

guineensis umbrosa HORN, 1932 (*Cicindela*)

(Rec. South Austral. Mus. 4, 553, Fig. 3)

Mehrere Syntypen, North-East Papua, Mt. Lamington, 1300–1500 ft., leg. McNAMARA, im South Australian Museum.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

gunningi PÉRINGUEY, 1898 (*Myrmecoptera*)

(Trans. S. Afr. Phil. Soc. 10, 312)

Mehrere Syntypen, Transvaal, Barberton, Leydenburg.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, ex Coll. PÉRINGUEY.

guttula viridimetallica HORN, 1934 (*Cicindela*)

(Bull. Soc. Nat. Lux. 44, 74)

♂ Holotypus, Süd-Ost-Celebes, Tangke Salokko-Gebirge, 1500 m, 1.–5. I. 1932, leg. HEINRICH; [B. M. 1933–117 im DEI].

hackeri SLOANE, 1905 (*Cicindela*)

(Proc. Linn. N. S. Wales 30, 229)

Mehrere Syntypen, Queensland, Cooktown, in Coll. HACKER, leg. SLOANE und FRENCH.

DEI: Syntypen: 2 Ex. ohne Fundort, Coll. HACKER; 1 Ex. Australia, Somerset I. 1876, leg. ALBERTIS.

hackeri SLOANE 1906 (*Distypsidera*)

(Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 31, 557)

Mehrere Syntypen, Queensland, Coen, 150 Meilen nördl. von Cooktown, leg. HACKER.

DEI: 2 Syntypen, Queensland, Coen District, Cape York, leg. HACKER.

haefligeri HORN, 1905 (*Cicindela*)

(Stett. Ent. Ztg. 66, 281)

♂ Holotypus, Africae Germanicae Orientalis partes interiores, Kigonsera, leg. HÄFLIGER, via ERTL an HORN; im DEI.

haenschi HORN, 1900 (*Oxychila*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 364)

♂ Holotypus, Ecuadoria orientalis, Napo, 1899–1900, leg. HAENSCH; im DEI.

halyi HORN, 1900 (*Tricandyla*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 193)

♂ Holotypus, Ceylon; [durch PLASON] im DEI.

hamata PÉRINGUEY, 1893 (*Cosmema*)

(Trans. S. Afr. Soc. 7, 92)

Mehrere Syntypen, South Africa, Cape Colony, Sunday River.

DEI: Syntypen: 2 Ex. Cape Colony, Grah. I. Grah. Ton; 2 Ex. ohne Fundort, G/m; ex Coll. PÉRINGUEY.

Syn. zu *coarctata* LATREILLE & DEJEAN, 1822.**hamulipenis** HORN, 1938 (*Cicindela*)

(Ent. Beih. 5, 14, Taf. 85, Fig. 1)

♂ Holotypus, Brasília centr., Goyaz; im DEI.

hamulipenis HORN, 1933 (*Odontochila*)

(Rev. Chil. Hist. Nat. 37, 76—77, Fig. 18)

♂ Holotypus, Columbia, ex Coll. BROWN-EHLERS-V. DE POLL; im DEI.

hanseatica HORN, 1927 (*Cicindela*)

(Ent. Mitt. 16, Nr. 1, 58, Fig. 5)

Mehrere Syntypen, Küstengebiet des Persischen Golfes, Bender Abbas, leg. SCHMIDT.

DEI: 13 Syntypen, Abbas, 27.—29. V. 1926, leg. SCHMIDT.

harmandi FLEUTIAUX, 1893 (*Cicindela*)

(Ann. Soc. Ent. Fr. 62, 494)

Mehrere Syntypen, Cambodge, Chaudoc, 1877, leg. HARMAND, im Museum Genua.

DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Cochinc., M. Chaudoc, 1877, leg. HARMAND, ex Museum Paris.

hauserana HORN, 1905 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 143)

Mehrere Syntypen, Ost-Afrika, Uheheland, Kidugala, durch HAUSER.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

helleri HORN, 1897 (*Cosmema*)

(Not. Leyd. Mus. 19, 237)

♀ Holotypus, Transvaal, in Coll. HORN; [Komatipoort, durch HARTMANN-KRAATZ] im DEI.

hennebergorum HORN, 1892 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 221)

♀ Holotypus, Afrika, Njam-Njamensi, Dr. JUNKERI, durch HENNEBERG; im DEI.

Syn. zu *chrysopyga* HORN, 1892.**hennigi** HORN, 1898 (*Heptodonta*)

(Ent. Nachr. 24, 177)

♀ Holotypus, Assam, Khasia Staaten, leg. KRICHELDORFF, via HENNIG an HORN; im DEI.

Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Khasia Staaten“, steht auf dem Etikett „Khasia-Hill, 1896“.

hennigi HORN, 1898 (*Therates*)

(Ent. Nachr. 24, 178)

♂ Holotypus, Assam, Khasi Staaten, leg. KRICHELDORFF, via HENNIG an HORN; im DEI.

Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Khasi Staaten“, steht auf dem Etikett „Khasia-Hill, 1896“.

henryi HORN, 1925 (*Cicindela*)

(Ent. Rec. & Journ. Var. 37, 165)

1 ♂, 2 ♀♀, Syntypen, Ceylon, Horawupotana, 8.—14. X. 1924, leg. HENRY.

DEI: 1 Syntypus, Ceylon, Horawupotana, 14. X. 1924.

herculeana HORN, 1942 (*Tricondyla*)

(Arb. morph. tax. Ent. 9, 138—139)

♀ Holotypus, Paloe, bei Lindoe, im westl. Celebes, 3700 Fuß hoch, V. 1937, leg. KALIS; im DEI.

hevero PÉRINGUEY, 1893 (*Megacephala*)

(Trans. S. Afr. Phil. Soc. 7, 22)

Mehrere Syntypen, South Africa, Damaraland.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, durch DE VYLDER, ex Coll. PÉRINGUEY.

Syn. zu *regalis* BOHEMAN, 1848.**hewitti** HORN, 1908 (*Cicindela*)

(Journ. Asiat. Soc. Beng. Straits Branch 50, 99)

♂ Holotypus, Borneo, Kuching, VI. 1903, leg. LEWIS; im DEI.

heydeni HORN, 1894 (*Ctenostoma*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 109)

♀ Holotypus, Brasília, leg. FELDEGG, ex Coll. v. HEYDEN; im DEI.

***hidrophoba atroreducta* HORN, 1930 (*Cicindela*)**

(Rev. Chil. Hist. Nat. 34, 9—10)

Mehrere Syntypen, Mexico, Yukatan, Chichen Itza, VI. 1929, Coll. BEQUAERT, im Museum Comparat. Anat. Cambridge (U. S. A.) und in Coll. HORN.

DEI: 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

***hilariola* BATES, 1874 (*Cicindela*)**

(Ent. Monthly Mag. 10, 263)

♂ Holotypus, Northern Persia, leg. MILLINGEN; im DEI.

***hildebrandti* HORN, 1903 (*Dromica*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 421)

♀ Holotypus, Africa Orientalis Britannica; im DEI.

***hirsutum* HORN, 1892 (*Ctenostoma*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 66)

♀ Holotypus, Brasilia, ex Coll. RICHTER; im DEI.

Syn. zu *macilentum* KLUG, 1834.

***histrio* TSCHITSCHERIN, 1903 (*Cicindela*)**

(Horae Soc. Ent. Ross. 36, 16)

34 Syntypen: Perse oriental.; Chorasán, région Zirkuh; massif de Bamrud, 20.—21. VII. 1901; Neh-i-Bendan (Nihbandan), env. de Bendán, 9. V. 1898; Seistan, env. de Nasir-abad, 23. V. 1898; Sarhad (Serhad), localités Hurmuk et Duz-ab, Duz-ab à Podahl, localité Kuh-i-Murhak, 10.—11., 12.—15., 16.—24., 24.—26. VI. 1898, et localité Shur-ab, 12. VIII. 1898; Région de Bampur, riv. Bampur, 15.—22. VII. 1898, et Rarra, 16.—17. IV. 1901; leg. ZARUDNY.

DEI: 2 Syntypen, Chorasán, région Zirkuh, Neh-i-Bendan, 9. V. 1898, leg. ZARUDNY.

***honorei* FLEUTIAUX, 1894 (*Derocrania*)**

(Ann. Soc. Ent. Fr. 62 (1893), 502)

Mehrere Syntypen, Inde, Pulney-Hills, leg. HONORÉ, am Berg Kodeicanel, leg. CASTETS, im Museum Genua.

DEI: 1 Syntypus, Indes Orientales, Mts. Kodeicanel, leg. CASTETS.

***hopei* CASTELNAU, 1867 (*Tetracha*)**

(Trans. Roy. Soc. Victoria 8, 37)

Mehrere Syntypen, Australien, Nickol Bay, leg. BOSTOCK.

DEI: 1 Syntypus, Nickol Bay, ex Britischen Museum.

***hopkinsi* HORN, 1909 (*Prothyma*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 313)

Syntypen: 1 ♀, Philippinen, durch HOPKINS, in Coll. HORN; 1 ♀ Süd-Luçon, Depart. Fayabas, Dolores, Coll. CARLOS DE MAZAMEDO, im Museum Madrid; 1 ♂, Lamao, Bataan, 10. VII. 1907, Coll. CURRAN, im Museum Manila.

DEI: 1 ♀ Syntypus, ohne Fundort, durch HOPKINS.

***horni* KOLBE, 1897 (*Bennigsenium*)**(Ostafr. 4, Col., 347; nom. praeocc. = *insperata* KOLBE, 1915, Gen. Ins. Cic., 276)

Mehrere Syntypen, Deutsch-Ost-Afrika, bei Taru im Hinterland von Mombassa, leg. THOMAS.

DEI: 1 Syntypus, Taru, Mombassa.

***horni* FAIRMAIRE, 1900 (*Cicindela*)**(Bull. Soc. Ent. Fr., 134; nom. praeocc. = *umbratilis* FAIRMAIRE, 1903, Ann. Soc. Ent. Belg. 47, 358)

Mehrere Syntypen, Madagascar, Suberbieville, leg. PERRIER.

DEI: 2 Syntypen, Madagascar, leg. PERRIER.

***horni* KOLBE, 1896 (*Mantica*)**

(Ent. Nachr. 22, 7)

2 ♂♂, Syntypen, Süd-West-Afrika, Gr. Namaland, auf dem Han-ami-Plateau, II. 1885, leg. SCHENCK; in Coll. HORN und im Museum Berlin.

DEI: 1 ♂ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

***hornianus* HORN, 1892 (*Omus*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 91)

♂ Holotypus, California?, ex Coll. RICHTER.

DEI: ♂ Holotypus, ohne Fundort, ex Coll. RICHTER.

Syn. zu *californicus* ESCHSCHOLTZ, 1829.

***howittii* CASTELNAU, 1867 (*Megacephala*)**

(Trans. Roy. Soc. Victoria, 31)

Mehrere Syntypen, Australien, Cooper's Creek, leg. HOWITT; in Coll. HOWITT und Coll. CASTELNAU.

DEI: 1 Syntypus, Centr. Australia, Cooper's Creek, ex Coll. V. DE POLL.

***humeralis* HORN, 1913 (*Dromica*)**

(Rev. Zool. Afr. 2, 277)

Mehrere Syntypen, Angola, Bailundo, via ERTL an HORN, im Musée du Congo.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

***humillima* GESTRO, 1893 (*Cicindela*)**

(Ann. Mus. Genova (2) 13, 353)

Mehrere Syntypen, Birmania, am Fluß Iravaddi, Bhamò, Teinzò, Shwegoo, Kathà, Rangoon, leg. FEA, in Coll. FEA.

DEI: 14 Ex. Birmania, Bhamò, VI. VIII. 1885 und 1 Ex. Teinzò, 1886; leg. FEA: Syntypen.

***hybrida grumi* TSCHITSCHERIN, 1903 (*Cicindela*)**

(Horae Soc. Ent. Ross. 36, 98)

16 Syntypen. Monts Nan-shan, région de la riv. Babo-che, 11.000' — 12.700' d'alt., expéd. GRUM-GRZHIMAÏLO! 1890, ex Coll. SEMENOV.

DEI: 3 Syntypen, Babo-che, u X 51 — X0, Do 13, VIII. 1890.

***hybrida hamifasciata* KOLBE, 1886 (*Cicindela*)**

(Arch. Naturg. 52, 1, 170)

Mehrere Syntypen, Korea, IX. 1884, zwischen Söul und Pingan, leg. GOTTSCHKE, im Museum Berlin.

DEI: 1 Syntypus, Korea, ex Museum Berlin.

***hybrida iberica* MANDL, 1935 (*Cicindela*)**

(Arb. morph. tax. Ent. 2, Nr. 4, 302—303)

Mehrere Syntypen, Nordspanien, Soria, Valadolid, Olmedo, in Coll. MANDL und Coll. HORN.

DEI: 1 ♂, Espagne, ex Coll. LE MOULT; 1 Ex. Hispanien, Olmedo, leg. LAUFFER; 1 ♂, Valladolid; 1 Ex. Lagune de Valladolid: Syntypen.

Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Valadolid“ steht auf dem Etikett „Valladolid“.

***hybrida kozlovi* TSCHITSCHERIN, 1903 (*Cicindela*)**

(Horae Soc. Ent. Ross. 36, 99)

10 Syntypen, Thibet or., région Dabasun-gobi (au SE du lac Dalai-dabasu et au N de la chaîne Tamyrtyn-ula), expéd. KOZLOV und KAZNAKOV!, 1901, ex Coll. SEMENOV.

DEI: 3 Syntypen, Dabasun-gobi, 2. VIII., VIII. 1901, Exped. KOZLOV.

***hybrida lusitanica* MANDL, 1935 (*Cicindela*)**

(Arb. morph. tax. Ent. 2, 4, 303)

Mehrere Syntypen, Portugal, Nord-Estremadura, Marinha Grande, in Coll. MANDL und Coll. HORN.

DEI: 5 Syntypen, Portugal, Marinha Grande (nicht Marinha!), durch LE MOULT.

***hybrida magnifica* HORN, 1905 (*Cicindela*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 156)

Mehrere Syntypen, Nord-Mongolei, Changai-Gebirge.

Der Fundort wurde aus Ent. Nachr. 141; 1893 entnommen.

DEI: 29 Syntypen, nördl. Mongolei, Changai-Gebirge, durch REITTER-LEDER.

***hybrida magygarica* ROESCHKE, 1891 (*Cicindela*)**

(In: HORN & ROESCHKE, Mon. pal. Cic., 35, 38, 40, Taf. 1, Fig. 8f—g; Taf. 5, Fig. 8c)

Mehrere Syntypen, Ungarn, leg. MERKL.

DEI: 5 Syntypen: 4 Ex. S.-Ungarn; 1 Ex. Banat; leg. MERKL; 1 Ex. ohne Fundort.

***hybrida majalis* MANDL, 1935 (*Cicindela*)**

(Arb. morph. tax. Ent. 2, Nr. 4, 304—305)

Mehrere Syntypen, Italien, Benevento, Lavello, Sambiasi-Calabrien, Stazzano, Pianazo, Modena, Bebbiena, Spilamberto-Emilia, in Coll. MANDL, Coll. HORN und im Naturhistorischen Museum Wien.

DEI: Syntypen: 1 Ex. Italien, durch REITTER-LEDER; 1 Ex. Italien, Lavello, durch REITTER; 3 Ex. Benevento, 5. 97, durch ROUSSEAU.

***hybrida przewalskii* DOKHTOUROFF, 1887 (*Cicindela*)**

(Horae Soc. Ent. Ross. 21, 439)

Mehrere Syntypen, Thibet septentr., am Fluß Yang tzékiang und Kon-tschun-tschu, Tschun-Tschu-Oumà, Bydjun, 12.000—14.000 ft., leg. PRZEWAŁSKY.

DEI: 2 ♂♂, 1 ♀ Syntypen, Amdo, 1884, leg. PRZEWAŁSKY.

***hybrida pseudoriparia* MANDL, 1935 (*Cicindela*)**

(Arb. morph. tax. Ent. 2, Nr. 4, 305)

Mehrere Syntypen, Westküste Frankreichs, St. Jean de Monts, Arcachon, Pau, Gave der Pau; Spanien, Bilbao.

DEI: 6 Ex. St. Jean de Monts, durch SIRGUEY; 2 Ex. dto. durch VENDIC; 1 Ex. Arcachon, durch HORN; 1 Ex. Gave de Pau, durch MICOLAS; 5 Ex. Bilbao, durch HEYNE: Syntypen.

25 Beitr. Ent. 23, H. 5/8

hybrida reitteri HORN, 1897 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 253)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Mongolia borealis, Urga, durch REITTER.

DEI: 1 Syntypus, Mongolia borealis, durch REITTER.

hybrida rumelica APFELBECK, 1904 (*Cicindela*)

(Käferf. Balkanh. 1, 5)

Mehrere Syntypen, Ost-Rumelien, am See Vajakiöj, leg. APFELBECK.

DEI: 4 Syntypen, Burgas, Vajakiöj-See, leg. APFELBECK.

illecebrosa DOKHTOUROFF, 1885 (*Cicindela*)

(Horae Soc. Ent. Ross. 19, 280)

Mehrere Syntypen, Kourgan-Tubé, am Fluß Vakch (Sourkhab, Kisyl-soù), Boukhara, IV., leg. GROUM-GRGIMAÏLO.

DEI: 1 Syntypus, Kourgan-Tubé, ex Coll. DOKHTOUROFF.

immaculatum HORN, 1924 (*Procephalus*)

(Rev. Col. Nac. Vic. Rocafuerte 6, nr. 15/18, 10, Taf. Fig. 4)

Mehrere Syntypen, Ecuador occid., Naranjapata, leg. CAMPOS. (Der Fundort wurde aus Revista Chil. H. N. 29, 182; 1925 entnommen.)

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

impressifrons CHAUDOIR, 1864 (*Collyris*)

(Ann. Soc. Ent. Fr. (4) 4, 500)

3 ♂♂, 1 ♀ Syntypen, Cochinchine, durch DEYROLLE, im Museum Paris.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Cochinchine, 1874, ex Coll. CHAUDOIR.

incerta HORN, 1892 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 81)

♂ Holotypus, Insel Philippin, ex Coll. RICHTER; im DEI.

Syn. zu *terminata* DEJEAN, 1825.**incognita** HORN, 1892 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 82)

♀ Holotypus, Neu-Seeland?, ex Coll. RICHTER; im DEI [ohne Fundort].

Syn. zu *austromontana* BATES, 1878.**indica** FLEUTIAUX, 1893 (*Cicindela*)

(Ann. Soc. Ent. Fr. 62, 484)

Mehrere Syntypen, Inde, im Museum Genua.

DEI: 1 Syntypus, Indien, ex Coll. FLEUTIAUX.

innocens HORN, 1893 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 199)

♀ Holotypus, Nova Guinea; im DEI.

innocentior HORN, 1904 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 427)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Deutsch Neu-Guinea, leg. HAUSER; im DEI.

insignis coapteroides HORN, 1935 (*Collyris*)

(Koleopt. Rundsch. 21, 53–54)

♂ Holotypus, Assam, Margherita, IV. – V. 1889, leg. DOHERTY, ex Coll. V. DE POLL; im DEI.

insignis pseudacrolia HORN, 1935 (*Collyris*)

(Koleopt. Rundsch. 21, 54)

1 ♀, Philippinen, ex Coll. BROWN; 1 ♀, dto., ex Coll. RUGE; 1 ♀, Insel Negros, Cuernos Mts., Coll. BAKER; 1 ♂, Punjab, ex Coll. Museum Tring.; Syntypen.

DEI: 1 ♀, Insel Negros, Cuernos, Coll. BAKER; 1 ♀, Philippinen, ex Coll. BROWN; 1 ♂ Punjab: Syntypen.

insignis semiaenescens HORN, 1935 (*Collyris*)

(Koleopt. Rundsch. 21, 52–53)

♀ Holotypus, Laos, Oberer Mekong [V.]; im DEI.

insperata crassicollis HORN, 1934 (*Cicindela*)

(Ver. Ges. Lux. Naturf., Nr. 6, 7, 8, 9, 10, 73–74, Separat Abdruck)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Lower Tana-Sabake, IV. – V. 1932, leg. TURNER und ARTHUR.

DEI: 1 ♀ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Tana-Sabake“, steht auf dem Etikett „Tana-Sabakil“.

intempestiva PÉRINGUEY, 1893 (*Cicindela*)

(Trans. S. Afr. Phil. 7, 53)

Mehrere Syntypen, South Africa, Cape Colony, Bathurst, Seymour.

DEI: Syntypen: 1 Ex. ohne Fundort, Nr. 22; 1 Ex. Seymour, 1892; ex Coll. PÉRINGUEY.

Syn. zu *marginella* DEJEAN, 1826.

intermedia HORN, 1892 (*Cosmema*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 68)

(♀) Holotypus, Caffraria [Zulu-Caffraria]; im DEI.

Syn. zu *elegantula* BOHEMAN, 1848.**intermedia** SLOANE, 1906 (*Megacephala*)

(Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 31, 323, Taf. 29, Fig. 55)

Mehrere Syntypen, N. W. Australia, King's Sound, Carnot Bay, in Coll. MAC LEAY Museum, FRENCH, LEA, SLOANE.

DEI: 1 ♂ Syntypus, N. W. Australia, Carnot Bay, ex. Coll. SLOANE.

interrupta DOKHTOUROFF, 1883 (*Distypsidera*)

(Rev. Mens. Ent. 1, 7)

Mehrere Syntypen, Australia, Somerset.

DEI: 1 Syntypus, Australia, Somerset, I. 1875, leg. D'ALBERTIS.

Syn. zu *gruti* PASCOE, 1862.**interruptofasciata** FLEUTIAUX, 1893 (*Cicindela*)

(Ann. Soc. Ent. Fr. 62, 494, Fig.)

Holotypus, Birmanie, Siam, Lakhon, leg. HARMAND.

DEI: Holotypus, Lakhon, 1878, leg. HARMAND.

Syn. zu *mouhoti* CHAUDOIR, 1865.**intersita** PÉRINGUEY, 1893 (*Cicindela*)

(Trans. S. Afr. Phil. 7, 53)

Mehrere Syntypen, South Africa, Cape Colony, Riversdale, Enon.

DEI: 1 Syntypus, Cape Colony, Enon., ex Coll. PÉRINGUEY.

Syn. zu *marginella* DEJEAN, 1826.**intricatorugulosa** HORN, 1942 (*Tricondyla*)

(Arb. morph. tax. Ent. 9, 139)

♀ Holotypus, Ceylon, Urugalla, 5. V. 1902; im DEI.

invicta PÉRINGUEY, 1894 (*Myrmecoptera*)

(Trans. Ent. Soc. London, 452)

Mehrere Syntypen, Mashunaland, Salisbury, leg. MARSHALL.

DEI: 3 Syntypen, Mashunaland.

io microgemmea HORN, 1932 (*Cicindela*)

(Rec. South Austral. Mus. 4, 551—552, Fig. 2)

Mehrere Syntypen, North-East Papua, Mt. Lamington, 1.300—1.500 ft., leg. MCNAMARA, im South Australian Museum.

DEI: 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

iodopleura BATES, 1872 (*Odontochila*)

(Ent. Monthly Mag. 8, 285)

Mehrere Syntypen, Chontales, Nicaragua, durch BELT.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

jacobsoni HORN, 1913 (*Cicindela*)

(Not. Leyd. Mus. 35, 249)

Syntypen: 2 ♀♀, Simalur, Lasikin, IV. 1913 (nos. 2756 und 2758); 1 ♀, Simalur, Labuan Badjang, VI. 1913 (no. 3743); leg. JACOBSON, in Coll. JACOBSON und Coll. VETH.

DEI: 1 ♀ Syntypus, Labuan Badjang, VI. 1913, leg. JACOBSON.

janthinum FAIRMAIRE, 1903 (*Megalomma*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. 47, 359)

Mehrere Syntypen, Région Malgache, Ankarahitra, leg. PERRIER.

DEI: Syntypen, Madagascar, 2 Ex.; 1 Ex. dto. Suberblle; leg. PERRIER.

jo HORN, 1900 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 203—204)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, N. Guinea, Milne Bay [durch STAUDINGER]; im DEI.

jordani HORN, 1896—97 (*Caledonomorpha*)

(Ann. Mus. Genova (2) 17, 270)

Mehrere Syntypen: Fergusson, IX.—XII. 1894, leg. MEEK, Tring; M¹⁸ Astrolabe, II. 1893, leg. LORIA, im Museum Genua und Tring.DEI: 2 Ex. N. Guinea S. E., M¹⁴ Astrolabe, II. 1893, leg. LORIA, ex Museum Genua; 1 Ex. Fergusson I., IX.—XII. 1894, leg. MEEK, ex Museum Tring.; Syntypen.

jordani HORN, 1899 (*Myrmecoptera*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 53)

♂ Holotypus, Lindi, XII. 1896, leg. REIMER, 1 Ex. dto., in Coll. Mus. Tring und Coll. HORN; 1 ♀, Zomba, Upp. Shire R., 3000 p., X.—XII. 1895, leg. RENDALL, in Coll. Mus. Tring; Paratypen.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.
Syn. zu *egregia* GERMAR, 1843.

jordani HORN, 1898 (*Odontochila*)
(Not. Leyd. Mus. 20, 102)

♂ Holotypus, mehrere Paratypen, Ecuador, Cachabé, low. c., XI. 1896, leg. ROSENBERG, im Museum Tring (ROTHSCHILD) und in Coll. HORN.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, ex Museum Tring.

juncta KRAATZ, 1887 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 150)

Mehrere Syntypen, ohne Fundort.
DEI: 1 ♀ Syntypus, ohne Fundort, 87, Coll. KRAATZ.
Syn. zu *decempustulata* MÉNÉTRIÉS, 1848.

junker KOLBE, 1892 (*Cicindela*)
(Stett. Ent. Ztg. 53, 144)

♀ Holotypus, Afrika, Njam-Njam, leg. JUNKER; [durch SCHLÜTER] im DEI.

juno HORN, 1901 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 355)

♂ Holotypus, Africa centr. Britann., Ubemba.
DEI: ♂ Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung, 1900, leg. GUILLEMÉ.

junodi PÉRINGUEY, 1893 (*Myrmecoptera*)
(Trans. S. Afr. Phil. Soc. 7 (1892), 67)

Mehrere Syntypen, South Africa, Delagoa Bay, 20 Meilen von Lourenço Marques.
DEI: Syntypen: 2 Ex. Delagoa Bay; 1 Ex. Lightfoot, 1893; 4 Ex. ohne Fundort; ex Coll. PÉRINGUEY.

kachowskyi HORN, 1903 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 422)

♀ Holotypus, Provincia „Harrar“, leg. KACHOWSKY, in Coll. HORN [X]; im DEI.

kampeni HORN, 1913 (*Cicindela*)
(Tijdschr. Ent. 56, 310)

♂ Holotypus, N. Neu-Guinea, Hollandia, 6. IV. 1911, leg. v. KAMPEN und GJELLERUP, in Coll. HORN; im DEI.

katangana MANDL, 1964 (*Neochila*)
(Rev. Zool. Bot. Afr. 69, Nr. 3—4, 307—308)

♂ Holotypus (No 543), Katanga, Kalehe, XI. 1937; 1 ♀ (No 548), dto.; 1 ♂ (No 544), Lulua, Kafakumba; 1 ♂ (No 563), Kafakumba, XII. 1932, leg. OVERLAET; 1 ♂ (No 545) Katanga, riv. Sashila, leg. OVERLAET; 2 ♂♂ (No 546 bis No 547), Mukunkoto, 1937; 2 ♀♀ (No 549—No 550), riv. Sashila; 1 ♀ (No 551), Luashi, XI. 1938, leg. FREYNE; im Musée Royal de l'Afrique Centrale, Tervuren; 1 ♀ (No 557), Katanga, Sashila, X. 1925, ex LE MOULT, ex Coll. HORN; 1 ♀ (No 553), Kalehe; 1 ♀ (No 562), Elisabethville, 1935, leg. RICHARD; in Coll. MANDL; Paratypen.
DEI: 1 ♀ Paratypus, Belg. Congo, Katanga, riv. Sashila, X. 1925 (No 557), ex LE MOULT.

kigonserana HORN, 1905 (*Odontochila*)
(Stett. Ent. Ztg. 66, 278)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Africae Germanicae Orientalis partes interiores, Kigonsera, leg. HAEFLIGER, via ERTL an HORN.
DEI: 1 ♀ Syntypus, Kigonsera, 1904.

kigonserana prototypica HORN, 1926 (*Odontochila*)
(Ent. Bl. 22, 165)

Mehrere Syntypen, Nord-Rhodesia, Belg. Congo, Mufungwa, 1.—16. XII. 1911, leg. BEQUAERT; 150—200 miles W- of Kambowe, 3500—4500 ft., leg. NEAVE; Deutsch-Ostafrika, Upangwa.
DEI: 1 Syntypus, Belg. Congo, Katanga.

kimberleyensis MJÖBERG, 1916 (*Megacephala*)
(Ark. Zool. 11, nr. 10, 3)

3 ♂♂, 2 ♀♀, Syntypen, Australien, Fitzroy River, Noonkanbah, Kimberley District.
DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, N. W. Australien, Kimberley District, durch MJÖBERG.

klagesi HORN, 1903 (*Tetracha*)
(Proc. Ent. Soc. Wash. 5, 332)

1 ♀, mehrere ♂♂, Syntypen, South Venezuela, in den Bergen von Parima, V.—VI. 1898—1900, 2.500—3.000 ft., leg. KLAGES.
DEI: 3 Syntypen, Venezuela, Mt. Juajual, 3500 ft. (nicht 2.500—3.000 ft.), 5. IV. 1900.

klugi HORN, 1898 (*Ctenostoma*)

(Rev. Cic., 28)

♂ Holotypus, Brasilia; im DEI.

Syn. zu *rugosum* KLUG, 1824.**klugi** HORN, 1893 (*Pogonostoma*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 14)

♀ Holotypus, Madagascar, ex Coll. RICHTER (Dupont); im DEI.

Syn. zu *elegans* BRULLÉ, 1834.**kolbei** HORN, 1897 (*Cicindela*)(Dtsch. Ent. Ztschr., 253; nom. praeocc. = *kolbeana* HORN, 1915, Gen. Ins. Cic. 273, Fig. 234)

2 ♀♀, Syntypen, D. O.-Africa, Ugogo, leg. v. BENNIGSEN; im DEI.

kolbei HORN, 1897 (*Cosmema*)

(Ent. Nachr. 23, 238)

1 ♂, 1 ♀, Afrika, Transvaal, Mp' home, im Museum Berlin; 1 ♀, Huilla, in Coll. HORN; Syntypen.

DEI: 1 ♀ Syntypus, Angola, Huilla, Coll. NONFRIED.

kolbei HORN, 1894 (*Cratichneumon*)

(Ent. Nachr. 20, 245)

Mehrere Syntypen, Togo, leg. CONRADT.

DEI: 2 Syntypen, Togo, leg. CONRADT.

Syn. zu *chrysopyga* HORN, 1892.**kollari** HORN, 1901 (*Neocollyris*)

(Rev. Cic., 47)

♂ Holotypus, centrales Indiae Orientalis Ant. provinciae; im DEI.

kraatzii HORN, 1894 (*Calochroa*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 172, Taf. 3, Fig. 4)

♀ Holotypus, Vorder-Indien, Nord-Canara, leg. ANDREWES.

DEI: ♀ Holotypus, Canara, 94, leg. ANDREWES.

Syn. zu *calligramma* SCHAUM, 1861.**kraatzii** DOKHTOUROFF, 1883 (*Cicindela*)

(Rev. Mens. Ent. 1, 10)

Mehrere Syntypen, N. Guinea, in Coll. DOKHTOUROFF

DEI: 1 Syntypus, Nov. Guinea.

Syn. zu *tetrachoides* GESTRO, 1876.**kraatzii** HORN, 1892 (*Collyris*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 365)

♂ Holotypus, Java, ex Coll. RICHTER; im DEI.

kraatzii HORN, 1899 (*Heptadonta*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 54)

♀ Holotypus, Sikkim; im DEI.

kraatzii HORN, 1894 (*Pogonostoma*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 221)

♂ Holotypus, Nossibé, durch KRAATZ; im DEI.

kraatzii HORN, 1900 (*Therates*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 195)

♂ Holotypus, Penang, im DEI.

krüperi HORN, 1892 (*Megacephala*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 91)

♂ Holotypus, Africa occident., leg. KRÜPER; im DEI.

Syn. zu *megacephala* OLIVIER, 1790.**labiomaculata** HORN, 1892 (*Collyris*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 357)

♂ Holotypus, Borneo, ex Coll. RICHTER; im DEI.

labiopalpis HORN, 1932 (*Collyris*)

(Soc. ent. France, Livre cent., 205, Fig. 15 u. 25)

♂ (!) Holotypus, Tonkin, Chapa [ex JEANVOINE, Coll. CLERMONT]; im DEI.

lacordairei DEJEAN, 1831 (*Iresia*)

(Spec. Col. 5, 207)

Mehrere Syntypen, Transversal.

DEI: 1 Syntypus, Rio, ex cab. DEJEAN-Coll. V. DE POLL.

lacunosa PUTZEY, 1875 (*Cicindela*)

(Compt. rend. Soc. Ent. Belg., 68 (sep. (2) 1875, nr. 14, 4))

Mehrere Syntypen, Ceylon, Anaradjapoora, leg. VOLXEM.

DEI: 1 ♀ Syntypus, Ceylon.

laeta TATUM, 1851 (*Myrmecoptera*)(Ann. Mag. Nat. Hist. (2) 8, 51; nom. praeocc. = *revoili* FAIRMAIRE, 1882. In: REVOIL, Faune & Flore Comalis Col., 6)

Mehrere Syntypen, Abyssinia.

DEI: 1 Syntypus, Abyssinia, leg. TATUM.

laevicollis mandli BASILEWSKY, 1966 (*Megacephala*)

(Ann. Mus. Afr. centr. (Sér. 8°) Sci. zool. no 152, 77, Fig. 17b)

Afrique, Kenya: ♂ Holotypus, Kibwezi, im MRAC; 11 Ex., dto. im MRAC, BM, ZMB und DEI; 1 Ex. dto. leg. SCHEFFER, im NMW; 5 Ex. Ikutha, im ZMB und DEI; 1 Ex. Bura, im MRAC; 1 Ex. lac Jipe, Teita Distr., rive NE, VII. 1957, leg. BASILEWSKY und LELEUP, im MRAC; 1 Ex. Brit. East Africa, 1900, leg. BETTON, im DEI: Paratypen.

DEI: Paratypen: 1 Ex. Africa or., Ikutha; 1 Ex. E. Africa, Kibwezi, durch JANSON; 1 Ex. Brit. East Africa, 1900, eg. BETTON.

lanei HORN, 1924 (*Cicindela*)

(Bull. Soc. Sc. Cluj 2, 47)

1 ♂, 2 ♀♀, Syntypen, Brésil, Rio Vaccaria, Matto Grosso.

DEI: 1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Matto Grosso, Vacaria (nicht Vaccaria!), XII. 1922, leg. LANE.

laportei HORN, 1900 (*Pogonostoma*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 193)

♂ Holotypus, Madagascar, Sikora, am Fuß des östl. Hochplateaus, im DEI.

lateralis HORN, 1905 (*Tetracha*)

(Not. Leyd. Mus. 25, 219)

♀ Holotypus, Amazonas, [Amazonen-Strom] in Coll. HORN; im DEI.

laticollis HORN, 1903 (*Dromica*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 318)

Mehrere ♀♀, Syntypen, Transvaal, Pietersburg, leg. DONCKIER.

DEI: 2 ♀♀, Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

latipennis WATERHOUSE, 1837 (*Manticora*)

(Ann. Mag. Nat. Hist. (2) 1, 503, Fig. 62)

Mehrere Syntypen, nahe Kurrichane, leg. SMITH.

DEI: 1 Syntypus, Port Natal, durch BANEMAN-KLUG, ex Museum Berlin.

leai SLOANE, 1905 (*Cicindela*)

(Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 30, 234)

Mehrere Syntypen, Australia, Cooktown, in Coll. HACKER, Coll. LEA, Coll. FRENCH und Coll. SLOANE.

DEI: Syntypen, Queensland: 1 Ex. Cooktown, 1906, ex Coll. SLOANE; 4 Ex. Cape York, Coen Distr., ex Coll. HACKER.

lefroyi HORN, 1908 (*Cicindela*)

(Rec. Ind. Mus. 2, 409)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Bengal, Pusa, Chapra, leg. LEFROY, via ANDREWES an HORN; im DEI.

lepidula HORN, 1903 (*Dromica*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 318)

Mehrere Syntypen, Transvaal, Pietersburg, leg. DONCKIER.

DEI: 5 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

leptalis BATES, 1881 (*Odontocheila*)

(Biol. Centr. Amer. Col. 1, 15)

Mehrere Syntypen, Mexico, Cerro de Plumas, leg. HÖGE, Juquila, leg. BOUCARD, Coll. SALLÉ.

DEI: 1 Syntypus, Mexico, Cerro de Plumas, leg. HÖGE, ex Museum Berlin.

leuconoe BATES, 1890 (*Cicindela*)

(Trans. Ent. Soc. London, 508, Taf. 16, Fig. 11)

Mehrere Syntypen, Mexico, Manzanillo in Michoacan, Acapulco in Guerrero; leg. HÖGE.

DEI: Syntypen: 2 Ex. Manzanillo, Michoacan; 3 Ex. Acapulco, Guerrero; leg. HÖGE.

levigata HORN, 1894 (*Collyris*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 14)

♀ Holotypus, Borneo or., Coll. KRAATZ; [1892, leg. FRUHSTORFER] im DEI.

levigatum HORN, 1908 (*Pogonostoma*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 367)

Mehrere Syntypen, Nordost-Madagascar, Amboaniho, Vohemar.

DEI: 5 Syntypen, Amboaniho.

levisculpta HORN, 1894 (*Distypsidera*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 222)

♂ Holotypus, Queensland; im DEI.

levithoracica HORN, 1891 (*Cicindela*)

(In: HORN & ROESCHKE, Mon. pal. Cic., 148—149)

Mehrere Syntypen, Süd-Kaukasus.

DEI: 1 Syntypus, Kaukasus, durch STAUDINGER.

Syn. zu *sublacerata* SOLSKY, 1874.**limbata** BERTOLONI, 1858 (*Dromica*)

(Mem. Accad. Bologna 1, 308, Taf. 23, Fig. 3, 4)

Mehrere Syntypen, am Fluß Magnárta, Prov. Inhambanensis Mozambici, leg. KAROLUS FORNASINTUS; Bononiae, 1848; in Coll. BERTOLONI.

DEI: 1 Syntypus, Mozambique, Magnárta.

limbigera PÉRINGUEY, 1893 (*Cicindela*)(Trans. S. Afr. Phil. Soc. 7, 60; nom. praecoc. = *limbifera* PÉRINGUEY, Gen. Ins. Cic., 271)

Mehrere Syntypen, South Africa; Cape Colony, Port Elisabeth; Transvaal, Potchefstroom, Boksburg; Orange Free State Parys; Natal, Frere.

DEI: Syntypen: 2 Ex. Excourt Natal; 1 Ex. ohne Fundort, ex S. African Museum; ex Coll. PÉRINGUEY.

limpopoiana PÉRINGUEY, 1893 (*Myrmecoptera*)

(Trans. S. Afr. Phil. Soc. 7, 69)

Mehrere Syntypen, South Africa, Middle Limpopo, Neighbourhood of Fort Tuli.

DEI: 1 Syntypus, Middle Limpopo, ex Coll. PÉRINGUEY.

linearis discretegrossesculpta HORN, 1942 (*Collyris*)

(Arb. morph. tax. Ent. 9, 140)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Tonkin, Hoah Binh, 1928, leg. COOMAN; im DEI.

linearis pronotalis HORN, 1901 (*Neocollyris*)

(Rev. Cic., 46)

♀ Holotypus, Siam, „Chan“, leg. MOUHOT; im DEI.

linearis srnkai HORN, 1894 (*Collyris*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 15)

♂ Holotypus, Birmania sup., Ruby Mines, 7500', ex Coll. SRNKA; im DEI.

lineifera SLOANE, 1913 (*Cicindela*)

(Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 38, 402)

Holotypus, mehrere Paratypen, W. Australia, 100 Meilen nördl. von Kalgoorlie, leg. DU BOULAY, im Museum Melbourne.

DEI: 1 Paratypus, W. Australia, 17. XI. 1911, leg. DU BOULAY.

Syn. zu *tetragramma* BOISDUVAL, 1835.**litorea alboreducta** HORN, 1934 (*Cicindela*)

(Ver. Ges. Lux. Nat. Nr. 6, 7, 8, 9, 10, 71)

1 ♀, Obock, ex Coll. Théry, 1 ♂, Djibuthi, ex Coll. Plason, STAUDINGER, 1913; in Coll. HORN; 1 ♂, 1 ♀, Djibuthi, XII. 1926, leg. OMER COPER, im Britischen Museum: Syntypen.

DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

liturata ROESCHKE, 1891 (*Cicindela*)

(In: HORN & ROESCHKE, Mon. pal. Cic., 69, Taf. 2, Fig. 6a)

Mehrere Syntypen, ohne Fundort.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, 88, Coll. KRAATZ.

Syn. zu *campestris* LINNÉ, 1758.**livingstoni** HAROLD, 1879 (*Cicindela*)(Col. Heft 16, 9; nom. praecoc. = *congoensis* PÉRINGUEY, 1888, Ann. Mag. Nat. Hist. (6) 2, 219)

Mehrere Syntypen, West-Afrika, aus dem Innern, 1874, leg. POGGE.

DEI: 1 Syntypus, Lunda Reich, leg. POGGE, durch HAROLD, ex Museum Berlin.

löffleri MANDL, 1969 (*Heptodonta*)

(Zeitschr. Arb. österr. Ent. 21, 2, 51—52, Fig. 1)

♂ Holotypus, 11 Paratypen, Nord-Borneo, Kinabalu-Westhang, ca. 1900 m, 5. III. 1969, leg. LÖFFLER, in Coll. MANDL.

DEI: 2 ♀♀, Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

lomii HORN, 1938 (*Cicindela*)

(Atti Mus. Civ. Stor. Natur. Trieste 14, 135—136)

Syntypen, Somaliland: 1 ♂, bei Belet-Uen, IV. 1926, leg. LOMI; 1 ♂, Gabredarre, 4. IV. 1937, leg. FACCA.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Somali/T., Gabredarre, 4. IV. 1937, leg. FACCA.

longestriata HORN, 1912 (*Cicindela*)

(Arch. Naturg. 78, A 11, 83)

Mehrere Syntypen, Französisch-Kongo, Fort-Sibut, ex. Coll. LE MOULT.

DEI: 2 Syntypen, H'Chari-Tchad, Fort-Sibut, ex Coll. LE MOULT.

longesulcata HORN, 1900 (*Tricondyla*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 194)

♀ Holotypus, Madikere; [Hindoustan Mérid.] im DEI.

longicollis HORN, 1892 (*Collyris*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 358)

2 ♂♂, Syntypen, Philippinen.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Ins. Philippinen, ex Coll. RICHTER.

Syn. zu *albivittata* ERICHSON, 1834.**longicornis** HORN, 1914 (*Cicindela*)

(Arch. Naturg. 79, A 11 (1913), 33)

♂ Holotypus, San Salvador, La Union; im DEI.

longilabris HORN, 1896 (*Oxychila*)

(Ent. Nachr. 22, 338)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Brasilia, in Coll. HORN und im Museum Berlin.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Brasilia.

Syn. zu *similis* HORN, 1892.**longipalpis** HORN, 1892 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 78)

♂ Holotypus, Java; im DEI.

loriae HORN, 1896—97 (*Cicindela*)

(Ann. Mus. Genova (2) 17, 272)

2 ♀♀, Syntypen, Nouvelle Guinée britannique, Paumotu Riv., IX.—XII. 1892, leg. LORIA, im Museum Genua.

DEI: 1 ♀ Syntypus, N. Guinea S. E., Paumotu Riv., IX.—XII. 1892, leg. LORIA.

lucasi DOKHTOUROFF, 1882 (*Cicindela*)

(Rev. Ent. 1, 274)

Mehrere Syntypen, N. Guinea, in Coll. DOKHTOUROFF.

DEI: 1 Syntypus, N. Guinea.

Syn. zu *funerata* BOISDUVAL, 1835.**lucidicollis aeneoparva** HORN, 1934 (*Prothyma*)

(Natuur. Maandblad 23, 145)

Mehrere Syntypen. Insel Philippinen, Samar, Biliran, Cabuntug, Sargao, leg. BAKER und GREGOR.

DEI: Syntypen, Philippinen: 4 Ex. Island Samar; 4 Ex. Island Biliran, leg. BAKER; 1 Ex. Cabuntug, Sargao;

1 Ex. Island Biliran; leg. GREGOR.

lucidicollis opacosericea HORN, 1929 (*Prothyma*)

(Ent. Nachr. 3, 6)

Mehrere Syntypen, S. O. Luzon, Mt. Isarog, 1916, leg. BÖTTCHER, Sorsogon, leg. BAKER, in Coll. BAKER, Washington und Coll. HORN.

DEI: Syntypen, S. Luzon: 1 Ex. Mt. Isarog; 2 Ex. Sorsogon, leg. BAKER.

luctuosa RAGUSA, 1904 (*Cicindela*)

(Il Natur. Sicil. 17, 85)

Mehrere Syntypen, Sicilia, Monello bei Palermo, VIII., leg. RAGUSA.

DEI: 1 Syntypus, Sicilia, leg. RAGUSA.

Syn. zu *aphrodisia* BAUDI, 1864.**lugens** RAGUSA, 1881 (*Cicindela*)

(Il Natur. Sicil. I, 5, Taf. 1, Fig. 1)

Syntypen: Mehrere Ex. Mondello bei Palermo, VII., leg. RAGUSA; 1 Ex. ohne Fundort, leg. ROTTENBERG.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, von RAGUSA geschenkt.

Syn. zu *aphrodisia* BAUDI, 1864.

tumulata mandli (SCHILDER) MANDL, 1967 (*Cicindela*)

(Ann. Nat. Mus. Wien 70, 381—382, Fig. 1)

52 Syntypen, zwischen Van und Üzalp, 27. V. 1966, Türkei-Expedition.
DEI: 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

luteoguttata BRANCSIK, 1892 (*Cicindela*)

(Jahrb. Naturw. Ver. Trencs. Com., 209)

5 Syntypen, Nossibé, leg. FREY.
DEI: 1 Syntypus, Nossibé, durch BRANCSIK.
Syn. zu *madagascariensis* HORN, 1892.

macleayi HORN, 1895 (*Collyris*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 81)

♀ Holotypus, Thibet; im DEI.
Syn. zu *smithi* CHAUDOIR, 1864.

maculicorne HORN, 1934 (*Pogonostoma*)

(Arb. morph. tax. Ent. 1, 31)

Mehrere Syntypen, N.-Madagascar, Mt. d'Ambre, ded. HEYNE und SICARD; 1 ♂, Volamar, zwischen Nossi Bé und Dagna Imarez, ded. JANSON; im Museum Paris und in Coll. HORN.
DEI: Syntypen, Madagascar: 2 Ex. Mt. d'Ambre, ded. SICARD, ex Museum Paris; 1 Ex. durch NICKERL; 1 Ex. Ambre Gebirge, ded. HEYNE; 1 Ex. zwischen Nossi Bé und Dagna Suarez, Volamar, ded. JANSON.
Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Dagna Imarez“ steht auf dem Etikett „Dagna Suarez“.

madagascariensis HORN, 1892 (*Euryoda*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 71)

♀ Holotypus, Madagascar, Nossibé [durch SCHRÖDER]; im DEI.

maheva FAIRMAIRE, 1897 (*Cicindela*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. 41, 363—364)

3 Syntypen, Suberbieville, leg. PERRIER.
DEI: 1 Ex. Madagascar, Suberbieville, leg. PERRIER; 1 Ex. ohne Fundort, durch FAIRMAIRE; Syntypen.
Syn zu *maheva* KÜNCKEL, 1887.

maindroni HORN, 1897 (*Cicindela*)

(Ent. Nachr. 23, 98)

Mehrere Syntypen, Kurrachee, Sind, M. VIII. 1896, leg. MAINDRON.
DEI: 2 Syntypen, Kurrachee, leg. MAINDRON.

maindroni HORN, 1900 (*Therates*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 197)

♂ Holotypus, Borneo occident., Pontianak, 1898, via MAINDRON an HORN; im DEI.

malabarica FLEUTIAUX & MAINDRON, 1903 (*Cicindela*)

(Bull. Soc. Ent. Fr., 72)

Mehrere Syntypen, Malabarica, am Fluß Mahesiae, leg. MAINDRON, in Coll. FLEUTIAUX, Coll. MAINDRON und im Museum Paris.
DEI: 4 Syntypen, Cote de Malabar, Mahé, VII. 1901, leg. MAINDRON.

malaris HORN, 1896 (*Cicindela*)

(Bull. Mus. Paris 2, 329)

♂ Holotypus, 2 Paratypen, Pébas, Haut-Amazone, 1847, leg. CASTELNAU; im Museum d'Histoire Naturelle de Paris.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

mandibularis HORN, 1895 (*Cratohaerea*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 86)

♀ Holotypus, Senegambia [leg. FELSCH]; im DEI.
Syn. zu *brunet* GORY, 1833.

marginata KRAATZ, 1890 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 367)

Mehrere Syntypen, ohne Fundort.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, Coll. KRAATZ.
Syn. zu *atrata* PALLAS, 1776.

marginepunctata HORN, 1908 (*Cosmema*)

(Not. Leyd. Mus. 30, 32)

Mehrere Syntypen, Angola, Chiyaka Distr., XI. 1907, leg. WELLMANN.
DEI: 8 Syntypen, Benguela, XI. 1907, leg. WELLMANN.

mariae GESTRO, 1893 (*Cicindela*)

(Ann. Mus. Genova (2) 13, 361)

Mehrere Ex. am Berg Carin Chebà, Biapò, 400—900 m, IV. 1888; 1 Ex. Umgebung Toungoo, am Fluß Sittang, V. 1888; leg. FEA; in Coll. FEA: Syntypen.

DEI: 1 Syntypus, Carin Chebà, 400—900 m, IV. 1888, leg. FEA.

maritima kirgisica MANDL, 1936 (*Cicindela*)

(Arb. morph. tax. Ent. 3, Nr. 1, 28—29)

Mehrere Syntypen, Mittel- und Südrussland: Tirowo, Mosir im Gouv. Minsk, Wolga- und Dnjeprinseeln und Buchten im Gouv. Kostroma und Saratow, Katherinenburg; Gouv. Saratow, Simbirsk, Cherson, Ural'sk, Kirgisensteppe; Fl. Andisk im Kaukasus.

DEI: Syntypen: 2 Ex. Kirgisen, durch KÖNIG; 1 Ex. Cherson, durch STAUDINGER; 1 Ex. Wolgabucht bei Saratow auf Sand, 30. VI. 1918, leg. BEHNING; 1 Ex. Saratow, 3. VII. 1919; 1 Ex. Andisk, ex cab. DETROLLE-Coll. V. DE POLL; 1 Ex. Tirowo, Mosir im Gouv. Minsk, 11. VI. 1905.

marquardti HORN, 1906 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 91)

Mehrere Syntypen, Sao Paulo oder Matto Grosso.

DEI: 6 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

marshallana HORN, 1901 (*Myrmecoptera*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 123)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Süd-Africa, Mashonaland, Umtali, Dec.

DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, XII. 1900, durch MARSHALL.

marshalli PÉRINGUEY, 1896 (*Cicindela*)

(Trans. S. Afr. Phil. Soc. 7, 108—109)

Mehrere Syntypen, South Africa, Zambezia, Salisbury.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, ex Coll. PÉRINGUEY.

marshallisculpta HORN, 1914 (*Cicindela*)

(Arch. Naturg. 79, A 11 (1913), 17)

♀ Holotypus, Deutsch-Ostafrika, Neu-Langenburg; im DEI.

mashuna PÉRINGUEY, 1894 (*Cicindela*)

(Trans. Ent. Soc. London, 448)

Mehrere Syntypen, Mashunaland, Salisbury, leg. MARSHALL.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, Nr. 30, ex Coll. PÉRINGUEY.

Syn. zu *uncivittata* QUEDENFELDT, 1883.

mastersi CASTELNAU, 1867 (*Cicindela*)

(Trans. Roy. Soc. Victoria, 8, 33)

Mehrere Syntypen, New South Wales, Eastern Creek.

DEI: 2 Syntypen, Eastern Creek, ex cab. BROWN — cab. CASTELNAU.

mathani HORN, 1897 (*Cicindela*)

(Ent. Nachr. 23, 18)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Ecuador, La Chima, I.—III. 1893, leg. MATHAN [1^{er} Semestre 1893]; im DEI.

mauchi albocostata HORN, 1939 (*Dromica*)

(Journ. East Afr. Uganda Nat. Hist. Soc. 14, 152)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Kitui, leg. TOKER, im Museum Coryndon und in Coll. HORN.

DEI: 1 Syntypus, Africa, Nairobu. Kitui, X. 1937, leg. TOKER.

maxillaris HORN, 1894 (*Cicindela*)

(Ann. Mus. Genova (2) 14, 679)

3 ♂♂, Syntypen, Sumatra, Si-Rambé, leg. MODIGLIANI.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Si-Rambé, XII.—III. 1891, leg. MODIGLIANI.

mediopilosa HORN, 1934 (*Megacephala*)

(Nat. Maandblad 12, 155)

♂ Holotypus, Australia occident., Swan-River, Carnarvon District, 1932, leg. LE MOULT; im DEI.

mediospinosa HORN, 1898 (*Pogonostoma*)

(Rev. Cic., 21)

♂ Holotypus, Diego-Madagaskar, Annanarivo; [leg. SIKORA] im DEI.

Syn. zu *coeruleum* CASTELNAU & GORY, 1837.

megalomoides HORN, 1896 (*Cicindela*)

(Ent. Nachr. 22, 342)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Madagaskar, Nossibé, leg. SIKORA; [durch DONCKIER] im DEI.

***megaspilota* DOHRN, 1884 (*Cicindela*)**

(Stett. Ent. Ztg. 45, 44)

Holotypus, Turkestan; im DEI.

Syn. zu *granulata* GEBLER, 1843.***melancholica semicircumcincta* MANDL, 1959 (*Cicindela*)**

(Stuttg. Beitr. Nat. 18, 2—3, Fig. 4)

♂ Holotypus, SO-Iran, Djiroft, Anbar Abad, leg. RICHTER; 29 Ex. dto., 1.—18. V. 1956; 1 Ex. Iran-Khuzistan, Shadegan, 1.—10. IV. 1956; 10 Ex. Iran-Belutschistan, Iranshar, 800 m, 1.—10., 22.—30., 23. IV., 1.—10., 11. bis 21. V. 1954, leg. RICHTER und SCHÄUFFELE; im Museum für Naturkunde Stuttgart: Paratypen.
DEI: Paratypen: 1 Ex. S. O. Iran, Djiroft, Anbar Abad, 1.—18. V. 1956, leg. RICHTER; 1 Ex. Iran, Belutschistan, Iranshar, 800 m, 22.—30. IV. 1954, leg. RICHTER und SCHÄUFFELE.

***mesoepisternalis* HORN, 1933 (*Cicindela*)**

(Mitt. Ent. Ver. Bremen 21 (Bericht), 3, Fig.)

♀ Holotypus, Kashmir, Skardo, VII. 1887, leg. LEECH; im DEI.

***microcephala* HORN, 1924 (*Cicindela*)**

(Philipp. Journ. Sc. 24, 87)

♀ Holotypus, Philippine, Mindanao, Surigao, leg. BAKER; im DEI.

***microtuberculatum* HORN, 1934 (*Pogonostoma*)**

(Arb. morph. tax. Ent. 1, 29—30)

3 ♀♀, Antongil Bay, 1898, leg. MOCQUERYS jr., im Museum Paris, in Coll. FLEUTIAUX und in Coll. HORN.
DEI: 1 ♀ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

***mimula* PÉRINGUEY, 1896 (*Cicindela*)**

(Trans. S. Afr. Phil. Soc. 7, 109)

Mehrere Syntypen, South Africa, Zambesia, Salisbury.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, ex Coll. PÉRINGUEY.

***minarum* PUTZEYS, 1845 (*Cicindela*)**

(Mém. Soc. Sc. Liège 2, 369)

7 Syntypen, Brésil, Province des Mines.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Brasilien, leg. PUTZEYS, ex Coll. RICHTER.

***minimum* HORN, 1893 (*Megalomma*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 197)

2 ♂♂, Syntypen, Madagascar, leg. GOUDOT, im Museum Berlin und in Coll. HORN.
DEI: 1 ♂ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

***minimum levisculptum* HORN, 1934 (*Pogonostoma*)**

(Arb. morph. tax. Ent. 1, 32)

♀ Holotypus, Forêt Analamazotra-Perinet, XII. 1930, leg. OLSUFIEFF; im DEI.

***minutissima* MANDL, 1967 (*Cicindela*)**

(Ent. Arb. Mus. FREY 18, 386—387)

♂ Holotypus, Australia, Northern Territory, Beswick, I. 1958, leg. DEMARZ; mehrere Paratypen, dto.; in Coll. FREY, Tutzing und in Coll. MANDL.

DEI: 3 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

***minutula* GUÉRIN, 1849 (*Cicindela*)**

(Rev. Mag. Zool., 144)

3 Syntypen, Port. Guinée, an der Quelle Kakand, nahe des Dorfes Papels, 1,5 km von Cacheo, leg. BOCANDÉ.
DEI: 1 Syntypus, Senegal port., ex cab. BROWN — Coll. V. DE POLL.

***miseranda* HORN, 1893 (*Cicindela*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 200)

2 ♂♂, Syntypen, Bukoba, leg. STUHLMANN, im Museum Berlin und in Coll. HORN.
DEI: 1 ♂ Syntypus, Bukoba, 19. XI. 1890, leg. STUHLMANN.

***mixta* HORN, 1892 (*Cicindela*)**(Dtsch. Ent. Ztschr., 215; nom. praeocc. = *mixtula* HORN, 1915, Gen. Ins. Cic., 409)

2 ♀♀, Syntypen, ohne Fundort, ex Coll. RICHTER; im DEI.

***modica* GESTRO, 1893 (*Cicindela*)**

(Ann. Mus. Genova (2) 13, 354)

Mehrere Syntypen, Birmania, Palon, Pegu, VIII., IX., leg. FEA, in Coll. FEA.

DEI: Syntypen: 2 Ex. Palon, Pegu, VIII., IX. 1887; 1 Ex. Birmania, Rangoon, VI. 1887; 1 Ex. Birmania, Bhamò, VIII. 1886; leg. FEA.

Syn. zu *decempunctata* DEJEAN, 1825.

mona lisa HORN, 1927 (*Cicindela*)

(Ent. Mitt. 16, Nr. 1, 56, Fig. 1)

♂ Holotypus, Küstengebiet des Persischen Golfes, Bender Abbas, leg. SCHMIDT [27.—29. V. 1926]; im DEI.

moseri HORN, 1901 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 356)

Mehrere Syntypen, Insula Larat, Timor Laut, durch MOSER.

DEI: 5 Syntypen, Larat Insel, Tenimber I.

motschulskyi HORN, 1893 (*Cicindela*)(Dtsch. Ent. Ztschr., 198; nom. praecoc. = *motschulskyana* HORN, 1915, Gen. Ins. Cic., 289)

♀ Holotypus, Ind. or.; im DEI.

mucronata JORDAN, 1894 (*Cicindela*)

(Nov. Zool. 1, 663)

Mehrere Syntypen, N. Luzon, Philippines, 5.000—6.000 ft., 1894, leg. WHITEHEAD.

DEI: 1 Syntypus, N. Luzon, C. Engano, leg. WHITEHEAD.

murchisona corpulenta HORN, 1907 (*Megacephala*)

(Not. Leyd. Mus. 29, 63)

♀ Holotypus, Queensland borealis, in Coll. HORN; [Nr. 13, durch BATES] im DEI.

murchisona elongata HORN, 1934 (*Megacephala*)

(Natuur. Maandblad 23, 154)

18 ♂♂, 10 ♀♀, Syntypen, Violet-See (der ein Teil des Way-Sees ist), leg. DARLINGTON, Exped. HARVARD, im Museum Comp. Zool. Cambridge, USA, im W. Austral. Museum und in Coll. HORN.

DEI: 7 ♂♂, 4 ♀♀, Syntypen, Australia, L(ake), part of L. Way, Wiluna, W. A., 2., 3. XII. 1933, Exped. HARVARD, leg. DARLINGTON, ex Museum Cambridge, USA.

mygaloides THOMSON, 1857 (*Manticora*)

(Mon. Cic. 1, 66)

2 Syntypen, Mozambique, Kurrechan, Natal, in Coll. THOMSON.

DEI: 1 Syntypus, Mozambique, ex Coll. V. DE POLL.

Syn. zu *latipennis* WATERHOUSE, 1837.**nahuelbutas** PENA, 1957 (*Cylindera*)

(Rev. chil. Ent. 5, 35, Fig. 1—2)

♂ Holotypus, Caramávida Nahuelbuta (W), Arauco, 750 m, 25.—31. XII. 1953; 1 Ex. dto., 1.200—1.400 m, 1.—5. I. 1954; 27 Ex. Caramávida, 750 m, 25.—31. XII. 1953; 2 Ex. Caramávida, Nahuelbuta, 720—1.000 m, 5.—10. II. 1953; 139 Ex. Caramávida, 1.200—1.400 m, 1.—6. I. 1954; 18 Ex. Alto de Caicupil, 1.200—1.300 m, 8.—12. I. 1954; 37 Ex. Pichinahuel, 1.100—1.400 m, 23.—31. I. 1954; leg. PENA; im Museo Nacional de Historia Natural de Santiago, Sociedad Científica Chilena CLAUDIO GAY de Santiago, Colección Nacional de Insectos del Ministerio de Agricultura de Santiago, Investigaciones Entomológicas de la Universidad de Chile, Instituto Pedagógica de Santiago, en la Academia de Ciencias de California (U.S.A.), en la colección del WENDLER-FUNARO de New Rochelle (U.S.A.), en la colección DOEDEYNs, en Mineola (U.S.A.), U. S. National Museum Washington (U.S.A.), Chicago Natural History Museum, Chicago, Illinois (U.S.A.) y colección NELSON de Michigan (U.S.A.): Paratypen.

DEI: 1 Paratypus, Chile, Caramávida, Nahuelbuta, 1.200—1.400 m, 1.—16. I. 1954.

nanula HORN, 1937 (*Cicindela*)

(Ent. Bl. 33, 57)

5 ♂♂, 1 ♀ Syntypen, Insel Lucon, Laguna, Paete, leg. GREGOR, im National Museum Washington und in Coll. HORN.

DEI: 2 ♂♂, Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

natalensis PÉRINGUEY, 1886 (*Cicindela*)

(Trans. S. Afr. Phil. Soc. 4, 69)

2 Syntypen, Cape Colony, Kowie (wahrscheinlich der Fundort), in Coll. PÉRINGUEY.

DEI: 1 Ex. ohne Fundort, Nr. 39.

Syn. zu *intricata* DEJEAN, 1831.**natalica** PÉRINGUEY, 1893 (*Dromica*)

(Trans. S. Afr. Phil. Soc. 7, 77)

Mehrere Syntypen, Natal, D'URBAN.

DEI: 1 Syntypus, Natal.

Syn. zu *clathrata* KLUG, 1834.**neervoorti** HORN, 1914 (*Cicindela*)

(Arch. Naturg. 79, A 11 (1913), 27)

♂ Holotypus, Insel Engano, Res. Benkoden, leg. DOHERTY, ex Coll. V. DE POLL; im DEI.

neumanni KOLBE, 1894 (*Cicindela*)

(Stett. Ent. Ztg. 55, 361)

Mehrere Syntypen, Afrika, Magila in Usambara, Anfang V. 1893, leg. NEUMANN.

DEI: 1 Syntypus, Africa orient., mit den Angaben der Beschreibung, ex Museum Berlin.

***nevadica tubensis* CAZIER, 1939 (*Cicindela*)**

(Bull. Brooklyn ent. Soc. 34, 25)

♀ Holotypus, Arizona, Tuba City, Coconino Co., 5. VII. 1937, leg. ALLEN, in Coll. CAZIER; 5 ♂♂, 10 ♀♀, Paratypen, dto.; in Coll. ALLEN und Coll. CAZIER.

DEI: 1 ♂, 1 ♀ Paratypen, Tuba City, Ariz., 5., 30. VII. 1937, leg. ALLEN.

***nietneri* HORN, 1894 (*Cicindela*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 200)

♂ Holotypus, Ceylon; im DEI.

***nietneri* HORN, 1895 (*Collyris*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 357)

♀ Holotypus, Ceylon; im DEI.

Syn. zu *punctatella* CHAUDOIR, 1864.***nigra* DOKHTOUROFF, 1885 (*Cicindela*)**

(Horae Soc. Ent. Ross. 19, 266)

Mehrere Syntypen, Boukhara, Samarkand, Djam, Karschy.

DEI: 2 Syntypen, ohne Fundort, ex Coll. DOKHTOUROFF.

Syn. zu *decempustulata* MÉNÉTRIÉS, 1848.***nigraelabris* DOKHTOUROFF, 1885 (*Cicindela*)**

(Horae Soc. Ent. Ross. 19, 266)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Taschkent.

DEI: 1 Syntypus, Turkestan, ex Coll. DOKHTOUROFF.

Syn. zu *decempustulata* MÉNÉTRIÉS, 1848.***nigricans* HORN, 1926 (*Oxygonia*)**

(Rev. Chil. Hist. Nat. 30, 189)

2 ♂♂, 1 ♀, Syntypen, Gorgona Island (Columb.), Exped. St. GEORGE, Collenette. Museum Britann.

DEI: 1 ♀ Syntypus, Gorgona Island, on rocles in stream, VII. 1924, St. GEORGE Exped. Collenette.

***nigrilabris* BATES, 1890 (*Cicindela*)**

(Trans. Ent. Soc. London, 495)

Mehrere Syntypen, Mexico, Refugio in Durango, leg. HÖGE.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

***nigripalpis* HORN, 1894 (*Tricondyla*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 224)

♂ Holotypus, Insel Ceylon; im DEI.

***nigroplagiata* HORN, 1926 (*Myrmecoptera*)**

(Ent. Bl. 22, 164—165)

Mehrere Syntypen, Katanga, Sashila-Fluß, X. 1925, leg. LE MOULT.

DEI: 7 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

***nigroplagiata dilacerata* HORN, 1931 (*Myrmecoptera*)**

(Ver. Ges. Lux. Natur., 8)

Mehrere Syntypen, S-W-Katanga, Sandoa am Oberen Lulua, 10. XI. 1920/X. 1930, leg. OVERLAET.

DEI: 7 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, ex Musée du Congo.

***nigroreticulata* HORN, 1927 (*Cicindela*)**

(Rev. Chil. Hist. Nat. 31, 139—140, Fig. 9)

♂ Holotypus, Brazil, Chochilha Grande, leg. R. Grande do Sul; im DEI.

***nigrovittata* HORN, 1896 (*Cicindela*)**

(Stett. Ent. Ztg. 57, 172)

Mehrere Syntypen, Minas Geraes, in Coll. DOHRN und Coll. HORN.

DEI: 3 Syntypen, Minas Geraes, durch NONFRIED.

***nicinctoides* HORN, 1892 (*Cicindela*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 81)

♂ Holotypus, Vaterland Süd-Ost-Asien oder Malaiischer Archipel, ex Coll. RICHTER.

DEI: ♂ Holotypus, ohne Fundort, ex Coll. RICHTER.

Syn. zu *limosa* SAUNDERS, 1834.***novaseelandica* HORN, 1892 (*Cicindela*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 83)

Mehrere Syntypen, Nov. Zeeland, ex Coll. RICHTER.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

Syn. zu *helmsi* SHARP, 1886.

nubifera QUEDENFELDT, 1883 (*Cicindela*)

(Berl. Ent. Ztschr. 27, 243, Taf. 3, Fig. 2)

Mehrere Syntypen, Angola, Malange, leg. MECHOW.

DEI: 2 Syntypen, Malange.

Syn. zu *flavipes* PUTZEYS, 1880.**nudopectoralis** HORN, 1903 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 423)

♂ Holotypus, Deserta „Danakil“, 1896, leg. KACHOWSKY; im DEI.

oberthüri HORN, 1896 (*Oxychila*)

(Ent. Nachr. 22, 337)

2 ♂♂, Syntypen, Bolivia, Cochabamba, 1889, leg. GERMAIN, via OBERTHÜR an HORN; im DEI.

oberthüri HORN, 1896 (*Ozygonia*)

(Ent. Nachr. 22, 340)

Mehrere Syntypen, Prov. de Bolivar, Balzapamba, III.—IV. 1894, leg. MATHAN, in Coll. HORN und Coll. OBERTHÜR.

DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

obliquefasciata HORN, 1912 (*Therates*)

(Ent. Mitt. 1, 133)

2 ♂♂, 1 ♀ Syntypen, Formosa, Fuhosho, Alihang, leg. SAUTER, im Museum Viennensis und in Coll. HORN.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Formosa, Alihang, leg. SAUTER.

obliquus FLEUTIAUX, 1893 (*Therates*)

(Ann. Soc. Ent. Fr. 42, 497)

Mehrere Syntypen, Haute-Birmanie, États de Momeit, mines des Rubis, leg. DOHERTY, im Museum Genuea.

DEI: 1 Syntypus, H^{te} Birmanie, Mines des Rubis, 1200—2300 m, 1890, leg. DOHERTY, ex Coll. FLEUTIAUX.**obscurata** HORN, 1894 (*Collyris*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 218)

♂ Holotypus, Patria ignota, confer infra!

DEI: ♂ Holotypus, ohne Fundort.

Syn. zu *rugosa* CHAUDOIR, 1864.**obscuripes** BATES, 1886 (*Cicindela*)

(Ann. Mag. Nat. Hist. (5) 17, 70—71)

Mehrere Syntypen, Ceylon, Bogawantalawa, 27. XI.—27. IV. 1881—1882, leg. LEWIS.

DEI: 1 Syntypus, Ceylon, 3. IV. 1882, leg. LEWIS.

Syn. zu *nietneri* MOTSCHULSKY, 1859.**obsoletesignata** HORN, 1895 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 91)

♀ Holotypus, St. Catharina; im DEI (leg. RIEBE).

ocellifera HORN, 1905 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 144)

♂ Holotypus, Deutsch-Ostafrika, Mpwapwa, leg. v. BENNINGSEN, in Coll. HORN; im DEI.

octussis DOHRN, 1885 (*Cicindela*)

(Stett. Ent. Ztg. 46, 255)

Mehrere Syntypen, Turcomanniae, Merw.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort.

Syn. zu *decempustulata* MÉNÉTRIÉS, 1848.**o'neilli** HORN, 1924/1925 (*Dromica*)

(Proc. Rhodesia Sc. Assoc. 23, 24)

Mehrere Syntypen, S. Rhodesia, Chilimanzi Reserve, 17.—19. XII. 1919, Umvuma, XI.—XII. 1917; leg. O'NEIL.

DEI: Syntypen, S. Rhodesia, leg. O'NEIL: 1 Ex. Umvuma norfil, 1 Ex. dto. XII. 1917, 2 Ex. Chilimanzi Reserve, 17., 19. XII. 1919.

orbicollis SLOANE, 1904 (*Distypsidera*)

(Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 29, 529)

Mehrere Syntypen, Queensland, Cairns Distr., leg. DODD.

DEI: 1 Syntypus, Kuranda, durch HACKER.

ordinata JAKOVLEFF & DOKHTOUROFF, 1885 (*Cicindela*)

(Horae Soc. Ent. Ross. 19, 250, Taf. 11, Fig. 6)

Holotypus, Fergana, Dorf Balyktchy, leg. KUSCHAKIEWITSCH und WILKINS.

DEI: Holotypus, Fundort auf dem Etikett nicht zu lesen, 9. VII., ex Coll. JAKOVLEFF.

Syn. zu *deserticola* FALDERMANN, 1836.

***orichalcina* HORN, 1896 (*Collyris*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 149)

♂ Holotypus, mehrere Paratypen, Naga Hills, N-Manipur, Punjab, in Coll. ROTHSCHILD und Coll. HORN.
 DEI: Paratypen: 1 Ex. Assam, N-Manipur, 1 Ex. Naga Hills; ex Tring. Museum.

***oscari* HORN, 1904 (*Cicindela*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 425)

♀ Holotypus, Amuma/Gande Kore, Land Argobbas, 19. V. 1900, leg. v. ERLANGER und NEUMANN, Exped. vom Roten Meer zum Nil; im DEI.

***ovicolle* HORN, 1893 (*Pogonostoma*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 15)

2 ♂♂, Syntypen, Madagascar, im Museum Berlin (GOUDOT) und in Coll. HORN.
 DEI: 1 ♂ Syntypus, Madagascar, Sikora, Annanarivo.

***ovipennis* BATES, 1883 (*Cicindela*)**

(Trans. Ent. Soc. London, 214, Taf. 13, Fig. 1)

Mehrere Syntypen, Japan, Sado, leg. LEWIS.
 DEI: 1 Syntypus, Insel Sado, 6. X. 1881, leg. LEWIS.

***orychiiformis* HORN, 1905 (*Megacephala*) nom. nud.**

(Syst. Ind. Cic., 50)

DEI: 4 Syntypen, Philadelphia, leg. HAENSCH.

***palpalis* DOKHTOUROFF, 1888 (*Cicindela*)**

(Horae Soc. Ent. Ross. 22, 139)

Syntypen: 1 Ex. chinesisch. Provinz, Kan-szu, VI., leg. POTANIN; 1 ♂, 1 ♀, China, in Coll. DOKHTOUROFF.
 DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, China.
 Syn. zu *hybrida* LINNÉ, 1758.

***papuana* GESTRO, 1879 (*Distypsidera*)**

(Ann. Mus. Genova 14, 556)

3 Syntypen, Nova Guinea merid., am Fluß Katau und Fly, leg. D'ALBERTIS, im Museum Genua.
 DEI: 1 Syntypus, Nova Guinea, Katau, leg. D'ALBERTIS.

***paradoxa* HORN, 1892 (*Cicindela*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 75)

1 ♂, Ceylon, 2 Ex. im Museum Berlin; Syntypen.
 DEI: 1 ♂ Syntypus, Ceylon.

***parallelum* HORN, 1909 (*Pogonostoma*)**

(Soc. Ent. 24, nr. 12, 89)

Mehrere Syntypen, Madagascar, Majunga.
 DEI: 3 Syntypen, Madagascar, Majunga, durch DONCKIER.

***parovana platti* CAZIER, 1936 (*Cicindela*)**

(Bull. S. Calif. Acad. Sci. 35, 161, Fig. 6)

California, Benton's Crossing, Mono Co., VII., IX. 1935, leg. PLATT und CAZIER, ♂ Holotypus und mehrere Paratypen; in Coll. CAZIER, Coll. PLATT, Coll. BLOEKER, Jr. und in der California Academy of Sciences.
 DEI: 1 ♂, 1 ♀ Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung, 8. IX. 1935/12. VIII. 1936 (Funddatum in der Beschreibung nicht genannt).

***pauper* HORN, 1896 (*Cicindela*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 151, 358)

Holotypus, mehrere Paratypen, Lucon bor., leg. WHITEHEAD, in Coll. ROTHSCHILD und Coll. HORN.
 DEI: 2 Paratypen, Lucon, 94, leg. WHITEHEAD.
 Syn. zu *virginea* SCHAUM, 1860.

***pentacomioides* HORN, 1900 (*Odontochila*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 202)

♀ Holotypus, St. Paulo, im DEI.

***pentheri* HORN, 1899 (*Myrmecoptera*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 381)

2 ♀♀, Syntypen, Africa merid., Matabeland, leg. PANTHER.
 DEI: 1 ♀ Syntypus, Süd-Afrika, leg. PENTHER (nicht PANTHER!), ex Museum Vienn.

***péringueyi* HORN, 1895 (*Cicindela*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 359)

Mehrere Syntypen, Togo, leg. CONRADT.
 DEI: 5 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

péringueyi HORN, 1896 (*Dromica*)
(Ent. Nachr., 338)

♂ Holotypus, Region interior. Mosambic; im DEI.

perrieri FAIRMAIRE, 1897 (*Cicindela*)
(Ann. Soc. Ent. Belg. 41, 364)

Mehrere Syntypen, Malgacha, Suberbieville, leg. PERRIER, in Coll. OBERTHÜR.
DEI: 1 Syntypus, Madagascar, durch FAIRMAIRE.

perrieri FAIRMAIRE, 1900 (*Pogonostoma*)
(Bull. Soc. Ent. Fr., 135)

Mehrere Syntypen, Madagascar, Suberbieville, leg. PERRIER.
DEI: Syntypen, leg. PERRIER: 1 Ex. Madagascar, Suberbieville; 1 Ex. ohne Fundort.

phalangioides SCHMIDT-GOEBEL, 1846 (*Cicindela*)
(Faun. Col. Birm. 1, 8, Taf. 1, Fig. 5)

Mehrere Syntypen, aus einer der birmanischen Provinzen, 1836–1839, leg. HELFER.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, ex Coll. HELFER – Coll. NICKERL.

picolominii RIVERS, 1893 (*Amblychila*)
(Zoë 4, 219, Taf. 29)

Mehrere Syntypen, W. Arizona, Peach Springs, Truxton Valley, Höhe 5000 ft.
DEI: 2 Syntypen, Arizona, Peach Springs, leg. RIVERS.

piligera HORN, 1897 (*Cicindela*)
(Ent. Nachr. 23, 18)

♂ Holotypus, Minas Geraes, Coll. FAIRMAIRE, via FLEUTIAUX an HORN; im DEI.

pilosifrons HORN, 1924/25 (*Dromica*)
(Proc. Rhodesia Sc. Assoc. 23, 23)

♂ Holotypus, Rhodesia borealis, in Coll. HORN; im DEI.

pilosipes HORN, 1925 (*Cicindela*)
(Rev. Chil. H. N. 29, 181–182, Fig. 22d)

2 ♂♂, 1 ♀ Syntypen, Pto. Castilla, Rep. Honduras, 21. III., 11. IV. 1924, leg. BEQUAERT; im DEI.

pilosulum HORN, 1898 (*Ctenostoma*)
(Rev. Cic., 29)

♀ Holotypus, Pernambuco, Serra de Communaty, leg. GOUNELLE, I. – III. 1893; im DEI.

pinguis HORN, 1894 (*Collyris*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 14)

♀ Holotypus, Sumatra (Dehli); im DEI.

plagiata PÉRINGUEY, 1893 (*Myrmecoptera*)
(Trans. S. Afr. Phil. Soc. 7, 19, Taf. 2, Fig. 2)

Mehrere Syntypen, South Africa, Damaraland, Walfish Bay.
DEI: 5 Syntypen, Walfish Bay, I. 1892, ex Coll. PÉRINGUEY.
Syn. zu *pallida* FABRICIUS, 1801.

planicornis HORN, 1897 (*Bennigsenium*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 61)

Mehrere Syntypen, Deutsch-Ost Afrika, Dar-es-Salaam.
DEI: Syntypen: 6 Ex. mit den Angaben der Beschreibung; 1 Ex. ohne Fundort; ex Coll. v. BENNIGSEN.

planifrons HORN, 1905 (*Collyris*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 293)

♀ Holotypus, Ceylon; im DEI.

planifrons HORN, 1896 (*Dromica*)
(Ent. Nachr. 22, 339)

♂ Holotypus, Zululand, ex Coll. BROWN; im DEI.

planifrontoides HORN, 1925 (*Collyris*)
(Ent. Rec. Journ. Var., 165)

Syntypen, Ceylon: 1 ♂, 1 ♀, Anuradhapura, 7. XII. 1916, leg. HENRY; 1 ♀, Wellawaya, XI. 1905.
DEI: Syntypen: 1 ♀, Wellawaya, XI. 1905, 1 Ex. Anuradhapura, 7. XII. 1916.

plasoni HORN, 1903 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 423)

♀ Holotypus, Borneo bor., Kinibalu, leg. EVERETT, durch PLASON; im DEI.

- plicaticollis*** HORN, 1911 (*Ctenostoma*)
(Ent. Bl. 7, 153)
♂ Holotypus, Peru, Amazonas, Tarapoto, IV. trim. 1885, leg. MATHAN; im DEI.
- pticicollis*** HORN, 1901 (*Neocollyris*)
(Rev. Cic., 63—64)
♀ Holotypus, Ind. or. merid., Nilgiri Hills; im DEI.
- plurigemmosa*** HORN, 1937 (*Cicindela*)
(Occ. Pap. Bernice P. Bishop Mus. 13, 1—3, Fig. 1)
5 ♂♂, 2 ♀♀, Syntypen, Solomon Islands, Tulagi, 16.—24. XII. 1934, leg. PAGDEN, „Sasapi cutting“.
DEI: 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, SAKM.
- plustchevskyi*** DOKHTOUROFF, 1883 (*Distypsidera*)
(Rev. Mens. Ent. 1, 7)
2 Syntypen, Australie, Somerset, in Coll. DOKHTOUROFF.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, I. 1875, leg. D'ALBERTIS.
Syn. zu *gruti* FASCOE, 1862.
- praecisa*** BATES, 1890 (*Cicindela*)
(Trans. Ent. Soc. London, 498, Taf. 16, Fig. 4)
Mehrere Syntypen Mexico, Chilpancingo in Guerrero, leg. SMITH und HÖGE.
DEI: 1 Syntypus, Chilpancingo, Guerrero, leg. HÖGE.
- prepusula*** HORN, 1907 (*Odontochila*)
(Stett. Ent. Ztg. 68, 328)
Mehrere Syntypen, Matto Grosso.
DEI: 6 Syntypen, Matto Grosso, durch STAUDINGER.
- pretiosa*** DOKHTOUROFF, 1882 (*Cicindela*)
(Rev. Ent. 1, 276)
Mehrere Syntypen, Amazone, in Coll. DOKHTOUROFF.
DEI: 2 Syntypen, Amazone.
- princeps angusto-nigrescens*** HORN, 1928 (*Therates*)
(Koleopt. Rundsch. 14, 169)
♂ Holotypus, Ost-Borneo, Mahakan-Fluß, Songei Boh, Coll. MjöBERG; im DEI.
- prodiga*** ERICHSON, 1847 (*Cicindela*)
(Arch. Naturg. 13, 68)
Mehrere Syntypen, Peru.
DEI: 2 ♀♀, Peru, Cumbase, durch STAUDINGER.
- prodotiformis*** HORN, 1892 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 88)
♂ Holotypus, West-Africa, ex Coll. RICHTER-PLASON; im DEI.
- proepipleuralis*** HORN, 1926 (*Myrmecoptera*)
(Ent. Bl. 22, 164)
Mehrere Syntypen, Katanga, Sashila-Fluß, X. 1925, leg. LE MOULT.
DEI: 4 Syntypen, B. Congo, Katanga, riv. Sashila, leg. LE MOULT.
- pronotalis*** HORN, 1922 (*Cicindela*)
(Zool. Meded. 7, 108)
♀ Holotypus, Tonkin, Hoo-Binh, leg. DONCKIER; im DEI.
- proserpina*** HORN, 1904 (*Cicindela*)
(Dtsch. Ent. Ztschr., 424)
♂ Holotypus, Kaffa, leg. NEUMANN und v. ERLANGER, Exped. vom Roten Meer zum Nil.
DEI: ♂ Holotypus, Kaffa, II., leg. NEUMANN.
- prothymoides*** HORN, 1908 (*Cicindela*)
(Stett. Ent. Ztg. 69, 120)
Mehrere Syntypen, Malabar, Karkur Ghat, leg. ANDREWES; in Coll. ANDREWES und Coll. HORN.
DEI: 2 Syntypen, Malabar, Karkur Ghat.
- pseudanthracinum*** HORN, 1934 (*Pogonostoma*)
(Arb. morph. tax. Ent. 1, 30—31)
Mehrere Syntypen; Diego Suarez, leg. HEYNE, ALLUAUD und DONCKIER; Mt. d'Ambre, leg. HEYNE und SICARD;
Forêt Analamazotra-Perinet, 12.—13. XII. 1930, leg. OLSUFIEFF; im Museum Paris und in Coll. HORN.

DEI: Syntypen: 1 Ex. Amber Geb.; 1 Ex. Diego Suarez; 1 Ex. dto. leg. HEYNE; 1 Ex. Madagascar, Diego Suarez, 1893, leg. ALLUAUD; 1 Ex. Madagascar, ex cab. BROWN; ex Coll. EHLERS V. DE POLL; 2 Ex. Forêt Analamazotra-Perinet, 12.—13., 18.—20. XII. 1930 (Funddatum in der Beschreibung nicht genannt), leg. OLSUFIEFF; 1 Ex. Mt. d'Ambre, leg. SICARD, ex Museum Paris.

***pseudochrysis* HORN, 1929 (*Odontochila*)**

(Rev. Chil. Hist. Natur. 33, 382—383, Fig. 94)

Syntypen: 1 ♂, Matto Grosso, via STAUDINGER & BANG-HAAS; 1 ♀, Bolivia, Prov. Del Sara, Coll. STEINBACH, in Carnegie Museum, Pittsburgh.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Matto Grosso.

***pseudocoarctata* HORN, 1924/25 (*Dromica*)**

(Proc. Rhodesia, S. Assoc. 23, 23)

2 ♂♂, 2 ♀♀, Syntypen, S. Rhodesia, Vumba Mts., 2.—15. XI. 1924, im Rhodesia Museum und in Coll. HORN.

DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, 5.700 ft., 2.—15. II. (nicht 2.—15. XI.!).

***pseudocylindriformis* HORN, 1914 (*Prothyma*)**

(Arch. Naturg. 79, A 11 (1913), 15)

Mehrere Syntypen, Formosa, Shisha, V.—VI. 1912, Banshoryo-Distrikt, Sokutsu, leg. SAUTER.

DEI: Syntypen, Formosa: 2 Ex. Shisha, V.—VI. 1912, 2 Ex. Shis A 5 6, V.—VI. 1912, 1 Ex. Sokutsu, Banshoryo-Distrikt, 1912; leg. SAUTER.

***pseudodeserticola* HORN, 1891 (*Cicindela*)**

(In: HORN & ROESCHKE, Mon. pal. Cic., 112, Taf. 3, Fig. 15)

Mehrere ♂♂, Syntypen, chinesisch Turkestan, Chotan, 1200 m, VI., leg. CONRADT.

DEI: 2 ♂♂, Syntypen, Chotan, 1200 m, 18. VI. 1890, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

***pseudodromica* HORN, 1932 (*Cicindela*)**

(Stylops 1, 81)

2 ♀♀, Syntypen, Trichinopolis, Mudukolam, IX. 1931, leg. Sammler des Government Entomologist, Combatore (P. S. N.), im Imperial Institut of Entomology und in Coll. HORN.

DEI: 1 ♀ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

***pseudointerposita* HORN, 1924 (*Cicindela*)**

(Mem. Depart. Agr. India 8, nr. 9, 90)

Mehrere Syntypen, Insula Panaon, XII. 1915, Coll. BOETTCHER.

DEI: 5 Syntypen, Philippinen, Panaon.

***pseudolongipalpis* HORN, 1930 (*Cicindela*)**

(Arch. Hydrobiol., Suppl., 8, 47)

Mehrere Syntypen, Südsumatra, in der Nähe Tjurup, am Wasserfall Kapala Tjurup und am Musi-Fluß, in der Nähe von Aër Simpang, S., 6. V. 1929, leg. FEUERBORN; in Coll. HORN, in Museen Dresden, Hamburg, Leiden und Amsterdam.

DEI: 5 Syntypen, Sumatra, Musi-Tjurup, 6. V. 1922.

***pseudo-minimum* HORN, 1934 (*Pogonostoma*)**

(Arb. morph. tax. Ent. 1, 29)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, in silvis Analamazotra-Perinet, 10.—12. VII. 1930, leg. Familie OLSUFIEFF; im DEI.

***pseudo-nana* HORN, 1924 (*Cicindela*)**

(Mem. Dep. Agr. Ind., 8, nr. 9, 90)

1 ♂, 2 ♀♀, Syntypen, Luzon, Mt. Banahao, IV.—VI. 1914, via MAINDRON-KERREMANS und MOSER an HORN.

DEI: Syntypen, Luzon: 1 Ex. Mt. Banahao, IV. 1914, Coll. BOETTCHER; 1 Ex. durch MAINDRON-KERREMANS.

***pseudoplebeja* MANDL, 1960 (*Cicindela*)**

(Beitr. Ent. 10, Nr. 1—2, 185—186)

♂ Holotypus, Cairns, Barron River, I. 1907, leg. DODD; 19 Paratypen, dto.; in Coll. HORN und Coll. MANDL.

DEI: Paratypen: 6 Ex. Cairns; 8 Ex. Cairns, Barron River, 4 Ex. dto., I. 1907; leg. DODD.

***pseudopupillata* HORN, 1938 (*Cicindela*)**

(Ent. Beih. 5, 12, Taf. 56, Fig. 26)

♂ Holotypus, Neu-Guinea, Toricelli Gebirge, 900 m, leg. SCHLAGINHAUFEN; im DEI.

***pseudorafflesia* HORN, 1925 (*Cicindela*)**

(Ent. Bl. 21, 139)

1 ♂, Nord-West Australien, Sharks Bay, Carnarvon, leg. SLOANE, 1 ♀ Nord-Australien, leg. BLACKBURN, in Coll. HORN; Syntypen; im DEI.

***pseudorusticana* HORN, 1921 (*Cicindela*)**

(Ent. Bl. 17, 182)

2 ♂♂, Syntypen, Neu-Kamerun, Pama-Quelle, IV. 1913, Coll. HOVY, im Museum Berlin und in Coll. HORN.

DEI: 1 ♂ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

***pseudoscabra* PÉRINGUEY, 1893 (*Mantichora*)**

(Trans. S. Afr. Phil. Soc. 7, 10, 16)

♂ Holotypus, Ovampoland, Cunene River, leg. ERIKSSON [1890–1891]; im DEI.
Syn. zu *latipennis* WATERHOUSE, 1837.***pseudosignata* HORN, 1902 (*Collyris*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 70)

2 ♀♀, Syntypen, Tonkin, Montes Maous, IV. – V. 1900, 2–3000', leg. FRUHSTORFER; im DEI.

***pseudospeciosa* HORN, 1932 (*Collyris*)**

(Soc. ent. France, Livre cent., 208)

Mehrere Syntypen, Philippinen, Insel Sibuyan, leg. BAKER, in Coll. HORN und im National Museum Washington.
DEI: 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.***pseudosuturalis* HORN, 1914 (*Cicindela*)**

(Arch. Naturg. 79, A 11 (1913), 21)

2 ♀♀, Syntypen, Angola, Katanga, Bihe, XII. 1906, 5200 Fuß hoch, leg. WELLMANN.
DEI: 1 ♀ Syntypus, Katanga.***pseudotereticollis* HORN, 1929 (*Cicindela*)**

(Stett. Ent. Ztg. 90, 322)

♀ Holotypus, Belg. Congo, Katanga, Kinda, via STAUDINGER & BANG-HAAS an HORN; im DEI.

***pseudotrimaculata* HORN, 1934 (*Prothyma*)**

(Mém. Acad. Malgache 20, 22)

Mehrere Syntypen, N.-W. Madagascar, Ramena, Sambirano, Antseva-Ambobaka, XI. 1933/I. – II. 1934, leg. MELLIS; 1 ♀, Majunga, leg. DONCKIER.

DEI: Syntypen, N.-W. Madagascar: 11 Ex. Antseva-Ambobaka, Ramena, 1 Ex. Antseva, XI. 1931; leg. MELLIS; 1 Ex. Majunga, leg. DONCKIER.

Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Majunga“ steht auf dem Etikett „Mazunga“.

***psilogramma* BATES, 1890 (*Cicindela*)**

(Trans. Ent. Soc. London, 507, Taf. 16, Fig. 10)

Mehrere Syntypen, Mexico, Villa Lerdo in Durango, leg. HÖGE.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

Syn. zu *tenuisignata* LECORDAIRE, 1851.***punctata* DOKHTOUROFF, 1882 (*Cicindela*)**

(Rev. Ent. 1, 216)

Mehrere Syntypen, Turkestan.

DEI: 1 Ex. Cal-Kuldscha?, 1 Ex. Fluß Tamla: Syntypen.

Syn. zu *granulata* GEBLER, 1843.***punctipennis* FAIRMAIRE, 1903 (*Megalomma*)**

(Ann. Soc. Ent. Fr. 72, 181)

Mehrere Syntypen, Région Malgache, Ankarahitra, leg. PERRIER.

DEI: 1 Syntypus, Ankarahn, leg. PERRIER.

Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Ankarahitra“, steht auf dem Etikett „Ankarahn“.

***purpurea* HORN, 1895 (*Collyris*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 82)

Mehrere Syntypen, Java.

DEI: 5 Syntypen, Java occident., Pengalengan, 4000, Sukabumi, 2000, 1893, leg. FRUHSTORFER.

***putzeysi* HORN, 1900 (*Cicindela*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 207)

♂ Holotypus, Angola; [Kakonda] im DEI.

***quadrinotatus binotatus* HORN, 1892 (*Euprosopus*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 69)

♀ Holotypus, Brasilia, ex Coll. RICHTER; im DEI.

***quadripunctulata* MANDL, 1969 (*Cicindela*)**

(Reichenbachia 12, Nr. 5, 154–155)

♂ Holotypus, Indien, Madras, Anamalai Hills, Cinchona, 3500 ft., V. 1965, leg. NATHAN und mehrere Paratypen
dto.; in der Zoologischen Sammlung des Bayerischen Staates in München und in Coll. MANDL.

DEI: 6 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

***quadrisignata rivalieri* BASILEWSKY, 1966 (*Megacephala*)**

(Ann. Mus. Afr. centr. (Sér. 8°) Sci. zool. no 152, 46, Fig. 6b)

Afrique, Haute-Volta: ♂ Holotypus, Batie, VIII. 1954, leg. BAUDON, im MRAC; 1 ♂, Kolumbia, Bobo-Dioulasso, IX. 1959, leg. HAMON, im ORSTOM; N. Togo: 1 ♂, Sokode, im DEI; 1 ♂, de Sokode à Basari, leg. SCHRÖDER, im ZMB; N. Dahomey: 1 ♀, Parakou, im MRAC; 1 ♀, Djougou, im DEI; Paratypen.
DEI: 1 ♂, Paratypus, Sokode, ex Coll. v. BENNIGSEN.

***quadristriata* HORN, 1897 (*Cicindela*)**

(Ent. Nachr. 23, 239)

2 ♀♀, Syntypen, Afrika, Huilla [Coll. NONFRIED]; im DEI.

***quadrisulcata* HORN, 1935 (*Collyris*)**

(Koleopt. Rundsch. 21, 49)

♀ Holotypus, Süd-Madras; im DEI.

***quattuorpunctata* KRAATZ, 1890 (*Cicindela*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 282, Taf. 2, nr. 2, f. 3)

Mehrere Syntypen, Tarbagatei.

DEI: 1 Syntypus, Tarbagatai, Coll. KRAATZ.

Syn. zu *granulata* GEBLER, 1843.

***queenslandica* SLOANE, 1909 (*Cicindela*)**

(Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 34, 300)

Mehrere Syntypen, Queensland, Cairns ("Anderson, on seabeach"), via LEA an HORN.

DEI: 1 Syntypus, Cairns.

***quinquecostata* HORN, 1892 (*Dromica*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 67)

♂ Holotypus, Natal; im DEI.

***reconciliatrix* HORN, 1900 (*Euryoda*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 200)

♀ Holotypus, Tenasserim, im DEI.

***rectangulivertex* HORN, 1929 (*Collyris*)**

(Journ. F. M. S. Mus. 14, 465)

♀ Holotypus, British North Borneo, Sandakan, via BAKER an HORN; im DEI.

***rectolabialis* FAIRMAIRE, 1914 (*Prothyma*)**

(Arch. Naturg. 79, A 11 (1913), 13)

1 ♂, Madagaskar, Diego Suarez, leg. DONCKIER; 1 ♀, dto. in Coll. FLEUTIAUX: Syntypen.

DEI: 1 ♂ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

***reducta* HORN, 1892 (*Cicindela*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 370)

Mehrere Syntypen, Sumatra, ex Coll. RICHTER.

DEI: 5 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

Syn. zu *discreta* SCHAUUM, 1863.

***regalis atrospinosa* HORN, 1931 (*Megacephala*)**

(Ver. Ges. Lux. Naturf., 6–7 (Separatabdruck))

Mehrere Syntypen, Katanga, Kafakumba, 1928, leg. OVERLAET, Coll. LE MOULT, im Museum Congo und in Coll. HORN.

DEI: Syntypen, B. Congo, Katanga, Kafakumba: 2 Ex. Coll. LE MOULT; 7 Ex. 1928, leg. OVERLAET.

***regalis katangana* BASILEWSKY, 1950 (*Megacephala*)**

(Bull. Soc. ent. Fr. 55, 79)

Elisabethville (Mission, AGRICOLE LEPLAE, XI. 1911; MASSART, XI. 1930, Holotypus; SEYDEL, XI. 1948), Nieuw-dorp (Miss. AGRIC. LEPLAE, XII. 1911), Sampwe (BEQUAERT, XII. 1911), Mukabe-Kasari (DONCKER, 1936), Lukafu (DE WITTE, XI.–XII. 1930); 15 Ex. im Musée du Congo Belge à Tervuren; 1 Ex. im Institut royal des Sciences naturelles de Belgique: Elisabethville (BRÉDO, 1. 1939): Paratypen.

DEI: 1 Paratypus, Katanga, Makabe-Kasari, 1936, leg. DONCKER.

***regalis naivashae* BASILEWSKY, 1962 (*Megacephala*)**

(Ann. Mus. Afr. centr. (Sér. 8°), Sci. Zool. no. 107, 74, Fig. 6)

Holotypus, 24 Paratypen, Kenya, Naivasha, 2.000 m, 13.–14. V. 1937, Miss. Afrique orientale, im Musée Royal de l'Afrique Centrale, Tervuren.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, Miss. Zool. I. R. S. A. C. en Afrique orientale (BASILEWSKY und LELEUP), ex Coll. Mus. Congo.

***regalis revoili* LUCAS, 1881 (*Megacephala*)**

(Bull. Soc. Ent. Fr., 101)

Mehrere Syntypen, Somali, Ouarsanguelles, Darror, Karkar, leg. RÉVOIL.
 DEI: 1 Syntypus, Somali, Ouarsangueli, 1881, leg. RÉVOIL, ex Museum Paris.

***regalis rugipennis* HORN, 1935 (*Megacephala*)**

(Stett. Ent. Ztg. 96, 161—162)

♀ Holotypus, Ebango, XI., Schweiz. wiss. Exped. Angola, 1932/33; im DEI.

***regalis sebakuana* PÉRINGUEY, 1903 (*Megacephala*)**

(Bull. Soc. Ent. Fr., 338)

Mehrere Syntypen, Rhodésia merid., Sebakwe.

DEI: Syntypen, Rhodesia: Sebakwe, 1 Ex.; Gnelo, 1902, 1 Ex.; leg. PÉRINGUEY; Coll. PÉRINGUEY.

***regalis serratosetosa* HORN, 1932 (*Megacephala*)**

(Tijdschr. Ent. 75, 26—27)

Afrika, nahe Harrar und Kolubi, leg. KRISTENSEN, mehrere Syntypen.

DEI: 18 Ex. Harrar, 3 Ex. Kolubi-Ab.; leg. KRISTENSEN: Syntypen.

***regalis vansonii* BASILEWSKY, 1966 (*Megacephala*)**

(Ann. Mus. Afr. centr. (Sér. 8°), Sci., Zool. no. 152, 93—95)

Southern Rhodesia, Umtali: ♀ Holotypus, XII. 1953, im MRAC; 1 ♀, im AMNH; 1 ♂, XII. 1945, im NMSR; 1 ♀, 1902, leg. BODONG, im SAM; 6 ♂♂, 2 ♀♀, XI.—XII. 1931, leg. SHEPPARD, im MRAC; 1 ♂, X. 1952, leg. MYERE, im Museum FREY; 1 ♂, XI. 1953, leg. JUNOR, im Albany Museum; Wedza: 1 ♀, leg. BOULTON, im Carnegie Museum; Vumba Mts., Mpudzi Riv.: 2 ♀♀, XI. 1901, leg. MARSHALL, im RIPP und DEI; Chirinda: 1 ♀, 1912, leg. SWYNNERTON, im BM; Chirinda Forest: 2 ♀♀, I. 1948/XI. 1957, im NMSR und MRAC; 1 ♀, XII. 1952, leg. v. SON, im TM; Chirinda Forest, Mt. Selinda: 1 ♀, I. 1948, im MRAC; Mocambique, Vila Pery: 3 ♂♂, 1 ♀, XII. 1929, leg. LESNE, im MP, MRAC und DEI; Transvaal, Zoutpansberg: 1 ♀, 700 m, in Coll. MANDL; Koedoes River: 1 ♂, 2 ♀♀, XII. 1902, leg. BREYER, im TM und MRAC; Duivelskloof: 1 ♂, I. 1925, leg. JANSE, im TM; Krabbefontein, Politsi near Tzaneen: 1 ♀, I. 1914, im TM; Shilouvane: 3 ♀♀, 1904, leg. JUNOD, im MRAC, MP und DEI; Leydsdorp: 1 ♂, II. 1927, leg. v. SON, im TM; Pretoria: 1 ♂, XI. 1923, leg. JANSE, im TM; Grootdraai, Olifants Riv.: 1 ♀, XI. 1927, leg. LANG, im TM; Paratypen.
 DEI: Paratypen: 1 ♀, Mpudzi Riv., Mawida, XI. 1901, leg. MARSHALL; 1 ♀, Shilouvane, 1904; 1 ♂, Mozambique, Vila Pery, Anf. XII. 1920, leg. LESNE.

***regalis viridissima* BASILEWSKY, 1966 (*Megacephala*)**

(Ann. Mus. Afr. centr. (Sér. 8°) Sci. Zool. no 152, 102, Fig. 21 und 20b)

Afrique, N.E. Rhodesia: ♂ Holotypus, Chiengi, lac Moera, XII. 1946, leg. CASTERS, im MRAC; 9 ♂♂, 4 ♀♀, Ubemba, 1902, leg. GUILLEMÉ, im MRAC und im MP; 1 ♂, 2 ♀♀, Rosallas, im DEI; 2 ♂♂, 4 ♀♀, Kasama, XII. 1951, leg. BOLKOMB, im NMSR und im MRAC; 2 ♂♂, 4 ♀♀, Kabatu, im NMF, MCZ, Museum Prague und Museum Leiden; 2 ♂♂, Rhodesia, in Coll. MANDL: Paratypen.
 DEI: Paratypen: 1 Ex. N. West-Rhodesia, 2 Ex. Rhodesia, Rosalla, 1 Ex. Rhodesia, Rabetu (Fundort in der Beschreibung nicht genannt!); Coll. PLASON, STAUDINGER, 1913.

***respiciens* HORN, 1920 (*Cicindela*)**

(Ark. Zool. 13, nr. 11, 18)

Mehrere Syntypen, merid. Galla, Ganale, Haro Gobam, 7.—13. IV. 1901; Somali; leg. ERLANGER; im Museum Berlin und in Coll. HORN.

DEI: Syntypen: 3 Ex. S. Galla, Ganale, 7., 13. IV. 1901; 1 Ex. S. Galla, Haro-Gobana; leg. ERLANGER.

Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Haro Gobam“, steht auf dem Etikett „Haro-Gobana“.

***resplendens* DOKHTOUROFF, 1888 (*Cicindela*)**

(Horae Soc. Ent. Ross. 22, 143)

Mehrere Syntypen, Ordoss, VIII.

DEI: 2 Syntypen, Ordoss, 1884, leg. POTANIN.

***resplendens* HORN, 1902 (*Collyris*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 66)

♀ Holotypus, Tonkin, Montes Mauson, IV.—V. 1900, 2—3000', leg. FRUHSTORFER; im DEI.

***reticostata* HORN, 1908 (*Cicindela*)**

(Proc. Acad. Philad., 509)

♂ Holotypus, Angola, Enyalanganja, 3 Std. südl. von Ekuiva River, XI. 1907, leg. WELLMANN.

DEI: Benguela, XI. 1907, leg. WELLMANN; vielleicht Holotypus.

***revoili* FAIRMAIRE, 1882 (*Dromica*)**

(In: RÉVOIL, Faune & Flore Comalis, Col., 6)

Mehrere Syntypen meridionale-orientale Afrique.

DEI: 1 Syntypus, Somali, Ouarsanguelles, 1881, durch RÉVOIL.

***rhytidopteroides* HORN, 1924 (*Cicindela*)**

(Mem. Dep. Agric. India 8, nr. 9, 89)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Bengal.

DEI: 1 Ex. Hanus, Ledir, 1923.

ribbei HORN, 1895 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 360)

2 ♂♂, Syntypen, Salomo Archip., Shortlands Ins., leg. RIBBE.

DEI: 1 ♂ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

richteri HORN, 1901 (*Neocollyris*)

(Rev. Cic., 62)

♀ Holotypus, Borneo, ex Coll. RICHTER; im DEI.

ritsemae HORN, 1895 (*Cicindela*)

(Not. Leyd. Mus. 17, 15)

2 ♀♀, Syntypen, in den Bergen von Argentinien, Prov. Catamarca, 1893, leg. TEN KATE.

DEI: 1 ♀ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, Laogebirgstrasse, ex Museum Leyden.

roeschkei HORN, 1892 (*Collyris*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 365)

♀ Holotypus, Calcutta, ex Coll. RICHTER [Calcutta-ATKINSON]; im DEI.

roseiventris linearis HORN, 1905 (*Cicindela*)

(Syst. Ind. Cic., 22)

Mehrere Syntypen, Costa Rica, San Carlos, Coll. SCHILD-Burgdorf; im DEI.

DEI: 5 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

rothschildi HORN, 1896 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 152)

Holotypus, mehrere Paratypen, Luzon bor., leg. WHITEHEAD, 94, in Coll. ROTHSCHILD und in Coll. HORN.

DEI: 1 ♂, S. Luzon, Albay; 1 ♀, N. Luzon; leg. WHITEHEAD, 94, ex Museum Tring.: Paratypen.

rudolfbennigseni HORN, 1912 (*Cicindela*)

(Ent. Mitt. 1, 306)

♂ Holotypus, Neu-Guinea, Sattelberg, ex Coll. v. BENNIGSEN; im DEI.

rufiventris beckeri HORN, 1897 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 171)

Mehrere Syntypen, Mexiko, Sierra de Durango, nahe bei Canelas, leg. BECKER.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Sierra de Durango, leg. BECKER.

rufiventris nigroconfluens HORN, 1923 (*Cicindela*)

(Zool. Jahrb. Abt. Syst. 47, 322)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Costa Rica, Turrialba, leg. SCHILD; im DEI.

rufiventris reducta HORN, 1897 (*Cicindela*)(Dtsch. Ent. Ztschr., 171; nom. praeocc. = *rufiventris reducens* HORN, 1915, Gen. Ins. Cic., 386)

Mehrere Syntypen, Mexico, Guadalajara, leg. HÖGE.

DEI: 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

rufomarginata maculatovittata HORN, 1938 (*Cicindela*)

(Ent. Beih. 5, 11, Taf. 45, Fig. 15—19)

Mehrere Syntypen, Kassai-Land, Kondue, leg. LUJA; Franz. Kongo-Gebiet, Franceville und Diélé, via DONCKIER an HORN.

DEI: Syntypen, Congo: 11 Ex. Kassai, Kondue, leg. LUJA; 2 Ex. dto. Coll. ROLLE; 3 Ex. Diélé, Coll. DONCKIER; 1 Ex. Franceville, Coll. V. DE POLL; 1 Ex. ohne Fundort, ex Coll. RICHTER.

rugatilis BATES, 1890 (*Cicindela*)

(Trans. Ent. Soc. London, 497)

Mehrere Syntypen, Mexico, Toluca, leg. SALLÉ und HÖGE.

DEI: Syntypen: 1 Ex. Mexico, Toluca, leg. HÖGE und 1 Ex. dto., ex Coll. RICHTER.

rugei HORN, 1892 (*Collyris*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 354)

♀ Holotypus, Mindanao, ex Coll. RUGE; im DEI.

rugifer HORN, 1895 (*Procephalus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 354)

♀ Holotypus, Bahía; im DEI.

rugifer HORN, 1902 (*Therates*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 74)

♀ Holotypus, Tonkin, Montes Maous, IV. — V. 1900, 2—3000', leg. FRUHSTORFER; im DEI.

***rugosa* BERTOLONI, 1858 (*Dromica*)**

(Mem. Accad. Bologna, 1, 305, Taf. 23, Fig. 2)

Mehrere Syntypen; am Fluß Magnára, Prov. Inhambanensis Mosambici, leg. KAROLUS FORNASINIUS; Bononiae, 1848, Coll. BERTOLONI.

DEI: 1 Syntypus, Mokambo-Bai.

Syn. zu *bertolonii* THOMSON, 1856.***rugosoangustus* HORN, 1929 (*Therates*)**

(Ztschr. Insbiol. 24, 19—20)

♂ Holotypus, Tonkin, Chapa, 1. VII. 1927, leg. JEANVOINE; im DEI.

***rugulosus* HORN, 1900 (*Therates*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 194)

1 ♂, N. O.-Sumatra, Tebing tinggi, leg. SCHULTHEISS; 1 ♀, Java (?): Syntypen; im DEI.

***rusticana* PÉRINGUEY, 1893 (*Cicindela*)**

(Trans. S. Afr. Phil. Soc. 7, 43—44)

Mehrere Syntypen, South Africa, Transvaal, Barberton.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, ex Coll. PÉRINGUEY.

***ruth* HORN, 1907 (*Megacephala*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 266)

♂ Holotypus, Matto Grosso.

DEI: ♂ Holotypus, Garbe, Grenze von S-Paulo & Matto Grosso, durch STAUDINGER.

***saetigera* HORN, 1893 (*Cicindela*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 198)

♀ Holotypus, Cap York, durch SRNKA; im DEI.

***sarawakensis* THOMSON, 1957 (*Collyris*)**

(Arch. Ent. 1, 133)

Holotypus, Borneo, Sarawak, ex Coll. BATES; im DEI.

***sauteri* HORN, 1912 (*Cicindela*)**

(Ent. Mitt. 1, 134)

Mehrere Syntypen, Formosa, Kosempo, 1. V.—14. VI. 1908, Taihorin, VI. 1911; leg. SAUTER.

DEI: 5 Ex. Formosa, Taihorin, VI. 1911, 1 Ex. Kosempo, 2.—14. VI. 1908; leg. SAUTER: Syntypen.

***sauteri* HORN, 1912 (*Collyris*)**

(Ent. Mitt. 1, 131)

2 ♂♂, 2 ♀♀, Syntypen, Formosa, Taihorin, VII. 1911, leg. SAUTER.

DEI: 2 Syntypen, Formosa, Taihorin, VI. 1911 (Funddatum in der Beschreibung nicht genannt), VII. 1911, leg. SAUTER.

***sauteri grossepunctata* HORN, 1935 (*Collyris*)**

(Koleopt. Rundsch. 21, 49)

♂ Holotypus, Tonkin; im DEI.

***scabra* PÉRINGUEY, 1893 (*Mantichora*)**(Trans. S. Afr. Phil. Soc. 7, 16; nom. praecoc. = *manica* PÉRINGUEY, 1898, l. c. 10, 305)

Mehrere Syntypen: Delagoa Bay, Rikatla, Antiocha; Mashunaland, Manica Tuli; Mozambique.

DEI: 1 Syntypus, Delagoa Bay, ex Coll. PÉRINGUEY.

***scapularis* HORN, 1896 (*Odontochila*)**

(Bull. Mus. Paris 2, 328)

2 ♂♂, Syntypen, Cayenne, ex Coll. DEJEAN — Coll. CHAUDOIR.

DEI: 1 ♂ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

***schaefferi* HORN, 1903 (*Cicindela*)**

(Journ. New York Ent. Soc. 11, 213)

♀ Holotypus, „California?“, via SCHAEFFER (Brooklyn) an HORN; im DEI.

***schaumi* HORN, 1892 (*Collyris*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 366)

♀ Holotypus, Cornwallis, ex Coll. RICHTER; im DEI.

***schaumi* HORN, 1895 (*Otenostoma*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 354)

♀ Holotypus, Bahía [leg. FRUHSTORFER]; im DEI.

schaumi HORN, 1892 (*Deroerania*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 67)

1 ♀, Ceylon; 1 Ex. im Museum Berlin: Syntypen.

DEI: 1 ♀ Syntypus, Ceylon, leg. SCHLÜTER.

schaumi HORN, 1892 (*Megalomma*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 73)

♂ Holotypus, Madagascar, ex Coll. RICHTER; im DEI.

Syn. zu *viridicyanea* AUDOUIN & BRULLÉ, 1839.**schaumi** HORN, 1892 (*Myrmecoptera*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 220)

Ost-Afrika, 1 ♀, Madinula, in Coll. HORN, 1 ♀, Witu, Dana Fl., im Museum Berlin: Syntypen.

DEI: 1 ♀ Syntypus, Ost-Afrika, Madinula, leg. DE HILAIRE.

schaumi HORN, 1893 (*Pogonostoma*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 16)

♂ Holotypus, Madagascar, ex Coll. RICHTER-PLASON (GOUDOT); im DEI.

schaumi HORN, 1892 (*Therates*)(Dtsch. Ent. Ztschr., 69; nom. praeocc. = *schaumianus* HORN, 1905, Syst. Ind. Cic., 11)

♀ Holotypus, Borneo, ex Coll. RICHTER; im DEI.

schaumi HORN, 1892 (*Thopeutica*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 75)

♀ Holotypus, Celebes, Minahassa; im DEI.

schaumi triangulomicans HORN, 1942 (*Cicindela*)

(Arb. morph. tax. Ent. 9, 139—140)

♀ Holotypus, bei Koelawi Paloe im westlichen Celebes, 3100 m, III. 1937, leg. KALIS; im DEI.

schaumianus flavoornata HORN, 1931 (*Therates*)

(Ent. Nachrichtenbl. 5, 5—6)

5 ♂♂, Borneo occident., Mowong, Mitte IX. 1907, leg. MUIR, via ARANGUA an HORN; 4 weitere Ex. durch HADDEN an HORN; im Museum Honolulu und in Coll. HORN: Syntypen.

DEI: 3 ♂♂, Syntypen, W. Borneo, Mowong, IX. 1907, leg. MUIR.

schmalzi HORN, 1898 (*Ctenostoma*)

(Rev. Cic., 32)

2 ♀♀, Syntypen, St. Catharina, leg. SCHMALZ; im DEI.

schmalzi HORN, 1896 (*Oxychila*)

(Ent. Nachr. 22, 337)

Mehrere Syntypen, Brasilia, St. Catharina, durch SCHMALZ an HORN; 1 Ex. im Museum Berlin.

DEI: 1 Ex. Brasilia, durch FELSCHKE, 5 Ex. Joinville, durch SCHMALZ.

Syn. zu *similis* HORN, 1892.**schmidtgoebeli** HORN, 1893 (*Collyris*)

(Ann. Mus. Genova (2) 13, 378)

Birmanie, Teinzò, Carin Chebà, Tenasserim, leg. FEA, mehrere ♀♀, 4 ♂♂; in Coll. FEA: Syntypen.

DEI: 2 Syntypen, Carin Chebà, 900—1100 m, 5. XII. 1888, leg. FEA.

Syn. zu *variularis* CHAUDOIR, 1860.**schmidtgoebeli** HORN, 1895 (*Euryoda*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 87)

♀ Holotypus, Laos [leg. STEVENS]; im DEI.

schmidti HORN, 1927 (*Cicindela*)

(Ent. Mitt. 16, Nr. 1, 57, Fig. 2)

♀ Holotypus, Küstengebiet des Persischen Golfes, Bender Abbas, leg. SCHMIDT [27.—29. V. 1926]; im DEI.

schultzei HORN, 1908 (*Prothyma*)

(Philipp. Journ. Sc. 3, 273)

Syntypen, Philippinen: 2 ♂♂, Insula Romblon, No. 2049, 1 ♀, Insula Sibuyan, No. 1965; leg. GREGOR; in Coll. „Bureau of Science“, Manilensis.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Insula Romblon, leg. GREGOR, Acc. No. 2049.

schultzeorum HORN, 1904 (*Megacephala*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 430)

♀ Holotypus, Kamerun, Yola, 20. V. 1903, leg. SCHULTZE; im DEI.

schucarzi HORN, 1923 (*Cicindela*)

(Zool. Jahrb. 47, Abt. Syst., 324, f, c)

♂♂, 6 ♀♀, Syntypen; am Licht, Panama, Ancon, IV. 1911, leg. KRAFT; Canalzone, Alt-Panama, 15. V. 1909/49. II. 1912.

DEI: 1 Ex. Old Pan., Beach, 1 ♀, Old Panama, R. of Pan., 15. V. 1909, 1 ♂, 1 ♀, arc-light globe Ancon, CZ Pan., IV. 1911, leg. KRAFT; ex Coll. JENNINGS: Syntypen.

scitula SLOANE, 1909 (*Cicindela*)

(Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 34, 298)

♂ Holotypus, Australia, Northern Territory, Pine Creek Distr., durch FRENCH an SLOANE; [VII. 1909] im DEI.

scripta HORN, 1891 (*Cicindela*)

(In: HORN & ROESCHKE, Mon. pal. Cic., 141—143)

Süd-Ost-Rußland, Charkow, Kurusch, Derbent etc., mehrere Syntypen.

DEI: 1 Syntypus, Caucasus, durch STAUDINGER.

seidlitzii KRAATZ, 1890 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 111)

Mehrere Syntypen, wahrscheinlich ehemals Siebenbürgen.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, Coll. KRAATZ.

Syn. zu *elegans* FISCHER, 1823—1824.

seleiensis NIDEK, 1955 (*Cicindela*)

(Ent. Bl. 50 (1954), 232, Fig. 1—3)

♂ Holotypus, 2 ♂♂, Paratypen, Saleier, leg. KALIS, in Coll. v. NIDEK.

DEI: 1 ♂ Paratypus, Celebes, Ins. Saleier, XII. 1933, leg. KALIS.

semicincta HORN, 1892 (*Odontochila*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 69)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, ohne Fundort, ex Coll. RICHTER; im DEI.

Syn. zu *batesi* CHAUDOIR, 1860.

*

semilevis HORN, 1897 (*Dromica*)

(Ent. Nachr. 23, 98)

♂ Holotypus, Zululand, ex. Coll. DOKHTOUROFF; im DEI.

semperi HORN, 1893 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 320)

♂ Holotypus, Insel Philippinen; im DEI.

septentrionale FLEUTIAUX, 1903 (*Pogonostoma*)

(Bull. Soc. Ent. Fr., 172)

Mehrere Syntypen, Madagascar, Diego-Suarez, montagne d'Ambre, durch DONCKIER.

DEI: Madagascar, Diego Suarez, durch DONCKIER, 2 Syntypen.

sericeolongicornis HORN, 1926 (*Cicindela*)

(Ent. Mitt. 15, 76)

2 ♀♀, Syntypen, Uganda, Gulu, IV.—V. 1925, leg. CARPENTER.

DEI: 1 ♀ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

sericeus CASEY, 1897 (*Dromochorus*)

(Ann. New York Acad. Sc., 294)

2 ♂♂, 1 ♀ Syntypen, Texas.

DEI: 1 Syntypus, Texas, durch CASEY.

Syn. zu *beltragei* SALLÉ, 1877.

seriegutta HORN, 1934 (*Cicindela*)

(Mém. Acad. Malgache, 20, 28, Fig. 20)

5 ♂♂, 1 ♀ Syntypen, N.-W. Madagascar, Antseva, Ambobako, Riv. Ramena, XI. 1933/I., II. 1934, leg. MELLIS; im DEI.

seriepunctata HORN, 1892 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 80)

2 ♂♂, Syntypen, Darjeeling, von ATKINSON, ex Coll. RICHTER; im DEI.

seriepunctata HORN, 1929 (*Dromica*)

(Stett. Ent. Ztg. 90, 312—313)

Mehrere Syntypen, Katanga, Kinda, via STAUDINGER & BANG-HAAS an HORN.

DEI: 9 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

serietuberculata HORN, 1929 (*Dromica*)

(Stett. Ent. Ztg. 90, 314)

Syntypen, Katanga: 1 ♀, Kinda, via STAUDINGER & BANG-HAAS an HORN; 1 ♀, Kafakumba, via LE MOULT an HORN; im DEI.

setosula HORN, 1909 (*Dromica*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 92)

♀ Holotypus, Africa centralis, Kwango-District; im DEI.

***sezmaculata* PÉRINGUEY, 1893 (*Cosmema*)**

(Trans. S. Afr. Phil. Soc. 7, 85, Taf. 2, Fig. 8)

Mehrere Syntypen, South Africa, Transvaal, Lydenburg, Potchefstroom, Delagoa Bay, teste CHAUDOIR.

DEI: 1 Syntypus, Potchefstroom, N. 64, ex Coll. PÉRINGUEY.

Syn. zu *citrooguttata* CHAUDOIR, 1864.***shirakii* HORN, 1927 (*Cicindela*)**

(Wien. Ent. Ztg. 44, Nr. 1 u. 2, 41)

4 Syntypen, Formosa: 1 ♂, 1 ♀, Roeichi, nördlich-zentrales Formosa, ca. 8000 Fuß hoch, 14. IV. 1924; 1 ♂, 1 ♀, Tattaka, mittleres-zentrales Formosa, ca. 9000 Fuß hoch, 20. V. 1924; leg. SHIRAKI.

DEI: Syntypen, Formosa: 1 Ex. Roeichi, 15. IV. 1924 (nicht 14. IV. 1924!); 1 Ex. Tattaka, 20. V. 1924, ex Coll. LE MOULT.

***sicardi* HORN, 1927 (*Pogonostoma*)**

(Wien. Ent. Ztg. 44, Nr. 1 u. 2, 38)

Madagascar borealis, Mont d'Ambre, leg. SICARD, via SICARD an HORN, ♂ Holotypus; im DEI.

***sicheli* THOMSON, 1857 (*Manticora*)**

(Mon. Cic., 9, Taf. 2, Fig. 7, 8, 10)

Syntypen, Frontière de la Cafferie; 1 ♂, 1 ♀, in Coll. THOMSON, 1 ♂, 1 ♀, in Coll. MNISZECH, provenant de l'ancienne Coll. SAFFERLING.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Cape, ex Coll. V. DE POLL.

Syn. zu *tuberculata* GEER, 1778.***signata* HORN, 1902 (*Collyris*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 69)

Mehrere Syntypen, Tonkin, Montes Mauson, IV. – V. 1900, 2–3000' leg. FRUHSTORFER.

DEI: 6 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

***sikorae* HORN, 1896 (*Megalomma*)**

(Ent. Nachr. 22, 342)

♀ Holotypus, Madagascar, am Fuß des östl. Hochplateaus, leg. SIKORA; im DEI.

***sikorae* HORN, 1894 (*Pogonostoma*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 239)

Madagascar, durch SIKORA, 1 ♀; in Coll. SRNKA 1 ♂: Syntypen.

DEI: 1 ♀ Syntypus, Madagascar, durch SIKORA.

***similis* HORN, 1892 (*Euryoda*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 70)

1 ♀, Guinea; 1 ♀, im Museum Berlin; Syntypen.

DEI: 1 ♀ Syntypus, Guinea.

Syn. zu *versicolor* DEJEAN, 1825.***similis* HORN, 1892 (*Oxychila*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 89)

♀ Holotypus, Rio Grande do Sul; [durch STAUDINGER] im DEI.

***simpliceps* HORN, 1900 (*Ctenostoma*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 361)

♀ Holotypus, Rio de Janeiro; im DEI.

***simulator* HORN, 1894 (*Odontochila*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 223)

♂ Holotypus, Columbia; im DEI.

***simulatrix* HORN, 1896 (*Cicindela*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 150)

♂ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, Ins. Philipp.; in Coll. ROTHSCHILD und Coll. HORN.

DEI: 1 ♀ Paratypus, Ins. Philipp.

***sinaloae* BATES, 1890 (*Cicindela*)**

(Trans. Ent. Soc. London, 505)

Mexico, Mazatlan, leg. HÖGE, mehrere Syntypen.

DEI: 1 ♂, 2 ♀♀, Mazatlan, in Sinaloa, leg. HÖGE.

***singularis* FLEUTIAUX, 1899 (*Metopon*)**

(Bull. Soc. Ent. Fr., 255)

Mehrere Syntypen, Brésil, Jatahy, Prov. de Goyas.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

singularis somolica MANDL, 1959 (*Cicindela*)

(Bonn. Zool. Beitr. 10, Nr. 1—2, 101)

♂ Holotypus, 12 Paratypen, Berbera, leg. MARTIN, im Museum ALEXANDER KOENIG und in Coll. MANDL.
DEI: 1 Paratypus, Berbera, leg. MARTIN.**sinuosa** BRULLÉ, 1837 (*Cicindela*)

(Voyage Orbigny, Ins. Col., 8)

Mehrere Syntypen, am Ufer des Parana, Corrientes, leg. ORBIGNY.

DEI: 1 Syntypus, Parana, leg. ORBIGNY, durch SPENGER, Coll. WEBER.

sjöstedti HORN, 1927 (*Cicindela*)

(Wien. Ent. Ztg. 44, Nr. 1 u. 2, 42—43)

British-Ost Afrika, Gilgil, 8000 Fuß hoch, IV., leg. SANDBERG, mehrere Syntypen, im Museum Stockholm und in Coll. HORN.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

sloanei HORN, 1920 (*Megacephala*)

(Ark. Zool. 13, nr. 11, 2)

♀ Holotypus, Australia; im DEI.

smaragdina HORN, 1894 (*Collyris*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 220)

♀ Holotypus, Ind. or.; [durch DEYROLLE] im DEI.

soalalae FAIRMAIRE, 1903 (*Cicindela*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. 47, 358)

Mehrere Syntypen, Région Malgache, Soalala, Ankarahitra, leg. PERRIER.

DEI: 2 Ex. Soalala, 1 Ex. Ankarahis; leg. PERRIER: Syntypen. Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Ankarahitra“ steht auf dem Etikett „Ankarahis“.

sobrina erichsoni HORN, 1892 (*Tetracha*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 369)

♂ Holotypus, ohne Fundort, ex Coll. RICHTER; im DEI.

sobrina globosicollis HORN, 1914 (*Megacephala*)

(Arch. Naturg. 79, A 11 (1913), 5)

Mehrere ♂♂, Syntypen, Britisch-, Holländisch- und Französisch Guyana.

DEI: 1 ♂, Br. Guyana, durch STAUDINGER; 1 ♂, Surinam, Coll. SCHAUM; 1 ♂, Cayenne, Armitage, durch BATES; 1 ♂, Blanc: Syntypen.

solskyi DOKHTOUROFF, 1882 (*Cicindela*)

(Rev. Ent. 1, 275)

Mehrere Syntypen, Malacca, in Coll. DOKHTOUROFF.

DEI: 1 Syntypus, Malacca.

Syn. zu *conicollis* SCHAUM, 1862.**soror** HORN, 1935 (*Cosmema*)

(Stett. Ent. Ztg. 96, 163)

♀ Holotypus, W. Afrika, Angola, Benguella, 1913, ex Coll. PLASON, via STAUDINGER & BANG-HAAS an HORN; im DEI.

sparsimpilosa HORN, 1914 (*Cicindela*)

(Arch. Naturg. 79, A 11 (1913), 29)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Port Darwin, Palmerston, XI. 1908, leg. DODD; im DEI.

speciosula HORN, 1892 (*Collyris*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 361)

Mehrere Syntypen, Palawan.

DEI: 4 Syntypen, Palawan, durch STAUDINGER.

spectabilis PÉRINGUEY, 1893 (*Myrmecoptera*)

(Trans. S. Afr. Phil. Soc. 7, 64)

Mehrere Syntypen, South Africa, Zambezia.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, ex Coll. PÉRINGUEY.

spectabilis inhumerosa HORN, 1928 (*Therates*)

(Koleopt. Rundsch. 14, 169)

♂ Holotypus, Ost-Borneo, Mamakan-Fluß, Songei Boh, Coll. MjöBERG; im DEI.

speculifera HORN, 1934 (*Prothyma*)

(Mém. Acad. Malgache 20, 27)

Mehrere Ex. Madagascar, merid. Ampandradava, Bekily, 1 ♂, Ambovombé, 3. IV. 1932, 1 ♀, M-gne Kalambatitra, I. 1933; leg. SEYRIG; im Museum Paris und in Coll. HORN: Syntypen.

DEI: 29 Ex. S. Madagaskar, Ampandrandava, 1 Ex. Kalambatitra, I. 1933; leg. SEYRIG: Syntypen.
Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Ampandradava“ steht auf dem Etikett „Ampandrandava“.

spenceri SLOANE, 1897 (*Megacephala*)

(Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 22, 33)

Mehrere Syntypen, West-Australia, Murchison River, Coll. FRENCH.

DEI: 1 ♀ Syntypus, West-Australia, Murchison River.

sphaericollis HORN, 1931 (*Cicindela*)

(Ent. Nachr. 5, 3–4)

♂ Holotypus, Celebes, Macassar, Coll. V. DE POLL; im DEI.

spinicollis HORN, 1908 (*Cicindela*)

(Journ. Asiat. Soc. Bengal, Straits Branch, 50, 100)

♀ Holotypus, North Borneo; im DEI.

spinipenne HORN, 1893 (*Pogonostoma*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 13)

♀ Holotypus, aus dem Innern von Madagascar, leg. HILDEBRANDT; [ex. Coll. RICHTER] im DEI.

Syn. zu *chalybaeum* KLUG, 1835.

spinolae GESTRO, 1889 (*Cicindela*)

(Ann. Mus. Genova (2) 7, 85)

Mehrere Ex. Birmania, Teinzò, V., Bhamo, VI.; 1 Ex. Meetan, Tenasserim, IV.; in Coll. FEA: Syntypen.

DEI: 2 Syntypen, Birmania, Teinzò, 1886, Coll. FEA.

spinosa violaceanigra MANDL, 1956 (*Megacephala*)

(Opusc. Zool. München 11, 3)

Bolivia, Region Amazonica, Trinidad, X. 1951, leg. ZISCHKA, in Coll. ZISCHKA und Coll. MANDL, ♂ Holotypus, 6 Paratypen.

DEI: 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

spuria HORN, 1892 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 360)

♂ Holotypus, Sumatra, ex Coll. RICHTER; im DEI.

Syn. zu *cruentata* SCHMIDT-GOEBEL, 1846.

srnkae HORN, 1893 (*Pogonostoma*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 15)

♀ Holotypus, Madagascar, durch SRNKA; im DEI.

staudingeri HORN, 1892 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 368)

Mehrere Syntypen, Sao Paulo, durch STAUDINGER.

DEI: 5 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

Syn. zu *chlorosticta* KOLLAR, 1836.

staudingeri KRAATZ, 1883 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 27, 337)

5 Syntypen, Turkestan, Osch.

DEI: 1 Ex. Turkestan Osch., Coll. KRAATZ, ex cab. STAUDINGER-Coll. V. DE POLL; 1 Ex. ohne Fundort, Coll. KRAATZ: Syntypen.

Syn. zu *sturmi* MENÉSTRIS, 1832.

sternbergi HORN, 1898 (*Odontochila*)

(Not. Leyd. Mus. 20, 101)

♂ Holotypus, Venezuela, Coll. STERNBERG; im DEI.

stiengensis HORN, 1914 (*Collyris*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. 58, 138)

♀ Holotypus, Cochinchine, Stieng, ex Coll. CASTELNAU-Coll. BROWN-Coll. EHLERS v. DE POLL; im DEI.

strachani HOPE, 1842 (*Calochroa*)

(Ann. Mag. Nat. Hist. 10, 91)

Mehrere Syntypen, Sierra Leone, leg. STRACHAN.

DEI: 2 Syntypen, Guinea, ex Coll. DOKHTOUROFF.

strandii HORN, 1914 (*Dromica*)

(Arch. Naturg. 79, A 11 (1913), 11)

♀ Holotypus, Südost Angola; im DEI.

strandii HORN, 1914 (*Oxychila*)

(Arch. Naturg. 79, A 11 (1913), 7)

♂ Holotypus, Peru, Chanchamayo, leg. HEYNE.

strandii crebrepunctata HORN, 1929 (*Dromica*)

(Stett. Ent. Ztg. 90, 315)

♀ Holotypus, Katanga, Kawa-Fluß, XII. 1925, via LE MOULT an HORN; im DEI.

striolata auricollis FLEUTIAUX, 1886 (*Cicindela*)

(Compt. rend. Soc. Ent. Belg., 88)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Sumbava.

DEI: 1 ♀ Syntypus, Sumbava, ex Coll. FLEUTIAUX.

striolata uniens HORN, 1896 (*Cicindela*)

(Stett. Ent. Ztg. 57, 174)

S.-Palawan und Balabak, mehrere Syntypen.

DEI: 3 Ex. S.-Palawan, 6 Ex. Balabak; durch STAUDINGER: Syntypen.

striolata wetterensis HORN, 1914 (*Cicindela*)

(Arch. Naturg. 79, A 11 (1913), 28)

♀ Holotypus, Insel Wetter, 1901, leg. KÜHN; [Asia Arch.] im DEI.

stutzeri HORN, 1913 (*Dromica*)

(Rev. Zool. Afr. 2, 272)

Belg. Congo: 1 ♀, Katanga, leg. STUTZER; mehrere Ex. Elisabethville, 14. XI. 1911, leg. BEQUAERT und Miss. AGRIC. LEPLAE, im Musée du Congo: Syntypen.

DEI: Belg. Congo: 1 ♀, Katanga, leg. STUTZER; 3 Ex. Elisabethville, 14. XI. 1911, Miss. AGRIC. LEPLAE: Syntypen.

suavis HORN, 1896 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 151)

♀ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, Lucon merid., Albay, leg. WHITEHEAD, 94; in Coll. ROTHSCHILD und Coll. HORN.

DEI: 1 ♀ Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

subfasciata HORN, 1892 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 370)

♂ Holotypus, Sumatra, ex Coll. RICHTER; im DEI.

Syn. zu *discreta* SCHAUM, 1863.**sublacerata** SOLSKY, 1874 (*Cicindela*)

(Reise Turk. FEDTSCHENKO, Col., 8)

Mehrere Syntypen, bei der Stadt Kokan, 10. VI. 1871, 7. VI., auf der Strecke Mochrama—Biš-Aryk; leg. FEDTSCHENKO-Exped. Turk.

DEI: 1 Ex. Turkmenien, 1 Ex. ohne Fundort, ex Coll. RICHTER: Syntypen.

submetallicus niger CAZIER, 1937 (*Omus*)

(Pan-Pacific Ent. 13, 94)

♂ Holotypus (No. 4478 C. A. S. Ent.), Paratypen; 1 ♀ (No. 4479 C. A. S. Ent.) und mehrere Ex.; California, Wartham Canyon, Fresno Co., 26. III. 1937, leg. BLUM, 18. III. 1928, leg. WAGNER; in Coll. WAGNER, Coll. BLUM, Coll. NUTTING und Coll. CAZIER.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, 26. III. 1937, leg. BLUM.

subtilis HORN, 1904 (*Pogonostoma*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 1, 81)

Mehrere Syntypen, Diego-Suarez.

DEI: 5 Syntypen, Madagascar, Diego Suarez, 1893, leg. ALLUAUD.

subtilobscurata HORN, 1925 (*Collyris*)

(Ent. Bl. 21, 133)

♀ Holotypus, Basilan; im DEI.

subvittata KRAATZ, 1890 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 368)

Mehrere Syntypen, ohne Fundort.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, Coll. KRAATZ.

Syn. zu *atrata* PALLAS, 1776.**sumatrensis** HORN, 1896 (*Collyris*)

(Stett. Ent. Ztg. 57, 176)

Mehrere Syntypen, Insel Sumatra, Mitt I. 1894, leg. DOHRN.

DEI: 1 Syntypus, Soekaranda, I. 1894, leg. DOHRN.

suturalis HORN, 1900 (*Tetracha*)

(Ent. Nachr. 26, 53)

Ecuador, Posorja, leg. CAMPOS, mehrere Syntypen.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

tascosaensis DAVIS, 1918 (*Cicindela*)

(Bull. Brookl. Ent. Soc. 13, 33—34, Taf. 2)

♂ Holotypus, mehrere Paratypen, Texas, Tascosa, V. 1917, in Coll. DAVIS, Coll. HARRIS und Coll. LENG.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

Syn. zu *roseiventris* CHEVROLAT, 1834.**tenella** PÉRINGUEY, 1893 (*Myrmecoptera*)

(Trans. S. Afr. Phil. Soc. 7, 63—64)

♂ Holotypus, South Africa, Barberton, Transvaal.

DEI: ♂ Holotypus, ohne Fundort, ex Coll. PÉRINGUEY.

tenellula HORN, 1903 (*Dromica*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 317)

Gazaland, Mt. Chirinda, XII, leg. MARSHALL, mehrere Syntypen.

DEI: 5 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

tenuilineata HORN, 1892 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 80)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Madagascar, ex Coll. RICHTER.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

Syn. zu *melancholica* FABRICIUS, 1798.**terminalis completesignata** HORN, 1929 (*Cicindela*)

(Journ. F. M. S. Mus. 14, 468)

Mehrere Syntypen, Britisch Nord-Borneo, Kudat, 1st—10th. IX.

DEI: 5 Syntypen, N. Borneo, Kudat, 2., 3., 9., 10. IX. 1927.

tetradia FAIRMAIRE, 1899 (*Cicindela*)

(Ann. Soc. Ent. Belg. 43, 511)

Mehrere Syntypen, Malgache, Vallée de la Betsiboka, leg. PERRIER.

DEI: 1 Syntypus, Madagascar, Suberbile, leg. PERRIER.

thebana VRIES VAN DOESBURGH, 1895 (*Cicindela*)

(Tijdschr. Ent. 38, 4—5, Fig.)

9 Syntypen, Aegypten, Karnak, am Ufer des Nils.

DEI: 1 Syntypus, Aegypten, Karnak, 1893.

Syn. zu *trisinata* DEJEAN, 1822.**thierfelderi** HORN, 1925 (*Distipsidera*)

(Ent. Mitt. 14, 179)

♀ Holotypus, Südküste vom Holländischen Neu-Guinea, leg. THIERFELDER, durch METHNER; im DEI.

thomsoni HORN, 1894 (*Collyris*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 217)

♂ Holotypus, Penang [ohne Fundort]; im DEI.

thomsoni DOKHTOUROFF, 1882 (*Tetracha*)

(Spec. Cic. 1, 61)

2 Syntypen, Bolivie, in Coll. DOKHTOUROFF.

DEI: 1 Syntypus, Bolivie, durch STAUDINGER.

Syn. zu *coerulea* LUCAS, 1857.**thoracica** HORN, 1892 (*Tetracha*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 90)

♀ Holotypus, Amazonen-Strom [ex Coll. RICHTER]; im DEI.

Syn. zu *affinis* DEJEAN, 1825.**tonkinensis** HORN, 1902 (*Therates*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 78)

Mehrere Syntypen, Tonkin, Montes Mauseon, IV.—V. 1900, 2—3000', leg. FRUHSTORFER.

DEI: 9 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

traducens HORN, 1903 (*Dromica*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 316)

♂ Holotypus, Gazaland, Up. Busi R., XII. 1901, leg. MARSHALL; im DEI.

***transvaalensis* DOKHTOUROFF, 1883 (*Dromica*)**

(Rev. Mens. Ent. 1, 9)

Mehrere Syntypen, Transvaal, in Coll. DOKHTOUROFF.

DEI: 1 Syntypus, Transvaal.

Syn. zu *furcata* BOHEMAN, 1848.***tremolerasi* HORN, 1909 (*Megacephala*)**

(Rev. Mus. La Plata 16, 32)

Syntypen: 1 ♂, 2 ♀♀, Uruguay, Salto, leg. TREMOLERAS, in Coll. HORN; 1 ♀, von SILVESTRI, XI. 1899, in Entre Rios provincia illa Argentinae, leg. CONCORDIAM.

DEI: 1 ♂, 2 ♀♀, mit den Angaben der Beschreibung: Syntypen.

***tricostata* HORN, 1897 (*Dromica*)**

(Ent. Nachr. 23, 237)

♀ Holotypus, Afrika, Benguela; [DEYROLLE] im DEI.

***tricotulata* HORN, 1932 (*Dromica*)**

(Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 15, 200—201 (Separat-Abdruck)).

♀ Holotypus, Angola merid., Fluß („mulola“), Chimpopo, XI., leg. MONARD, Miss. Scient. Suisse 1928/29; im DEI.

***tricuspidensis* HORN, 1932 (*Odontochila*)**

(Rev. Ent. 2, 409—410)

1 ♂, Rio Anajas, Para, VI., 1 ♂, ohne Fundort: Syntypen; im DEI.

***trifasciata boliviana* MANDL, 1956 (*Cicindela*)**

(Ent. Arb. Mus. G. FREY 7, 386—387)

♀ Holotypus, 4 Paratypen, Bolivia tropica, Santa Cruz, 500 m ü. M., 20. X. 1954, leg. ZISCHKA, in Coll. ZISCHKA.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

***trifasciata latioresignata* MANDL, 1967 (*Cicindela*)**

(Ent. Arb. Mus. G. FREY 8, 435—437)

♂ Holotypus, Nord-Peru, Puerto Pizarro, 14 km nördl. v. Tumbas, 1. V. 1959, leg. WEYRAUCH; 17 Paratypen, dto.

DEI: 4 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

***triramosa* KOLLAR, 1836 (*Cicindela*)**

(Ann. Hofmus. Wien, 330)

Mehrere Syntypen, Ind. or., Madras.

DEI: 1 Syntypus, Madras.

Syn. zu *cognata* WIEDEMANN, 1823.***trispecularis* HORN, 1895 (*Pentacomia*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 358)

♂ Holotypus, Brasilia; im DEI.

Syn. zu *degandei* TATUM, 1851.***tristis pseudofemoratis* HORN, 1938 (*Oxychila*)**

(Ent. Beih. 5, 22)

1 ♂, 1 ♀, Gebirge von Rio Grande do Sul bei Taquara, II. 1926, leg. EMRICH; 1 ♀, Brasilien: Syntypen.

DEI: 1 ♀, Süd-Brasilien, S. Francisco de Paulo, leg. EMRICH; 1 ♂, S. Francisco de Paulo, mit den Angaben der Beschreibung; 1 ♀, Brésil.

***tristis pseudonigroaenea* HORN, 1938 (*Oxychila*)**

(Ent. Beih. 5, 25)

Mehrere Syntypen, Peru, Chanchamayo, 1500 m, leg. HEYNE, Cuzco, 2—3000 m und Pozuzo, leg. ROLLE und FASSL, Quiroz, am Rio Pancartambu, 10. XI. 1933, leg. WARD.

DEI: Syntypen, Peru: 3 Ex. Chanchamayo, 1500 m, leg. HEYNE; 2 Ex. Cuzco, 2—3000 m, 1 Ex. Pozuzo; leg. ROLLE; 2 Ex. Quiroz, Rio Pancartambu, 10. XI. 1933, leg. WARD.

***tritoma* FLEUTIAUX, 1893 (*Cicindela*)**

(Ann. Soc. Ent. Fr. 62, 493, Fig.)

Mehrere Syntypen, Birmanie, Cochinchine, im Museum Paris und Genua.

DEI: 2 ♀♀, Syntypen, Birmanie, Teinzö, 1886, durch FEA.

Syn. zu *mouhoti* CHAUDOIR, 1865.***triumphatis* HORN, 1902 (*Euryoda*)**

(Dtsch. Ent. Ztschr., 75)

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Tonkin, Montes Mauson, IV.—V. 1900, 2—3000', leg. FRUHSTORFER; im DEI.

***truncatilabris* FAIRMAIRE, 1897 (*Cicindela*)**

(Ann. Soc. Ent. Belg. 41, 364)

Mehrere Syntypen, Malgache, Suberbieville, leg. PERRIER, in Coll. OBERTHÜR.

DEI: 1 Syntypus, Madagascar, durch FAIRMAIRE.

tuolumnae LENG, 1902 (*Cicindela*)

(Trans. Amer. Ent. Soc. 28, 157)

Nord-Amerika, Hetch Hetchy Valley, Tuolumne Co., Cal., leg. VAN DYKE, mehrere Syntypen.

DEI: 1 Syntypus, Tuolumne Co. Cal., leg. VAN DYKE.

Syn. zu *pusilla* SAY, 1817.**umfuliana** PÉRINGUEY, 1896 (*Myrmecoptera*)

(Trans. S. Afr. Phil. Soc. 7, 116)

Mehrere Syntypen, South Africa, Zambezia, Umfuli River.

DEI: 1 ♀, Zambezia, Buluwayo, 1 ♂, Mashunaland, ex. Coll. PÉRINGUEY: Syntypen.

Syn. zu *mauchi* BATES, 1872.**uncifera** HORN, 1901 (*Oxygonia*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 124)

Mehrere Syntypen, Ecuador, leg. HAENSCH.

DEI: 3 ♂♂, Syntypen, Ecuador, Santa Inéz, leg. HAENSCH.

unicolor HORN, 1892 (*Cicindela*)(Dtsch. Ent. Ztschr., 86; nom. praecoc. = *rufoaenea* HORN, 1915, Gen. Ins. Cic., 402)

♂ Holotypus, Argentinisches Hochgebirge, leg. KLÄGER; im DEI.

unicolor HORN, 1935 (*Collyris*)

(Koleopt. Rundsch. 21, 52)

♀ Holotypus, Laos, Stadt Ju, IV.; im DEI.

uniformis HORN, 1900 (*Oxygonia*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 201)

♂ Holotypus, Ecuador; im DEI.

upangwana MANDL, 1964 (*Neochila*)

(Rev. Zool. Bot. Afr. 69, Nr. 3—4, 306—307)

♀ Holotypus (No 558), Dtsch. O. Afr., Upangwa, STAUDINGER; 1 ♀ Paratypus (No 559), dto.; in Coll. HORN; im DEI.

van hageni MUTCHLER, 1938 (*Cicindela*)

(Amer. Mus. Novit. no. 981, 2, Fig.)

♂ Holotypus, 1 ♂, 7 ♀♀ (1 ♀ schlecht erhalten); Paratypen, Galapagos, Indefatigable Island, 13. XI. 1935 at 7:30 A. M., leg. V. HAGEN, im American Museum.

DEI: 1 ♀ Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

variventris QUEDENFELDT, 1883 (*Cicindela*)

(Berl. Ent. Ztschr. 27, 245)

Angola, Malange, leg. v. MECHOW, mehrere Syntypen.

DEI: 1 Syntypus, Malange, ex Coll. RICHTER.

Syn. zu *erythropuga* PUTZEY, 1880.**ventanasa** BATES, 1890 (*Cicindela*)

(Trans. Ent. Soc. London, 503)

Mehrere Syntypen, Mexico, Ventanas in Durango, La Noria in Sinaloa, leg. HÖGE.

DEI: 1 Syntypus, Ventanas, Durango, leg. HÖGE.

Syn. zu *rufiventris* DEJEAN, 1825.**ventralis obscuriventris** HORN, 1933 (*Prepusa*)

(Rev. Chil. Hist. Nat. 37, 77)

4 ♂♂, 1 ♀ Syntypen, Amazonas, Sao Paulo de Olivença, II., III. 1932, leg. WUCHERPFENNIG; im DEI.

venus HORN, 1907 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 22)

Mehrere Syntypen, Nilgiri Hills, leg. ANDREWES; in Coll. HORN und Coll. ANDREWES.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

vermifera HORN, 1908 (*Heptodonta*)

(Ent. Wochenbl. 25, 84)

3 ♂♂ Syntypen, Yunnan; im DEI.

versicolor bottegoi HORN, 1896—1897 (*Euryoda*)

(Ann. Mus. Genova (2) 17, 268)

Syntypen, Somali; am Berg Egherta, X. 1895, leg. BOTTEGO; 1 ♂, 1 ♀, Scioa, Kaka, IV., Arramba, IX. 1877, leg. ANTINORI; im Museum Genua.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Scioa, Arramba, IX. 1877, leg. ANTINORI.

versicolor duplicata HORN, 1923 (*Prothyma*)

(Zool. Jahrb. 47, Abt. Syst. 318)

♂ Holotypus, Brit. Ost-Afrika, Liban [Süd Abessin]; im DEI.

vestitum FAIRMAIRE, 1900 (*Pogonostoma*)

(Bull. Soc. Ent. Fr., 134)

Mehrere Syntypen, Madagascar, Environs de Suberbieville, leg. PERRIER.

DEI: 1 Ex. ohne Fundort, durch FAIRMAIRE; 1 Ex. Madagascar, Suberbieville; leg. PERRIER: Syntypen.

vicina confluentesubtilis HORN, 1914 (*Cicindela*)

(Rev. Zool. Afr. 3, 421)

Syntypen, Belg. Congo; 1 ♂, Kapiri, IX. 1912; mehrere Ex. Mufungwa, 1.—16. XII. 1911, leg. BEQUAERT, im Musée du Congo, Tervueren und in Coll. HORN.

DEI: 2 Syntypen, Belg. Congo, Mufungwa, 1.—16. XII. 1911, leg. BEQUAERT.

virginatis HORN, 1901 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 358)

♀ Holotypus, Luzon, SEMPER; im DEI.

virgulata FAIRMAIRE, 1904 (*Euryoda*)

(Bull. Soc. Ent. Fr., 128)

Mehrere Syntypen, Madagascar, Namoroka, Ambongo, leg. PERRIER.

DEI: 1 Ex., mit den Angaben der Beschreibung; 1 Ex. ohne Fundort; Syntypen.

viridescens HORN, 1894 (*Collyris*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 219)

♂ Holotypus, Java, Preanger [Larvang, durch STAUDINGER]; im DEI.

Syn. zu *rugosa* CHAUDOIR, 1864.***viridicincta*** HORN, 1894 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 173)

Mehrere Syntypen, Vorder-Indien, Nord-Canara, leg. ANDREWES.

DEI: 3 Syntypen, Canara, 94, leg. ANDREWES.

viridicyanea natalia HORN, 1934 (*Prothyma*)

(Mém. Acad. Malgache 20, 23—24, Fig. 21)

Mehrere Syntypen, Madagaskar, Forêt Périnet-Analamazaotra, 5.—18. XII. 1930, leg. NATALIE OLSOUFIEFF.

DEI: 18 Syntypen, Forêt Analamazaotra-Perinet, 5., 5.—10., 12.—13., 15.—18. XII. 1930, leg. OLSOUFIEFF. Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Analamazaotra“ steht auf dem Etikett „Analamazaotra“.

viridicyanea subtilevelutina HORN, 1934 (*Prothyma*)

(Mém. Acad. Malgache 20, 24)

♀ Holotypus, Madagascar; im DEI.

viridiflavescens HORN, 1923 (*Cicindela*)

(Zool. Jahrb. 47, Abt. Syst., 329)

Mehrere Syntypen, San Domingo, Ihaituba, X. 1922, leg. KAEMPFFER.

DEI: 7 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

viridiflavescens originatis HORN, 1936 (*Cicindela*)

(Ent. Bl. 32, 23—24)

4 ♂♂, 1 ♀ Syntypen, Haiti, zwischen Kenscoff und Furey, 5000' hoch, 23. IX. 1934, leg. DARLINGTON jr., im Museum Comp. Zool. Cambridge und in Coll. HORN.

DEI: 2 ♂♂, Syntypen, Auto Rd., Furey-Kenscoff, Mt. La Selle, 5000 ft., IX. 1923, Haiti, 1934, leg. DARLINGTON.

viridis RAFFRAY, 1882 (*Cicindela*)

(Bull. Soc. Ent. Fr. 47)

Mehrere Syntypen, Abyssinien, Adoua.

DEI: 1 Syntypus, Abyssinien, Adoua.

viridisticta interjecta HORN, 1935 (*Cicindela*)

(Pan-Pacific Ent. 11, 65)

4 ♀♀, Syntypen, Mexico, Jalisco, nahe Guadalajara, 3. XII. 1903, leg. CLENDON, ex Coll. BONDITCH, im Museum Cambridge, Mass. und in Coll. HORN.

DEI: 2 ♀♀, Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

vitalisi HORN, 1924 (*Collyris*)

(Faune Opusc. Inst. Sc. Indochine, nr. 3, 10)

♂ Holotypus, Annam, Giaray, 2. II. 1921, leg. DE SALVAZA; im DEI.

vuliletorum HORN, 1914 (*Cicindela*)

(Rev. Zool. Afr. 3, 427)

3 ♀♀, 1 ♂ Syntypen, Soudan Franc., Haut-Sénégal-Niger, Koulikoro, VII., leg. VUILLET; 1 ♂, Kati, VII. 1913, leg. FOUQUET, in Coll. FLEUTIAUX.

DEI: 1 ♂, 3 ♀♀, Syntypen, Koulikoro, 7. VII. 1911, leg. VUILLET.

waageni HORN, 1900 (*Euryoda*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 198)

♂ Holotypus, Sudan orient., Fassoglu; im DEI.

waagenorum HORN, 1900 (*Therates*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 198)

♀ Holotypus, nahe der Berge Darjeeling (Darjiling), leg. v. WAAGEN; im DEI.

waterhousei HORN, 1900 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 206)

♀ Holotypus, Ceylon, via Britisches Museum an HORN; im DEI.

wellmani HORN, 1907 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 421)

♂ Holotypus, Angola, Ciyaka, 6000', IX.—X. 1906, leg. WELLMAN; im DEI.

wellmani HORN, 1908 (*Cosmema*)

(Not. Leyd. Mus. 30, 31)

Mehrere Syntypen, Angola, Chiyaka Distr., XI. 1907, leg. WELLMAN.

DEI: 1 Ex. mit den Angaben der Beschreibung, 7 Ex. Benguella, XI. 1907, leg. WELLMAN.

wickhami HORN, 1903 (*Cicindela*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 182)

Mehrere Syntypen; S. Arizona, Tucson, 13.—15. VII., 23—2500', leg. WICKHAM; Arizona, in Coll. KOEBELE; Mexico, in Coll. FUCHS.

DEI: 1 Ex. Ariz., Tucson, 13.—15. VII., 23—2500 ft., leg. WICKHAM; 1 Ex. Mex. LUETGENS, 1 Ex. Mexico o., Schawapp; ex Coll. FUCHS: Syntypen.

wilkinsi DOKHTOUROFF, 1885 (*Cicindela*)

(Horae Soc. Ent. Ross. 19, 279)

♀ Holotypus, am Fluß Mouk-sou, Karateghinoise, 8—9,000 Fuß, 16. VIII. 1878, leg. WILKINS; im DEI.
Syn. zu *granulata* GEBLER, 1843.**willeyi** HORN, 1904 (*Cicindela*)

(Spol. Zeyl. 2, 36, 41, Taf. 7, Fig. 4)

2 ♀♀, Syntypen, Ceylon, Central Province.

DEI: Ceylon: 1 ♀, Nr. 92—59, ex Britischen Museum, 1 ♀, leg. WILLEY: Syntypen.

willistoni amargosae DAHL, 1939 (*Cicindela*)

(Bull. Brooklyn ent. Soc. 34, 221)

♂ Holotypus, California, 4 Meilen nördl. von Furnace Creek, Death Valley, Inyo County, 3. IV. 1939, leg. DAHL, in Coll. DAHL; 41 ♂♂, 51 ♀♀, Paratypen, dito., leg. HAGEN, BARR, JENSEN und DAHL; 8 Ex. in Coll. HAGEN, 4 Ex. in Coll. BARR, 15 Ex. in Coll. JENSEN, 2 Ex. in der California Academy of Sciences, 2 Ex. in Coll. HORN, 4 Ex. in Coll. CAZIER und 57 Ex. in Coll. DAHL.

DEI: 1 ♂, 1 ♀ Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

willistoni pseudosenilis HORN, 1900 (*Cicindela*)

(Ent. Nachr. 26, 117)

Mehrere Syntypen, California, Owen's lake, Inyo Co.

DEI: Syntypen, California: 2 Ex. Owen's lake, LUETGENS, Inyo Co., 4 Ex. Inyo Co., leg. RICKSECKER, 1 Ex. LUETGENS, durch STAUDINGER.

wimmeri MANDL, 1958 (*Megacephala*)

(Kol. Rundsch. 36, 31)

Holotypus, mehrere Paratypen, Bolivien, Santa Cruz, 500 m ü. M., leg. ZISCHKA, in Coll. MANDL, Coll. ZISCHKA, im DEI und in diversen anderen Sammlungen.

DEI: 2 Paratypen, Bolivia, oriental, Santa Cruz, 500 m, 10. X. 1954, leg. ZISCHKA.

zarudniana TSCHITSCHERIN, 1903 (*Cicindela*)

(Horae Soc. Ent. Ross. 36, 5)

26 Syntypen, Perse orient., Neh-i-Bendan (Nihbandan), env. de Bendan, 8.—9. V. 1898, Sarhad (Serhad), Duz-ab à Podahi, 16.—24. VI. 1898, Noukabad, Kuusha, 1., 2.—5. V. 1901; leg. ZARUDNY.

DEI: 3 Syntypen, Persisch Beludzhistan, Kerman, Sarhad, 16.—24. VI. 1898, 1., 2.—3. V. 1901, leg. ZARUDNY.

zikani HORN, 1911 (*Ctenostoma*)

(Ent. Bl. 7, 152)

Mehrere Syntypen, Minas Geraes, Mar de Hespanha, 12. XII.—7. I., leg. ZIKAN.

DEI: 4 Syntypen, Minas-Brazil, Mar de Hespanha, 12. XII. 1909/5., 7. I. 1910, leg. ZIKAN.

zischkai MANDL, 1956 (*Cicindela*)

(Ent. Arb. Mus. G. FREY, 7, 384—386)

♂ Holotypus, 9 Paratypen, Bolivia, 35 km NE von Cochabamba, 3500 m ü. M., 10. I. 1954, leg. ZISCHKA, in Coll. MANDL und Coll. ZISCHKA.

DEI: 1 Ex. Bolivia, 35 km NE de Cochabamba, 3500 m; 1 Ex. dto., 10. I. 1954; leg. ZISCHKA: Paratypen.

Wahrscheinlich nicht beschriebene Arten:

colossea HORN (*Cicindela*)

DEI: 3 Ex. Basse-Californie, La Paz, 2 Ex. Golfe de Californie, Ile San José; 1914, DIGUET, ex Museum Paris; 2 Ex. Mexico, Coll. CHARERI-GHILLANI-V. DE POLL-Museum Genua; Typen.

fallaciosa SCHMIDT (*Cicindela*)

DEI: 1 Type, Celebes, Menado, ex Coll. v. DE POLL.

hauseri REITTER (*Cicindela*)

DEI: 2 Typen, Turkestan, Thian-Schan.

horni PÉRINGUEY (*Myrmecoptera*)

DEI: 3 Ex. ohne Fundort, ex Coll. PÉRINGUEY; Typen.

nigropilosa HORN (*Odontochila*)

DEI: 2 Ex. Manaos, I, II, 9., 16.—VII. 1927, leg. ZIKAN; Typen.

oculata penthica ALLUAUD (*Cicindela*)

DEI: 1 Ex. Madagascar, Bekily 1, 1933; 1 Ex. dto. 1932; leg. SEYRIG; Paratypen.

orellana BATES (*Ctenostoma*)

DEI: 1 Typus, Ega, leg. BATES, ex cab. TURNER-Coll. v. DE POLL.

silvaticoides HORN (*Cicindela*)

DEI: 2 Ex. Sagres, v. VOLXEM, Coll. PUTZEYS; Typen.

tuberculata GESTRO (*Tricondyla*)

DEI: 2 Ex. Carin Chebà, 900—1100 m, 5. XII. 1888, leg. FEA; Typen.

yamahoi MIWA (*Cicindela*)

DEI: 1 Type, Formosa, Alikang, VII. 1932, leg. MIWA.

Zusammenfassung

Es wird ein Katalog der Cicindelidae-Typen vorgelegt, die in den Sammlungen des ehemaligen Deutschen Entomologischen Instituts aufbewahrt werden.

Summary

A catalogue of the types of Cicindelidae preserved in the collections of the former Deutsches Entomologisches Institut is presented.

Резюме

Предлагается каталог типов семейства Cicindelidae, которые хранятся в коллекциях бывшего Немецкого Энтомологического Института.