

Institut für Pflanzenschutzforschung
der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR zu Berlin
Bereich Eberswalde
Abteilung Taxonomie der Insekten

HANNELORE GAEDIKE

Katalog der in den Sammlungen der Abteilung Taxonomie der Insekten des Institutes für Pflanzenschutzforschung, Bereich Eberswalde (ehemals Deutsches Entomologisches Institut), aufbewahrten Typen — XVII

(Coleoptera: Scydmaenidae, Orthoperidae, Discolomidae, Ptiliidae, Scaphiidae)

Scydmaenidae

abnormis REITTER & CROISSANDEAU, 1890 (*Euconnus*)
(Nat. Sicil. 9, 216)

Syntypen, Südbrasilien, bei Blumenau, leg. HETSCHKO.
DEI: 1 Syntypus, Blumenau, leg. HETSCHKO.

absconditus L. W. SCHAUFUSS, 1866 (*Scydmaenus*)
(Nova Acta Ac. Leop. Carol. 33, 61—62)

Syntypen, Chile, leg. GERMAIN.
DEI: 4 Syntypen, Chile.

akauensis REITTER, 1913 (*Euconnus*)
(Ent. Mitt. 2, 267)

Holotypus, Formosa, Akau, XII. 1907, leg. SAUTER, im DEI.

albanicum APFELBECK, 1907 (*Cephennium*)
(Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien 116, Abt. 1, 518)

Syntypen, Albanien, Merdita, im Gebirge bei Oroshi, Mal i Shëit und bei Fandi, Munela, Zebia, in Buchenwäldern.
DEI: 1 Syntypus, Merdita, M. Schëit.

alluaudi LHOSTE, 1938 (*Scydmaenus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 5, 119—120, Fig. 15)

Holotypus, Paratypen, Madagascar, Diégo-Suarez, 1893, leg. ALLUAUD; Fort Dauphin, 1900, leg. ALLUAUD. Holotypus im Mus. Paris, Paratypen im DEI.
DEI: 1 Paratypus, Tananarive von FRANZ als ssp. *tananarivensis* beschrieben (Faune de Madagaskar, im Druck); 1 Paratypus, Madagascar, F. Dauphin, 1900, leg. ALLUAUD nach FRANZ „eine andere Art oder zumindest andere ssp.“.

andrae LHOSTE, 1938 (*Mastigus*)
(Bull. Soc. Ent. France 42 (1937), 282—283, Fig. 5)

Syntypen, Cap (Kap der guten Hoffnung), Constantia, 28. IX. 1919, im Mus. Paris und im DEI.
DEI: 1 ♀ Syntypus als ♀ Typus ausgezeichnet, Constantia, 28. IX. 1919; ein als ♂ Typus ausgezeichnetes Ex. mit den Angaben Kapstadt, 25. 6. 1916 und den Gen. Präp. ist nicht in der Beschreibung erwähnt.

angustus REITTER & CROISSANDEAU, 1890 (*Scydmaenus*)
(Nat. Sicil. 9, 220)

Syntypen, Südbrasilien, bei Blumenau, leg. HETSCHKO.
DEI: 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

anuradhapurae LHOSTE, 1939 (*Euconnus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 6, 9—10, Fig. 23, 24)

Holotypus, Paratypen, Ceylon, Anuradhapura, 1899, leg. W. HORN, im DEI.
DEI: Holotypus, 5 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

appendiculata L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Glandularia*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 25—26)

Syntypen, Singapore.
DEI: 1 ♀ Syntypus, Singapore.

- aridulus** REITTER & CROISSANDEAU, 1890 (*Euconus*)
(Nat. Sicil. 9, 219)
Syntypen, Brasilien, Blumenau, leg. HETSCHKO.
DEI: 1 Syntypus, Blumenau, leg. HETSCHKO.
- arionis** REITTER & CROISSANDEAU, 1890 (*Euconus*)
(Nat. Sicil. 9, 219)
Syntypen, Südbrasilien, bei Blumenau, leg. HETSCHKO.
DEI: 3 Syntypen, Blumenau, leg. HETSCHKO.
- asserculatus** L. W. SCHAUFUSS, 1866 (*Scydmaenus*)
(Nova Acta Ac. Leop. Carol. 33, 68)
2 Syntypen, Neu Granada am Rio Madalena, in den Sammlungen v. D. BRUCK und SCHAUFUSS.
DEI: 1 Syntypus, R. Granada.
- aurifer** L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Scydmaenus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 41—42)
Syntypen, Singapore.
DEI: 1 Syntypus, Singapore.
- aurorae** L. W. SCHAUFUSS, 1884 (*Eumicrus*)
(Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova 21, 393, 417)
Syntypen, Neu Guinea, Ansus, leg. BECCARI, im Mus. Genua.
DEI: 2 Syntypen, Neu Guinea, Ansus, IV. 1875, leg. BECCARI.
- aurosepticus** REITTER, 1882 (*Euconus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 26, 193; Taf. IX, Fig. 2)
Syntypen, Senegambien (Nach den Angaben der Einleitung ist die genaue Fundortbezeichnung „Westafrika, Umgeb. von Addah.).
DEI: 1 Syntypus, W. Afrika, Senegambia, v. WALZAHN, 1880.
- basimpressus** W. & C. BLATNY, 1916 (*Stenichnus*)
(Neue Beitr. syst. Insektenk. 1, 6)
Syntypen, Kreta, leg. PAGANETTI-HUMMLER.
DEI: 1 Syntypus, Kreta, PAGANETTI.
- batesii** L. W. SCHAUFUSS, 1866 (*Scydmaenus*)
(Nova Acta Ac. Leop. Carol. 33, 71—72; Taf. 2, Fig. 11)
2 Syntypen, Brasilien, Ega, leg. BATES, in den Sammlungen v. BONVOULOIR und SCHAUFUSS.
DEI: 1 Syntypus, Ega, leg. BATES.
- baumeisteri** L. W. SCHAUFUSS, 1884 (*Eumicrus*)
(Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova 21, 393, 413—414)
Syntypen, Neu Guinea, Hatam, leg. BECCARI & RAFFRAY, im DEI und in Sammlung BAUMEISTER.
DEI: 1 Syntypus, Neu Guinea.
- bellus** L. W. SCHAUFUSS, 1884 (*Eumicrus*)
(Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova 21, 392, 410)
Syntypen, Neu Guinea, leg. RAFFRAY, im DEI.
DEI: 2 Syntypen, Neu Guinea, septentr.
- bifoveolatus** L. W. SCHAUFUSS, 1866 (*Scydmaenus*)
(Nova Acta Ac. Leop. Carol. 33, 65)
Syntypen, Mexico, Teapa.
DEI: 1 Syntypus, Mexico, Nr. 418, Teapa.
- biimpressus** L. W. SCHAUFUSS, 1866 (*Scydmaenus*)
(Nova Acta Ac. Leop. Carol. 33, 39)
Syntypen, Brasilien.
DEI: 1 Syntypus, Brasilien, Nr. 435.
- bioculatus** L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Cyrtoscydmus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 17—18)
Holotypus, Zanzibar, im DEI.
- bisphaericus** L. W. SCHAUFUSS, 1866 (*Eumicrus*)
(Nova Acta Ac. Leop. Carol. 33, 82—83)
Syntypen, Mexico, Teapa.
DEI: 1 Syntypus, Teapa.
- blandus** L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Scydmaenus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 34—35)
Syntypen, Arabien, Aden, Zanzibar, Bagamoyo.
DEI: 1 Syntypus, Aden; 2 Syntypen, Zanzibar; 8 Syntypen, Bagamoyo.
- bodemeyeri** KARAMAN, 1962 (*Leptomastax*)
(Biol. Glasnik 15, 178—179)
♂ Holotypus, Alem Dagh, Asia minor, im DEI; 1 ♂, 3 ♀♀, Paratypen, vom selben Fundort; 2 ♂♂, 1 ♀, Beikos; 6 Ex. Konstantinopel; 1 ♂, Turcia; 1 ♀, Turcia Edirne; 2 ♀♀, Belgradieröd.
DEI: Holotypus, Asia Minor, Alem-Dagh, leg. v. BODEMEYER, ohne Determinationsetikett von Z. KARAMAN.

bodemeyeri REITTER, 1903 (*Cephennium*)
(Wien. Ent. Ztg. 22, 222)

Syntypen, Anatolien, Goek-Dagh und Alem-Dagh, 1903, leg. v. BODEMEYER.
DEI: 1 Syntypus, Asia Minor, Goek-Dagh, leg. v. BODEMEYER.

bodemeyeri REITTER, 1903 (*Euconnus*)
(Wien. Ent. Ztg. 22, 223—224)

Zahlreiche Syntypen, Kleinasien, Goek-Dagh und Belgrader Wald bei Konstantinopel, 1903, leg. v. BODEMEYER.
DEI: 1 Syntypus, Asia Minor, Goek-Dagh, leg. v. BODEMEYER.

brenskeanus REITTER, 1884 (*Euconnus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 28, 54)

Syntypen, Griechenland, Kumani, leg. E. BRENSKE.
DEI: 1 Syntypus, Morea, Cumani, leg. BRENSKE.

breviceps L. W. SCHAUFUSS, 1866 (*Scydmaenus*)
(Nova Acta Ac. Leop. Carol. 33, 58—59; Taf. 1, Fig. 6)

Syntypen, Cuba, leg. GUNDLACH und POEY, in den Sammlungen RIEHL, CHEVROLAT und SCHAUFUSS.
DEI: 1 Syntypus, Cuba.

brevitarse L. W. SCHAUFUSS, 1884 (*Agathelot*)
(Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova 21, 394, 421—422)

Syntypen, Borneo, Sarawak, leg. DORIA, BECCARI, im Mus. Genua.
DEI: 1 Syntypus, Borneo, Sarawak, 1865—66, leg. DORIA.

bulgaricus RAMBOUSEK, 1909 (*Euconnus*)
(Casopis 6, 20—21, 23—24, Fig. 13)

8 Syntypen, Bulgarien, Umgeb. von Sophia, Dragolevc, Pančarevo (Isker) und Germanski monast.
DEI: 1 Syntypus, Bulgaria, Sofia, Germ. mon. VI. 08, leg. RAMBOUSEK.

calvescens L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Cyrtoscydmus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 10—11)

Syntypen, Zanzibar.
DEI: 23 Syntypen, Zanzibar.

campestris L. W. SCHAUFUSS, 1866 (*Scydmaenus*)
(Nova Acta Ac. Leop. Carol. 33, 47—48; Taf. 1, Fig. 3a, b)

Syntypen, Chile in Pampas, leg. GERMAIN, in den Sammlungen von BONVOULGIR's und SCHAUFUSS.
DEI: 3 Syntypen, Chile, Pampas.

capensis LHOSTE, 1939 (*Euconnus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 6, 2—3, Fig. 7)

Holotypus, Paratypen, Afrika, Kap der Guten Hoffnung, Stellenbosch, XI. 1887, im DEI.
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

capillaris L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Cyrtoscydmus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 20)

♂♀ Syntypen, Singapore.
DEI: 17 Syntypen, Singapore.

cassoviensis MACHULKA, 1931 (*Neuraphes*)
(Casopis 28, 84)

Diese Art wurde 1926 (Casopis 23, 49) von MACHULKA als var. *cassoviensis* beschrieben. Nach Artikel 10b der Nomenklaturregeln muß das Jahr der Urbeschreibung 1931 lauten, da erst zu diesem Zeitpunkt die Erhebung in den Artstatus erfolgte.
Syntypen, 1 Ex. Košice; 1 Ex. Bihar, leg. FLEISCHER; 1 Ex. Dalmatien, Crkvica, leg. MATCHA; 2 Ex. Bulgarien, Samokov, leg. HILF.
DEI: 2 ♂♂ Syntypen, Bulgarien, Samokov, 1911, leg. HILF.

carinangulus REITTER & CROISSANDEAU, 1890 (*Euconnus*)
(Nat. Sicil. 9, 218)

Syntypen, Südbrasilien, bei Blumenau, leg. HETSCHKO.
DEI: 3 Syntypen, Brasilien mer., Blumenau, leg. HETSCHKO.

carinatosternalis LHOSTE, 1938 (*Scydmaenus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 5, 111—112, Fig. 2)

Holotypus, Sumatra, Lampong, Wai Lima, XI. XII. 1921, leg. KARNY. 11 Paratypen, Tonkin, Hoa-Binh, leg. R. P. DE COOMAN, 1927.
DEI: Holotypus mit den Angaben der Beschreibung.

cavifrons L. W. SCHAUFUSS, 1866 (*Scydmaenus*)
(Nova Acta Ac. Leop. Carol. 33, 38)

♂ Holotypus, Brasilien, in Sammlung SCHAUFUSS, im DEI.

centurionis L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Cyrtoscydmus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 11)

Syntypen, Singapore.
DEI: 1 Syntypus, Singapore.

cecinjense APFELBECK, 1907 (*Cephenium*)
(Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien 116, Abt. 1, 519)

Syntypen, Montenegro, bei Cetinje unter abgefallenem Laub von *Carpinus duinensis*, leg. APFELBECK.
DEI: 1 Syntypus, Citinje, leg. APFELBECK.

chevolati L. W. SCHAUFUSS, 1866 (*Scydmaenus*)
(Nova Acta Ac. Leop. Carol. 33, 69; Taf. 2, Fig. 8)

Syntypen, Mexico, Yucatan.
DEI: ♂ Lectotypus, 2 ♀♀ Paralectotypen, Yucatan, hiermit festgelegt.

clanculus REITTER & CROISSANDEAU, 1890 (*Euconnus*)
(Nat. Sicil. 9, 218)

Syntypen, Südbrasilien, bei Blumenau, leg. HETSCHKO.
DEI: 4 Syntypen, Brasilien, Blumenau, leg. HETSCHKO.

collaris paganettii FRANZ, 1960 (*Stenichmus*)
(Eos 36, 317—318, Fig. 25)

Syntypen, Calabrien, Aspromonte und St. Eufemia, leg. PAGANETTI, im DEI.
DEI: ♂ Typus, Calabria, Aspromonte, leg. PAGANETTI, von FRANZ als Holotypus ausgezeichnet, in der Originalbeschreibung aber nicht als solcher gekennzeichnet, hiermit als Lectotypus festgelegt; 2 Paralectotypen, vom selben Fundort.

collaris subseriatus FRANZ, 1960 (*Stenichmus*)
(Eos 36, 317—318, Fig. 26)

Syntypen, Kaukasus, leg. LEDER, im DEI.
DEI: ♂ Typus, Kaukasus, leg. LEDER, von FRANZ als Holotypus ausgezeichnet, in der Originalbeschreibung aber nicht als solcher gekennzeichnet, hiermit als Lectotypus festgelegt; 2 Paralectotypen vom selben Fundort.

commilitonis L. W. SCHAUFUSS, 1866 (*Eumicrus*)
(Nova Acta Ac. Leop. Carol. 33, 84—85)

Syntypen, Mexico, Teapa.
DEI: 2 Syntypen, Teapa.

conciliator APFELBECK, 1906 (*Euconnus*)
(Glasn. Zem. Muz. Bosn. Herc. 17, 244)

Syntypen, Bosnien und Süd Serbien, Bela Palanka.
DEI: 2 Syntypen, Bosnien, APFELBECK.

concretus SHARP, 1887 (*Eumicrus*)
(Biol. Centr. Amer. Col. 2, Part 1, 68; Taf. 2, Fig. 24)

Syntypen, Guatemala, El Reposo, Cerra Zunil, San Isidro, Pantaleon, Zapote, San Gerónimo, El Jicaro, San Juan in Vera Paz (CHAMPION); Panama, Volcan de Chiriqui 2000—3000 Fuss (CHAMPION).
DEI: 1 Syntypus, S. Geronimo, Guatemala, CHAMPION.

conicus REITTER, 1882 (*Euconnus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 26, 152)

Syntypen, Brasilien, Sao Paolo, 3000 Fuss, coll. SIMON.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

conspicuus SCHAUM, 1859 (*Scydmaenus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 3, 50)

Syntypen, Andalusien.
DEI: 7 Syntypen, Andalusien.

constrictus REITTER & CROISSANDEAU, 1890 (*Euconnus*)
(Nat. Sicil. 9, 218)

Syntypen, Südbrasilien, bei Blumenau, leg. HETSCHKO.
DEI: 4 Syntypen, Brasilien, Blumenau, leg. HETSCHKO.

contractus REITTER & CROISSANDEAU, 1890 (*Euconnus*)
(Nat. Sicil. 9, 218)

Syntypen, Südbrasilien, bei Blumenau, leg. HETSCHKO.
DEI: 1 Syntypus, Brasilien, Blumenau, leg. HETSCHKO.

cozalis L. W. SCHAUFUSS, 1899 (*Scydmaenus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 39—40)

Syntypen, Zanzibar.
DEI: 1 Syntypus, Zanzibar, leg. RAFFRAY.

cribricolle L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Glaphostoma*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 21)

Syntypen, Zanzibar.
DEI: 1 Syntypus, Zanzibar.

dalmatinus MACHULKA, 1930 (*Scydmorephes*)
(Ent. Nachrichtenbl. Troppau 4, 43—44)

3 Syntypen, Süddalmatien, Castelnouva, 2 im DEI, 1 in Sammlung MACHULKA.

decolor LHOSTE, 1939 (*Scydmaenus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 6, 283, Fig. 1, 2)

Holotypus, Togo, leg. CONRADT, im DEI.

delectus L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Scydmaenus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 38–39)

Syntypen, Zanzibar.
DEI: 6 Syntypen, Zanzibar.

denticornis REITTER & CROISSANDEAU, 1890 (*Scydmaenus*)
(Nat. Sicil. 9, 220)

Syntypen, Südbrasilien, bei Blumenau, leg. HETSCHKO.
DEI: 10 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

dentipes L. W. SCHAUFUSS, 1866 (*Scydmaenus*)
(Nova Acta Ac. Leop. Carol. 33, 71; Taf. 2, Fig. 10a–c)

Syntypen, Cuba, leg. GUNDLACH in den Sammlungen RIEHL und SCHAUFUSS.
DEI: 1 Syntypus, Cuba.

deplanatum L. W. SCHAUFUSS, 1884 (*Agathelos*)
(Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova 21, 394, 421)

Syntypen, Borneo, Sarawak, leg. DORIA und BECCARI, im Mus. Genua.
DEI: 1 Syntypus, Borneo, Sarawak, 1865–66, leg. DORIA.

deplanatus L. W. SCHAUFUSS, 1866 (*Eumicrus*)
(Nova Acta Ac. Leop. Carol. 33, 81–82; Taf. 3, Fig. 17)

1 Syntypus, Caracas in Sammlung CHEVROLAT; 1 Syntypus, Venezuela in Sammlung SCHAUFUSS; beide im DEI.

depressipennis REITTER, 1910 (*Stenichmus*)
(Wien. Ent. Ztg. 29, 162–163)

Syntypen, Sicilien, Ficuzza, leg. LEONHARD.
DEI: 1 Syntypus, Sicilien, Ficuzza, leg. LEONHARD.

depressus REITTER & CROISSANDEAU, 1890 (*Euconnus*)
(Nat. Sicil. 9, 219)

Syntypen, Südbrasilien, bei Blumenau, leg. HETSCHKO.
DEI: 1 Syntypus, Südbrasilien, bei Blumenau, leg. HETSCHKO.

designatus L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Cyrtoscydmus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 7)

Syntypen, Zanzibar.
DEI: 1 Syntypus, Zanzibar.

dilatatus REITTER & CROISSANDEAU, 1890 (*Scydmaenus*)
(Nat. Sicil. 9, 220)

Syntypen, Südbrasilien, bei Blumenau, leg. HETSCHKO.
DEI: 3 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

dispersepunctatus LHOSTE, 1938 (*Scydmaenus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 5, 119, Fig. 12)

Syntypen, Java, Batavia, III. 1921, im DEI.
DEI: 11 Syntypen, Java, Batavia, III. 1921.

diverseimpressus L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Cyrtoscydmus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 8–9)

Syntypen, Zanzibar.
DEI: 1 Syntypus, Zanzibar.

diversepilosus L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Scydmaenus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 42)

Syntypen, Singapor.
DEI: 1 Syntypus, Singapor.

duricollis REITTER, 1903 (*Neuraphes*)
(Wien. Ent. Ztg. 22, 222–223)

Wenige Syntypen, Kleinasien, Goek-Dagh, 1903, leg. BODEMEYER.
DEI: 1 Syntypus, Asia Minor, Goek-Dagh, leg. BODEMEYER.

efflorescens L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Scydmaenus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 36)

Syntypen, Zanzibar, Bagamoyo; Arabien, Aden.
DEI: 2 Syntypen, Bagamoyo; 17 Syntypen, Aden.

elegans L. W. SCHAUFUSS, 1866 (*Scydmaenus*)
(Nova Acta Ac. Leop. Carol. 33, 52–53)

Holotypus, Brasilien, Neu-Friburg, in Sammlung SCHAUFUSS, im DEI.

eques REITTER & CROISSANDEAU, 1890 (*Euconnus*)
(Nat. Sicil. 9, 218)

Syntypen, Südbrasilien, bei Blumenau, leg. HETSCHKO.
DEI: 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

erichsoni L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Glandularia*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 24)

Syntypen, Singapore.

DEI: 1 Syntypus, Singapore, nach FRANZ syn. zu *fricatoris* L. W. SCHAUFUSS.

eumicriformis REITTER & CROISSANDEAU, 1890 (*Euconnus*)
(Nat. Sicil. 9, 217)

Syntypen, Südbrasilien, bei Blumenau, leg. HETSCHKO.

DEI: 2 Syntypen, Brasilien, Blumenau, leg. HETSCHKO.

eumicroides L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Horaeomorphus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 21–22)

Syntypen, Singapore.

DEI: 1 Syntypus, Singapore.

excavatus L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Scydmaenus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 37)

Syntypen, Arabien, Aden.

DEI: 1 Syntypus, Aden.

excaviceps LHOSTE, 1938 (*Eustemmus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 5, 126, Fig. 23, 24)

Holotypus, Pondichéry, im Mus. Paris. Paratypen, Ceylon, leg. WINTER; Ceylon, Kanthalay, Bandarawella, 1899, leg. HORN, im DEI; Pondichéry, VI. 1901, MAINDRON.

DEI: 1 Paratypus, Kanthalay, 1899, leg. HORN.

excedens REITTER & CROISSANDEAU, 1890 (*Euconnus*)
(Nat. Sicil. 9, 217)

Syntypen, Südbrasilien, bei Blumenau, leg. HETSCHKO.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

explicationis L. W. SCHAUFUSS, 1884 (*Eumicrus*)
(Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova 21, 393, 418–419)

Holotypus, Neu Guinea, leg. RAFFRAY, im DEI.

extensionis L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Scydmaenus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 40)

Syntypen, Singapore.

DEI: 1 Syntypus, Singapore.

exul REITTER & CROISSANDEAU, 1890 (*Euconnus*)
(Nat. Sicil. 9, 219)

Syntypen, Südbrasilien, bei Blumenau, leg. HETSCHKO.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

femineus L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Cyrtoscydmus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 3–4)

Syntypen(?), Singapore.

DEI: Das in der SCHAUFUSS-Sammlung vorhanden gewesene eine Exemplar ist verloren gegangen, ob bei der Beschreibung mehrere Exemplare vorgelegen haben, ist nicht bekannt.

festivum L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Cephennium*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 27–28)

Syntypen, Singapore.

DEI: 2 Syntypen, Singapore.

filicornis L. W. SCHAUFUSS, 1884 (*Eumicrus*)
(Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova 21, 394, 414–415)

Holotypus, Java, leg. A. RAFFRAY, im DEI.

fimbriatulus REITTER, 1882 (*Euconnus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 26, 151)

Syntypen, Brasilien, Sao Paolo, 2600 Fuß, in coll. SIMON.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

finidus REITTER & CROISSANDEAU, 1890 (*Euconnus*)
(Nat. Sicil. 9, 216)

Syntypen, Südbrasilien, bei Blumenau, leg. HETSCHKO.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

formosanus REITTER, 1913 (*Euconnus*)
(Ent. Mitt. 2, 266–267)

2 Syntypen, Formosa, Takao, leg. SAUTER, im DEI.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Takao, XII. 1907, leg. SAUTER.

fricatoris L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Glandularia*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 23–24)

Syntypen, Singapore.

DEI: 1 Syntypus, Singapore.

fugitor REITTER & CROISSANDEAU, 1890 (*Euconnus*)
(Nat. Sicil. 9, 216)

Syntypen, Südbrasilien, Blumenau, leg. HETSCHKO.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

fundaebraccatus C. SCHAUFUSS, 1891 (*Cyrtoscydmus*)
(Ann. Soc. Ent. France 60, 333–335)

Syntypen, Philippinen, Antipolo, leg. SIMON, im Mus. BAER und im DEI.
DEI: 3 Syntypen, Antipolo, leg. E. SIMON.

galericulatus L. W. SCHAUFUSS, 1866 (*Scydmaenus*)
(Nova Acta Ac. Leop. Carol. 33, 51–52)

Syntypen, Mexico, Teapa.
DEI: 1 Syntypus, Teapa.

ganglbaueri APFELBECK, 1907 (*Cephennium*)
(Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien 116, Abt. 1, 519–520)

Syntypen, Albanien, meriditanische Gebirge, unter tiefen Laublagen, Mal i Shëit, 1905, leg. APFELBECK; Zebia, 1906, leg. WINNEGUTH.
DEI: 1 Syntypus, Merdita, M. Schëit.

gedensis LHOSTE, 1939 (*Euconnus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 6, 5, Fig. 8, 9)

Holotypus, Java, Mons Gede, 8000 Fuß, 1892, leg. FRUHSTORFER; Paratypen, Java, Pengalengan, 4000 Fuß, 1893, leg. FRUHSTORFER, im DEI.
DEI: Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung.

geniculatus L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Scydmaenus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 40–41)

Syntypen, Arabien, Aden.
DEI: 2 Syntypen, Aden.

gibbium REITTER & CROISSANDEAU, 1890 (*Euconnus*)
(Nat. Sicil. 9, 219)

Syntypen, Südbrasilien, bei Blumenau, leg. HETSCHKO.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

gigas C. SCHAUFUSS, 1891 (*Scydmaenus*)
(Rev. d'Ent. 10, 20; nom. nov. pro *Sc. giganteus* C. SCHAUFUSS, Nunquam Otiosus 3, 591–592, 1890)

Syntypen, Madagascar.
DEI: 1 Syntypus, Madagascar.

glandifer L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Cyrtoscydmus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 14)

Syntypen, Singapore.
DEI: 1 Syntypus, Singapore.

gloriosus L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Scydmaenus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 32–33)

Syntypen, Zanzibar.
DEI: 1 Syntypus, Zanzibar.

gracilis KING, 1864 (*Heterognathus*)
(Trans. Ent. Soc. N.S. Wales 1, 97; Taf. VII, Fig. 3)

Syntypen, Australien, Paramatta, South Creek, Brownlow Hill, unter Rinde von toten Bäumen.
DEI: 2 Syntypen, Paramatta.

grossi FRANZ, 1958 (*Scydmaenus*)
(Kol. Rundsch. 35, 5–6, Fig. 4)

♂ Holotypus, Paratypen, Ufer der Insel Iba, im Tschadsee, 31. 3. 1957, leg. FRANZ; Paratypen, Tschadsee, Seeufer bei Bol, 23.–30. 3. 1957, leg. FRANZ.
DEI: 4 Paratypen, Tschadseeufer b. Bol, AEF, leg. FRANZ.

gulosus KING, 1864 (*Scydmaenus*)
(Trans. Ent. Soc. N.S. Wales 1, 94)

Syntypen, Australien, Paramatta, Sydney, Camden.
DEI: 1 Syntypus, Paramatta.

helveticum MACHULKA, 1930 (*Cephennium*)
(Wien. Ent. Ztg. 47, 17–18, Fig. 5)

Syntypen, Monte Generosa, Schweiz.
DEI: 6 ♂♂ Syntypen, Monte Generosa, Schweiz, 26. VII. 1914.

hetschkoi REITTER & CROISSANDEAU, 1890 (*Euconnus*)
(Nat. Sicil. 9, 217)

Syntypen, Südbrasilien, bei Blumenau, leg. HETSCHKO.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

heydenii ROTTENBERG, 1870 (*Mastigus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 14, 233–234)

Zahlreiche Syntypen, Cava bei Neapel, an Gebirgsbach in einer Schlucht, VI. 1869, leg. v. ROTTENBERG.
DEI: 12 Syntypen, Neapel, leg. ROTTENBERG.

hilfi HOLDHAUS, 1915 (*Stenichnus*)
(Wien. Ent. Ztg. 34, 350—351)

Syntypen, Monte Gargano (Apulien), am Abhang der Valle Carbonara, unterhalb Monte S. Angelo.
DEI: 8 Syntypen, Monte Gargano, 4. 1907, leg. HILF.

hirsutus L. W. SCHAUFUSS, 1866 (*Scydmaenus*)
(Nova Acta Ac. Leop. Carol. 33, 41)

2 Syntypen, Mexico, Teapa, in Sammlung SCHAUFUSS und CHEVROLAT; 1 Syntypus angeblich Venezuela.
DEI: 1 Syntypus, Mexico, Teapa.

hirtipes L. W. SCHAUFUSS, 1866 (*Scydmaenus*)
(Nova Acta Ac. Leop. Carol. 33, 53—54)

Syntypen, Neu Granada.
DEI: 1 Syntypus, N. Granada.

hoabinhensis LHOSTE, 1938 (*Scydmaenus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 5, 114—116, Fig. 8)

Holotypus, Hoa Binh, im Mus. Paris; zahlreiche Paratypen, Tonkin, Hoa-Bin, 1930, leg. R. P. DE COOMAN; Canton, II, 1925, leg. J. DUCHAINE; Hanoi, in coll. BEDEL; Sumatra; Ceylon, Weligama, leg. HORN, 1899; Java, Batavia, 1920; im DEI.
DEI: 12 Paratypen, Sumatra; 1 Paratypus, Batavia, 3. 1920; 4 Paratypen, Weligama, 1899, leg. HORN.

holdhausi APPELBECK, 1911 (*Cephenhium*)
(Glasn. Zem. Muz. Bosn. Herc. 23, 210)

Syntypen, Herzegowina bei Jablanica.
DEI: 1 Syntypus, Wgth. 02, Jablanica.

holdhausi FRANZ, 1960 (*Stenichnus*)
(Eos 36, 302—303, Fig. 15)

♂ Holotypus, ♀ Paratypus, Ficuzza, leg. LEONHARD, im DEI; 2 ♂♂, Ficuzza, leg. HOLDHAUS; 1 ♂, Messina, leg. HOLDHAUS; 2 ♂♂, Palermo, leg. HOLDHAUS; 1 ♂, 1 ♀, Failla, coll. SCHAUFUSS, im DEI; 1 ♂, Sizilien, coll. KRAATZ, im DEI.
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Ficuzza, Sizilien, leg. O. LEONHARD; 1 Paratypus, Sizilien, Failla; 1 Paratypus, Sizilien.

horni MACHULKA, 1933 (*Cephenhium*)
(Sbornik 11, 95, Fig. 4)

Syntypen, Italien, Toscana, Vallombrosa, leg. BAUDI; Toscana, Apenninen, leg. SAULCY, im DEI.
DEI: Lectotypus, 3 Paralectotypen, Toscana, Apenninen; 3 Paralectotypen, Vallombrosa; von BESUCHET design., noch nicht publiziert.

horni montanellum MACHULKA, 1933 (*Cephenhium*)
(Sbornik 11, 95, Fig. 5)

Syntypen, Val Camonica, Borno, leg. KRÜGER; 2 ♂♂, Ledrotal, in Sammlung O. REISS.
DEI: 2 Syntypen, Val Camonica, Borno.

horni MACHULKA, 1930 (*Stenichnus*)
(Ent. Nachrichtenbl. Troppau 4, 83—84)

Syntypen, Sardinia, Arizo, Monte Genargentu, Geo C. KRÜGER, coll. LEONHARD, im DEI.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

hovalius LHOSTE, 1938 (*Scydmaenus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 5, 125—126, Fig. 17)

Holotypus, Paratypen, Madagascar, coll. SCHAUFUSS, im DEI.
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Madagascar.

humeralis L. W. SCHAUFUSS, 1866 (*Scydmaenus*)
(Nova Acta Ac. Leop. Carol. 33, 54—55; Taf. 1, Fig. 4 a, b)

Syntypen, Neu-Granada, Venezuela.
DEI: 4 Syntypen, Neu Granada.

hyalinus L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Scydmaenus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 37—38)

Syntypen, Zanzibar.
DEI: 5 Syntypen, Zanzibar.

idoneus L. W. SCHAUFUSS, 1866 (*Eumicrus*)
(Nova Acta Ac. Leop. Carol. 33, 91)

Holotypus, Venezuela, im DEI.

immersionis L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Cyrtoscydmus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 6)

Syntypen, Zanzibar.
DEI: 1 Syntypus, Zanzibar.

impressicollis L. W. SCHAUFUSS, 1866 (*Eumicrus*)
(Nova Acta Ac. Leop. Carol. 33, 83)

Syntypen, Brasilien, Neu Friburg.
DEI: 1 Syntypus, N. Friburg.

impudicus LHOSTE, 1939 (*Euconnus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 6, 284—285, Fig. 7, 8)

Holotypus, Singapore, im DEI.

incerta L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Glandularia*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 27)

Syntypen, Zanzibar.
DEI: 1 Syntypus, Zanzibar.

incertus MACHULKA, 1930 (*Scydmoraphes*)
(Ent. Nachrichtenbl. Troppau 4, 41–42)

♂ Holotypus, Velebit-Ostaria, 1910, leg. M. HILF, coll. LEONHARD, im DEI.

incompletus REITTER & CROISSANDEAU, 1890 (*Euconus*)
(Nat. Sicil. 9, 217)

Syntypen, Brasilien, bei Blumenau, leg. HETSCHKO.
DEI: 1 Syntypus, Brasilien, Blumenau, leg. HETSCHKO.

incongruens L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Cyrtoscydmus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 18)

Syntypen, Zanzibar.
DEI: 1 Syntypus, Zanzibar.

inflatus FRANZ, 1960 (*Stenichnus*)
(Eos 36, 322–323, Fig. 29)

♂ Holotypus, Algier, im DEI.

insulindensis LHOSTE, 1938 (*Scydmaenus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 5, 125, Fig. 22)

Holotypus, Paratypen, Sumatra, coll. SCHAUFUSS, im DEI.
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Sumatra.

interrupta L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Glandularia*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 26–27)

Syntypen, Singapore.
DEI: 1 Syntypus, Singapore.

italicum MACHULKA, 1930 (*Cephennium*)
(Wien. Ent. Ztg. 47, 16–17, Fig. 4)

2 ♂♂, 2 ♀♀, Syntypen, Italien, Baiso, Prov. Reggio — Em.-A., leg. DODERO.
DEI: 2 Syntypen, Baiso, Prov. Reggio Em., 27., 29. VII. 1920, leg. A. DODERO.

jurečki MACHULKA, 1930 (*Cephennium*)
(Wien. Ent. Ztg. 47, 14–15, Fig. 2)

Syntypen, Folgaria, Tirol m., leg. JUREČEK; Ötz-Umhausen, Tirol, leg. DUCHOŇ; Val Camonica, Italien, Rovereto, Pieve die Ledro, Judicarien.
DEI: ♂ Lectotypus, 3 Paralectotypen, Pieve die Ledro, Judikarien, 10. VII. 1908, von BESUCHET designiert, noch nicht publiziert.

kingii KING, 1864 (*Phagonophana*)
(Trans. Ent. Soc. N.S. Wales 1, 92; Taf. 6, Fig. A 1–4)

Syntypen, Australien, Paramatta, leg. KING; Petersham, unter Rinde von toten *Eucalyptus resinifera*, leg. MASTERS.
DEI: 1 Syntypus, Paramatta.

kombuisi LHOSTE, 1938 (*Scydmaenus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 5, 122–124, Fig. 20)

Holotypus, Paratypen, Java-Zee, leg. KL. KOMBUIS, II.–XI. 1920, im DEI.
DEI: Holotypus, 9 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

kraatzi LHOSTE, 1938 (*Scydmaenus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 5, 117, Fig. 9)

Holotypus, Paratypen, Madagascar, Tananarive, Holotypus im Mus. Paris, Paratypen im DEI.
DEI: 2 Paratypen, Tananarive.

laborator L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Cyrtoscydmus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 13–14)

Holotypus, Singapore, im DEI.

laevigatus L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Cyrtoscydmus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 19)

Syntypen, Zanzibar; Arabien, Aden.
DEI: 4 Syntypen, Zanzibar; 16 Syntypen, Aden.

langei REITTER, 1884 (*Euconus*)
(Verh. zool. bot. Ges. Wien 34, 91)

Syntypen, Syrien, Haifa, leg. LANGE.
DEI: 1 Syntypus, Syrien, Caifa, leg. LANGE.

latipennis REITTER & CROISSANDEAU, 1890 (*Euconus*)
(Nat. Sicil. 9, 216)

Syntypen, Südbrasilien, bei Blumenau, leg. HETSCHKO.
DEI: 3 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

latitarsus L. W. SCHAUFUSS, 1866 (*Scydmaenus*)
(Nova Acta Ac. Leop. Carol 33, 62—63)

2 ♂♂ Syntypen, Chile, „las Pampas“, leg. GERMAIN, in den Sammlungen von BONVOULOIR und SCHAUFUSS.
DEI: 1 Syntypus, Pampas.

lentifer LHOSTE, 1938 (*Scydmaenus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 5, 120—121, Fig. 13, 14)

Syntypen, Java, coll. SCHAUFUSS, im DEI.
DEI: 2 Syntypen, Java.

leonhardi REITTER, 1905 (*Euconnus*)
(Wien. Ent. Ztg. 24, 242—243)

Syntypen, Cephallonia, Megalo Vuno, 1905, leg. LEONHARD.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

lepidus REITTER & CROISSANDEAU, 1890 (*Euconnus*)
(Nat. Sicil. 9, 217)

Syntypen, Südbrasilien, bei Blumenau, leg. HETSCHKO.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

liguricus FAIRMAIRE, 1859 (*Mastigus*)
(Bull. Soc. Ent. France, Ser. 3, Tom VII, CCXVI)

Syntypen, Alpes maritimes, leg. GHILIANI.
DEI: 1 Syntypus, Alp. marit.

lolodorfensis LHOSTE, 1939 (*Scydmaenus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 6, 282—283, Fig. 3, 4)

Holotypus, Camerun, Lolodorf, 1895, leg. L. CONRADT, im DEI.

longiceps L. W. SCHAUFUSS, 1866 (*Scydmaenus*)
(Nova Acta Ac. Leop. Carol. 33, 67)

Syntypen, Chile.
DEI: 1 Syntypus, Chile, Pampas.

longicornis REITTER & CROISSANDEAU, 1890 (*Scydmae*)
(Nat. Sicil. 9, 220)

Syntypen, Südbrasilien, bei Blumenau, leg. HETSCHKO.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

lothari REITTER & CROISSANDEAU, 1890 (*Euconnus*)
(Nat. Sicil. 9, 217)

Syntypen, Südbrasilien, bei Blumenau, leg. HETSCHKO.
DEI: 3 Syntypen, Brasilien, Blumenau, leg. HETSCHKO.

lunicornis LHOSTE, 1938 (*Scydmaenus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 5, 118, Fig. 10, 11)

Holotypus, 2 Paratypen, Zanzibar, leg. RAFFRAY, im DEI.

macrocornis LHOSTE, 1939 (*Euconnus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 6, 7—8, Fig. 12, 13)

Holotypus, Sumatra, 1930, leg. C. SCHAUFUSS, im DEI.

madagascariensis LHOSTE, 1939 (*Scydmaenus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 6, 282, Fig. 5, 6)

Holotypus, Madagascar, coll. KRAATZ, im DEI.

manillae C. SCHAUFUSS, 1891 (*Cyrtoscydmus*)
(Ann. Soc. Ent. France 60, 335)

Syntypen, Philippinen, Manilla, leg. SIMON, im Mus. BAER und DEI.
DEI: 1 Syntypus, Mimille, leg. E. SIMON.

mancioranus L. W. SCHAUFUSS, 1884 (*Eumicrus*)
(Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova 21, 392, 408—409)

Syntypen, Borneo, Sarawak, leg. DORIA und BECCARI, 1865; Sumatra, Ajer Mantcior, VIII. 1878, leg. O. BECCARI, im Mus. Genua.
DEI: 1 Syntypus, Sumatra, Ajer Mantcior, VIII. 1878, leg. BECCARI.

merditanus APFELBECK, 1907 (*Euconnus*)
(Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien 116, Abt. 1, 517—518)

Syntypen, Albanien, Gebirge bei Oroshi und Fandi im Miriditengebiet, in Eichen- und Buchenwäldern, unter tiefen Laublagen.
DEI: 1 Syntypus, Merdita, Zebia.

mexicanus L. W. SCHAUFUSS, 1866 (*Eumicrus*)
(Nova Acta Ac. Leop. Carol. 33, 78—79)

Syntypen, Mexico, Teapa.
DEI: 2 Syntypen, Teapa.

minimus REITTER & CROISSANDEAU, 1890 (*Euconnus*)

(Nat. Sicil. 9, 219)

Syntypen, Südbrasilien, bei Blumenau, leg. HETSCHKO.

DEI: 3 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

minutissimus L. W. SCHAUFUSS, 1866 (*Eumierus*)

(Nova Acta Ac. Leop. Carol. 33, 77–78; Taf. 3, Fig. 16)

5 Syntypen, Südamerika, Amazonas, leg. BATES, in den Sammlungen v. BONVOULOIR und SCHAUFUSS.

DEI: 2 Syntypen, Amazonas.

molukkensis FRANZ, 1971 (*Syndicus*)

(Kol. Rundsch. 49, 17–18, Fig. 6)

♂ Holotypus, Molukken, im DEI.

monroi BROUN, 1893 (*Phaganophana*)

(Manual N. Zealand Col., Teil 5, 1063–1064)

Syntypen, Clevedon, leg. MUNRO.

DEI: 2 Syntypen, Clevedon, Auckland, N.Z.

murinus L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Scydmaenus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 31, 318)

Syntypen, Columbien, leg. MORITZ, im Mus. Berlin No. 5142 und in Sammlung SCHAUFUSS.

DEI: 1 Syntypus, Columbien, leg. MORITZ.

myrmecophilus AUBÉ, 1861 (*Scydmaenus*)

(Ann. Soc. Ent. France (4) I, 197–198)

Syntypen, San Raphael, leg. M. RAYMOND, im Boden, immer in Gesellschaft von einer sehr kleinen Ameise.

DEI: Wahrscheinlich 1 Syntypus (nach FRANZ „Eos 37, 421, 1961“). San Raphael, zusammen mit einer kleinen Ameise.

nalandae LHOSTE, 1939 (*Euconnus*)

(Arb. morph. tax. Ent. 6, 5–6, Fig. 10, 11)

Holotypus, Ceylon, Nalanda, 1899, leg. HORN, im DEI.

nanulus L. W. SCHAUFUSS, 1866 (*Scydmaenus*)

(Nova Acta Ac. Leop. Carol. 33, 44–45)

2 Syntypen, Amazonas, leg. BATES, in den Sammlungen SCHAUFUSS und v. BONVOULOIR.

DEI: 1 Syntypus, Amazonas.

nigripalpis L. W. SCHAUFUSS, 1884 (*Scydmaenus*)

(Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova, 21, 389–395)

Syntypen, Borneo, Sarawak, leg. DORIA und BECCARI, im Mus. Genua.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

nitidus L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Scydmaenus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 33, 35)

Syntypen, Zanzibar, Bagamoyo.

DEI: 2 Syntypen, Zanzibar, Bagamoyo.

nodicornis L. W. SCHAUFUSS, 1866 (*Scydmaenus*)

(Nova Acta Ac. Leop. Carol. 33, 70; Taf. 2, Fig. 9)

Syntypen, Chile, leg. GERMAIN.

DEI: 2 Syntypen, Chile.

novahollandensis LHOSTE, 1938 (*Scydmaenus*)

(Arb. morph. tax. Ent. 5, 113–114, Fig. 5, 6)

Holotypus, 1 Paratypus, Indisch Holland, im DEI.

nudipennis LHOSTE, 1939 (*Euconnus*)

(Arb. morph. tax. Ent. 6, 9, Fig. 21, 22)

Holotypus, Paratypen, Sumatra, 1930, leg. SCHAUFUSS, im DEI.

DEI: Holotypus, 2 Paratypen, Sumatra.

nutans LHOSTE, 1939 (*Euconnus*)

(Arb. morph. tax. Ent. 6, 8–9, Fig. 17, 18)

Holotypus, Java, coll. KRAATZ, im DEI.

oblongus bosnicus MACHULKA, 1928 (*Tetramelus*)

(Ent. Nachrichtenbl. Troppau 2, 60, Fig. 2)

Syntypen, Bosnien, Stambulčić, leg. ZOUFAL; Herzegovina.

DEI: Syntypen; 1 ♂ Herzegovina, Jablanica; 2 Ex. Herzegovina, Velež-Planina, 1900; 1 ♂ Central-Bosnien; 3 Ex. Bosnien, Maklen-Pass, 1902, leg. O. LEONHARD.

ocularis L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Cyrtoscydmus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 33, 12–13)

Syntypen, Singapore.

DEI: 1 Syntypus, Singapore.

olivieri REITTER, 1882 (*Eumierus*)

(Verh. zool. bot. Ges. Wien 31 (1881), 582)

Syntypen, Algier.

DEI: 6 Syntypen, Algier.

- orientalis** LHOSTE, 1939 (*Euconnus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 6, 8, Fig. 19, 20)
Holotypus, Sumatra, 1930, leg. C. SCHAUFUSS, im DEI.
- ovicollis** L. W. SCHAUFUSS, 1884 (*Eumicrus*)
(Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova 21, 392, 410)
Holotypus, Singapur, im DEI.
- ovipennis** REITTER & CROISSANDEAU, 1890 (*Euconnus*)
(Nat. Sicil. 9, 216)
Syntypen, Südbrasilien, bei Blumenau, leg. HETSCHKO.
DEI: 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
- pachyscelis** REITTER & CROISSANDEAU, 1890 (*Euconnus*)
(Nat. Sicil. 9, 216)
Syntypen, Südbrasilien, bei Blumenau, leg. HETSCHKO.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- paeninsularis** L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Syndicus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 22–23)
Syntypen, Singapur.
DEI: ♂ Lectotypus, 6 Paralectotypen, Singapur, von FRANZ (Kol. Rundsch. 49, 15, 1971) festgelegt.
- parabulbosus** FRANZ, 1971 (*Scydmaenus*)
(Kol. Rundsch. 49, 32, Fig. 6)
♂ Holotypus, Nord-Neuguinea, im DEI.
- pauper** REITTER & CROISSANDEAU, 1890 (*Euconnus*)
(Nat. Sicil. 9, 217)
Syntypen, Südbrasilien, bei Blumenau, leg. HETSCHKO.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
- permictus** REITTER & CROISSANDEAU, 1890 (*Euconnus*)
(Nat. Sicil. 9, 218)
Syntypen, Südbrasilien, bei Blumenau, leg. HETSCHKO.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
- perrisii** REITTER, 1882 (*Eumicrus*)
(Verh. zool. bot. Ges. Wien 31 (1881), 583)
Syntypen, Frankreich, Istrien, Ungarn, Croatien.
DEI: 1 Syntypus, Frankreich mer.
- petraeus** APFELBECK, 1911 (*Euconnus*)
(Glasn. Zem. Muz. Bosn. Herc. 23, 212–213)
Syntypen, Herzegowina, bei Hrasna und Neuma.
DEI: ♂ Syntypus, Hrasno, 02, APFELBECK.
- pici** LHOSTE, 1938 (*Scydmaenus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 5, 113, Fig. 1)
Holotypus, de Tananarive, im Mus. Paris; Paratypus, Madagascar, Tananarive, im DEI.
DEI: 1 Paratypus, Tananarive.
- pinguiculus** REITTER & CROISSANDEAU, 1890 (*Euconnus*)
(Nat. Sicil. 9, 219)
Syntypen, Südbrasilien, bei Blumenau, leg. HETSCHKO.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- planus** FRANZ, 1961 (*Scydmoraphes*)
(Eos 37, 469–470, Fig. 39)
♂ Holotypus, Algier, im DEI.
- plicatulus** L. W. SCHAUFUSS, 1866 (*Scydmaenus*)
(Nova Acta Ac. Leop. Carol. 33, 42–43)
1 Syntypus, Neu Granada, 1 Syntypus, Mexico, Teapa, in Sammlung SCHAUFUSS, im DEI.
- princeps** KING, 1864 (*Heterognathus*)
(Trans. Ent. Soc. N.S. Wales 1, 98; Taf. VII, Fig. 1, 2)
Syntypen, Australien, Paramatta, Lane Cöve.
DEI: 1 Syntypus, Paramatta.
- principulus** L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Syndicus*)
(Horae Soc. Ent. Ross. 21, 114)
2 Syntypen, Sumatra, auf Tabak.
DEI: 1 Syntypus, Sumatra.
- prolixus** REITTER, 1884 (*Euconnus*)
(Verh. zool. bot. Ges. Wien 34, 90)
Syntypen, Syrien, Haifa.
DEI: 3 Syntypen, Syrien, Haifa, leg. REITTER.

proterviformis FRANZ, 1960 (*Stenichnus*)
(Eos 36, 306–307, Fig. 18)

Holotypus, Spanien, in den Marismas bei Los Palacios, II. 1951, leg. FRANZ, in Sammlung FRANZ. Paratypen vom selben Fundort und vom Acker bei Carmona im Bereich des andalusischen Schwarzerdegebietes bei Sevilla aus Detritus geseiht, leg. FRANZ.

DEI: 1 Paratypus, Umgebung Carmona, Andalusien, leg. H. FRANZ.

providus REITTER & CROISSANDEAU, 1890 (*Euconnus*)
(Nat. Sicil. 9, 216)

Syntypen, Südbrasilien, Blumenau, leg. HETSCHKO.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

prudens L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Alaudula*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 32)

Syntypen, Zanzibar.

DEI: Das in der SCHAUFUSS-Sammlung vorhanden gewesene eine Exemplar ist verloren gegangen, ob bei der Beschreibung mehrere Exemplare vorgelegen haben ist nicht bekannt.

pubescens L. W. SCHAUFUSS, 1866 (*Eumicrus*)
(Nova Acta Ac. Leop. Carol. 33, 76–77; Taf. 3, Fig. 14)

4 Syntypen, Cuba, leg. GUNDLACH, in den Sammlungen RIEHL, SCHAUFUSS und CHEVROLAT.

DEI: 1 Syntypus, Cuba.

punitio L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Cyrtoscydmus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 5)

Syntypen, Zanzibar.

DEI: 1 Syntypus, Zanzibar.

pustulatus L. W. SCHAUFUSS, 1866 (*Scydmaenus*)
(Nova Acta Ac. Leop. Carol. 33, 46–47)

Holotypus, Brasilien, Rio de Janeiro, in Sammlung REICHE, im DEI.

quadrioveolata L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Glandularia*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 25)

Syntypen, Singapur.

DEI: 1 Lectotypus, Singapur, hiermit festgelegt.

quadripunctatus L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Cyrtoscydmus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 16–17)

Syntypen, Zanzibar.

DEI: 1 Syntypus, Zanzibar.

quadristriatus REITTER, 1884 (*Leptomastax*)
(Verh. zool. bot. Ges. Wien 34, 94)

Syntypen, Syrien, Haifa.

DEI: 1 Syntypus, Syrien, Haifa.

raffrayi L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Cephennium*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 29)

Syntypen, Singapur.

DEI: 1 Syntypus, Singapur.

raptax C. SCHAUFUSS, 1890 (*Scydmaenus*)
(Nunquam Otiosus 3, 592–593)

Syntypen, Madagaskar.

DEI: 2 Syntypen, Madagaskar.

variclava LHOSTE, 1939 (*Euconnus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 6, 285–286, Fig. 10, 11)

Holotypus, Sumatra, in Tabak, GROUVELLE, im DEI.

rectispina L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Alaudula*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 31–32)

Syntypen, Aden, Arabien.

DEI: 2 Syntypen, Aden.

refertus L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Cyrtoscydmus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 9)

Syntypen, Zanzibar.

DEI: 1 Syntypus, Zanzibar, 1 Syntypus, ohne Fundortangabe.

regularis L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Scydmaenus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 41)

Syntypen, Singapur.

DEI: 1 Syntypus, Singapur.

regulus L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Cyrtoscydmus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 5–6)

Syntypen, Singapur.

DEI: 1 Syntypus, Singapur.

reissi MACHULKA, 1933 (*Cephennium*)
(Sborn. ent. odd. Nár. Mus. Praze 11, 94)

Syntypen, Italien, Val Camonica, Borno, coll. O. LEONHARD; Ledrotal, coll. WOERNLE.

DEI: Lectotypus, 3 Paralectotypen, Val Camonica, Borno, coll. LEONHARD, von BESUCHET ausgezeichnet, noch nicht publiziert.

Alle Exemplare von MACHULKA als *C. doderoi* ausgezeichnet, aber von BESUCHET als Etikettierungsfehler bezeichnet.

reissi bergamascum MACHULKA, 1933 (*Cephennium*)
(Sborn. ent. odd. Nár. Mus. Praze 11, 94—95)

Syntypen, Italien, Bergamasker Alpen, Mte. Grigna, Oltre il Colle.

DEI: 3 Syntypen, Mte Grigna.

Alle Exemplare von MACHULKA als *doderoi alpestre* ausgezeichnet, von BESUCHET als Etikettierungsfehler bezeichnet.

rifensis FRANZ, 1960 (*Stenichnus*)
(Eos 36, 298—299, Fig. 12)

1 ♂, 4 ♀♀ Syntypen, Tanger, Marokko, im DEI.

DEI: ♂ Typus, Tanger, von FRANZ als Holotypus ausgezeichnet, in der Originalbeschreibung aber nicht als solcher gekennzeichnet, hiermit als Lectotypus festgelegt. 2 ♀♀ Paralectotypen, Tanger.

robiniae L. W. SCHAUFUSS, 1884 (*Eumicrus*)
(Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova 21, 393, 418)

Syntypen, Neu Guinea, Andai, VIII. 1872, leg. D'ALBERTIS, im DEI; Insel Aru, Wakan, leg. O. BECCARI, 1873, im Mus. Genua.

DEI: 1 Syntypus, Neu Guinea, Andai, VIII. 1872, leg. D'ALBERTIS.

romanus FRANZ, 1961 (*Scydmorephes*)
(Eos 37, 455—456, Fig. 28)

♂ Holotypus, Roma, 1899, leg. MÜNSTER; 1 ♂ Paratypus, im DEI.

DEI: ♂ Holotypus, Roma, 1899, leg. MÜNSTER.

rubens SCHAUM, 1841 (*Scydmaenus*)
(Analecta Entomologica, p. 28)

Syntypen, Columbien, in den Sammlungen MORITZ, GERMAR und KUNZ und im Mus. Berlin.

DEI: 1 Syntypus, Columbien.

rubiginosus L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Cyrtoscydmus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 15—16)

Syntypen, Arabien, Aden.

DEI: 1 Syntypus, Aden.

ruficornis L. W. SCHAUFUSS, 1884 (*Eumicrus*)
(Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova 21, 392, 412)

Syntypen, Neu Guinea.

DEI: 1 Syntypus, Neu Guinea.

ruthenum zoufali MACHULKA, 1924—31 (*Cephennium*)
(Sborn. prirod. Mus. Bratislava 1924—31, 5—6)

Syntypen, Slowakei bei Rachovo, Prostějov, Umg. Jasina, Abhänge des Berges Bliznica bei Jagdhütte Diana, leg. MACHULKA und ZOUFAL.

DEI: 5 Syntypen, Diana-lak, Podk. Rus., VI., leg. ZOUFAL.

sardous FRANZ, 1961 (*Scydmorephes*)
(Eos 37, 425—426, Fig. 8)

♂ Holotypus, Sardinien, Assuni, leg. KRAUSSE, im DEI.

sardous REITTER, 1913 (*Stenichnus*)
(Ent. Bl. 9, 143)

Syntypen, Sardinien.

DEI: 1 Syntypus, Sardinien, Golfo Aranci, leg. DODERO.

sauteri REITTER, 1913 (*Euconnus*)
(Ent. Mitt. 2, 265—266)

Holotypus, Formosa, Akau, XII. 1907, leg. SAUTER, im DEI.

schaufussianus FRANZ, 1970 (*Euconnus*)
(Beitr. Ent. 20, 554—555, Fig. 19)

♂ Holotypus, Sumatra, Tabak Gr., im DEI.

schenkingi REITTER, 1913 (*Euconnus*)
(Ent. Mitt. 2, 266)

Syntypen, Formosa, 1 Ex. Taihorin, 1 Ex. Anping, leg. SAUTER, im DEI.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Anping, VI. 1911, leg. SAUTER.

scopulatus L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Cyrtoscydmus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 7—8)

Syntypen, Aden, Arabien.

DEI: 2 Syntypen, Aden.

scopulifer L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Cyrtoscydmus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 9–10)

Syntypen, Zanzibar.
DEI: 1 Syntypus, Zanzibar.

scutellatus L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Scydmaenus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 33–34)

Syntypen, Zanzibar, Bagamoyo; Arabien, Aden.
DEI: 3 Syntypen, Bagamoyo; 1 Syntypus, Aden.

scydmaenoides LHOSTE, 1938 (*Scydmaenus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 5, 124, Fig. 21)

Holotypus, Paratypen, Sumatra, coll. SCHAUFUSS, im DEI.
DEI: Holotypus, 7 Paratypen, Sumatra.

semiglabratus LHOSTE, 1938 (*Scydmaenus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 5, 116–117, Fig. 7)

Holotypus, 17 Paratypen, Madagascar, Androy, 1900, leg. ALLUAUD, Holotypus im Mus. Paris, Paratypen im DEI.
DEI: 3 Paratypen, Madagascar.

separatus L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Scydmaenus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 36–37)

♂ Holotypus, Zanzibar, Bagamoyo, im DEI.

sexfoveatus LHOSTE, 1939 (*Euconnus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 6, 3–4, Fig. 3, 4)

Holotypus, Afrika, Kap der Guten Hoffnung, Stellenbosch, XI. 1887, im DEI.

siculus FRANZ, 1960 (*Stenichnus*)
(Eos 36, 313–314, Fig. 21)

11 Syntypen, Sizilien, Messina, 1906, O. LEONHARD. 5 Syntypen, Ritino, 8. 4.; 5 Syntypen, Messina, leg. HOLDHAUS;
1 Syntypus, Fiumedinisi, leg. HOLDHAUS.
DEI: ♂ Typus, Sicilia, Messina, 1906, leg. O. LEONHARD, von FRANZ als Holotypus ausgezeichnet, in der Originalbeschreibung aber nicht als solcher gekennzeichnet, hiermit als Lectotypus festgelegt, 2 Paralectotypen vom selben Fundort.

similis L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Scydmaenus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 39)

Syntypen, Singapore.
DEI: 1 Syntypus, Singapore.

simonis STUSSINER, 1880 (*Leptomastax*)
(Verh. zool. bot. Ges. Wien 30, 499–500)

Syntypen, Istrien: Pola; Lesina; Dalmatien; Griechenland; Italien, Neapel.
DEI: 1 Syntypus, Lesina, REITTER.

simplicitus L. W. SCHAUFUSS, 1866 (*Scydmaenus*)
(Nova Acta Ac. Leop. Carol. 33, 57)

Syntypen, Mexico, Teapa.
DEI: 3 Syntypen, Teapa.

slovenicum MACHULKA, 1924–31 (*Cephennium*)
(Sborn. prirod. Mus. Bratislava 1924–31, 2–4)

Syntypen, Slowakei, Košice; Podkarpatská Rus, Umgebung von Užhorod, leg. MACHULKA; Trenčianske Teplice, am Berg Žihlavník, leg. K. KOČI.

DEI: 1 Syntypus, Slov. Košice, 1927, leg. MACHULKA.

soror FRANZ, 1970 (*Scydmaenus*)
(Beitr. Ent. 20, 539–540, Fig. 5)

♂ Holotypus, Insel Key, im DEI.

spatulus REITTER & CROISSANDEAU, 1890 (*Euconnus*)
(Nat. Sicil. 9, 219)

Syntypen, Südbrasilien, bei Blumenau, leg. HETSCHKO.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

speculator L. W. SCHAUFUSS, 1866 (*Eumicrus*)
(Nova Acta Ac. Leop. Carol. 33, 79–80)

Syntypen, Mexico, Teapa.
DEI: 1 Syntypus, Teapa.

spinicolle L. W. SCHAUFUSS, 1866 (*Cephennium*)
(Nova Acta Ac. Leop. Carol. 33, 95–96; Taf. 4, Fig. 20)

2 Syntypen, Neu Granada, am Fluss Magdalena, in den Sammlungen v. D. BRUCK und SCHAUFUSS.
DEI: 1 Syntypus, Neu Granada.

spinipes L. W. SCHAUFUSS, 1866 (*Scydmaenus*)
(Nova Acta Ac. Leop. Carol. 33, 73; Taf. 2, Fig. 12)

Syntypen, Mexico, Teapa.
DEI: 1 Syntypus, Mexico, Teapa.

sphaericollis L. W. SCHAUFUSS, 1866 (*Eumicrus*)
(Nova Acta Ac. Leop. Carol. 33, 85)

2 Syntypen, Südamerika, Amazonas, leg. BATES, ♂ in Sammlung v. BONVOULOIR, ♀ in Sammlung SCHAUFUSS.
DEI: ♀ Syntypus, Amazonas.

stolzi MACHULKA, 1932 (*Cephennium*)
(Časopis 29, 71–72, Fig. 1)

♂ Holotypus, Italien, Como-See, Mte. Bisbino, coll. O. LEONHARD, im DEI.

subcompressus REITTER & CROISSANDEAU, 1890 (*Euconnus*)
(Nat. Sicil. 9, 219)

Syntypen, Südbrasilien, bei Blumenau, leg. HETSCHKO.
DEI: 3 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

subplicata L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Glandularia*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 24–25)

Syntypen, Bagamoyo und Zanzibar.
DEI: 1 Syntypus, Bagamoyo.

sumatrensis L. W. SCHAUFUSS, 1884 (*Syndicus*)
(Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova 21, 391, 405)

Syntypen, Sumatra, Ms. Singalan, leg. BECCARI im Mus. Genua.
DEI: 1 Syntypus, Sumatra, Mt. Singalang, VII. 1878, leg. O. BECCARI.

subimpressus L. W. SCHAUFUSS, 1866 (*Scydmaenus*)
(Nova Acta Ac. Leop. Carol. 33, 55–56)

Syntypen, Brasilien.
DEI: 1 Syntypus, Brasilien.

subnudus L. W. SCHAUFUSS, 1866 (*Eumicrus*)
(Nova Acta Ac. Leop. Carol. 33, 86–87)

Syntypen, Brasilien.
DEI: 1 Syntypus, Brasilien.

sultanus L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Cyrtoscydmus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 19–20)

Syntypen, Zanzibar.
DEI: 1 Syntypus, Zanzibar.

suturalis L. W. SCHAUFUSS, 1866 (*Scydmaenus*)
(Nova Acta Ac. Leop. Carol. 33, 53)

Holotypus, Venezuela, im DEI.

taihorinus REITTER, 1913 (*Scydmaenus*)
(Ent. Mitt. 2, 268)

♂ Holotypus, Formosa, Taihorin, leg. SAUTER, im DEI.

talparum LOKAY, 1921 (*Neuraphes*)
(Časopis 17 (1920), 1–3)

Syntypen, Umgeb. Prag, in Nestern vom Maulwurf.
DEI: 1 Syntypus, Prag, Baumgarten.

talparum NERESHEIMER & WAGNER, 1921 (*Neuraphes*)
(Ent. Mitt. 10, 3, Fig. 2)

Syntypen, Mark Brandenburg, Wildpark-Golm, in Nestern von *Talpa europaeus* L., 29. XII. 1918, leg. NERESHEIMER & WAGNER.
DEI: 17 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

tananarivensis LHOSTE, 1938 (*Eustemmus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 5, 126–127, Fig. 25)

Holotypus, Madagascar, Tananarive, im DEI.

tarsalis MACHULKA, 1930 (*Scydmoraphes*)
(Ent. Nachrichtenbl. Troppau 4, 33)

Syntypen, Italien, 1 ♂ Camerata nuova; 1 ♀ Castel di Sangro, leg. PAGANETTI, beide in Sammlung MACHULKA; 2 ♂♂, 1 ♀ Calabria, Aspromonte, leg. PAGANETTI, im DEI.
DEI: 3 Syntypen, siehe Originalbeschreibung.

tenuicornis L. W. SCHAUFUSS, 1884 (*Eumicrus*)
(Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova 21, 393, 416–417)

Syntypen, Java und Insel Key, leg. RAFFRAY & BECCARI; 1 Ex. von Insel Key, im Mus. Genua.
DEI: 4 Syntypen, Java.

terminatus L. W. SCHAUFUSS, 1866 (*Scydmaenus*)
(Nova Acta Ac. Leop. Carol. 33, 56)

Syntypen, Mexico, Teapa.
DEI: 1 Syntypus, Teapa.

timendus L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Cyrtoscydmus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 4–5)

Syntypen, Singapore.
DEI: 1 Syntypus, Singapore.

tinggiensis LHOSTE, 1938 (*Scydmaenus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 5, 112–113, Fig. 3)

Holotypus, 3 Paratypen, Sumatra, Tebing-Tinggi, leg. SCHULTHEISS, im DEI.

tirolense MACHULKA, 1930 (*Cephennium*)
(Wien. Ent. Ztg. 47, 15–16, Fig. 3)

Syntypen, Tirol, Oetz-Umhausen, leg. DUCHON und LAVARONE.
DEI: ♂ Lectotypus, 1 Paralectotypus, S. Tirol, Lavarone, VII. 1914, von BESUCHET ausgezeichnet, aber noch nicht publiziert.

trapezicollis LHOSTE, 1938 (*Scydmaenus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 5, 124, Fig. 18, 19)

♂ Holotypus, Borneo, Sarawak, 1865–1866, coll. DORIA, im DEI.

triarcticuli LHOSTE, 1939 (*Euconnus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 6, 7, Fig. 14–16)

Holotypus, Siam, Bangkok, leg. C. SCHAUFUSS, 1930, im DEI.

tricapucinus FRANZ, 1970 (*Euconnus*)
(Beitr. Ent. 20, 552–553, Fig. 17)

Holotypus, 3 Paratypen, Singapore, Waldreservat in Bukit Timah, 16. 11. 1966, 18. 2., 17. 4. und 25. 7. 1967; 1 Paratypus, Universitätsgelände in Singapore; alle leg. MURPHY. 1 ♀ Paratypus, Singapore, im DEI.
DEI: ♀ Paratypus, Singapore.

trijoveatus L. W. SCHAUFUSS, 1866 (*Scydmaenus*)
(Nova Acta Ac. Leop. Carol. 33, 57–58; Taf. 1, Fig. 5 a, b)

Syntypen, Neu Granada, am Madalena Fluss, in den Sammlungen v. D. BRUCK und SCHAUFUSS.
DEI: 1 Syntypus, Neu Granada.

trigeminus L. W. SCHAUFUSS, 1866 (*Scydmaenus*)
(Nova Acta Ac. Leop. Carol. 33, 37; Taf. 1, Fig. 1 a, b)

2 Syntypen, Mexico, Teapa, in Sammlung SCHAUFUSS.
DEI: 1 Syntypus, Mexico, Teapa.

tritonus REITTER & CROISSANDEAU, 1890 (*Euconnus*)
(Nat. Sicil. 9, 219)

Syntypen, Südbrasilien, bei Blumenau, leg. HETSCHKO.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

tshadensis FRANZ, 1958 (*Scydmaenus*)
(Kol. Rundsch. 35, 2–3, Fig. 2)

Holotypus, Mar Korom bei Ira, nördlich von Bol, im Norden des Tschadsees, 27. 3. 1957, leg. FRANZ; zahlreiche Paratypen vom selben Fundort; Ufer des Tschadsees bei Bol; auf der Insel Broun bei Bol und der Insel Iba, 24.–30. 3. 1957, leg. FRANZ.
DEI: 4 Paratypen, Mar Korom bei Ira, Tschadgebiet, AEF, Distrikt Bol.

uliginosus L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Cyrtoscydmus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 18)

Syntypen, Zanzibar.
DEI: 1 Syntypus, Zanzibar.

umbonatus L. W. SCHAUFUSS, 1884 (*Eumicrus*)
(Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova 21, 392, 412)

Holotypus, Süd-Neu-Guinea, im DEI.

uncinatus L. W. SCHAUFUSS, 1884 (*Eumicrus*)
(Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova 21, 393, 419)

Syntypen, Sumatra, Ajer-Mantecor, leg. BECCARI; ♂ im Mus. Genua; 1 ♂, 1 ♀ Neu Guinea, leg. RAFFRAY.
DEI: 2 Syntypen, Neu Guinea.

unicus LHOSTE, 1938 (*Scydmaenus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 5, 121, Fig. 16)

Holotypus, Madagascar, coll. KRAATZ, im DEI, das Tier ist mit Ausnahme des Gen. Präp. auf dem Transport verloren gegangen.

validus C. SCHAUFUSS, 1890 (*Cyrtoscydmus*)
(Nunquam Otiosus 3, 588–589)

Holotypus, Madagascar, im DEI.

ventricosus v. ROTTENBERG, 1870 (*Scydmaenus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 14, 38–39)

Holotypus, Palermo.
DEI: ♂ Holotypus, Palermo, ROTTENBERG.

vestitoides REITTER, 1913 (*Scydmaenus*)
(Ent. Mitt. 2, 268)

2 Syntypen, Formosa, Takao, leg. SAUTER, im DEI.
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Takao, XI. 1907, leg. SAUTER.

vestitus REITTER & CROISSANDEAU, 1890 (*Euconnus*)
(Nat. Sicil. 9, 218)

Syntypen, Südbrasilien, bei Blumenau, leg. HETSCHKO.
DEI: 3 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

vilis L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Scydmaenus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 35)

Syntypen, Zanzibar, Bagamoyo; Arabien, Aden.
DEI: 1 Syntypus, Zanzibar; 2 Syntypen, Bagamoyo.

vittatus L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Cyrtoscydmus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 11–12)

Syntypen, Singapore.
DEI: 1 Syntypus, Singapore.

vulgaris C. SCHAUFUSS, 1890 (*Cyrtoscydmus*)
(Nunquam Otiosus 3, 589–590)

Syntypen, Madagascar.
DEI: 1 Lectotypus, 4 Paralectotypen, Madagaskar, von FRANZ festgelegt, im Druck.

wailimae LHOSTE, 1939 (*Stenichnus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 6, 1–2, Fig. 1, 2)

Holotypus, Paratypen, Sumatra, Lampongs, Wai Lima, XI.–XII. 1921, leg. KARNY, im DEI.
DEI: Holotypus, 2 Paratypen, Wai Lima, Z. Sum. Lampongs, No. 156, XI.–XII. 1921, leg. KARNY.

winneguthi APFELBECK, 1907 (*Euconnus*)
(Sitzungsber. Akad. Wiss. Wien 116, Abt. 1, 516–517)

Syntypen, Albanien, Gebirge bei Oroshi, Mal i Shëit in Eichenlaublagen. Montenegro, bei Dulcigno in Eichenwald, leg. WINNEGUTH.
DEI: 1 Syntypus, Merdita, M. Schëit.

zanzibaricum L. W. SCHAUFUSS, 1889 (*Cephennium*)
(Berl. Ent. Ztschr. 33, 28–29)

Syntypen, Zanzibar.
DEI: 1 Syntypus, Zanzibar.

zanzebaricus L. W. SCHAUFUSS, 1884 (*Scydmaenus*)
(Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova 21, 391, 402)

Holotypus, Zanzibar, im DEI.
DEI: Holotypus, Zanzibar, RAFFRAY.

zumpti LHOSTE, 1937 (*Scydmaenus*)
(Rev. Franc. Ent. 4, 190)

Holotypus, Paratypen, Cameroun, Ekona, 5. 11. 1935, im Mus. Paris und in Sammlung F. ZUMPT.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

Wahrscheinlich nicht beschrieben.

banaticum MACHULKA (*Neuraphes*)

DEI: 1 Ex. Banat; 1 Ex. Zlet?; als Typen ausgezeichnet.

biselongatus SCHAUFUSS

DEI: 1 ♀ Sydney, als Typus ausgezeichnet.

brevis SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex. Sydney, als Typus ausgezeichnet.

coloratus SCHAUFUSS

DEI: 4 Ex. Sydney, als Typen ausgezeichnet.

comosus SCHAUFUSS

DEI: 4 Ex. Sydney, als Typen ausgezeichnet.

cristatus SCHAUFUSS

DEI: 1 ♀, N. Guinea, Hatam, VII. 1873, leg. BECCARI, als Typus ausgezeichnet.

decipiens MACHULKA (*Scydmoraphes*)

DEI: 3 Ex. Bulg. Samokov, 1911, leg. HILF; 8 Ex. Bulg. Tschamkorija, 1911, leg. HILF; 1 Ex. Tripolis; 1 Ex. Cons; 1 Ex. Balkan, leg. REITTER, als Typen ausgezeichnet.

decipiens MACHULKA (*Stenichnus*)

DEI: 1 Ex. Spanien, leg. REITTER und LEDER, als Typus ausgezeichnet.

doderoi MACHULKA (*Scydmoraphes*)

DEI: 2 Ex. Carroforte, Sardinien, 27. IV. 1902, leg. DODERO, als Typen ausgezeichnet.

giraffa SCHAUFUSS

DEI: 1 ♀, Neu Guinea, als Typus ausgezeichnet.

grossepunctatus MACHULKA (*Stenichnus*)

DEI: 1 Ex. Algeciras, leg. DIECK, als Typus ausgezeichnet.

hirtulus SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex. Molukken, als Typus ausgezeichnet.

horni MACHULKA (*Euconnus*)

DEI: 1 Ex. Rapallo, BRENSKE; 1 Ex. Tirol; 1 Ex. Garfagnana, PAGANETTI; 3 Ex. Val. Camonica, Cogno, leg. G. KRÜGER; 12 Ex. Val. Camonica, leg. G. KRÜGER; 1 Ex. Mte. Legnone, 30. VI. 04, leg. PINKER; alle als Cotypen ausgezeichnet.

hyppocephaloides SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex. Alger, als Typus i.l. von SCHAUFUSS ausgezeichnet.

impressus SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex. Sydney, als Typus ausgezeichnet.

inscentis SCHAUFUSS

DEI: 2 Ex. Sydney, als Typen ausgezeichnet.

insularis MACHULKA (*Scydmorephes*)

DEI: 20 Ex. Insel Elba, 1908, leg. PAGANETTI; 2 Ex. Insel Elba, leg. MOCZARSKI.

istriensis MACHULKA (*Euconnus*)

DEI: 1 Ex. Mto. Maggiore, als Cotypus ausgezeichnet.

longicornis SCHAUFUSS

DEI: 1 ♀, Columbien, leg. MORITZ, als Typus ausgezeichnet.

macrops SCHAUFUSS

DEI: 2 Ex. Sydney, als Typen ausgezeichnet.

marginatus SCHAUFUSS

DEI: 3 Ex. Sydney, als Typen ausgezeichnet.

meridionalis MACHULKA (*Euconnus*)

DEI: 2 Ex. Zante, Kalamaki, 1909, leg. M. HILF, als Typen ausgezeichnet.

micropterus REITTER (*Euconnus*)

DEI: 1 Ex. Brasilien, Blumenau, leg. HETSCHKO, als Typus ausgezeichnet.

minor SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex. Rochampton?, als Typus ausgezeichnet.

mitis SCHAUFUSS

DEI: 1 ♀, Abyss. leg. RAFFRAY, als Typus ausgezeichnet.

myrmecophilus grandis MACHULKA (*Scydmorephes*)

DEI: 3 Ex. Provence, Cap D'Anteba, leg. A. CARRET, als Typen ausgezeichnet.

nigricornis SCHAUFUSS

DEI: 1 ♀, Columbien, leg. MORITZ, als Typus ausgezeichnet.

obenbergeri MACHULKA (*Euconnus*)

DEI: 1 Ex. Bosnia, Prozon, 1902, leg. LEONHARD; 1 Ex. Bosnien, Bjelašnica Plan, leg. LEONHARD; als Cotypen ausgezeichnet.

oculatus SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex. N.-Holl.?, als Typus ausgezeichnet.

pragensis MACHULKA (*Euconnus*)

DEI: 1 Ex. RČS. Slov. Košice, leg. MACHULKA; 1 Ex. Bohemia, Stromovia, leg. MACHULKA; 3 Ex. Prag, Baumgarten; alle als Cotypen ausgezeichnet.

psepharobius SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex. Süd. Austral, als Typus ausgezeichnet.

puber SCHAUFUSS

DEI: 1 ♀, Columbien, leg. MORITZ, als Typus ausgezeichnet.

punctipennis MACHULKA (*Scydmorephes*)

DEI: 2 Ex. Daghestan, LEDER, REITTER; 1 Ex. Caucas. occ. Circassien, LEDER, REITTER; als Typen ausgezeichnet.

purcignei MACHULKA (*Euconnus*)

DEI: 1 Ex. Kajmakčalan, als Cotypus ausgezeichnet.

pyrenaeus MACHULKA (*Neuraphes*)

DEI: 1 Ex. Cauterets Hts. Pyren. Aug. 1892, leg. EHLERS; 1 Ex. Pyren. H. leg. CROISSANDEAU, als Typen ausgezeichnet.

quadripunctulatus SCHAUFUSS

DEI: 2 ♀♀, Neu Guinea, als Typen ausgezeichnet.

roubali MACHULKA (*Neuraphes*)

DEI: 1 ♂, Caucasus occ. Krasnaja Poljana, VII. 1910, leg. ROUBAL, als Typus ausgezeichnet.

rubidus SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex. Abyss., leg. RAFFRAY, als Typus ausgezeichnet.

sanio SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex. Sydney, als Typus ausgezeichnet.

sardiniensis REITTER (*Neuraphes*)

DEI: 1 Ex. Sardinien, Aritzo, Mte Genargentu, leg. C. KRÜGER, als Typus ausgezeichnet.

sardiniensis MACHULKA (*Scydmoraphes*)

DEI: 15 Ex. Sardinia, Aritzo, Mte Genargentu, leg. KRÜGER, als Typen ausgezeichnet.

schatzmayeri DODERO (*Leptomastax*)

DEI: 3 Ex. Macedonia, Keretschkoi, leg. A. SCHAUTZMAYER, als Typen ausgezeichnet.

signatus MACHULKA (*Scydmoraphes*)

DEI: 2 ♂♂, Sardinia, Aritzo, Mte. Genargentu, leg. C. KRÜGER; 1 Ex. Sardinien, leg. RAYMOND; als Typen ausgezeichnet.

sterbai MACHULKA (*Euconnus*)

DEI: 1 ♂, Pyr. centr., leg. v. BRUCH, als Typus ausgezeichnet.

tasmanicus SCHAUFUSS

DEI: 4 Ex. Tasmanien, als Typen ausgezeichnet.

tenuicornis doderoi MACHULKA (*Scydmoraphes*)

DEI: 1 ♂, Sardinia, Assuni, leg. KRAUSSE, als Typus ausgezeichnet.

tenuicornis intermedius MACHULKA (*Neuraphes*)

DEI: 1 ♂, Sardinien, als Typus ausgezeichnet.

tibialis MACHULKA (*Scydmoraphes*)

DEI: 2 Ex. Gallia, Aude, Belcaire, als Typen ausgezeichnet.

zanzibarius SCHAUFUSS

DEI: 1 ♀, Bagam., als Typus ausgezeichnet.

Orthoperidae

schneideri REITTER, 1902 (*Orthoperus*)

(Wien. Ent. Ztg. 21, 137—138)

Zahlreiche Syntypen, Corsica, bei Ajaccio, leg. O. SCHNEIDER.
LEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

obscurus C. R. SAHLBERG, 1817—1834 (*Cosyphus*)

(In: Insecta Fennica 1817—1834, 474)

Zahlreiche Syntypen, Helsingfors, Insel Drumsö, Frühjahr 1833.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundortangaben.

rhenanum REITTER, 1877 (*Sacium*)

(L'Abeille 16, 2—3)

Mehrere Syntypen, Rheinufer; 1 Syntypus, Frankfurt (Main).
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundortangaben.

Discolomidae

acuticlava JOHN, 1954 (*Parmaschema*)

(Ann. hist. Mus. nat. Hung. N.S. 5, 243—244, Fig. 1—9)

Neu Guinea, Huon-Golf, Sattelberg, 1899, leg. BIRÓ; Typus ♂♀ und 20 Paratypen im Mus. Budapest, 10 Paratypen im DEI.
DEI: 6 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

aemulus JOHN, 1935 (*Notiophygus*)

(Arb. morph. tax. Ent. 2, 6—7; Taf. 1, Nr. 4; Taf. 2, Nr. 4)

Syntypen, 7 Weeks Poort Berg, Ladysmith, 5000—6000 ft., XII. leg. H. K. BARNARD; 1 ♂, 1 ♀, im Mus. Capetown, 1 ♀ im DEI.

DEI: 1 ♂ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

andreaei JOHN, 1929 (*Notiophygus*)

(Suppl. Ent. 17 (1928), 64; Taf. 4, Nr. 26)

♀ Holotypus, 3 ♀♀ Paratypen, Ft. Holk, unter Laub, im DEI.

DEI: ♀ Holotypus, 3 ♀♀ Paratypen, Ft. Holk, 27. 12. 1915, unter Laub.

angolensis JOHN, 1957 (*Cassidoloma*)

(Publ. Cult. Comp. Diam. Angola 34, 21—23, Fig. 1—9)

Hiemilignosa am Lago Calundo, bei Cameia, Mexico, 19. 1. 1955 und Cazombo, Alto-Zambeze, Angola, 10. 2. 1955; Luna de Carvalho, unter Rinde abgestorbener Bäume; Typus ♂♀ im Mus. Tervuren, 7 Paratypen im Mus. Dundo-Lunda, Angola, 5 Paratypen im DEI, 3 Paratypen im British Mus.

DEI: 3 Paratypen, ohne Fundortangabe.

angulosus JOHN, 1929 (*Notiophygus*)

(Suppl. Ent. 17 (1928), 60; Taf. 3, Nr. 14; Taf. 12, Reihe 3, Nr. 14)

Bei dem Berliner Stück angegeben: Cp. b. Esp.: ♂ Holotypus im Mus. Paris, 1 ♂ 2 ♀♀, Paratypen im Mus. Capetown, 1 ♂ Paratypus im DEI, 1 ♂ Paratypus im Mus. Berlin.
DEI: 1 ♂ Paratypus, ohne Fundortangabe.

annamensis JOHN, 1956 (*Aphanocephalus*)

(Ent. Bl. 52, 30; Taf. 5, Fig. 1)

Holotypus, 1 Paratypus, Laos, Annam; 1 Paratypus, Tonkin, Hoa-Binh, leg. DE COOMAN im Mus. London; 2 Paratypen, Goa, Annam, im DEI; 1 Paratypus Shaowu-Fukien, leg. J. KLAPPERICH im Mus. Bonn.
DEI: 1 Paratypus, Goa, 7. 9. 1862; 1 Paratypus, Annam, Laos.

atrocinctus JOHN, 1942 (*Aphanocephalus*)

(Arb. morph. tax. Ent. 9, 13–15; Taf. 1, Fig. 5–8; Taf. 2, Fig. 8)

Syntypen; Semarang und Merbaboe, Java, leg. DRESCHER; 5 Ex. im DEI; 1 Ex. im Mus. Budapest; 3 Ex. Soekaboemie, Java, leg. E. CORDIER, im Mus. Paris.

DEI: 3 Syntypen, Merbaboe, leg. DRESCHER; 1 Syntypus, Java, Soekaboemie, 4. VI. 1908, leg. CORDIER.

austerus JOHN, 1941 (*Aphanocephalus*)

(Ent. Bl. 37, 194; Taf. VIII, Fig. 9–10)

Syntypen, Rockhampton, 3 Ex. im Mus. Hamburg; 2 Ex. im DEI; 1 Ex. im Mus. Budapest.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

backeri JOHN, 1959 (*Parmaschema*)

(Rev. Zool. Bot. Afr. 59, 283, Fig. 2)

Lukelenge, Congo Belge, VIII. 1951, leg. DE BACKER; Typus ♂♀, Paratypen im Mus. Congo Belge, Tervuren; Paratypen im DEI.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

baseniger JOHN, 1935 (*Notiophygus*)

(Arb. morph. tax. Ent. 2, 11–12; Taf. 1, Nr. 14; Taf. 2, Nr. 23)

Syntypen, George District, C.P., VII., leg. C. THORNE; 2 ♀♀ im Mus. Capetown, 1 ♀ im DEI.

DEI: 1 ♀ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

basilewskyi JOHN, 1955 (*Parmaschema*)

(Ann. Mus. Congo Tervuren Zool. 36, 175–177, Fig. 1–8)

Ruanda, Contref. Est du Muhavura, 2100 m, 28. I. 1953, leg. P. BASILEWSKY; Typus ♂♀, Paratypen im Mus. Tervuren, 3 Paratypen im DEI.

DEI: 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

brasiliense JOHN, 1944 (*Discoloma*)

(Arb. morph. tax. Ent. 11, 101–102; Taf. 3, Fig. 1, 2; Taf. 8, Fig. 8; Taf. 10, Fig. 1, 8)

18 Syntypen, Theresopolis, Rio de Janeiro, im Mus. Paris und im DEI.

DEI: 6 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

brasiliensis JOHN, 1944 (*Fallia*)

(Ent. Bl. 40, 88; Taf., Fig. 15–17)

Syntypen, Bahia, Brasilien, leg. P. SERRE; 1 Ex. im Mus. Paris, 1 Ex. im DEI.

DEI: 2 Syntypen, Brésil, Bahia, 1913, leg. P. SERRE.

buruensis JOHN, 1954 (*Profallia*)

(Beitr. Ent. 4, 663–664, Fig. 1a–e)

♀ Holotypus, Buru, Station I, I.–III. 1922, (Buru-Exped. 1921–22), leg. L. J. TOXOPEUS, im DEI.

camerunensis JOHN, 1942 (*Aphanocephalus*)

(Arb. morph. tax. Ent. 9, 16–17; Taf. 3, Fig. 1–5)

5 Syntypen, Kamerun, leg. L. CONRADT, im DEI.

DEI: 2 Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT.

cinereus tetratuberculatus JOHN, 1929 (*Notiophygus*)

(Suppl. Ent. 17 (1928), 44–45; Taf. 3, Nr. 15; Taf. 12, Reihe IV, Nr. 15, 15a)

Uitenhagen, Grahamstown, Brakekloof Farm; ♂ Holotypus, 2 ♀♀ Paratypen im Mus. Capetown, 1 ♀ Paratypus, im DEI, 1 ♂ im Mus. Paris.

DEI: 1 ♀ Paratypus, Brak Kloof Farm, XII. 1892, leg. WHITE?.

circumcinctus JOHN, 1935 (*Notiophygus*)

(Arb. morph. tax. Ent. 2, 22–23; Taf. 1, Nr. 6)

Syntypen, George District, C.P., August, leg. C. THORNE; 1 ♀ im Mus. Capetown, 1 ♀ im DEI.

DEI: 1 ♀ Syntypus, George Dist., C.P., VIII. 1931, leg. C. THORNE.

circumvallatus JOHN, 1929 (*Notiophygus*)

(Suppl. Ent. 17 (1928), 39; Taf. 11, Reihe V, Nr. 11)

Willowmore, ♂ Holotypus, 4 ♂♂, 2 ♀♀ Paratypen im DEI.

DEI: ♂ Holotypus, 2 ♂♂, 1 ♀ Paratypen, Willowmore, leg. H. BRAUNS.

clipeoexcisus JOHN, 1940 (*Cephalophanus*)

(Ent. Bl. 36, 83–85; Taf.)

♂ Holotypus, Sumatra, Si-Rambé, 1890/91, leg. MODIGLIANI, im DE.

comatus morulus JOHN, 1955 (*Notiophygus*)

(S. Afr. animal life 2, 312—313; Taf. IV, Fig. 1a—d)

Cape Prov.: Quuteniqua Berge, Robinson Pass, 2000 Fuss, unter Steinen in Protea-Heide, 7. 1. 1951; nahe Haarlem, 10 Meilen E. Avontuur, 28. 2. 1951, 1 Paratypus unter Steinen und Gebüsch auf trockenem Hügel, leg. P. BRINCK & G. RUDEBECK; Typus ♂ im Mus. Lund, 1 Paratypus ♂ im DEI.
 DEI: 1 ♂ Paratypus, S. Afr. Cape Prov., Haarlem, 10 miles E. Avontuur, 28. II. 1951, leg. BRINCK-RUDEBECK.

commodus JOHN, 1953 (*Notiophygus*)

(Ent. Bl. 49, 32—33)

S. Afrika, Grahamstown, 2 Ex. (Typus) im Mus. Berlin, 2 Paratypen im DEI.
 DEI: 3 Paratypen, Grahamstown.

comatus JOHN, 1929 (*Notiophygus*)

(Suppl. Ent. 17 (1928), 51—52; Taf. 5, Nr. 32)

Cap. b. Esp. ♀ Holotypus im Brit. Mus., 1 ♀ Paratypus im DEI.
 DEI: 1 ♀ Paratypus, Cap. b. Esp.

conradi JOHN, 1940 (*Cassidoloma*)

(Arb. morph. tax. Ent. 7, 266—267; Taf. 7, Nr. 7, 8; Taf. 8, Nr. 3a, b)

3 ♀♀ Syntypen, Togo und Lolodorf, S.O. Kamerun, 1895, leg. CONRADT, im DEI.
 DEI: 1 Syntypus, Togo, leg. CONRADT; 1 Syntypus, ohne Fundortangabe; 1 Syntypus, S.O. Kamerun, Lolodorf, 1895, leg. CONRADT.

consanguineus JOHN, 1935 (*Notiophygus*)

(Arb. morph. tax. Ent. 2, 8—9; Taf. 1, Nr. 2; Taf. 2, Nr. 2)

Syntypen, Meiringspoort, II., leg. K. H. BARNARD, 1 ♂ im Mus. Capetown, 1 ♂ im DEI.
 DEI: 1 Syntypus, Meirings Poort, II. 1932, leg. K. H. BARNARD.

contractus JOHN, 1955 (*Notiophygus*)

(S. Afr. animal life 2, 323—324; Taf. III, Fig. 2; Taf. IV, Fig. 4)

Cape Prov. Uniondale Road, leg. S. Afr. Mus. Exp. 1952; Typus ♂♀ und Paratypen im S. Afr. Mus., ♂♀ Paratypen im DEI
 DEI: 1 ♂ Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

cordiformis JOHN, 1929 (*Notiophygus*)

(Suppl. Ent. 17 (1928), 64—65; Taf. 4, Nr. 25; Taf. 11, Reihe VI, Nr. 25)

Pt. St. John, Pondoland, ♂ Holotypus, 7 ♀♀ Paratypen im Brit. Mus., 2 ♀♀ Paratypen im DEI.
 DEI: 2 ♀♀ Paratypen, S. Afrika, Pondoland, Port St. John, X. 1923, leg. R. E. TURNER.

crassipilus JOHN, 1929 (*Notiophygus*)

(Suppl. Ent. 17 (1928), 54; Taf. 10, Nr. 72)

Saldanka B., IX. 1912, ♀ Holotypus, im Mus. Capetown, 1 ♀ Paratypus im DEI.
 DEI: 1 ♀ Paratypus, Saldanka B. IX. 1912.

crucifer JOHN, 1942 (*Aphanocephalus*)

(Arb. morph. tax. Ent. 9, 15; Taf. 1, Fig. 1—4; Taf. 2, Fig. 9)

6 Syntypen, Merbaboe, Java, leg. DRESCHER, im DEI.
 DEI: 3 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

cubanum JOHN, 1944 (*Discoloma*)

(Arb. morph. tax. Ent. 11, 97; Taf. 2, Fig. 3, 4; Taf. 9, Fig. 2)

2 Syntypen, Cuba, 1 Ex. im Mus. Hamburg, 1 Ex. im DEI.
 DEI: 2 Syntypen, Cuba.

cuspidatus JOHN, 1929 (*Notiophygus*)

(Suppl. Ent. 17 (1928), 55; Taf. 10, Nr. 67)

Zonder End Peak, Caledon, 3600 ft.; Qudebosch, Caledon, 1500 ft.; ♀ Holotypus, 1 ♀ Paratypus im Mus. Capetown, 1 ♀ Paratypus im DEI.
 DEI: ♀ Paratypus, Qudebosch, Caledon, 1500 ft., I. 1917?, leg. K. H. BARNARD.

defrictum JOHN, 1942 (*Parmaschema*)

(Rev. Franc d'Ent. 9, 19—21, Fig. 1—8)

Syntypen, Sumatra, leg. RAFFRAY, 1 Ex. im DEI, 2 Ex. im Mus. Paris.
 DEI: 1 Syntypus, ohne Fundortangaben.

denticulatus GROUVELLE, 1927 (*Notiophygus*)

(Encycl. Ent. Sér. B 2, 124—125)

2 Syntypen, Caffrerie, leg. FRITSCH, im Mus. Paris.
 DEI: 1 Syntypus, Caffraria, leg. FRITSCH.

distans JOHN, 1929 (*Notiophygus*)

(Suppl. Ent. 17 (1928), 48—49; Taf. 4, Nr. 21; Taf. 11, Reihe 1, Nr. 21; Taf. 11, Reihe 6, Nr. 21)

Pt. Elizabeth. Cp. b. Esp., ♂ Holotypus, im DEI, 1 ♀ Paratypus im Brit. Mus., 1 ♂ Paratypus im Mus. Capetown.
 DEI: ♂ Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung.

donisi JOHN, 1956 (*Cassidoloma*)

(Rev. zool. bot. Afr. 54, 69—70; Taf. 1, Fig. 4a—c; Taf. 2, Fig. 3a—c)

27 Ex. (Typus ♂♀, Paratypen) im Mus. Royal du Congo Belge; Paratypen in Sammlung Mayné und im DEI. Yangambi, Stanleyville-Distr., leg. C. DONIS; Bulongo und Mweka, Kasai Distr., leg. J. SEVÈVNE.
 DEI: 4 Paratypen, Yangambi, 1952, leg. C. DONIS.

doreyanus JOHN, 1956 (*Aphanocephalus*)
(Ent. Bl. 52, 6—7; Taf. 2, Fig. 4)

Holotypus, Dorey, Niederländisch Neu-Guinea, im DEI.

dorsoplanata JOHN, 1940 (*Cassidoloma*)
(Arb. morph. tax. Ent. 7, 267; Taf. 8, Nr. 4a, b, 8, 9)

♀ Holotypus, Quela (Loanda) Fazenda Luhanga, leg. PRINZ CAROLATH S.G., im DEI.

dregei JOHN, 1941 (*Notiophygus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 8, 131—132; Taf. 4, Fig. 1—5)

♀ Holotypus, Cap. B. Spei, leg. DREGGE, im DEI.

durangoense JOHN, 1944 (*Discoloma*)
(Arb. morph. tax. Ent. 11, 97—98; Taf. 2, Fig. 5, 6; Taf. 7, Fig. 20)

5 Syntypen; Sierra de Durango, Mexico; Mexico, im DEI.

DEI: 1 Syntypus, Sierra de Durango, Mexico; 4 Syntypen, Mexico.

ellipticus JOHN, 1929 (*Notiophygus*)
(Suppl. Ent. 17 (1928), 24; Taf. 1, Nr. 4; Taf. 11, Reihe 3, Nr. 4; Taf. 9, Nr. 4)

Pondoland, Port St. John; ♂ Holotypus, 4 ♀♀ Paratypen im Brit. Mus., 2 ♀♀ im DEI.

DEI: S. Afrika, Pondoland, Port St. John, leg. R. E. TURNER, 1 ♀ Paratypus 1.—17. 3. 1924, 1 ♀ Paratypus 1.—14. V. 1923.

exsculptus JOHN, 1929 (*Notiophygus*)
(Suppl. Ent. 17 (1928), 59—60; Taf. 10, Nr. 70)

Capetown, Table Mt., ♀ Holotypus im Mus. Capetown, 1 ♀ Paratypus im DEI.

DEI: ♀ Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

fallax JOHN, 1954 (*Aphanocephalus*)
(Abh. u. Ber. Mus. Dresden 22, 17—18; Taf. 2, Fig. 5—8)

Kosempo, Formosa, leg. SAUTER; 5 Ex. Typus ♂♀, Paratypen im DEI; 3 Paratypen im Mus. Berlin; 2 Paratypen im Mus. Dresden.

DEI: ♂ Lectotypus, 4 Paralectotypen, S. Formosa, Kosempo, II. 1908, leg. SAUTER, hiermit festgelegt.
(Die Lectotypenfestlegung erfolgte, da, entgegen den Angaben der Beschreibung, kein Holotypus gekennzeichnet wurde.)

formosanus JOHN, 1954 (*Aphanocephalus*)
(Abh. u. Ber. Mus. Dresden 22, 17; Taf. 2, Fig. 1—4)

Pilam, Kosempo und Taihorin, Formosa, leg. SAUTER; 8 Ex. Typus ♂♀, Paratypen, im Mus. London, 7 Paratypen im DEI; 2 Paratypen im Mus. Dresden, 1 Paratypus im Mus. Bonn.

DEI: 1 Paratypus, S. Formosa, Kosempo, 11. 08, leg. SAUTER; 2 Paratypen, Formosa, Pilam, 1908, leg. SAUTER; 1 Paratypus, Taihorin, Formosa, VII. 1911, leg. SAUTER.

fülleborni JOHN, 1953 (*Cassidoloma*)
(Ent. Bl. 49, 111—113; Taf. 1, Fig. 1—3)

O.-Afrika, Langenburg, 1899, leg. FÜLLEBORN; Holotypus, 1 Paratypus im Mus. Berlin, 1 Paratypus im DEI.

DEI: 2 Paratypen, O. Afrika, Langenburg, 27. X. 1898—I. 1899, leg. FÜLLEBORN.

fulvus JOHN, 1929 (*Notiophygus*)
(Suppl. Ent. 17 (1928), 49—50; Taf. X, Nr. 66; Taf. X, untere Reihe, Nr. 66)

Riverdale Mountains, ♂ Holotypus, im Mus. Capetown, 1 ♀ Paratypus im DEI.

DEI: 1 ♀ Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

fumosus JOHN, 1935 (*Notiophygus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 2, 19—20; Taf. 1, Nr. 16)

Syntypen, Noord Hoek, C.P., Juni und Oktober, leg. R. T. LAWRENCE; Januar, leg. K. H. BARNARD; Oranje Kloof, Wynberg, März, leg. K. H. BARNARD und R. T. HESSE; Skeleton Row, Table Mt., Juli, leg. L. D. BOONSTRA; 5 ♂♂, 8 ♀♀ im Mus. Capetown; 2 ♂♂, 2 ♀♀ im DEI.

DEI: 3 Syntypen, Oranje Kloof, Wynberg, C.P., III. 1928, leg. K. H. BARNARD, 1 Syntypus, Noordhoek, Forest, C.P., I. 1928, leg. K. H. BARNARD.

germaini JOHN, 1944 (*Discoloma*)
(Arb. morph. tax. Ent. 11, 104—105; Taf. 3, Fig. 5, 6; Taf. 8, Fig. 7; Taf. 10, Fig. 4 & 10)

2 Syntypen, Cochabamba, Bolivien, leg. GERMAIN, im Mus. Paris und im DEI.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

griseus JOHN, 1955 (*Notiophygus*)
(Ann. Transv. Mus. 22, 379—380; Taf. II, Fig. 2a—e)

Cap. Provinz, Willowmore und Swartberg Pass, XI. 1948; leg. C. KOCH & G. VAN SON; 12 Ex., Typus ♂ ♀, Paratypen im Transv. Mus. Pretoria, 6 Paratypen im DEI.

DEI: 3 Paratypen; mit den Angaben der Beschreibung.

grouvellei JOHN, 1944 (*Discoloma*)
(Arb. morph. tax. Ent. 11, 91; Taf. 6, Fig. 1, 2; Taf. 7, Fig. 13—16)

5 Syntypen, Bahia, Brasilien, im Mus. Paris und im DEI.

DEI: 1 ♂ Syntypus, ohne Fundortangaben.

guineensis JOHN, 1958 (*Aphanocephalus*)
(Ann. Mus. Stor. nat. Genova 70, 120—122; Taf. 3, Fig. 2a—e)

Neu Guinea, Bujakori, Agosto 1890, leg. L. LORIA; Holotypus, 1 Paratypus im Mus. Genua, 1 Paratypus im DEI.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

hackeri JOHN, 1941 (*Aphanocephalus*)
(Ent. Bl. 37, 191—192; Taf. 8, Fig. 1—8 u. Textfig.)

3 Syntypen, Cairn, leg. H. HACKER, im DEI.
DEI: 2 Syntypen, Cairn, leg. HACKER.

hamulus JOHN, 1929 (*Notiophygus*)
(Suppl. Ent. 17 (1928), 23—24; Taf. 1, Nr. 38; Taf. 11, Reihe 3, Nr. 38)

Pondoland, Port St. John, ♂ Holotypus, 2 ♀♀ Paratypen, im British Mus., 1 ♀ im DEI.
DEI: ♀ Paratypus, S. Afrika, Pondoland, Port St. John, XII. 1923, leg. R. E. TURNER.

hessei JOHN, 1938 (*Notiophygus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 5, 128—130; Taf. 1, Fig. 2a—d, 3a—e)

Syntypen, Kleinsee und Lekkersing, N. Namaqualand, leg. A. J. HESSE; 4 ♂♂, 4 ♀♀ im Mus. Capetown, 4 ♂♂, 3 ♀♀ im DEI.
DEI: 3 ♂♂, 2 ♀♀ Syntypen, Kleinsee, N. Namaqualand.

humeralis simulatus JOHN, 1935 (*Notiophygus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 2, 23—24; Taf. 2, Nr. 15)

Syntypen; Hermanus und Bredasdorp, Januar und April, leg. R. T. LAWRENCE; George Distr., August, leg. H. THORNE; Swellendam, November, leg. R. E. TURNER; Durban, Natal; 8 ♂♂, 2 ♀♀ im Mus. Capetown; 2 ♂♂, 2 ♀♀ im DEI; 2 ♀♀ im British Mus.
DEI: 1 ♀ Syntypus, Hermanus, C.P., I. 1930, leg. R. T. LAWRENCE; 2 ♂♂ Syntypen, George Distr., C.P., VIII. 1931, leg. C. THORNE.

ignoratus JOHN, 1956 (*Notiophygus*)
(Beitr. Ent. 6, 22—23, Fig. 2—7)

♀ Holotypus, ohne Fundortangabe ex. coll. KRAATZ, im DEI.

impressus JOHN, 1929 (*Notiophygus*)
(Suppl. Ent. 17 (1928), 37—38; Taf. 7, Nr. 57; Taf. 12, Reihe 2, Nr. 57)

Kapland, East London, ♂ Holotypus im Mus. Paris, 1 ♂, 1 ♀ Paratypen im Zool. Staatsinst. Hamburg, 1 ♂ Paratypus im DEI.
DEI: 1 ♂ Paratypus, Kapland, East London, XII. 1912, leg. H. THOMSEN.

intonsus JOHN, 1956 (*Aphanocephalus*)
(Ent. Bl. 52, 26—28; Taf. 5, Fig. 4)

Holotypus, 2 Paratypen, Engano, Malaconni und Kisa-juc, 1891, leg. MODIGLIANI.
DEI: Holotypus, Engano, Kisa-juc, 1891, leg. MODIGLIANI.

johni GEISTHARDT, 1975 (*Parafallia*)
(Senckenbergiana Biol. 56, 39—41)

Ost-Nepal, Tal der Likhu Khola, Aufstieg von Shivalaya zum Jiri-Grat, etwa 2000 m, 9. IV. 1973, leg. J. MARTENS; Holotypus, 4 Paratypen im SMF; 1 Paratypus im Mus. Genf; 1 Paratypus im DEI; 5 Paratypen in coll. GEISTHARDT.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

kalimantanus JOHN, 1959 (*Aphanocephalus*)
(Ent. Bl. 55, 12, 14—15; Taf. 3, Fig. 2a—e)

Nunukan Insel, E. Kalimantan Distr., Indonesisch Borneo, I. 1954, leg. R. VON HENTIG; Typus ♂ ♀, Paratypen im Chicago Nat. Hist. Mus.; 1 Paratypus im DEI.
DEI: 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

karnyi JOHN, 1940 (*Parmaschema*)
(Arb. morph. tax. Ent. 7, 151; Taf. 3, Fig. 6—8b; Taf. 4, Fig. 1—4)

Holotypus, Wai Lima Zone, Sumatra, Lapongs, Nr. 215, 1921, leg. KARNY, im DEI.

klapperichi JOHN, 1956 (*Aphanocephalus*)
(Ent. Bl. 52, 8—9; Taf. 3, Fig. 4; Taf. 10)

Kuatun-Fukien, China, 6. 10. 1946, leg. TSCHUNG SEN.; Typus ♂ ♀ in coll. KLAPPERICH, 5 Paratypen im DEI.
DEI: 4 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

latus JOHN, 1935 (*Notiophygus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 2, 7—8, Textfig. V)

Syntypen, Mossel Bay, X., leg. R. E. TURNER; 1 ♀ im British Mus., 1 ♀ im DEI.
DEI: 1 ♀ Syntypus, S. Africa, Cape Province, Mossel Bay, X. 1933, leg. R. E. TURNER.

lawrencei JOHN, 1935 (*Notiophygus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 2, 13—14; Taf. 1, Nr. 12; Taf. 2, Nr. 12)

Syntypen, Grahamstown, II., leg. R. T. LAWRENCE, 1 ♂, 1 ♀ im Mus. Capetown, 1 ♂, 1 ♀ im DEI.
DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Grahamstown, II. 1933, leg. R. T. LAWRENCE.

levipilus JOHN, 1929 (*Notiophygus*)
(Suppl. Ent. 17 (1928), 35; Taf. 10, Nr. 69)

Tradouw Pass, Swellendam Dist. ♂ Holotypus, 3 ♀♀ Paratypen im Mus. Capetown, 1 ♀ Paratypus im DEI.
DEI: 1 ♀ Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

loriai JOHN, 1958 (*Aphanocephalus*)
(Ann. Mus. Stor. Nat. Genova 70, 118—120; Taf. 2, Fig. 1a—e)

Woodlark, 4. 3. 1890, leg. L. LORIA; Holotypus, 2 Paratypen im Mus. Genua; 1 Paratypus im DEI.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

***lunatus* JOHN, 1929 (*Notiophygus*)**

(Suppl. Ent. 17 (1928), 24–25; Taf. 2, Nr. 7; Taf. 11, Reihe 4, Nr. 7)

Afrika, Masiene, ♂ Holotypus, im Mus. Capetown, 1 ♀ Paratypus im DEI.
DEI: 1 ♀ Paratypus, Masiene P. E. Air, leg. R. F. LAWRENCE.***medium* JOHN, 1940 (*Parmaschema*)**

(Arb. morph. tax. Ent. 7, 151–152; Taf. 3, Fig. 9, 10; Taf. 4, Fig. 7, 8)

Holotypus, „Phil. Dal“, im Brit. Mus.

DEI: 1 Holotypus, „Phil. Dal“. Entgegen den Angaben der Beschreibung befindet sich der Holotypus in unserer Sammlung.

***minimus* JOHN, 1929 (*Notiophygus*)**

(Suppl. Ent. 17 (1928), 53; Taf. 8, Nr. 37; Taf. 11, Reihe 4, Nr. 37)

♂ Holotypus, Caffraria, im Mus. Hamburg.

DEI: ♂ Neotypus, Keurbooms River, Knysna, C.P.; Neotypus ♀, Albany, IX. 1949, leg. W. TAYLOR, von JOHN festgelegt. Das Zitat der Festlegung konnte nicht festgestellt werden, vielleicht nur eine i.l. Festlegung.

***milleri* JOHN, 1929 (*Notiophygus*)**

(Suppl. Ent. 17 (1928), 19; Taf. 1, Nr. 1; Taf. 9, Nr. 1; Taf. 11, Reihe 2, Nr. 1)

Natal — Durban — Malvern; ♂ Holotypus im Mus. Paris, 2 ♂♂, 1 ♀ Paratypen im DEI, 1 ♀ Mus. Berlin, 6 ♂♂, 1 ♀ Mus. Capetown.

DEI: 2 ♂♂, 1 ♀ Paratypen, Natal, Durban, davon 1 ♂, 1897, leg. A. MILLER.

***modestum* JOHN, 1944 (*Discoloma*)**

(Arb. morph. tax. Ent. 11, 95; Taf. 1, Fig. 5, 6a; Taf. 9, Fig. 4, 5)

11 Syntypen, Brasilien, Rio de Janeiro, Blumenau, im Mus. Hamburg, London und im DEI.

DEI: 4 Syntypen, Brasilien, Blumenau.

***modestum obscurum* JOHN, 1944 (*Discoloma*)**

(Arb. morph. tax. Ent. 11, 95–96; Taf. 1, Fig. 6b)

2 Syntypen, Sao Paulo, Brasilien, leg. SAUDE, im DEI.

***mollepunctatum* JOHN, 1944 (*Discoloma*)**

(Arb. morph. tax. Ent. 11, 99; Taf. 7, Fig. 1–5)

5 Syntypen, Blumenau, im DEI.

DEI: 4 Syntypen, Blumenau, Brasilien, leg. REITTER.

***mutans* JOHN, 1935 (*Notiophygus*)**

(Arb. morph. tax. Ent. 2, 18–19; Taf. 1, Nr. 11; Taf. 2, Nr. 9a, b & 19)

Syntypen, Keurbooms River, Knysna, Januar, leg. K. H. BARNARD; 1 ♂, 3 ♀♀ im Mus. Capetown, 1 ♂, 1 ♀ im DEI.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

***nigritanus* JOHN, 1958 (*Aphanocephalus*)**

(Ann. Mus. Stor. nat. Genova 70, 117–118; Taf. 1, Fig. 4a–e)

S.E. Neu Guinea, Hughibagu, 1891, leg. L. LORIA; Holotypus, 9 Paratypen im Mus. Genua, 5 Paratypen im DEI.

DEI: 4 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

***nigrodorsalis* JOHN, 1929 (*Notiophygus*)**

(Suppl. Ent. 17 (1928), 23; Taf. 11, Reihe 3, Nr. 6)

Pondoland, Port St. John, ♂ Holotypus, 2 ♀♀ Paratypen im British Mus., 1 ♂ Paratypus im DEI.

DEI: 1 Paratypus, S. Afrika, Pondoland, Port St. John, I. 1924, leg. R. E. TURNER.

***nigropilosus* JOHN, 1929 (*Notiophygus*)**

(Suppl. Ent. 17 (1928), 61; Taf. 9, Nr. 39)

Port Natal, ♀ Holotypus im Mus. Berlin, 1 ♀ Paratypus im DEI.

DEI: 1 ♀ Paratypus, ohne Fundortangaben.

***nunukanensis* JOHN, 1959 (*Aphanocephalus*)**

(Ent. Bl. 55, 12–14; Taf. 3, Fig. 1a–f)

Numukan Insel, E. Kilimatan Distr., Indonesisch Borneo, I. 1954, leg. R. VON HENTIG, unter Borke; Holotypus, 5 Paratypen im Mus. Chicago, 2 Paratypen im DEI.

DEI: 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

***obesus* JOHN, 1955 (*Notiophygus*)**

(Ann. Transv. Mus. 22, 383; Taf. 3, Fig. 2a–e)

Cograbies, L. Namaqualand, XI. 1951, leg. C. KOCH & G. VAN SON; 6 Ex., Typus ♂ ♀, Paratypen im Transv. Mus. Pretoria, 2 Paratypen im DEI.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

***oblongum* JOHN, 1944 (*Discoloma*)**

(Arb. morph. tax. Ent. 11, 93; Taf. 6, Fig. 5, 6; Taf. 7, Fig. 9–12)

21 Syntypen, Cochabamba, Bolivien, im Mus. Paris und im DEI.

DEI: 2 Syntypen, Cochabamba, Bolivien.

***obscurus* JOHN, 1929 (*Notiophygus*)**

(Suppl. Ent. 17 (1928), 26–27; Taf. 2, Nr. 8; Taf. 11, Reihe 2, Nr. 8)

Pondoland, Port St. John, ♂ Holotypus, 1 ♀ Paratypus im British Mus., 1 ♀ Paratypus im DEI.

DEI: 1 ♀ Paratypus, S. Afrika, Pondoland, Port St. John, 1.–17. III. 1924, leg. R. E. TURNER.

occultomaculatus JOHN, 1935 (*Notiophygus*)

(Arb. morph. tax. Ent. 2, 17—18; Taf. 1, Nr. 10; Taf. 2, Nr. 8)

Syntypen, Swartbergpass, P. Albert Div., C.P., 5000—6000 ft., XI, leg. K. H. BARNARD, 1 ♀ im Mus. Capetown, 1 ♂ im DEI.

DEI: 1 ♂ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

orizabae JOHN, 1944 (*Discoloma*)

(Arb. morph. tax. Ent. 11, 98—99; Taf. 6, Fig. 3, 4; Taf. 7, Fig. 6—8)

7 Syntypen, Orizaba, Mexico, im DEI.

DEI: 2 Syntypen, ohne Fundortangaben.

ovale JOHN, 1944 (*Discoloma*)

(Arb. morph. tax. Ent. 11, 103—104; Taf. 5, Fig. 1, 2; Taf. 10, Fig. 3)

9 Syntypen; Brasilien, leg. SAHLBERG; Bahia; im Mus. Paris und im DEI.

DEI: 3 Syntypen, Brasilien, Bahia.

paracanus JOHN, 1955 (*Notiophygus*)

(Ann. Transv. Mus. 22, 375—376; Taf. 1, Fig. 2a—d, Fig. 1c)

Still Bay, Cap. Provinz, XI. 1940, leg. G. VAN SON; 17 Ex., Typus ♂ ♀, Paratypen im Transv. Mus. Pretoria, 7 Paratypen im DEI.

DEI: 6 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

perbrincki JOHN, 1955 (*Notiophygus*)

(S. Afr. animal life 2, 310—311; Taf. 4, Fig. 2a—e)

Cape Prov., 15 Meilen S. Middleton, in trockener Aloë-Steppe, 16. 1. 1951, leg. P. BRINCK & G. RUDEBECK; ♂ ♀ und 3 Paratypen im Mus. Lund, 2 Paratypen im DEI.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

perlongus JOHN, 1955 (*Notiophygus*)

(Ann. Transv. Mus. 22, 383—385; Taf. 3, Fig. 3a—e)

S. Afrika, Mariepskop, V. 1951, leg. J. C. FAURE; 5 Ex., Typus ♂ ♀, Paratypen im Transv. Mus. Pretoria, 2 Paratypen im DEI.

DEI: 3 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

perlucidus JOHN, 1941 (*Aphanocephalus*)

(Ent. Bl. 37, 192—194; Taf. 8, Fig. 11—13)

Holotypus, Brisbane, leg. HACKER, im DEI.

An JOHN verliehen, dort nicht auffindbar.

perlucidum JOHN, 1944 (*Discoloma*)

(Arb. morph. tax. Ent. 11, 105—106; Taf. 5, Fig. 5, 6; Taf. 8, Fig. 10; Taf. 10, Fig. 6)

4 Syntypen, Brasilien, im Mus. Paris und im DEI.

DEI: 1 Syntypus, Brisbane, 2 Syntypen, ohne Fundortangaben.

perplexus JOHN, 1929 (*Notiophygus*)

(Suppl. Ent. 17 (1928), 38—39; Taf. 10, Nr. 64)

Swellendam Distr., Tradown Pass, XI. 1925, ♀ Holotypus im Mus. Capetown, ♀ Paratypus im DEI.

DEI: ♀ Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

piger JOHN, 1956 (*Notiophygus*)

(Ann. Transv. Mus. 22, 4, 520—522, Fig. 3a—e)

6 Ex.; Albany; leg. L. MICHAU, O. SMYTH; Grahamstown, leg. D. JORDAN, R. PROSSE, J. ZINN und J.C.D.W.; Typus ♂ ♀ im Transvaal Mus. Pretoria, 4 Paratypen im DEI.

DEI: 1 Paratypus, Grahamstown II. 1947, leg. J. ZINN; 1 Paratypus Sunstown, Ap: W., J.C.D.W.?

planus JOHN, 1929 (*Notiophygus*)

(Suppl. Ent. 17 (1928), 32; Taf. 2, Nr. 12)

Mossel Bay, Cape Province, ♀ Holotypus, 10 Paratypen im British Mus., 1 ♀ im Mus. Capetown, 4 ♀♀ im DEI.

DEI: 4 ♀♀ Paratypen, S. Afrika, Cape Province, Mossel Bay, leg. R. E. TURNER, 1 Ex. VI. 1921, 1 Ex. X. 1921, 1 Ex. 1.—14. XI. 1921, 1 Ex. 18.—30. XI. 1921.

plumbeus JOHN, 1929 (*Notiophygus*)

(Suppl. Ent. 17 (1928), 34—35; Taf. 10, Nr. 63)

Swellendam, ♂ Holotypus im Mus. Capetown, 1 ♂ Paratypus, im DEI.

DEI: ♂ Paratypus, Tradouw Pass, Swellendam Dist.

postpressus JOHN, 1935 (*Notiophygus*)

(Arb. morph. tax. Ent. 2, 27—28; Taf. 1, Nr. 5; Taf. 2, Nr. 26)

Syntypen, 7 Weeks Poort Berg, Ladysmith, 5500—7000 ft., Dezember, leg. K. H. BARNARD; 1 ♀ im Mus. Capetown, 1 ♀ im DEI.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

praecurvatus JOHN, 1929 (*Notiophygus*)

(Suppl. Ent. 17 (1928), 49; Taf. 5, Nr. 27; Taf. 12, Reihe 1, Nr. 27)

Natal, Durban, ♂ Holotypus, 1 ♀ Paratypus im Brit. Mus., 1 ♂ im DEI.

DEI: 1 ♂ Paratypus, Natal, Durban, 1904, leg. J. P. CREGOE.

pubescens beccarii JOHN, 1958 (*Aphanocephalus*)

(Ann. Mus. Civ. Stor. nat. Genova 70, 124; Taf. 3, Fig. 1a—e)

Borneo, Sarawak, 1865/66, coll. G. DORIA; Holotypus, 2 Paratypen im Mus. Genua; 1 Paratypus im DEI.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

pulchripictus JOHN, 1948 (*Notiophygus*)
(Tijdschr. Ent. 89 (1946), 124)

Syntypen, Afrika, Z.O. Transvaal, Baberton, leg. D. J. UYTENBOOGAART, 1 Ex. im Mus. Amsterdam, 1 Ex. im DEI.
DEI: 1 Syntypus, Z.O. Transvaal, Baberton, 15. X. 1938, leg. D. L. UYTENBOOGAART.

pullus JOHN, 1938 (*Notiophygus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 5, 130—132, Textfig.)

♀ Holotypus, Olifants R. Mts. Cold Bokkeveld, 4—5000 fts., IX. 1932, leg. BARNARD, im DEI.

pygmaeum NEVERMANN, 1930 (*Discoloma*)
(Ent. Bl. 26, 112—114)

Syntypen, Hamburg-Farm, 15. 4. 1923, 15. 2. 1924 und 26. 1. 1925, unter loser Rinde, 14 Ex.; an absterbenden *Theobroma cacao* 1 Ex.; auf trockener Rinde 2 Ex.; 2 Ex. im Mus. Washington, 2 Ex. im Mus. Hamburg, Rest in Sammlung NEVERMANN.
DEI: 1 Syntypus, Hamburgfarm, Reventazon, Ebene Limon, Costa Rica, unter loser Rinde, 15. IV. 1923, leg. F. NEVERMANN.

pygmaeum hoegei JOHN, 1944 (*Discoloma*)
(Arb. morph. tax. Ent. 11, 96; Taf. 9, Fig. 9b)

8 Syntypen, Mexico, leg. HÖGE, im DEI.
DEI: 6 Syntypen, Mexico, leg. HÖGE.

pygmaeum schmidti JOHN, 1944 (*Discoloma*)
(Arb. morph. tax. Ent. 11, 97; Taf. 8, Fig. 5, 6; Taf. 9, Fig. 6)

2 Syntypen, San José, Costa Rica, leg. H. SCHMIDT, im DEI.

sancatarinae JOHN, 1952 (*Discoloma*)
(Beitr. Ent. 2, 618—620, Fig. 1—9)

8 Ex., Typus ♂ ♀, Paratypen, S. Catarina, Brasilien, leg. LÜDERWALDT, im DEI.
DEI: ♂ Holotypus, 6 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

schaumi JOHN, 1943 (*Solitarium*)
(Ent. Bl. 39, 28—30)

♂ Holotypus, Brasilien, im DEI.

schmidti JOHN, 1944 (*Fallia*)
(Ent. Bl. 40, 88; Taf. 1, Fig. 18, 19)

Holotypus, La Caja bei San José, Costa Rica, leg. SCHMIDT, im DEI.

setosus JOHN, 1940 (*Holophygus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 7, 74—76, Taf. 1)

Syntypen, Cochabamba, Bolivia, ? 1889, leg. GERMAIN; 2 Ex. im Mus. Budapest, 1 Ex. im DEI.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

simplex JOHN, 1935 (*Notiophygus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 2, 12—13; Taf. 1, Nr. 13; Taf. 2, Nr. 11, 12)

Syntypen, Grahamstown, II., leg. R. T. LAWRENCE, 1 ♂, 2 ♀♀ im Mus. Capetown, 1 ♀ im DEI.
DEI: 1 ♀ Syntypus, C. r. Grahamstown.

splendidius JOHN, 1929 (*Notiophygus*)
(Suppl. Ent. 17 (1928), 30—31; Taf. 10, Nr. 65)

Riversdale Mountains, ♂ Holotypus, 1 ♂, 1 ♀ Paratypen im Mus. Capetown, 1 ♂, 1 ♀ Paratypen im DEI.
DEI: 1 ♂, 1 ♀ Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

spureus JOHN, 1955 (*Notiophygus*)
(Ann. Transv. Mus. 22, 382—383; Taf. 3, Fig. 1a—e)

Rosehaugh, E. Transvaal, X. 1952, leg. G. VAN SON; 12 Ex., Typus ♂ ♀, Paratypen im Transv. Mus. Pretoria, 5 Paratypen im DEI.
DEI: 3 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

subconcinus JOHN, 1929 (*Notiophygus*)
(Suppl. Ent. 17 (1928), 27—28; Taf. 7, Nr. 46; Taf. 11, Reihe 5, Nr. 46)

Port Natal, ♂ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, im British Mus., 1 ♂ Paratypus im DEI.
DEI: 1 ♂ Paratypus, Port Natal.

sublunatus JOHN, 1929 (*Notiophygus*)
(Suppl. Ent. 17 (1928), 25—26; Taf. 7, Nr. 40; Taf. 11, Reihe 4, Nr. 40)

Zululand, Eshowe, ♂ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, im British Mus., 1 ♂ Paratypus im DEI.
DEI: 1 ♂ Paratypus, S. Afrika, Zululand, Eshowe, 1.—22. 4. 1926, leg. R. E. TURNER.

submaculosus JOHN, 1929 (*Notiophygus*)
(Suppl. Ent. 17 (1928), 43—44; Taf. 8, Nr. 48; Taf. 12, Reihe 2, Nr. 48)

Cap d. b. Esp., 1837, leg. VERREAUX, ♂ Holotypus, 2 ♂♂ Paratypen im Mus. Paris.
DEI: 1 ♂ Paratypus, Cap de Bonne-Espérance, 1837, leg. VERREAUX.

suborbiculare JOHN, 1944 (*Discoloma*)
(Arb. morph. tax. Ent. 11, 107; Taf. 3, Fig. 3, 4; Taf. 8, Fig. 9; Taf. 10, Fig. 2, 9)

6 Syntypen, Cochabamba, Bolivien, leg. GERMAIN, im Mus. Paris und im DEI.
DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Cochabamba.

sufflatus JOHN, 1929 (*Notiophygus*)
(Suppl. Ent. 17 (1928), 65—66; Taf. 5, Nr. 29)

♀ Holotypus, Palmier River, unter Steinen, im DEI.

tenuis JOHN, 1929 (*Notiophygus*)
(Suppl. Ent. 17 (1928), 32—33; Taf. 4, Nr. 13; Taf. 9, Nr. 13, Taf. 11, Reihe 6, Nr. 13)

Kluttain, ♂ Holotypus im Mus. Capetown, ♀ Paratypus im DEI.
DEI: ♀ Paratypus, Kluttain.

thornei JOHN, 1935 (*Notiophygus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 2, 5—6; Taf. 1, Nr. 3; Taf. 2, Nr. 3)

Syntypen, George District, C. P., VIII., leg. C. THORNE; 2 ♂♂, 3 ♀♀ im Mus. Capetown, 1 ♂, 1 ♀ im DEI.
DEI: 1 ♂, 2 ♀♀ Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

tonkinensis JOHN, 1954 (*Aphanocephalus*)
(Bull. Brit. Mus. Ent. 3, 302; Taf. 14, Fig. 11—14)

Tonkin, Hoa Binh, leg. A. DE COOMAN & R. V. DE SALVAZA; Typus ♂ ♀, 21 Paratypen im Mus. Paris; 2 Paratypen im Brit. Mus., 6 Paratypen im DEI.
DEI: 6 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

tonkinensis JOHN, 1942 (*Cephalophanus*)
(Ent. Bl. 38, 171, Fig. 1—10)

Syntypen, Chiem-Hoa, Central-Tonkin, leg. FRUHSTORFER, 2 Ex. im Mus. Berlin, 2 Ex. im DEI.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

tricuspe JOHN, 1944 (*Discoloma*)
(Arb. morph. tax. Ent. 11, 104; Taf. 3, Fig. 7, 8; Taf. 10, Fig. 7)

2 Syntypen, Cochabamba, Bolivien, leg. GERMAIN, im Mus. Paris und im DEI.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundortangabe.

turneri JOHN, 1954 (*Pondonatus*)
(Bull. Brit. Mus. Ent. 3, 310—311; Taf. 16, Fig. 1—8)

24 Ex. Port St. John, Pondoland; 18 Ex. E. Cape Prov., Katberg; 5 Ex. Eshowe, Zululand; 2 Ex. Natal, Kloof, leg. R. E. TURNER; 41 Ex., Typus ♂ ♀, Paratypen im Brit. Mus.; 8 Paratypen im DEI.
DEI: 3 Paratypen, S. Afrika, E. Cape Prov., Katberg, 4000 ft., 14.—26. XI. 1932, leg. R. E. TURNER; 1 Paratypus, S. Afrika, Port St. John, Pondoland, 25.—31. 3. 1923, leg. TURNER; 1 Paratypus, S. Afrika, Natal, Kloof, 1500 ft., IX. 1926, leg. TURNER.

umdalanus JOHN, 1956 (*Notiophygus*)
(Beitr. Ent. 6, 19—20; Taf. 1, Mitte Fig. 1—5)

Südafrika, Umdala bei Fort Beaufort, 2. 1954, leg. H. ANDREAE; ♂ ♀ Typus, 3 Paratypen im Mus. Kapstadt, 2 Paratypen im DEI.
DEI: 1 ♂ Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

undulipennis JOHN, 1929 (*Notiophygus*)
(Suppl. Ent. 17 (1928), 56—57; Taf. 4, Nr. 20)

♀ Holotypus, Kapstadt, unter Steinen, im DEI.
DEI: ♀ Holotypus, Kapstadt, unter Steinen, 31. 5. 1916.

vansoni JOHN, 1938 (*Notiophygus*)
(Ann. Transv. Mus. 19, 297—298; Taf. 4, Nr. 1)

Syntypen, Tschakoma, Zautpansberg, Distr. N. Transvaal, leg. G. VAN SON, an Baumzweigen in feuchtem Wald; 3 ♂♂, 1 ♀ im Mus. Pretoria, 2 ♂♂ im DEI.
DEI: 2 ♂♂ Syntypen, Tschakoma, Zpbg., XI. 1931, leg. G. VAN SON.

velatus JOHN, 1935 (*Notiophygus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 2, 21—22; Taf. 1, Nr. 7; Taf. 2, Nr. 27)

Syntypen, Keeroms Berg, Worcester District, C. P., 5000—6000 ft., September, leg. K. H. BARNARD; 1 ♀ im Mus. Capetown, 1 ♀ im DEI.
DEI: 1 ♀ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, IX. 1930.

ventricosus JOHN, 1958 (*Aphanocephalus*)
(Ann. Mus. Civ. Stor. nat. Genova 70, 116—117; Taf. 1, Fig. 1 a—e)

Sumatra, Siboga und Si-Rambé, I.—III. 1891, leg. E. MODIGLIANI; Holotypus, 2 Paratypen im Mus. Genua; 1 Paratypus im DEI.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

vicinus JOHN, 1955 (*Notiophygus*)
(S. Afr. animal life 2, 315—316; Taf. 1, Fig. 4; Taf. 4, Fig. 5)

Natal, Pietermaritzburg, Nov. 1940, leg. R. F. LAWRENCE; ♂ ♀ Typus im S. Afr. Mus., 1 ♂ und 1 ♀ Paratypen im DEI.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

Ptiliidae

arnoldi ROSSKOTHEN, 1935 (*Acrotrichis*)
(Ent. Bl. 31, 170—171, Fig.)

Syntypen, Aachener Wald, leg. ROSSKOTHEN.
DEI: 2 Syntypen, Aachen, 1 Ex. 5. 1935, 1 Ex. 7. 1935, leg. ROSSKOTHEN.

boudieri ALLIBERT, 1844 (*Trichopteryx*)
(Rev. Zool. Paris 7, 134)

Syntypen, Lutetia.
DEI: 1 ♂, France „*boudieri* ALLIBERT *transversale* Type!), det. ALLIBERT.

brenskaei FLACH, 1887 (*Ptenidium*)
(Wien. Ent. Ztg. 6, 178–179)

Syntypen; 1 Ex. Morea, leg. BRENSKE; 2 Ex. Hamarat, leg. LÆDER.
DEI: 1 Syntypus, Morea, Hagios, Wlassis, leg. BRENSKE.

hopffgarteni FLACH, 1888 (*Ptilium*)
(Wien. Ent. Ztg. 7, 101–102)

Syntypen, Croatia, leg. HOPFFGARTEN & REITTER.
DEI: 1 ♀ Syntypus, Croatia, leg. REITTER.

invisibilis NIETNER, 1856 (*Trichopteryx*)
(In: Entomological Papers, Nr. II, VII. 1856, 6–7; Abdruck aus:
Journ. Ceylon Branch Roy. Asiatic Soc. 25, 1856, 528–529)

Zahlreiche Syntypen, Ceylon.
DEI: 2 Syntypen, Ceylon, NIETNER.

kraatzii FLACH, 1889 (*Actidium*)
(Verh. zool. bot. Ges. Wien 39, 500)

Syntypen, Hyères (BRISOUT).
DEI: 1 Syntypus, Hyeres.

longicorne FUSS, 1868 (*Ptenidium*)
(Berl. Ent. Ztschr. 12, 357)

2 Syntypen, Deutschland, Ahrweiler.
DEI: 1 Syntypus, Ahrweiler.

neresheimeri WAGNER, 1918 (*Actidium*)
(Ent. Mitt. 7, 26–28, Fig. 4b)

Holotypus, Paratypen, Stahnsdorf Kreis Teltow, 10. XII. 1916, leg. NERESHEIMER; 11. XI. 1917, leg. NERESHEIMER und WAGNER; in Coll. NERESHEIMER & WAGNER und im DEI.
DEI: Holotypus, 12 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

occidentalis LEA, 1907 (*Rodwayia*)
(Tasman. Nat. 1, 16)

Syntypen, West Australien, Swan River, in Nestern von Ameisen.
DEI: 1 Syntypus, W. Australien.

orientalis LEA, 1907 (*Rodwayia*)
(Tasman. Nat. 1, 16)

Syntypen, N. S. Wales, Sydney; Tasmanien, Launceston; in Nestern von Ameisen.
DEI: 2 Syntypen, N.S. Wales.

ovata LEA, 1907 (*Rodwayia*)
(Tasman. Nat. 1, 15)

Zahlreiche Syntypen, Tasmanien, Hobart, in Nestern von Ameisen.
DEI: 5 Syntypen, Tasmanien.

parva ROSSKOTHEN, 1935 (*Acrotrichis*)
(Ent. Bl. 31, 171, Fig.)

Syntypen, Aachener Wald, leg. ROSSKOTHEN; Oberbayern, leg. ARNOLD.
DEI: 1 Syntypus, Aachen, 8. 1934, leg. ROSSKOTHEN.

reitteri FLACH, 1887 (*Actidium*)
(Wien. Ent. Ztg. 6, 182)

2 Syntypen, Marocco, Casablanca, leg. REITTER.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

rugulodorsus SWEETMAN & HATCH, 1927 (*Nephanes*)
(Bull. Brooklyn Ent. Soc. 22, 265–266)

Holotypus, 17 Paratypen, Ames Iowa, 3. 6. 24, leg. SWEETMAN, in Kokons von *Osmoderma eremicola* K.; Holotypus in Sammlung SWEETMAN, Paratypen in Sammlung HATCH, Univ. Minnesota und DEI.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

rugulosa ROSSKOTHEN, 1935 (*Acrotrichis*)
(Ent. Bl. 31, 170, Fig.)

Syntypen, Aachener Wald, an Taubendünger; Tirol; leg. ROSSKOTHEN.
DEI: 1 Syntypus, Aachen, 8. 1934, leg. ROSSKOTHEN; 1 Syntypus, Gramais puabl, 1935.

silvatica ROSSKOTHEN, 1935 (*Acrotrichis*)
(Ent. Bl. 31, 171, Fig.)

Syntypen, Aachener Wald, leg. ROSSKOTHEN.
DEI: 1 Syntypus, Aachen, 5. 1935, leg. ROSSKOTHEN.

tibialis BRUCH, 1926 (*Limulodes*)
(Rev. Soc. ent. Argent. 1 (2), 11—12)

Zahlreiche Syntypen, Argentinien, Cabana, Alta Gracia.
DEI: 4 Syntypen, Cabana (Unquillo), Cordoba, 1926, leg. C. BRUCH.

variolatum FLACH, 1887 (*Actidium*)
(Wien. Ent. Ztg. 6, 181—182)

Holotypus, Dalmatien, Metcovich, leg. REITTER, im DEI.

vexans FLACH, 1889 (*Ptilium*)
(Verh. zool. bot. Ges. Wien 39, 504)

Syntypen, Corsica.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundortangaben.

vittata MOTSCHULSKI, 1845 (*Trichopteryx*)
(Bull. Soc. Imp. Nat. Moskau 18 (2), 521—522; Taf. X, Fig. 9)

34 Syntypen, Charkov, in Nestern von *Formica rufa minor*.
DEI: 2 Syntypen, Fundort unleserlich.

Scaphiidae

sinense PIC, 1954 (*Ascaphium*)
(Bull. Soc. ent. Mulhouse 1954, 56—57)

Holotypus, Paratypen, China, Fukien, Kuatan, 6. XII. 1946, leg. TSCHUNG SEN, in Sammlung KLAPPERICH.
DEI: 1 Paratypus, Kuatan, Fukien, China, 24. 11. 1946 (nicht 6. XII. 1946), leg. TSCHUNG SEN.

Zusammenfassung

Vorliegender Katalog beinhaltet die Coleopteren-Typen (Scydmaenidae, Orthoperidae, Discolomidae, Ptiliidae, Scaphiidae), die in den Sammlungen der Abteilung Taxonomie der Insekten des Institutes für Pflanzenschutzforschung, Bereich Eberswalde (ehemals Deutsches Entomologisches Institut), aufbewahrt werden.

Summary

The present catalogue includes the types of Coleoptera (Scydmaenidae, Orthoperidae, Discolomidae, Ptiliidae, Scaphiidae) preserved in the collections of the Department of Taxonomy of Insects of the Institute of Plant Protection Research, Eberswalde (former Deutsches Entomologisches Institut).

Резюме

Данный каталог содержит типы отряда Coleoptera (Scydmaenidae, Orthoperidae, Discolomidae, Ptiliidae, Scaphiidae), хранящиеся в коллекциях отдела таксономии насекомых Научно-исследовательского института защиты растений, Эберсвальдский филиал (бывший Немецкий энтомологический институт).