

Institut für Pflanzenschutzforschung
der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR zu Berlin
Bereich Eberswalde
Abteilung Taxonomie der Insekten
Eberswalde

HANNELORE GAEDIKE

Katalog der in den Sammlungen der Abteilung Taxonomie der Insekten des Institutes für Pflanzenschutzforschung, Bereich Eberswalde (ehemals Deutsches Entomologisches Institut), aufbewahrten Typen — XIX

(Coleoptera: Staphylinidae)

abbreviatus FENYES, 1914 (*Zyras*)
(Arch. Nat. 80 A 2, 52)

♀ ? Holotypus, Formosa, Taihorin, leg. SAUTER, det. Nr. 4353, im DEI.

abietum KIESENWETTER, 1858 (*Quedius*)
(Berl. Ent. Ztschr. 2, 57–58)

Syntypen, Griechenland, Parnes bei Athen, auf blühenden Apollotannen; Aetolische Alpen; leg. v. KIESENWETTER.
DEI: 1 Syntypus, Parnass.

absoloni RAMBOUSEK, 1916 (*Atheta*)
(Col. Rundsch. 4 (1915), 129–130)

10 Syntypen, südöstliche Hercegovina, im großen Ponor der Trebinjčica bei Turković am Popovo polje.

DEI: 1 Syntypus, Herzegowina, Ponor bei Turkovici, Popovo polje, 23. 7. 1914, leg. ABSOLON.

acroleucus KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)
(Arch. Nat. 25, 91)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. HELFER.

DEI: 3 Syntypen, Ceylon, leg. J. NIETNER; 1 Syntypus, Ostindien.

acuminata KRAATZ, 1859 (*Placusa*)
(Arch. Nat. 25, 43)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 8 Syntypen, Ceylon, leg. J. NIETNER.

acuminatus KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)
(Arch. Nat. 25, 93–94)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 4 Syntypen, Ceylon, leg. J. NIETNER.

acuminatus KRAATZ, 1859 (*Stenus*)
(Arch. Nat. 25, 165–166)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 2 Syntypen, Ceylon.

acuticollis KRAATZ, 1859 (*Homalota*)
(Arch. Nat. 25, 28–29)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 4 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

aemulus ROTTENBERG, 1870 (*Sumius*)
(Berl. Ent. Ztschr. 14, 33)

Syntypen, Palermo, 7. 12. 1868–20. 2. 1869; Rom, leg. ROTTENBERG; Corsica, leg. SCHWARZ; Neapel, leg. EMMERY.

DEI: 7 Syntypen, Palermo, leg. ROTTENBERG; 1 Syntypus, Rom, leg. ROTTENBERG.

aequinoctialis ERICHSON, 1839–40 (*Paederus*)
(Genera et Species Staphylinorum, 657)

Syntypen, Columbia, Cayenna.

DEI: 1 Syntypus, FAIRM.; 1 Syntypus, Cayenne.

aetolicum KRAATZ, 1858 (*Anthobium*)
(Berl. Ent. Ztschr. 2, 129)

Syntypen, ätolische Alpen, leg. v. KIESENWETTER.

DEI: 2 Syntypen, Aetol. Alp.

aetolicus KRAATZ, 1858 (*Quediiiformes*)
(Berl. Ent. Ztschr. 2, 58)

1♂, 1♀ Syntypen, ätolische Alpen, leg. v. KIESENWETTER.

DEI: 1 Syntypus, Alp. aetol.

affinis FUSS, 1868 (*Homalota*)
(Berl. Ent. Ztschr. 12, 354)

Syntypen, Ahrweiler, im Dünger und bei faulenden Pflanzen, leg. FUSS.

DEI: 4 Syntypen, Ahrweiler.

affinis KRAATZ, 1859 (*Lithocharis*)
(Arch. Nat. 25, 142)

♂ Holotypus, Ost-Indien, leg. HELFER, im DEI.

affinis KRAATZ, 1859 (*Myrmedonia*)
(Arch. Nat. 25, 23)

Syntypen, Ceylon, in Termittennestern, leg. NIETNER.

DEI: 5 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

- affinis* CZWALINA, 1871 (*Oxytelus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 14 (1870), 420–421)
Ca. 15 Syntypen, Königsberg.
DEI: 2 Syntypen, Königsberg.
- afra* EICHELBAUM, 1913 (*Elephromniusa*)
(Arch. Nat. 79 A 3, 157–158)
6 Syntypen, Ost-Afrika, Amani, 7.–10. 1903, leg. EICHELBAUM.
DEI: 1 Syntypus, Amani, 11. 1903, leg. EICHELBAUM.
- africana* BERNHAUER, 1912 (*Delopsis*)
(Ent. Mitt. 1, 179)
Syntypen, SO-Kamerun, Lolodorf, 1895, leg. CONRADT, im DEI und in Sammlung BERNHAUER.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- africana* BERNHAUER, 1932 (*Leptusa*)
(Kol. Rundsch. 17 (1931), 237)
Syntypen, Oran, im DEI und Sammlung BERNHAUER.
DEI: 1 Syntypus, Oran.
- africanum* ROUBAL, 1915 (*Anthobium*)
(Col. Rundsch. 4, 102)
[nom. nov. pro *A. tibiale* LUZE, Verh. zool. bot. Ges. Wien 60, 237–238; 1910]
Syntypen, Algier, Oran, im Mus. Wien und im DEI.
DEI: 1♂, 1♀ Syntypen, Oran.
- africanum* BERNHAUER, 1912 (*Philorinum*)
(Ent. Mitt. 1, 178)
Syntypen, Usambara, im DEI und Sammlung BERNHAUER.
DEI: 1 Syntypus, Usambara.
- africanus* EICHELBAUM, 1913 (*Megarthus*)
(Arch. Nat. 79 A 3, 114–115)
5 Syntypen, Amani, am Fuße des Berges Bomole im Ostusambaragebirge, 11. 10. 1903, leg. EICHELBAUM.
DEI: 1 Syntypus, Amani, 10. 1903.
- agilis* BAUDI, 1869 (*Tachyusa*)
(Berl. Ent. Ztschr. 13, 376)
12 Syntypen, Cypern.
DEI: 3 Syntypen, Cypern.
- albidicornis* BERNHAUER, 1913 (*Gyrophaena*)
(Denkschr. Akad. Wiss. Wien 89, 689)
Zahlreiche Syntypen, Samoa, Upolu, in einem Pilz, leg. RECHINGER.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- albomarginatus* BERNHAUER, 1922 (*Bledius*)
(Arch. Nat. 88 A 7, 225)
Syntypen, Formosa, Alikang, Suisharyo, 10. 1911, 2. 1912, leg. SAUTER.
DEI: 3 Syntypen, Formosa, Alikang, 7. 8. 1910 (nicht 10. 1911), leg. SAUTER.
- alienigenus* PUTHZ, 1964 (*Stenus*)
(Ann. Ent. Fenn. 30, 229–231, Abb. 4)
♂ Holotypus, ♀ Paratypus, Israel, Saffurije, an einer Quelle wenige km unterhalb Nazareths am Wege nach Haifa, 25. 8. 1913, leg. LIEBMANN, Holotypus, im DEI, Paratypus, in Sammlung PUTHZ.
DEI: 3 Holotypus, Israel, Saffurije, 25. 8. 1913, leg. LIEBMANN.
- alpestris* SCHEERPELTZ, 1935 (*Leptusa*)
(Kol. Rundsch. 21, 140–142)
Syntypen, östliches Gebiet des Zentralalpenbogens und östlicher Teil der nördlichen Kalkalpen bis zum Rhein, ohne nähere Fundortangaben.
DEI: 1 Syntypus, Turnau, Styr. bor.; 1 Syntypus, Eisenerzer Alp., Styr. sept., Südhang des Zeyritz Kampels, 1200 bis 1300 m, oberster Kurz-Teichgraben, subalp. Hochw., Moos und Rasen in Felsritzen, 4. 6. 1922, leg. KÄUFEL.
- alpicola* BRANCSIK, 1874 (*Leptusa*)
(Berl. Ent. Ztschr. 18, 227)
Zahlreiche Syntypen, Ungarn, Trencsiner Comitát, Berge bei Sillein und im Vratna-Tal, leg. BRANCSIK.
DEI: 1 Syntypus, Carpathen, leg. BRANCSIK.
- alternans* SACHSE, 1852 (*Silusa*)
(Stett. Ent. Ztg. 13, 118–119)
3♀ Syntypen, N. Amerika, Georgia, leg. A. GERHARDT.
DEI: 1 Syntypus, Georg., GERH.
- alutaceum* SCHUBERT, 1911 (*Cryptobium*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1911, 11–12)
Holotypus, Port.-Ost-Afrika, Beira, leg. A. BODONG, im DEI.
- aluticeps* BERNHAUER, 1927 (*Agerodes*)
(Mem. Soc. Ent. Ital. 5 (1926), 157–158)
Syntypen, Kolumbien, leg. v. BRUCK, im DEI und in Sammlung BERNHAUER.
DEI: 1 Syntypus, Columb., Haag.
- amabilis* KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)
(Arch. Nat. 25, 97–98)
Holotypus, Nord-Indien, leg. BACON, im DEI.
- amantiensis* EICHELBAUM, 1913 (*Dorylonia*)
(Arch. Nat. 79 A 3, 151–152)
22 Syntypen, Ostafrika, Amani, am Berg Bomole, 11. und 13. 10. 1903, leg. EICHELBAUM.
DEI: 1 Syntypus, Amani, 10. 03, leg. EICHELBAUM.
- amicissima* EICHELBAUM, 1913 (*Elephromniusa*)
(Arch. Nat. 79 A 3, 157)
14 Syntypen, Ostafrika, Amani, am Berg Bomole, 11. + 13. 10. 1903, leg. EICHELBAUM.
DEI: 2 Syntypen, Amani, 10. 1903, leg. EICHELBAUM.
- aneptus* CAMERON, 1925 (*Stenus*)
(Treubia 6, 178)
3 Syntypen, Java, Tjibodas, 1400 m, 8. 1921, leg. DAMMERMAN.
DEI: 1 Syntypus, Tjibodas, 1400 m, [23. 5. 1922], leg. DAMMERMAN.
- angulicollis* MÁKLIN, 1852 (*Megarthus*)
(Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou 25/II, 325)
Syntypen, Insel Sitkha, leg. FRANKENHAEUSER und HOLMBERG.
DEI: 1 Syntypus, Sitkha.

- angulipennis** BERNHAUER, 1908 (*Stenus*)
(Arch. Nat. 74, 297–298)
Syntypen, Paraguay, leg. DRAKE.
DEI: 2 Syntypen, Paraguay, leg. DRAKE.
- angustatus** KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)
(Arch. Nat. 25, 92)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 6 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER; 1 Syntypus, Ostindien.
- angustiformis** BAUDI, 1869 (*Phloeopora*)
(Berl. Ent. Ztschr. 13, 379–380 nota)
Syntypen, Apennin, unter Rinde von Lärchen, leg. BAUDI.
DEI: 1 Syntypus, Apennin.
- annulatus** FAUVEL, 1895 (*Xantholinus*)
(Rev. d'Ent. 14, 241)
Syntypen, Birma, Bhamo, 8.; Carin Cheba, 500–1000 m, 7.; Tenasserim, mont Mooleyit, 1800–1900 m, 3.; alle leg. FEA.
Inde; Pulo Penang; Sumatra. Ajer, Mantcior, 8., leg. BECCARI; Tandjong Morawa Serdang, Sungei-Bulu, 9., Mus. Leiden.
Borneo, Sarawak, leg. WALLACE.
DEI: 1 Syntypus, Carin Cheba, 900–1100 m, 5.–12. 1888, leg. FEA.
- annuliventris** KRAATZ, 1859 (*Leptusa*)
(Arch. Nat. 25, 12–13)
Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 1 Syntypus, Ind. post., leg. HELFER.
- antennalis** FENYES, 1914 (*Aleochara*)
(Arch. Nat. 80 A 2, 54–55)
♂? Holotypus, Formosa, Kankau (Koshun), leg. SAUTER, det. Nr. 4369, im DEI.
- antennatus** WENDELER, 1955 (*Holotrochus*)
(Dusenja 6, 195–196)
Syntypen, Brasilien, Espirito Santo, Sta. Theresa, 11. 1928, CONDE, in Sammlung WENDELER.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- antilope** FAUVEL, 1895 (*Leptochirus*)
(Rev. d'Ent. 14, 181)
Syntypen, Birma, Carin Ghécú, 1300–1400 m, 2., 3., 5.; Senmijion, 2.; leg. FEA.
DEI: 2 Syntypen, Carin Ghécú, 1300–1400 m, 2.–3. 1888, leg. FEA.
- apertus** BENICK, 1940 (*Stenus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 7, 330–332)
♂ Holotypus, Costa Rica, Hamburgfarm, Reventazon, Ebene Limon, 26. 1. 1935, in Sammlung BENICK; Paratypen, 2 ♀♀, vom selben Fundort, 10. 4., 4. 6. 1926, leg. F. NEVERMANN; 1 ♀, La Caja, 8 km westlich San José, 1930, leg. H. SCHMIDT, im DEI.
DEI: 1 Paratypus, La Caja, 8 km westlich San José, C. R., 1930, leg. SCHMIDT.
- apfelbecki** BERNHAUER, 1899 (*Medon*)
(Verh. zool. bot. Ges. Wien 49, 25)
Syntypen, Bosnien, Umgebung von Sarajevo, leg. APFELBECK.
DEI: 1 Syntypus, Bosnien, leg. APFELBECK.
- apicatis** KRAATZ, 1857 (*Lithocharis*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 715–716)
Syntypen, Cassel, leg. RIEHL; Lyon, leg. REY.
DEI: 2 Syntypen, Cassel, leg. RIEHL; 1 Syntypus, Lyon, leg. REY.
- apicatis** KRAATZ, 1859 (*Myllaena*)
(Arch. Nat. 25, 51)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 1 Syntypus, Ceylon, leg. NIETNER.
- apicipennis** KRAATZ, 1859 (*Isomalus*)
siehe *kraatzi* FAUVEL, 1878
- appendiculatus** SAHLBERG, 1880 (*Thinobius*)
(Kongl. Svenska Vetensk. Akad. Handl., N. F. 17, nr. 4, 100; Taf. 1, Fig. 16a–b)
Syntypen, Umgebung Chantaika, 18. 7. und 19. 7., in Coll. FAUVEL, HAGLUND, KRAATZ, SAHLBERG, Mus. Holm und Mus. Helsingfors.
DEI: 1♂ Syntypus, Kantaika, leg. SAHLBERG.
- appulsa** SCRIBA, 1867 (*Homalota*)
(Berl. Ent. Ztschr. 11, 389)
Syntypen, Jülich, leg. EICHHOFF.
DEI: 1 Syntypus, Jülich.
- arabs** SAULCY, 1864 (*Stilicis*)
(Ann. Soc. Ent. France IV. 4, 651–652)
Syntypen, Jerusalem, unter verrotteten Pflanzenresten.
DEI: 1 Syntypus, Jerusalem.
- arenarius** BENICK, 1938 (*Stenus*)
(Mitt. Münch. Ent. Ges. 28, 272)
Syntypen, Costa Rica: Ramal, Parismina, Santa Clara, 6. 3. 23, 1♂; Hamburgfarm, Reventazon, Ebene Limon, 25. 2. 24, 3♀, 1♂, 9. 2. 28, 1 Ex., 25. 3. 28, 1♀, 2. 2. 33, 4♂♂, 3♀♀, alle auf Sandbank oder im Sand am Reventazon. Genaue Beschreibung und Typenfestlegung (Mitt. Münch. Ent. Ges. 29, 35–36; 1939).
DEI: 1 Syntypus, Costa Rica, Hamburgfarm, Reventazon, Ebene Limon, auf Sandbank, 21. 2. 1933, leg. NEVERMANN.
- arenicola** THOMSON, 1868 (*Atheta*)
(Skandinaviens Coleoptera 10, 321–322)
Syntypen, Schweden, Ystad.
DEI: 1 Syntypus, Suecia.
- areolatus** BENICK, 1929 (*Stenus*)
(Ent. Bl. 25, 94, 97–98)
2♂♂ Syntypen, Bergamasker Alpen, Mte. Arera, 20. 7. 1914, leg. KÜNNEMANN, 1 Ex., in Coll. LINKE.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- argus** WENDELER, 1956 (*Heterothops*)
(Dusenja 7, 263)
Holotypus, Paratypen, Brasilien, Nova Teutonia, leg. PLAUMANN, in den Sammlungen FRANCKE und WENDELER.
DEI: 1 Paratypus, Brasilien, Nova Teutonia, leg. PLAUMANN.

- armicollis** BREIT, 1917 (*Sipalia*)
(Col. Rundsch. 6, 68-69)
Syntypen, Nord-Kroatien, Ivancica-Gebirge südlich von Waraschin, in Buchenwäldern, aus feuchtem Laub, leg. BREIT.
DEI: 2 Syntypen, Ivancica, Croatia bor.
- asemus** KRAATZ, 1859 (*Staphylinus*)
(Arch. Nat. 25, 77-78)
Holotypus, Nord-Indien, leg. BACON, im DEI.
- asiatica** KRAATZ, 1859 (*Aleochara*)
(Arch. Nat. 25, 15-16)
Einige Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 12 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- asiatica** BERNHAUER, 1909 (*Leptusa*)
(Soc. Ent. 23, 179-180)
Syntypen, Klein-Asien, Goek Dagh, leg. BODEMEYER.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- asiaticus** BERNHAUER, 1901 (*Geodromicus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1901, 249-250)
1♂, 1♀ Syntypen, Kleinasien, Bulghar Maaden, leg. VON BODEMEYER.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- aspericollis** FAUVEL, 1895 (*Calliderma*)
(Rev. d'Ent. 14, 236)
Syntypen, Birma, Carin Asciiu Cheba, 1200-1300 m, 1.; Carin Asciiu Ghécù, 1400-1500 m, 3.-4.; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Carin Asciiu Ghécù, 1400-1500 m, 3.-4. 88, leg. FEA.
- atkinsoni** FAUVEL, 1895 (*Leptochirus*)
(Rev. d'Ent. 14, 182)
Syntypen, Birma, Carin Cheba, 900-1400 m, 3., 5. 12., leg. FEA; Tenasserim, Tavoy.
DEI: 2 Syntypen, Carin Cheba, 900-1100 m, 5. 12. 1888, leg. FEA.
- atomaria** KRAATZ, 1856 (*Homalota*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 254-255)
Syntypen, mittleres und südliches Deutschland, ohne nähere Angaben.
DEI: 2 Syntypen, Crefeld.
- atomarioides** BRUNDIN, 1948 (*Atheta*)
(Ent. Tidskr. 69, 55)
♂ Holotypus, Bulgarien, Samakov, 1911, leg. HILF, im DEI.
- atramentarius** ROTTENBERG, 1870 (*Bledius*)
(Berl. Ent. Ztschr. 14, 35-36)
Zahlreiche Syntypen, Syracus, in Salzsümpfen am Hafen, 6.-21. 4. 1869, leg. ROTTENBERG; Südfrankreich.
DEI: 3 Syntypen, Syracus, leg. ROTTENBERG.
- atratum** BREIT, 1911 (*Coryphium*)
(Wien. Ent. Ztg. 30, 171-172)
Syntypen, Mte. Maggiore bei Abazzia, leg. BREIT.
DEI: 4 Syntypen, Mte. Maggiore, Istria, leg. BREIT.
- auripennis** KRAATZ, 1859 (*Staphylinus*)
(Arch. Nat. 25, 72-73)
Holotypus, Nord-Indien, leg. BACON, im DEI.
- auronotatus** FAUVEL, 1895 (*Staphylinus*)
(Rev. d'Ent. 14, 256)
Syntypen, Birma, Carin Cheba, 900-1100 m, 5.-12., leg. FEA.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
- austrica** SCHERPELTZ, 1935 (*Leptusa*)
(Kol. Rundsch. 21, 139-140)
Syntypen, Niederösterreich, Hohe Wand, 9. 1920, leg. SCHERPELTZ; weitere Syntypen von den meisten Alpenbergen Niederösterreichs.
DEI: 2 Syntypen, O. A., Hohe Wand A. i., Umgebung Waldegg Hütte, 26. 9. 1920, leg. SCHERPELTZ.
- azureus** BENICK, 1929 (*Stenus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1929, 59-61, Fig. 6, 7)
104 Syntypen, Philippinen, Basilan.
DEI: 2 Syntypen, Philippinen, Basilan.
- bagdadensis** STIERLIN, 1867 (*Platyprosopus*)
(Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 2, 218-219)
Syntypen, Bagdad, leg. SCHLÄFLI.
DEI: 1 Syntypus, Bagdad; 1 Syntypus, Bagdad, 5. 1862; 1 Syntypus ohne Fundortangaben.
- baicalensis** BERNHAUER, 1927 (*Philonthus*)
(Ent. Mitt. 16, 123-124)
Syntypen, 1♂, Baikalseegebiet, Turansk, im DEI; 1♀, Baikalseegebiet, Kultuk, in Sammlung BERNHAUER.
DEI: 1 Syntypus, Turansk, Baikalseegebiet, leg. FRANKLIN MÜLLER.
- balcanica** BERNHAUER, 1936 (*Atheta*)
(Kol. Rundsch. 22, 53)
Syntypen, Albanien, Tomor-Buranj, leg. REITTER.
DEI: 2 Syntypen, Albanien, Tomor-Buranj, leg. REITTER.
- balcanica** SCHERPELTZ, 1937 (*Lesteva*)
(Mitt. Naturw. Inst. Sofia 10, 191-192)
♂ Holotypus, Massiv des Masalat, Schipka-Balkan, ca. 1900 m, in Sammlung SCHERPELTZ, zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.
DEI: 1♀ Paratypus, Dalmatien, Gravosa, leg. APFELBECK.
- balticus** KRAATZ, 1859 (*Phytosus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 3, 52-53)
Syntypen, Swinemünde, leg. KRAATZ.
DEI: 4 Syntypen, Swinemünde.
- banghaasi** BENICK, 1929 (*Stenus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1929, 88-89)
Syntypen, Philippinen; 6♂♂, 6♀♀, Mt. Polis, Luzon; 32♂♂, 25♀♀, Luzon, Balbalan.
DEI: 1 Syntypus, Balbalan, Luzon.

- basalis** MÄKLIN, 1852 (*Proteinus*)
(Bull. Soc. Imp. Nat. Moskau 25/II, 324)
Syntypen, Insel Sitkha, leg. FRANKENHAEUSER & HOLMBERG.
DEI: 1 Syntypus, Sitkha.
- basicornis** FAUVEL, 1895 (*Staphylinus*)
(Rev. d'Ent. 14, 255–256)
Syntypen; Birma, Teinzo, 5.; Carin Cheba, 400–1100 m, 4., 5., 12.; Carin Ghéou, 1300–1400 m, 2., 3.; leg. FEA. Inde, Sylhet.
DEI: 1 Syntypus, Carin Cheba, 900–1100 m, 5.–12. 1888, leg. FEA.
- basicornis** KRAATZ, 1859 (*Stenus*)
(Arch. Nat. 25, 163–164)
Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.
- basilewskyi** FAGEL, 1954 (*Paederus*)
(Volume Jubilaire VICTOR VAN STRAELEN Inst. Royal Sc. Nat. Belg., Bruxelles, Band 2, 922–923)
♂ Holotypus, Congo Belge, Kivu, Gebiet Kabare, an der Mündung des Lwino, 1700 m, 11. 1951, leg. LELFUP, im Mus. Tervueren; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.
DEI: 1 ♀ Paratypus, vom Fundort des Holotypus.
- beesoni** CAMERON, 1924 (*Lispinus*)
(Trans. Ent. Soc. London 1924, 161)
Syntypen, Indien, Dehra Dun; Siwaliks.
DEI: 1 Syntypus, Nakraunda, Siwaliks, 8. 10. 1922, leg. CAMERON.
- beesoni** CAMERON, 1930 (*Stenus*)
(Fn. Brit. India Col. Staph. I, 346–347)
Syntypen, Chakrata district: Saini, Manjaon und Khedar Khuds; Bangar. Mussoorie district, Assam; Naga Hills, 5000 bis 7500 Fuß.
DEI: 1 Syntypus, Arni Gad., Mussoorie, 16. 10. 1921, leg. CAMERON.
- bella** MÄRKEL, 1844 (*Bolitochara*)
(In: GERMAR, Ztschr. f. Ent. 5, 209–210)
Syntypen, 1 ♂, leg. MÄRKEL; 1 ♀, leg. GRESSNER.
DEI: 1 Syntypus, Saxon, MÄRKEL.
- bellicosus** FAUVEL, 1895 (*Oxytelus*)
(Rev. d'Ent. 14, 202–203)
Syntypen, Birma, Carin Cheba, 900–1100 m, 5.–12., leg. FEA.
DEI: 5 Paralectotypen, mit den Angaben der Beschreibung, durch HAMMOND festgelegt.
- bellus** KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)
(Arch. Nat. 25, 83–84)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 3 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER; 1 Syntypus, Ostindien.
- benickiellus** PUTHZ, 1967 (*Stenus*)
(Ann. Ent. Fennici 33, 234–236)
♂ Holotypus, Rumänien, Sinaia, leg. v. BODEMEYER, im SMF; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.
DEI: 1 ♂ Paratypus, Schuler-Gbg. DEUBEL.
- benigseni** BERNHAUER, 1927 (*Leucitus*)
(Nova Guinea Zool. 15, 3, 293–294)
Syntypen, Neu Guinea, Kani Gebirge, leg. v. BENIGSEN, im DEI und in Sammlung BERNHAUER.
DEI: 1 Syntypus, D. N. Guinea, Limbang, leg. v. BENIGSEN.
- bernhaueri** POPPIUS, 1909 (*Bledius*)
(Acta Soc. Fn. Flora Fenn. 31 (8), 17)
Zahlreiche Syntypen, Nordküste der Halbinsel Kanin, Ufer des Krinka, 16. 7.; Kambalnitza, 18. 7.; leg. POPPIUS.
DEI: 2 Syntypen, Kanin, leg. POPPIUS.
- bernhaueri** SCHEERPELTZ, 1926 (*Leptusa*)
(Kol. Rundsch. 12, 5–7)
♂ Holotypus, 10 ♂♂, 15 ♀♀ Paratypen, Kärnten, Karawanken, Gipfelregion des Obir, ca. 2120 m, 17. 7. 1923, leg. SCHEERPELTZ und WINKLER, in Sammlung SCHEERPELTZ; Paratypen, vom selben Fundort, 5.–7. 8. 1924, leg. BERNHAUER.
DEI: 3 Paratypen, Eisenkappel, Kärnten, Obir, Gipfelreg., 2150 m, 23. 7. 1923, leg. SCHEERPELTZ.
- bernhaueri** CAMERON, 1925 (*Stenus*)
(Treubia 6, 177–178)
♂ Holotypus, Malabar bei Bandung, 1600 m, 26. 12. 1920, leg. DAMMERMAN; Paratypen, Java, Tjibodas. Die Typenserie besteht aus 4 Ex., aus der Beschreibung ist nicht ersichtlich, wieviel Exemplare von den beiden Fundorten vorlagen.
DEI: 1 Paratypus, Malabar, 1600 m, 26. 12. 1920.
- bernhaueri** RAMBOUSEK, 1916 (*Tenebriobius*)
(Col. Rundsch. 4 (1915), 130–132)
Syntypen, Mazedonien, Peristeri-Gebirge bei Monastir, 1800–2000 m, 8. 1914, leg. RAMBOUSEK.
DEI: 1 Syntypus, Maced. Perister alpin, 7. 14, leg. RAMBOUSEK.
- bicolor** REICHENSPERGER, 1933 (*Eciotophya*)
(Rev. d'Ent. 3, 184–186)
Zahlreiche Syntypen, Umbria, Putumayo, Peru, 1930, leg. KLUG; Hamburg Farm, San José, Costa Rica, 7. 10. 1932, 28. 1. 1933; Salvadora-Farm, Parismina-Fluß, 4. 10. 1931, leg. NEVERMANN.
DEI: 1 Syntypus, Costa Rica, Salvadora Farm, Parismina Fluß, 23.–30. 10. 1930, leg. NEVERMANN; 1 Syntypus, Costa Rica, Hamburg Farm, leg. NEVERMANN.
- bicolor** SCHUBERT, 1911 (*Erichsonius*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1911, 33)
Syntypen, Brit. Uganda, leg. GRAUER, in Sammlung v. BENIGSEN.
DEI: 1 Syntypus, Brit. Uganda, GRAUER.
- bicolor** CAMERON, 1931 (*Medome*)
(Fauna Brit. Ind. Col. Staph. 2, 189–190, Fig. 70)
Syntypen, Mussoorie district, Arni Gad; Chakrata district, Mohna, 5000–6500 Fuß.
DEI: 2 Syntypen, Mussoorie, Arni Gad., 17. 4. und 12. 6., leg. CAMERON.
- bicolor** WENDELER, 1942 (*Paederus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 9, 103)
♀ Holotypus, Cuman, Venezuela, im DEI.
- bicolor** FENYES, 1914 (*Schistogenia*)
(Arch. Nat. 80 A 2, 47–48)
Holotypus, Formosa, Anping, leg. SAUTER, det. Nr. 4381, im DEI; 6 Paratypen, vom selben Fundort.
DEI: 3 Paratypen, Anping, Formosa, 6. 1911, leg. SAUTER.

- bicornis** PUTHZ, 1972 (*Stenus*)
(Wiss. Mitt. Bosn.-herz. Landesmus. 2, Nat., 170-172)
♂ Holotypus, ♀ Paratypus, Macedonia, Djevdjelija, 21. 5. 1937, leg. LIEBMANN, im DEI; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung, im Mus. Genf. in coll. COIFFAIT, FAGEL und PUTHZ.
DEI: ♂ Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung; 1 ♂ Paratypus, Macedonia, Strumica, 19. 5. 1937, leg. LIEBMANN.
- bicuspis** KRAATZ, 1859 (*Scopaeus*)
(Arch. Nat. 25, 129)
Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 3 Syntypen, India orient.
- biforme** FAUVEL, 1895 (*Cryptobium*)
(Rev. d'Ent. 14, 237)
Syntypen, Birmanie, Rangoon, 5.; Bhamo, 7.; Probe, 12.; Carin Cheba, 900-1100 m, 12.; Carin Asciiui Ghécu, 1400-1500 m, 3.-4.; Pegu, Palon, 8.-9.; Tenasserim, Kawkareet, 2.; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Carin Ghecu, 1300-1400 m, 2.-3. 1888, leg. FEA; 1 Syntypus, Bhamo, Birmania, 7. 1886, leg. FEA.
- bifoveolata** KRAATZ, 1859 (*Linoglossa*)
(Arch. Nat. 25, 11-12)
Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 1 Syntypus, Ind. post., leg. HELFER.
- bifoveolata** BRISOUT DE BARNEVILLE, 1860 (*Lomechusa*)
(Ann. Soc. Ent. France III, 8, 345-346)
Syntypen, Frankreich, Umgebung Collioures, zusammen mit kleinen Ameisen, DELAROUZÉE.
DEI: 1 Syntypus, Collioures.
- bilineatus** FAUVEL, 1895 (*Platyprosopus*)
(Rev. d'Ent. 14, 239-240)
Syntypen, Birma, Bhamo, 8., leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Birmania, Bhamo, 8. 1886, leg. FEA.
- bimaculatus** KRAATZ, 1859 (*Boletobius*)
(Arch. Nat. 25, 63-64)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 5 Syntypen, Ceylon.
- binotata** KRAATZ, 1856 (*Aleochara*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 106-107)
Syntypen, im nördlichen Deutschland.
DEI: 2 Syntypen, Berlin; 1 Syntypus, Danzig.
- bipunctatus** FAUVEL, 1895 (*Leptochirus*)
(Rev. d'Ent. 14, 180-181)
Syntypen, Birma, Carin Cheba, 900-1100 m, 5.; Carin Ghécu, 1300-1400 m, 2., 3.; Tenasserim, mont Moolyit, 1800 bis 1900 m, 3.; Plapoo, 4.; alle leg. FEA. Siam, monts de La Khone, leg. HARMAND.
DEI: 2 Syntypen, Carin Ghecu, 1300-1400 m, 5. 1888, leg. FEA.
- birmanus** FAUVEL, 1895 (*Astenus*)
(Rev. d'Ent. 14, 222)
Syntypen, Birma, Carin Asciiui Ghécu, 1400-1500 m, 3.-4., leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- birmanus** FAUVEL, 1895 (*Leistotrophus*)
(Rev. d'Ent. 14, 246-247)
Syntypen, Birma, Carin Cheba, 900-1100 m, 5.-12.; Carin Asciiui Ghécu, 1400-1500 m, 3.-4.; leg. FEA.
DEI: 4 Syntypen, Carin Asciiui Ghecu, 1400-1500 m, 3.-4. 1888, leg. FEA.
- birmanus** FAUVEL, 1895 (*Lispinus*)
(Rev. d'Ent. 14, 184)
Syntypen, Birma, Carin Cheba, 1200-1300 m, 1.; Carin Asciiui Ghécu, 1400-1500 m, 3.-4.; Tenasserim, mont Moolyit, 1800-1900 m, 3.; alle leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Carin, Asciiui Ghecu, 1400-1500 m, 3.-4. 1888, leg. FEA.
- birmanus** FAUVEL, 1895 (*Paederus*)
(Rev. d'Ent. 14, 233)
Syntypen, Birma, Carin Cheba, 900-1100 m, 5.-12.; Carin Asciiui Cheba, 800-1400 m, 12.; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Birma, 1888, leg. FEA.
- birmanus** FAUVEL, 1895 (*Medon*)
(Rev. d'Ent. 14, 228-229)
Syntypen; Birma, Carin Cheba, 500-1000 m, 12.; Carin Ghécu, 1300-1400 m, 2.-3.; Carin Asciiui Ghécu, 1400-1500 m, 3.-4.; alle leg. FEA. Sikkim.
DEI: 1 Syntypus, Carin Asciiui Ghecu, 1400-1500 m, 3.-4. 1888, leg. FEA.
- bisinuatus** CAMERON, 1924 (*Priochirus*)
(Nova Guinea Zool. 15, 1, 81-82)
8 Syntypen, Neu Guinea, Mamberano Riv.
DEI: 2 Syntypen, N. Guinea, Mamberano Riv., Pionierbivak, 1920, leg. W. C. v. HEURN.
- bistriatus** FAUVEL, 1895 (*Lispinodes*)
(Rev. d'Ent. 14, 185)
Syntypen; Birma, Bhamo, 8., leg. FEA. Annam, Hué, leg. DE BEAUCHÈNE; Sikkim, Darjeeling, leg. CHRISTIE.
DEI: 1 Syntypus, Birmania, Bhamo, 8. 1885, leg. FEA.
- bodemeyeri** BERNHAUER, 1914 (*Aleochara*)
(Münch. Kol. Ztschr. 4, 43)
2 Syntypen, Kleinasien, Gock Dagh, leg. v. BODEMEYER, 1 Ex., in Sammlung BERNHAUER.
DEI: 1 Syntypus, Asia - Minor, Gock - Dagh, leg. v. BODEMEYER.
- bodemeyeri** BERNHAUER, 1903 (*Lathrobium*)
(Verh. zool. bot. Ges. Wien 53, 593)
2 Syntypen, Kleinasien, Gock-Dagh bei Hassa-Pasche-Kay unweit Salandja, 9.-12. 4. 1903, leg. v. BODEMEYER.
DEI: 1 Syntypus, Asia-Minor, Gock-Dagh, leg. v. BODEMEYER.
- bodemeyeri** BERNHAUER, 1914 (*Medon*)
(Münch. Kol. Ztschr. 4, 266)
Syntypen, Tunis, Ain Draham, leg. v. BODEMEYER.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- bodemeyeri** EPPELSHEIM, 1881 (*Philonthus*)
(Stett. Ent. Ztg. 42, 376)
Syntypen, Süd-Ungarn, dicht bei Herkulesbad, bei Mehadia, unter Steinen am Ufer der Czerna.
DEI: 1 Syntypus, Mehadia.

- bodemeyeri** BERNHAUER, 1902 (*Trogophloeus*)
(Verh. zool. bot. Ges. Wien 52, 701)
Syntypen, Kleinasien, Gock-Dagh, leg. v. BODEMEYER.
DEI: 1 Syntypus, Asia minor, Gock Dagh, leg. v. BODEMEYER.
- boettcheri** WENDELER, 1924 (*Priochirus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1924, 340)
♂♂ Syntypen, Philippinen, Nord-Palawan, Binaluan, 11. 1913, leg. BOETTCHER, in Sammlung WENDELER.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
- brachycera** KRAATZ, 1859 (*Acanthoglossa*)
(Arch. Nat. 25, 145)
Syntypen, ohne Fundortangaben.
DEI: 2 Syntypen, Ceylon.
- brachycerus** KRAATZ, 1859 (*Leptochirus*)
(Arch. Nat. 25, 191)
Mehrere Syntypen, Ceylon.
DEI: 4 Syntypen, Ceylon.
- brachyptera** KRAATZ, 1856 (*Oxyptoda*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 188)
Syntypen, Österreich.
DEI: 1 Syntypus, Österreich.
- brachypterus** KRAATZ, 1859 (*Pinophilus*)
(Arch. Nat. 25, 161–162)
Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.
- brachypterus** KRAATZ, 1859 (*Staphylinus*)
(Arch. Nat. 25, 76)
Holotypus, India boreali, leg. BACON, im DEI.
- brachypterus** KRAATZ, 1859 (*Stenus*)
(Arch. Nat. 25, 164)
Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.
- breviceps** REICHENSPERGER, 1933 (*Ecitomorpha*)
(Rev. d'Ent. 3, 182)
Syntypen, Costa Rica, Hamburg-Farm, San José, 3. 4. 1931, leg. NEVERMANN.
DEI: 1 Syntypus, Costa Rica, Hamburg-Farm, Reventazon, Ebene Limon, 7. 4. 1930.
- brevicollis** THOMSON, 1884 (*Omalium*)
(Opusc. Ent. Lund 10, 1033)
Syntypen, Lappland.
DEI: 1 Syntypus, Enontekis; 1 Syntypus, Muonio, leg. SAHLBERG.
- brevicollis** KRAATZ, 1856 (*Bolitochara*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 40–41)
Syntypen, Grafschaft Glatz, leg. ZEBE; Grafschaft Glatz, am Fuße der Heuscheuer unweit Abendorf, leg. KRAATZ.
DEI: 4 Syntypen, Silesia.
- brevicornis** KRAATZ, 1859 (*Lispinus*)
(Arch. Nat. 25, 187)
Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 1 Syntypus, India.
- brevicornis** KRAATZ, 1856 (*Ocalea*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 51)
Syntypen, Österreich.
DEI: 2 Syntypen, Österreich.
- brevicornis** CAMERON, 1927 (*Sternotropa*)
(Rec. South Austr. Mus. 3, 265–266)
Viti Levu, Holotypus Nr. 16434, Paratypen; Paratypen, Taveuni, Ovalau.
DEI: 2 Paratypen, Viti Levu, Fiji, leg. LEA.
- brevilingue** SCHIÖDTE, 1844–45 (*Micralymma*)
(Naturhist. Tidskrift Krøyer [2] 1, (4), 377–379; Taf. 4, Fig. 2)
Syntypen, Grönland, Kikertarsoeitsiak.
DEI: 1 Syntypus, Grönland, leg. SCHIÖDTE.
- brevipennis** KRAATZ, 1857 (*Othius*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 657)
Holotypus, Österreich, leg. Graf v. FERRARI, im DEI.
- brevis** KRAATZ, 1859 (*Pinophilus*)
(Arch. Nat. 25, 159–160)
Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.
- brevitarsis** BENICK, 1916 (*Stenus*)
(Ent. Mitt. 5, 245–246)
Holotypus, N. O.-Sumatra, Tebing-tinggi, leg. SCHULTHEISS, im DEI.
- breviuscula** KRAATZ, 1859 (*Lithocharis*)
(Arch. Nat. 25, 137–138)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 3 Syntypen, Ceylon.
- brunneipennis** KRAATZ, 1856 (*Aleochara*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 100–101)
Syntypen, ganz Deutschland, hauptsächlich an feuchten Localitäten.
DEI: 5 Syntypen, Germ.
- brunneiventris** KRAATZ, 1859 (*Aleochara*)
(Arch. Nat. 25, 14–15)
Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 1 Syntypus, Ind. post., leg. HELFER.
- brunnescens** SAHLBERG, 1870 (*Arpedium*)
(Not. Fauna Flora Fennica 11, 423)
Mehrere Syntypen, Karelien, Muonioniska, 5.–6., leg. PALMÉN und SAHLBERG.
DEI: 1 Syntypus, Muonio, leg. SAHLBERG.
- bucharicus** BERNHAUER, 1901 (*Medon*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1901, 244)
Syntypen, Centralasien, Buchara.
DEI: 1 Syntypus, Ost-Buchara, Tschitschantan, 1898, leg. HAUSER.

- cabrali** PUTHZ, 1968 (*Stenus*)
(Ark. Zool. 20, 446-448, Fig. 3-5)
♂ Holotypus, 9 ♂♂, 8 ♀♀ Paratypen, Brasilien, Sta. Catharina, Nova Teutonia, 1., 9. und 12. 1938, 2. 1939, leg. PLAUMANN;
♀ Paratypus, Ibidem, 27° 11' B., 52° 23' L., leg. PLAUMANN. Holotypus, Paratypen, im Mus. Stockholm, Paratypen, in
Coll. BENICK, KORGE, PUTHZ und im British Mus.
DEI: 1 ♀ Paratypus, Sta. Catharina, Nova Teutonia, Brasil., 1. 1938, leg. PLAUMANN.
- caelebs** ROTTENBERG, 1870 (*Quedius*)
(Berl. Ent. Ztschr. 14, 28-29)
Holotypus, Sicilien, Nicolosi, 9.-13. 5. 1869, leg. ROTTENBERG, im DEI.
- calabricus** REITTER, 1907 (*Micropeplus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1907, 484-485)
Zahlreiche Syntypen, Calabrien, Santa Eufemia d'Aspromonte, 1905, leg. PAGANETTI-HUMMLER.
DEI: 3 Paralectotypen, Calabria, Aspromonte, PAGANETTI, von P. NOHEL (im Druck) festgelegt.
- californicus** HUBBARD, 1894 (*Brathinus*)
(Proc. Ent. Soc. Washington 3, 11-12)
Zahlreiche Syntypen, Californien, Lake Tahoe; 2 Syntypen, Californien, Lisson.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung (als Paratypen nr. 4575 USNM ausgezeichnet).
- caligicola** PUTHZ, 1970 (*Stenus*)
(Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Giacomo Doria 78 (1970-71), 55-57)
♂ Holotypus, Calabria, Monte Cocuzzo, 9. 6. 1899, leg. A. FIORI, in Sammlung PUTHZ; zahlreiche Paratypen, siehe Ori-
ginalbeschreibung.
DEI: 3 Paratypen, Calabria, Aspromonte, leg. PAGANETTI; 1 Paratypus, Calabria, Sta. Eufemia d'Aspromonte, 1905, leg.
PAGANETTI.
- callifer** BENICK, 1938 (*Stenus*)
(Mitt. Münch. Ent. Ges. 28, 271)
♀ Holotypus, Costa Rica, La Caja, 8 km westlich von San José, leg. H. SCHMIDT. Genaue Beschreibung und genaue Be-
schreibung des Typenfundortes in Mitt. Münch. Ent. Ges. 29, 29-31; 1939.
DEI: Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- camura** ERICHSON, 1840 (*Myrmedonia*)
(Genera et Species Staphylinorum, 44)
Syntypen, Columbien, Puerto Cabello, in Sammlung MORITZ.
DEI: 1 Syntypus, MORITZ.
- capillaris** FAUVEL, 1895 (*Paederus*)
(Rev. d'Ent. 14, 231-232)
Syntypen, Birma, Carin Ascuiu Ghéou, 1400-1500 m, 3.-4., leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- capitata** BRUNDIN, 1948 (*Atheta*)
(Ent. Tidskr. 69, 55-56)
♂ Holotypus, Holstein, bei Eutin, im DEI.
- capitata** SCHUBERT, 1911 (*Eleusis*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1911, 2-3)
2 Syntypen, Brit.-Uganda, leg. GRAUER.
DEI: 1 Syntypus, Brit. Uganda, leg. GRAUER.
- capitatus** EPPELSHEIM, 1878 (*Stenus*)
(Stett. Ent. Ztg. 39, 421)
Syntypen, Oran, leg. LEDER.
DEI: 1 Syntypus, Oran.
- carinicollis** KRAATZ, 1859 (*Thinoharis*)
(Arch. Nat. 25, 143)
Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.
- carinthiaca** SCHERPELTZ, 1948 (*Leptusa*)
(Carinthia II 57, 159-164, Abb. 3)
Holotypus, Paratypen, Kärnten, in einer Doline im südwestlichen Teil des isolierten Kalkzuges Launsdorf-Brückl-Eber-
stein, leg. HÖLZEL, in Sammlung SCHERPELTZ.
DEI: 1 Paratypus, Carinthia, Launsdorf, 25. 9. 1946, leg. HÖLZEL.
- carpathica** WEISE, 1877 (*Leptusa*)
(Verh. Nat. Ver. Brünn 15 (1876), 10)
Zahlreiche Syntypen, Karpaten, am Hoverla, aus Buchenlaub, 1875, leg. WEISE; einige Syntypen, Kerzer Gebirge, 1876,
leg. REITTER.
DEI: 1 Syntypus, Hoverla.
- caspicus** REITTER, 1885 (*Micropeplus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 29, 366)
Syntypen, Lenkoran.
DEI: ♂ Lectotypus, Lenkoran, LEDER, REITTER, von NOHEL (im Druck) festgelegt.
- castaneipennis** KRAATZ, 1859 (*Coproporus*)
(Arch. Nat. 25, 60-61)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 2 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- castaneipennis** KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)
(Arch. Nat. 25, 96-97)
Syntypen: Ost-Indien, leg. HELFER; Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 6 Syntypen, Ostindien; 1 Syntypus, Ceylon, leg. NIETNER.
- castaneipennis** CAMERON, 1925 (*Thyreocephalus*)
(Treubia 6, 185-186)
7 Syntypen, Merauke, S. N. Guinea.
DEI: 3 Syntypen, Holländ. Indien, Merauke.
- castanoptera** KRAATZ, 1856 (*Euryusa*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 76)
Syntypen; 1 Ex. bei Berlin, am Fuße einer Eiche, leg. KRAATZ; 1 Ex. Österreich, leg. WAGENMAN, beide im DEI.
- castanoptera** KRAATZ, 1857 (*Lithocharis*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 716-717)
Holotypus, Baiern, leg. WALT, im DEI.

- cavifrons* BIERIG, 1933 (*Neobisnius*)
(Rev. de Ent. Rio de Janeiro 3, 51—54)
Holotypus, Paratypen, Puerto Armuelles, 6. 1930, leg. BIERIG, in Sammlung BIERIG; 3 Paratypen, Costa Rica, La Caja, 1931, leg. SCHMIDT, im DEI.
DEI: 1 Ex., C. R., Vara Blanca, zwischen Barba und Poas, 2000 m, leg. SCHMIDT, bei uns als Allotypus ausgezeichnet, dieser Fundort stimmt aber nicht mit dem in der Beschreibung genannten überein.
- ceylanense* KRAATZ, 1859 (*Conosoma*)
(Arch. Nat. 25, 62)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 2 Syntypen, Ceylon.
- ceylanense* KRAATZ, 1859 (*Cryptobium*)
(Arch. Nat. 25, 119)
Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.
ceylanensis KRAATZ, 1859 (*Holismorphus*)
(Arch. Nat. 25, 101—102)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 3 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- ceylanensis* KRAATZ, 1859 (*Palaminus*)
(Arch. Nat. 25, 153)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 1 Syntypus, Ceylon.
- ceylanensis* KRAATZ, 1859 (*Phloeopora*)
(Arch. Nat. 25, 41—42)
Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.
ceylanensis KRAATZ, 1859 (*Stilicus*)
(Arch. Nat. 25, 126)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 10 Syntypen, Ceylon.
- ceylonica* KRAATZ, 1857 (*Stenus*)
(Linnaea 11, 8—9)
Zahlreiche Syntypen, Ceylon, bei Colombo, unter faulenden Früchten, leg. NIETNER.
DEI: 7 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- chilensis* KRAATZ, 1859 (*Oxyopoda*)
(Berl. Ent. Ztschr. 3, 15)
Syntypen, Chile.
DEI: 1 Syntypus, Chile, leg. DEYROLLE.
- chilenus* BERNHAUER, 1939 (*Philonthus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 6, 13—14)
Syntypen, Isla Calbuco, Süd-Chile, 6. 2. 1937, leg. SCHWABE, im DEI und in Sammlung BERNHAUER.
DEI: 1 Syntypus, Isla Calbuco, Süd-Chile, 3. 10. 1937, leg. SCHWABE.
- chinense* BERNHAUER, 1927 (*Achenium*)
(Kol. Rundsch. 13, 94—95)
Syntypen, China, Tientsin, im DEI und Sammlung BERNHAUER.
DEI: 1 Syntypus, China, Tientsin.
- chinensis* BERNHAUER, 1928 (*Bledius*)
(Kol. Rundsch. 14, 8—9)
Syntypen, Schantung, Jentschoufu, 22. 11. 1911—1912, leg. KREYENBERG, im DEI und Sammlung BERNHAUER.
DEI: 11 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
- chobauti* FAUVEL, 1902 (*Megarhtrus*)
(Rev. d'Ent. 21, 179)
Syntypen; Kabylie, Gipfel des Djebel, Bou-Berak bei Dellys, unter abgestorbenen Blättern, 5., leg. CHOBAUT; Wald von Yakouren, leg. PUEL; Bougie, leg. CHOBAUT.
DEI: 5 Syntypen, Bou-Berak, Kabylie, leg. PUEL.
- chrysopyga* KRAATZ, 1859 (*Oligota*)
(Arch. Nat. 25, 45)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 2 Syntypen, Ceylon.
- cilifrons* HELLER, 1898 (*Priochirus*)
(Abh. u. Ber. Mus. Dresden 7 (1898/99), 16)
Syntypen, Celebes meridionalis, Bonthain und Maros, leg. SARASIN und FRUHSTORFER, im Mus. Dresden Nr. 11356 und 11084 und Mus. Tring.
DEI: 1 Syntypus, S. Celebes, Bua-Kraeng, 5000', 2. 1896, Nr. 11084, leg. FRUHSTORFER.
- cimicoides* FAUVEL, 1895 (*Oxytelopsis*)
(Rev. d'Ent. 14, 200—201)
Syntypen, Birma, Carin Ascuii Ghécu, 1400—1500 m, 3.—4., leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- cincticollis* KRAATZ, 1857 (*Quedius*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 508)
Syntypen, bei Wien, leg. Graf v. FERRARI und MILLER.
DEI: 2 Syntypen, Austria, leg. MILLER.
- cingulata* KRAATZ, 1858 (*Chilopora*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 148)
Syntypen, Baiern, leg. WALTJ.
DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Baiern, leg. WALTJ, von SCHLOW festgelegt.
- cinnamomea* KRAATZ, 1859 (*Dinopsis*)
(Arch. Nat. 25, 51)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: Lectotypus, 4 Paralectotypen, Ceylon, leg. NIETNER, von KLIMASZEWSKI (Canad. Ent., im Druck) festgelegt.
- cinnamomeum* KRAATZ, 1857 (*Omalium*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 1000—1001 nota)
Syntypen, Dalmatien, leg. KAHR.
DEI: 5 Syntypen, Dalmatien, leg. KAHR.
- cinnamoptera* KRAATZ, 1859 (*Lithocharis*)
(Arch. Nat. 25, 141)
Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 3 Syntypen, India orient.

- circumductus** FAUVEL, 1895 (*Philonthus*)
(Rev. d'Ent. 14, 263)
Syntypen; Birma, Carin Cheba, 900–1100 m, 5.–12., leg. FEA. Philippines, Antipolo, leg. SIMON.
DEI: 1 Syntypus, Birma, Carin Cheba, 900–1100 m, 5., 12. 88, leg. FEA.
- circumflexus** FAUVEL, 1895 (*Stenus*)
(Rev. d'Ent. 14, 211)
Syntypen, Birma, Carin Ghècu, 1300–1400 m, 2., 3.; Carin Asciiui Ghècu, 1400–1500 m, 3.–4.; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Carin Ghècu, 1300–1400 m, 2.–3. 1888, leg. FEA; 1 Syntypus, Carin Asciiui Ghècu, 1400–1500 m, 3.–4. 1888, leg. FEA.
- claritarsis** PUTHZ, 1971 (*Stenus*)
(Ent. Bl. 67, 100–102, Fig. 14–17)
♂ Holotypus, Lenkoran, leg. LEDER, in Sammlung PUTHZ; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.
DEI: 1 ♂ Paratypus, Caucasus, Meskigeln Gl., leg. LEDER, REITTER; 1 ♀ Paratypus, Talsch, coll. GEAWE.
- clavatus** ROTTENBERG, 1870 (*Callicerus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 14, 27)
Syntypen; 1 Ex. Syracus, 6.–21. 4. 1868; 1 Ex. Catania, 26. 2.–5. 4. 1868, leg. ROTTENBERG.
DEI: 1 Syntypus, Syrac.; 1 Syntypus, Catan.
- clavicornis** CAMERON, 1925 (*Gyrophaena*)
(Treubia 6, 189)
Zahlreiche Syntypen, Wai Lima, Sumatra, 11. und 12. 1921, leg. KARNY.
DEI: 16 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, 1 Ex. als Typus ausgezeichnet.
- clavicornis** KRAATZ, 1859 (*Myrmedonia*)
(Arch. Nat. 25, 24–25)
Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.
- coarcticollis** KRAATZ, 1859 (*Lispinus*)
(Arch. Nat. 25, 186)
Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 6 Syntypen, Indien.
- collare** SCHEERPELTZ, 1962 (*Scimbalium*)
(Beitr. Ent. 12, 530–532)
♀ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, Ägypt. Sudan, Bahr el Ghazahl, 4. 3. 1913; Holotypus, im DEI, Paratypus in Sammlung SCHEERPELTZ.
DEI: ♀ Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- comes** FAUVEL, 1895 (*Stenus*)
(Rev. d'Ent. 14, 207)
Syntypen, Lanasserim, Thagata, 4., leg. FEA.
DEI: ♂ Paralectotypus, Tenasserim, Thagata, 4. 1887, leg. FEA, von PUTHZ (Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg. 45 (9), 5; 1969) festgelegt. Der Paralectotypus trägt das Originaletikett FAUVELS „*collium* FVL“. Nach PUTHZ handelt es sich hierbei um einen Irrtum FAUVELS. Das oben genannte Exemplar gehört zur Typenserie von *comes* FVL.
- concolor** KRAATZ, 1859 (*Sunius*)
(Arch. Nat. 25, 149)
Holotypus, Ost-Indien, leg. HELFER, im DEI.
- condei** WENDELER, 1933 (*Paederus*)
(Mitt. Dtsch. Ent. Ges. 4, 57–58)
Syntypen, Brasilien, Espirito Santo, Sta. Theresa, 5., 9. 1928, leg. O. CONDE, in Sammlung WENDELER.
DEI: 1 ♀ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- conforme** KRAATZ, 1857 (*Omalium*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 987)
Holotypus, Baiern, leg. WATTL, im DEI.
- consentaneus** BENICK, 1938 (*Stenus*)
(Mitt. Münch. Ent. Ges. 28, 269)
♂ Holotypus, Costa Rica, La Caja, 8 km westlich San José, 1934, leg. SCHMIDT. (Genau Beschreibung und genaue Beschreibung des Typenfundortes in Mitt. Münch. Ent. Ges. 29, 26–27; 1939).
DEI: Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- consobrinus** BENICK, 1916 (*Stenus*)
(Ent. Mitt. 5, 242–244)
Holotypus, Usambara, im DEI.
- contristata** KRAATZ, 1856 (*Homalota*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 304–305)
Syntypen, südliches und mittleres Deutschland, ohne nähere Fundortangaben.
DEI: 4 Syntypen, Styria, leg. KAHR; 1 Syntypus, Silesia.
- convexula** EICHELBAUM, 1913 (*Atheta*)
(Arch. Nat. 79 A 3, 146–147)
Syntypen; 6 Ex., Dar-es-Salâm, im Garten der evangelischen Mission, in faulenden Zitronen, 5. 1903; 6 Ex., Tanga, im Mist des Zeburindes, 7. 1903; 25 Ex., Amani, 7.–11. 1903; alle leg. EICHELBAUM.
DEI: 2 Syntypen, Amani, 7.–9. 1903.
- cordatoides** PUTHZ, 1972 (*Stenus*)
(Wiss. Mitt. Bosn.-herz. Landesmus. 1 (1971), Nat., 279–281)
♂ Holotypus, 9 ♂♂, 9 ♀♀ Paratypen, Bulgarien, Maglige, leg. HILF; Holotypus, in Sammlung PUTHZ, Paratypen in Sammlung BENICK und im DEI.
DEI: 4 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.
- coriaceus** CAMERON, 1924 (*Geodromicus*)
(Trans. Ent. Soc. London 1924, 172, 173)
Syntypen; Indien, Chakrata District; Chulli Khud und Binal Gad, 7000–8000 Fuß.
DEI: 1 Syntypus, Chakrata Dist., Binal Gad, 7000–8000 Fuß, 28. 5. 1922, leg. CAMERON.
- coriaceus** FAUVEL, 1895 (*Lispinus*)
(Rev. d'Ent. 14, 185)
Syntypen; Birma, Carin Asciiui Cheba, 1200–1300 m, 1.; Carin Asciiui Ghècu, 1400–1500 m, 3., 4.; Bhamo, 8.; Tenasserim montagnes entre Meekalan et Kyeat, 1000–1400 m, 3.; alle leg. FEA. Pulo Penang; Java, monts Tengger, 1100 m, Icobodas, leg. FRUHSTORFER.
DEI: 1 Syntypus, Carin Asciiui Cheba, 1200–1300 m, 1. 1888, leg. FEA.
- coriaria** KRAATZ, 1856 (*Homalota*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 282–283)
Syntypen, Deutschland, ohne nähere Fundortangaben.
DEI: 6 Syntypen, Berlin; 1 Syntypus, Leipzig.

- corpulentus** LUZE, 1901 (*Mycetoporus*)
(Verh. zool. bot. Ges. Wien 51, 707–708)
Zahlreiche Syntypen; Riesengebirge, leg. SKALITZKY; Glatzgebirge, leg. v. BODEMEYER; Böhmen, leg. REITTER; Ungarn, leg. CHYZER, v. HEYDEN, REITTER; Croatien, leg. BERNHAUER, v. HEYDEN, v. VIERTL; Serbien, leg. MERKL; Siebenbürgen, Rodnaer Gebirge, leg. DEUBEL, GANGLBAUER; Steiermark, leg. KOLTZE; Bachergebirge, leg. GANGLBAUER; Kärnten, leg. KAUFMANN; Tirol, leg. HALBHERR, KAUFMANN, LOKAY; Salzburg, Gastein, leg. SKALITZKY; Niederösterreich, leg. KAUFMANN.
DEI: 1 Syntypus, Spindelmühle, Riesengebirge, leg. SKALITZKY.
- costaricensis** BERNHAUER, 1940 (*Falagria*)
(Arb. morph. tax. Ent. 7, 159–160)
Syntypen, Costa Rica, La Caja bei San José, 1934, leg. SCHMIDT, im DEI und in Sammlung BERNHAUER.
DEI: 5 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
- cozalis** FAUVEL, 1895 (*Paederus*)
(Rev. d'Ent. 14, 232–233)
Syntypen; Birma, Sennigion, 2.; Vyouk-Myoung, 4.; de Yonang-Young à Mandalay; Teinzo; Rangoon, 5.; Bhamo, 6.; Schwego-myó, 10.; Myeen-Kyan; alle leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Teinzo, Birmania, 1886, leg. FEA.
- cozalis** KRAATZ, 1858 (*Quedius*)
(Berl. Ent. Ztschr. 2, 59–60)
Syntypen, bei Athen, leg. v. HELDREICH und v. KIESENWETTER.
DEI: ♂ Lectotypus, Graecia, von FAGEL (Bull. Inst. R. Sci. Nat. Belg. 44 (24), 2–4; 1968) festgelegt.
- crassiuscula** KRAATZ, 1859 (*Homalota*)
(Arch. Nat. 25, 41)
Syntypen; Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 6 Syntypen, Ceylon, leg. J. NIETNER; 1 Syntypus, Ind. post., leg. HELFER.
- crassus** KRAATZ, 1859 (*Psilotrachelus*)
(Arch. Nat. 25, 124–125)
♂ Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.
- crenicollis** KRAATZ, 1857 (*Schistogenia*)
(Linnaea 11, 40)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 5 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- crenifrons** BERNHAUER, 1917 (*Osorius*)
(In: VOELTZKOW, A., Ergebnisse Reise in Ostafrika 3, 557)
♂ Holotypus, 1 Paratypus, Madagascar.
DEI: 1 Paratypus, Madagaskar.
- eres** PUTHZ, 1971 (*Stenus*)
(Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg. 47 (14), 3)
♂ Holotypus, Kreta, leg. PAGANETTI, im DEI.
- eribrata** FENYES, 1914 (*Aleochara*)
(Arch. Nat. 80 A 2, 55)
♂ ? Holotypus, Formosa, Anping, leg. SAUTER, det. Nr. 4370, im DEI; 1 Paratypus, vom selben Fundort.
DEI: Holotypus, Formosa, Anping, 1911, leg. SAUTER.
- eribrata** KRAATZ, 1856 (*Homalota*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 288)
Syntypen; 1 Ex. Baiern, leg. WALTZ; 2 Ex. Brieselanger Forst bei Berlin, unter feuchtem Laub, leg. WEIDHASE.
DEI: 3 Syntypen, Berlin.
- eribricollis** L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Edaphus*)
(Horae Soc. Ent. Ross. 21, 109)
Syntypen, Sumatra, in Nicotiana.
DEI: 1 Syntypus, Sumatra, in Tabak.
- eribripennis** KRAATZ, 1856 (*Leptusa*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 65–66)
Syntypen, Österreich.
DEI: 1 Syntypus, Austria.
- euneiformis** KRAATZ, 1856 (*Leptusa*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 66–67 nota)
Holotypus, Ungarn, leg. FRIVALDSKY, im DEI.
- cupreolus** FAUVEL, 1895 (*Mitomorphus*)
(Rev. d'Ent. 14, 240–241)
Syntypen; Birma, Carin Cheba, 900–1100 m, 5., 12.; Carin Asciiui Ghécu, 1400–1500 m, 3.–4.; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Carin Asciiui Gheci, 1400–1500 m, 3.–4. 88, leg. FEA.
- currani vastus** WENDELER, 1928 (*Priochirus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1928, 123)
Syntypen, Nord-Luzon, Heightsplan.
DEI: 1 Syntypus, Luzon, Heightsplan.
- currae** KRAATZ, 1856 (*Homalota*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 198–199)
Zahlreiche Syntypen, bei Ilseburg im Harz, am Ufer der Ilse; Thüringen; Österreich; Baiern.
DEI: 1 Syntypus, Herzyn, leg. KRAATZ; 1 Syntypus, Bavar, leg. WALTZ.
- curta** KRAATZ, 1859 (*Lithocharis*)
(Arch. Nat. 25, 136)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 3 Syntypen, Ceylon.
- curticornis** FAUVEL, 1895 (*Staphylinus*)
(Rev. d'Ent. 14, 256)
Syntypen, Birma, Carin Cheba, 900–1100 m, 5.–12., leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Birma, Carin Cheba, 400–900 m, 4. 1888, leg. FEA.
- cyanea** KRAATZ, 1856 (*Tachyusa*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 152)
Syntypen, Steyermark, leg. KAHR.
DEI: 1 Syntypus, Styria, leg. KAHR.
- cyanelytrius** KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)
(Arch. Nat. 25, 80)
Holotypus, Nord-Indien, leg. BACON.
DEI: Holotypus, Ostindien (Etikettierungs- oder Druckfehler?)

- dalmatina* SACHSE, 1852 (*Pronomaea*)
(Stett. Ent. Ztg. 13, 119—120)
Syntypen, Dalmatien, von KAHR.
DEI: 1 Syntypus, Dalmatien, leg. KAHR.
- dammermani* CAMERON, 1925 (*Neocallicerus*)
(Treubia 6, 193—194)
♂? Holotypus, Pangrango, 2400 m, 8. 1921, leg. DAMMERMAN, im DEI.
dammermani CAMERON, 1925 (*Pelioptera*)
(Treubia 6, 196)
4 Syntypen, Java, Tjibodas, 1400 m, leg. DAMMERMAN.
DEI: 1 ♂ Syntypus, Tjibodas, 1400 m, 28. 5. 1922, leg. DAMMERMAN.
- decipiens* KRAATZ, 1859 (*Scopaeus*)
(Arch. Nat. 25, 131)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 7 Syntypen, Ceylon.
decipiens KRAATZ, 1859 (*Staphylinus*)
(Arch. Nat. 25, 75—76)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 2 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- deformis* KRAATZ, 1856 (*Homalota*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 244)
Syntypen, Deutschland, ohne nähere Angaben.
DEI: 1 Syntypus, Crefeld.
- deinekini* ROUBAL, 1913 (*Lathrimaeum*)
(Kosmos (Lemberg) 38, 479—480)
Zahlreiche Syntypen, Nordkaukasus, am Gebirgsfluß Teberda, 6. 1912, leg. ROUBAL.
DEI: 9 Syntypen, ca. bei Teberda, 6. 1912, leg. ROUBAL.
- delicatulus* KRAATZ, 1857 (*Thinobius*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 884 nota)
Holotypus, Beaujolais, im DEI.
densepunctatus BENICK, 1938 (*Stenus*)
(Mitt. Münch. Ent. Ges. 28, 278)
Syntypen; 1 ♂, Nicaragua, Managua, leg. SOLARI; 5 ♂♂, 2 ♀♀, Costa Rica, San José, 1000—1200 m, 15. 9. 1930, 13. 10. 1932 und 20. 1. 1933, leg. NEVERMANN; 1 ♀, Curridabat, Rio Tiribi, 7. 6. 1925; 1 ♀, Mexico, Tapachula, leg. FLOHR. Genaue Beschreibung und genaue Angaben der Typenfundorte in Mitt. Münch. Ent. Ges. 29, 630—631; 1939.
DEI: 1 Syntypus, Costa Rica, San José, 1000—1200 m, 20. 1. 1933, leg. NEVERMANN.
- densus* BERNHAUER, 1922 (*Holosus*)
(Arch. Nat. 88 A 7, 221—222)
Syntypen, Formosa; 1 Ex., Taihorin, 1 Ex., Kosempo, leg. SAUTER; 1 Ex., im DEI, 1 Ex., in Sammlung BERNHAUER.
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Taihorin, 7. 1911, leg. SAUTER.
- dentifera* BRUNDIN, 1942 (*Atheta*)
(Ann. Nat. Hist. Mus. Wien 53, Teil 2, 206, Fig. 56, 88, 89, 90)
♂ Holotypus, 2 ♂♂, 4 ♀♀ Paratypen, Dänemark, Seeland, Damhusmosen bei Kopenhagen, leg. JOHANSEN, im Mus. Kopenhagen; 2 ♀♀, dto., leg. WEST; 1 ♀, Hilleröd, leg. JOHANSEN; 1 ♂, Schweden; 1 ♀, Sk. Bökebergsslätt, leg. LOHMÄNDER; 1 ♂, Deutschland; 1 ♂, 1 ♀, Brandenburg, Finkenkrug; 1 ♂, 2 ♀♀, Wildpark Golm; 1 ♀, Magdeburg; 1 ♂, 3 ♀♀, Sachsen, Umg. Leipzig-Kühnau; 1 ♂, 1 ♀, Modelwitz; 2 ♂♂, Schkeuditz, alle leg. LINKE; 1 ♀, Böhmen, Prag, leg. SKALITZKY; 1 ♀, Mähren, Proßnitz, leg. ZOUFAL; 1 ♂, Niederdonau, Neusiedlersee.
DEI: 1 ♂, 2 ♀♀ Paratypen, Mark, Wildpark — Golm.
depressus KRAATZ, 1859 (*Pinophilus*)
(Arch. Nat. 25, 157—158)
Holotypus, India boreali, BACON, im DEI.
Nach Ansicht von BERNHAUER vielleicht Type von *planus*, Fundort von *planus* ist aber India orientalis.
deubeli GANGLBAUER, 1896 (*Niphetodes*)
(Ann. Nat. Hofmus. Wien 11, 178—179)
Zahlreiche Syntypen, Siebenbürgen, Gipfel des Kuhhorns (Ineu), aus Grasbüscheln, leg. DEUBEL und GANGLBAUER; 2 Syntypen, Siebenbürgen, Bucsecs, leg. DEUBEL; 15 Ex. in Mus. Wien.
DEI: 1 Syntypus, Bucsecs bei Kronstadt, Transs.
dieckmanni SMETANA, 1957 (*Gabrius*)
(Ent. Bl. 53, 70—72)
♂ Holotypus, 3 ♂♂, 6 ♀♀ Paratypen, Deutschland, Thüringen, Salzstolle bei Esperstedt — Frankenhausen (Kyffhäuser), 30. 3. 1956, leg. DIECKMANN. Holotypus und Paratypen in Sammlung SMETANA, Paratypen in Sammlung DIECKMANN.
DEI: 1 ♂, 3 ♀♀ Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung, 1 ♀, 17. 8. 1954.
- dilaticornis* KRAATZ, 1856 (*Homalota*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 293—294)
Syntypen, Steiermark, leg. KAHR.
DEI: 1 Syntypus, Styria, leg. KAHR.
- dilutum* BERNHAUER, 1922 (*Leucocraspedum*)
(Arch. Nat. 88 A 7, 236)
Syntypen, Formosa, Shis und Kosempo, leg. SAUTER.
DEI: 3 Syntypen, Formosa, Shis A 56, 5.—6. 1912, leg. SAUTER; 1 Syntypus, Formosa, Kosempo, 22. 5. 1912, leg. SAUTER.
- dilutus* L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Edaphus*)
(Horae Soc. Ent. Ross. 21, 109—110)
Syntypen, Sumatra.
DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♂ Paralectotypus, Sumatra, Tabak, von PUTZ (Philippia 2, 87; 1974) festgelegt.
discalis FAUVEL, 1895 (*Stillicoderus*)
(Rev. d'Ent. 14, 225)
Syntypen, Birma, Carin Asciiui Ghécu, 1400—1500 m, 3.—4., leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
discipennis MULSANT & REY, 1853 (*Aleochara*)
(Opusc. Ent. 2, 61—62)
3 ♀ Syntypen, Lyon, Beaujolais.
DEI: 1 Syntypus, Lyon.
distigma KRAATZ, 1859 (*Conosoma*)
(Arch. Nat. 25, 61—62)
Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 1 Syntypus, Ost-Indien.

- divisus* SCHUBERT, 1911 (*Bolitobius*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1911, 35–36)
Holotypus, Chile, Concepcion.
DEI: Holotypus, Chile, Concepc., an Pilzen, leg. HERBST.
- dodopora* THOMSON, 1867 (*Atheta*)
(Skandinaviens Coleoptera 9, 283–284)
Syntypen, Schweden, Stehag in Skåne.
DEI: 1 Syntypus, Succia.
- drakei* BERNHAUER, 1908 (*Pinophilus*)
(Arch. Nat. 74, 305)
Syntypen, Paraguay, leg. DRAKE.
DEI: 2 Syntypen, Paraguay, DRAKE.
- dubia* KRAATZ, 1859 (*Homalota*)
(Arch. Nat. 25, 37)
Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.
dubia FENYES, 1914 (*Schistogenia* ?)
(Arch. Nat. 80 A 2, 48)
1 Ex., Formosa, Shis; 1 Ex., Formosa, Kosempo; leg. SAUTER. Holotypus det. Nr. 4386, 1 Paratypus, im DEI.
DEI: Holotypus, Formosa, Shis A 56, 5.–6. 1912, leg. SAUTER; 1 Paratypus, Kosempo, Formosa, 22. 5. 1912, leg. SAUTER.
- dubiosa* BENICK, 1935 (*Atheta*)
(Ent. Bl. 31, 29–31)
♂ Holotypus, Umgebung des Wirmsees, 16. 5. 1931, leg. STÖCKLEIN; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.
DEI: 1 Paratypus, Bosnia, Prozor, 1902, leg. LEONHARD.
- dubium* BERNHAUER, 1940 (*Conosoma*)
(Arb. morph. tax. Ent. 7, 158–159)
Syntypen, Costa Rica, La Caja 8 km westlich von San José, 1930, leg. SCHMIDT, im DEI und in Sammlung BERNHAUER.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- dubius* KRAATZ, 1859 (*Paederus*)
(Arch. Nat. 25, 151)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 5 Syntypen, Ceylon.
- dudu* EICHELBAUM, 1913 (*Myrmedonia*)
(Arch. Nat. 79 A 3, 153)
12 Syntypen, Ostafrika, Amani, 7.–11. 1903, leg. EICHELBAUM.
DEI: 1 Syntypus, Amani, 7.–11. 03, leg. EICHELBAUM.
- ecitonis* WASMANN, 1913 (*Mimonilla*)
(Ent. Mitt. 2, 377–378, 380)
2 Syntypen, Rio Itabapoa, E. Esp., S. Brasil., B. J. Januar/Februar 1906, leg. ZIKAN.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- egregia* APFELBECK, 1906 (*Aleochara*)
(Glasn. Zem. Muz. Bosn. Herceg. 17, 242–243)
Syntypen, Hercegovina; Crna Gora; Albanien.
DEI: 2 Syntypen, Hercegov., Utovo — bl., 1902, leg. APFELBECK.
- eichhoffi* SCRIBA, 1867 (*Atheta*)
(Berl. Ent. Ztschr. 11, 390)
♂♀ Syntypen, Jülich, im Anspüllicht, leg. EICHHOFF.
DEI: 1 ♂ Syntypus, Jülich.
- eichhoffi* SCRIBA, 1867 (*Homalota*)
(Berl. Ent. Ztschr. 11, 390)
Syntypen, Jülich, leg. EICHHOFF.
DEI: 1 Syntypus, Jülich.
- elatus* FAUVEL, 1904 (*Platyprosopus*)
(Rev. d'Ent. 23, 70)
[nom. nov. pro *P. indicus* KRAATZ, Arch. Nat. 25, 114; 1859]
Syntypen, Nord-Indien, leg. BACON.
DEI: 2 Syntypen, India or., leg. BACON (Etikettierungs- oder Druckfehler ?).
- elegans* KRAATZ, 1859 (*Cephalochetus*)
(Arch. Nat. 25, 123–124)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 7 Syntypen, Ceylon.
- elegans* BAUDI, 1857 (*Falagria*)
(Berl. Ent. Ztschr. 1, 97)
Syntypen, Cypern, leg. TRUQUI.
DEI: 1 Syntypus, Cypern.
- elegans* KRAATZ, 1857 (*Omalium*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 989–990)
Holotypus, Schlesien, Grafschaft Glaz, im DEI.
- elegantissimus* CAMERON, 1925 (*Philonthus*)
(Treubia 6, 186)
6 Syntypen, Java, Tjibodas, 1400 m, 8. 1921, leg. DAMMERMAN.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- elegantulus* KRAATZ, 1857 (*Compsochilus*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 896–897 nota)
Syntypen, Creta, leg. ZEBE.
DEI: 2 Syntypen, Creta, leg. ZEBE.
- elongata* KRAATZ, 1853, (*Myllaena*)
(Stett. Ent. Ztg. 14, 373)
Syntypen, Saxonia.
DEI: 1 Syntypus, Lipsia.
- elongatula balcanica* BRUNDIN, 1942 (*Atheta*)
(Ann. Nat. Hist. Mus. Wien 53, Teil 2, 230–232, Fig. 106)
Holotypus, Neusiedlersee-Gebiet, leg. WINKLER, in Sammlung BRUNDIN; zahlreiche Paratypen aus Deutschland, Banat, Frankreich und Kleinasien, siehe Originalbeschreibung.
DEI: 1 Paratypus, Banat, Herkulesbad, 1909, leg. HILF; 2 Paratypen, Zante, Kalamaki, 1909, leg. HILF; 1 Paratypus, Makien Pass, aus coll. LEONHARD.

- elongatula cretica* BRUNDIN, 1942 (*Atheta*)
(Ann. Nat. Hist. Mus. Wien 53, Teil 2, 232–233, Fig. 107)
♂ Holotypus, 1 ♂ Paratypus, Kreta, leg. PAGANETTI; Holotypus in Sammlung BRUNDIN, Paratypus im Mus. Wien.
DEI: 1 Paratypus, Kreta, leg. PAGANETTI.
- epfelsheimi* GANGLBAUER, 1896 (*Niphedodes*)
(Ann. Nat. Hofmus. Wien 11, 178)
16 Syntypen, Rodnaer Alpen, Gipfel des Koronjis, leg. GANGLBAUER & DEUBEL, 9 Ex. im Mus. Wien.
DEI: 1 Syntypus, Rodnaer-Gb., leg. DEUBEL.
- epfelsheimii* KRAATZ, 1895 (*Pygostenus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1895, 142)
♂ Holotypus, Togo, leg. CONRADT, im DEI.
- erythropterus* KRAATZ, 1857 (*Bledius*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 831–832)
Holotypus, Bayrische Alpen, leg. WATTL, im DEI.
- erythropus* KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)
(Arch. Nat. 25, 88–89)
Syntypen; Ceylon, leg. NIETNER; Nord- und Süd-Indien, leg. BACON.
DEI: 6 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- erythrostickus* KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)
(Arch. Nat. 25, 94–95)
Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 7 Syntypen, Ostindien.
- erythrurum* ROTTENBERG, 1870 (*Lathrobium*)
(Berl. Ent. Ztschr. 14, 31–32)
Zahlreiche Syntypen, Sizilien, Catania, 26. 2.–5. 4. 1869 und Palermo, 7. 12. 1868–20. 2. 1869; leg. ROTTENBERG.
DEI: 3 Syntypen, Palermo; 5 Syntypen, Catania; leg. ROTTENBERG.
- erythrurus* KRAATZ, 1858 (*Cyrtothorax*)
(Berl. Ent. Ztschr. 2, 368)
Holotypus, Nova Granada, im DEI.
- eustilbus* KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)
(Arch. Nat. 25, 98–99)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 3 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- exasperata* KRAATZ, 1859 (*Homalota*)
(Arch. Nat. 25, 32–33)
2 ♂♂ Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 1 Syntypus, Ceylon, leg. NIETNER.
- exasperatus* KRAATZ, 1859 (*Oxytelus*)
(Arch. Nat. 25, 175)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: ♂ Lectotypus, 4 ♂♂, 2 ♀♀ Paralectotypen, Ceylon, von HAMMOND festgelegt.
- excellens* KRAATZ, 1856 (*Homalota*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 235–236)
Syntypen; 1 Ex., Harz, Brocken, unter einem Stein; einige Ex., Schlesien, in Pilzen; 1 ♀, bei Berlin, in einem mit Pilzen bedeckten Baumstumpf; alle leg. KRAATZ; Thüringen; Bayern und Österreich.
DEI: 2 Syntypen, Berlin; 1 Syntypus, Thüringen; 1 Syntypus, Bavia; der Syntypus vom Brocken ist verloren gegangen.
- excisa* KRAATZ, 1857 (*Myrmedonia*)
(Linnaea 11, 50–51)
Syntypen, Ceylon, Termitehügel bei Colombo, 1855, leg. NIETNER.
DEI: 14 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- exigua* BENICK, 1943 (*Atheta*)
(Ent. Bl. 39, 66–67)
♀ Holotypus, Sicilien, Ficuzza, aus Sammlung LEONHARD, im DEI. Entgegen den Angaben in der Originalbeschreibung befindet sich im DEI noch ein 2. Exemplar vom selben Fundort und vom Autor auch als Typus ausgezeichnet.
- exigua* KRAATZ, 1859 (*Homalota*)
(Arch. Nat. 25, 36)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 4 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- exiguus* KRAATZ, 1859 (*Metoponcus*)
(Arch. Nat. 25, 108–109)
Holotypus, Ost-Indien, leg. HELFER, im DEI.
- exilis* KRAATZ, 1851 (*Philonthus*)
(Stett. Ent. Ztg. 12, 293–294)
Mehrere Syntypen, Berlin, Ananas-Haus des Prinzen ALBRECHT, leg. GRIMM; 1 Syntypus, Berlin, Nähe des botanischen Gartens, leg. WEIDENHASE.
DEI: 1 Syntypus, Berol., GRIMM; 2 Syntypen, Umgebung Berlin, GRIMM.
- eximia* EPPELSHEIM, 1883 (*Bolitochara*)
(Wien. Ent. Ztg. 2, 251–252)
Syntypen, Südungarn, bei Resicza, leg. MERKEL; bei Mahadia, leg. v. BODEMEYER.
DEI: 1 Syntypus, Mahadia.
- eximia* KRAATZ, 1856 (*Leptusa*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 67 nota)
Holotypus, Siebenbürgen, im DEI.
- explorator* FAUVEL, 1875 (*Stenus*)
(Faune gallo-rhén. III, 254–255)
Syntypen, Paris, Saint-Germain, leg. BRISOUT; Calvados, Plainville; Finistère, leg. DE LESÉLEUC; Limoges, Biscarosse, Hautes-Pyrénées, Vallée de Barousse, leg. PANDELLE.
DEI: 1 Syntypus, Paris.
- fairmairei* BERNHAUER, 1925 (*Calodera*)
(Arch. Nat. 91 A 12, 262–263)
Syntypen, Chile, leg. FAIRMAIRE, im DEI und coll. BERNHAUER.
DEI: 1 Syntypus, Chile, leg. FAIRMAIRE.
- fallaciosus* KRAATZ, 1862 (*Quedius*)
(Berl. Ent. Ztschr. 6, 268–269)
2 Syntypen, bei Berlin, leg. CALIX.
DEI: 2 Syntypen, German. bor., leg. CALIX.

fallax KRAATZ, 1856 (*Homalota*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 227–228)

Syntypen, Ufer des Mittelmeeres; Strand der Ostsee bei Misdroy, leg. HABELMANN.

DEI: 1 Syntypus, Italien, leg. SCHIÖDTE; 1 Syntypus, Misdroy, leg. HABELM.

fasciculatus SAHLBERG, 1870 (*Stenus*)

(Not. Fauna Flora Fennica 11, 341)

Syntypen; Süd-Finnland, See Yskjärvi bei Mohla, 11. 6.; Sortanlaks bei Pyhäjärvi, 23. 7.; Rautus, 12. 8.; Kexholm, Insel Konewits, Karelien, 1869.

DEI: 1 Syntypus, Carel., leg. SAHLBERG.

fasciipennis KRAATZ, 1859 (*Coproporus*)

(Arch. Nat. 25, 59–60)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 4 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

fasciventris FAUVEL, 1895 (*Anisolinus*)

(Rev. d'Ent. 14, 270–271)

Syntypen; Birma, Carin Cheba, 900–1100 m, 5.–12.; Bhamo, 4.; Teinzo, 5.; Pegou, Palon, 8.–9.; alle leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Palon (Pegù), 8.–9. 1887, leg. FEA.

fauveli BERNHAUER, 1902 (*Oxyopoda*)

(Verh. zool. bot. Ges. Wien 52 (Beiheft), 201)

Syntypen, Ostsibirien, Quellgebiet des Irkut, leg. LEDER.

DEI: 1 Syntypus, Quellgebiet des Irkut, leg. LEDER.

favosus LEA, 1906 (*Sunius*)

(Proc. Linn. Soc. N.S.W. 31, 199–200; Taf. 18, Fig. 3)

Syntypen, Australien, Queensland, Cairns, leg. HACKER.

DEI: 3 Syntypen, Mulgrave R., leg. HACKER.

feae FAUVEL, 1895 (*Eucibidulus*)

(Rev. d'Ent. 14, 247–248)

Syntypen, Birma, Carin Cheba, 900–1100 m, 5.–12., leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

feae FAUVEL, 1895 (*Eupiestus*)

(Rev. d'Ent. 14, 187–188)

Syntypen; Birma, Carin Cheba, 900–1100 m, 5.–12.; Tenasserim, Thagata, 4., leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Tenasserim, Thagata, 4. 1887, leg. FEA.

feae FAUVEL, 1895 (*Hesperus*)

(Rev. d'Ent. 14, 260–261)

Syntypen; Birma, Carin Cheba, 900–1100 m, 5.–12.; Carin Asciiui Ghécu, 1400–1500 m, 3.–4.; leg. FEA. Sikkim, Dajeeling, leg. CHRISTIE.

DEI: 1 Syntypus, Carin Asciiui Ghécu, 1400–1500 m, 3.–4. 1888, leg. FEA.

feae FAUVEL, 1895 (*Paederus*)

(Rev. d'Ent. 14, 232)

Syntypen; Birma, Senmigion, 2.; Katha, 4.; Teinzo, 5.; leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Teinzo, Birmania, 1886, leg. FEA, Maggio.

feae FAUVEL, 1895 (*Stilicoderus*)

(Rev. d'Ent. 14, 224–225)

Syntypen; Birma, Carin Ghécu, 1300–1400 m, 2.–3.; Carin Asciiui Ghécu, 1400–1500 m, 3.–4.; leg. FEA.

DEI: 3 Syntypen, Birma, Carin Asciiui Ghécu, 1400–1500 m, 3.–4. 1888, leg. FEA.

feae FAUVEL, 1895 (*Xantholinus*)

(Rev. d'Ent. 14, 242–243)

Syntypen, Birma, Carin Cheba, 900–1100 m, 5.–12. 1888, leg. FEA.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

femoratus SCHUBERT, 1911 (*Pinophilus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 1911, 8–9)

♂ Holotypus, China, Pingshiang, leg. KREYENBERG, im DEI.

femoratus L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Tamotus*)

(Nunquam otiosus 2, 289)

Holotypus, Cuba, leg. GUNDLACH, im DEI.

fenstratus FAUVEL, 1895 (*Stilicoderus*)

(Rev. d'Ent. 14, 225–226)

Syntypen, Birma, Carin Asciiui Ghécu, 1400–1500 m, 3.–4., leg. FEA.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

ferruginea CAMERON, 1925 (*Eusteniamorpha*)

(Treubia 6, 189–190)

3 Syntypen, Ostindien, Tjibodas, 1400 m, 24. 5. 1921.

DEI: 1 Syntypus, Tjibodas, 1400 m.

ferruginea CAMERON, 1928 (*Masuria*)

(Ent. Monthly Mag. 64, 52)

Syntypen; N. Indien, Mussorie, Mossy Falls; Chakrata, Khedar Khud; Simla Hills, Gahan, 7000–8000 Fuß.

DEI: 1 Syntypus, Chakrata Dist., Khedar Khud, 7500 Fuß, 7. 5. 1922, leg. CAMERON.

ferrugineum KRAATZ, 1857 (*Omalium*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 980–981)

Syntypen, Harz, Brocken, leg. KRAATZ.

DEI: 2 Syntypen, Brocken.

ferrugineus KRAATZ, 1859 (*Oxytelus*)

(Arch. Nat. 25, 173)

Syntypen; Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. HELFER.

DEI: 3 Lectotypus, 4 Paralectotypen, Ceylon; 3 Paralectotypen, India or., von HAMMOND festgelegt.

filum KRAATZ, 1862 (*Aleochara*)

(Berl. Ent. Ztschr. 6, 318–319)

Syntypen; 1 Ex., Österreich; 1 Ex., Bozen, leg. GREGLER; 1 Ex., Mühlhausen, leg. KELLNER.

DEI: 1 Syntypus, Bozen, Mai–Juni.

filum KRAATZ, 1859 (*Cryptobium*)

(Arch. Nat. 25, 119–120)

Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.

- filum* KRAATZ, 1859 (*Leptacinus*)
(Arch. Nat. 25, 111 - 112)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 7 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- finorum* BRISOUT, 1860 (*Homalota*)
(Ann. Soc. Ent. France III. 8, 343 - 344)
Syntypen, Frankreich, Saint-Germain, an Hirschlosung, Kadavern und Pilzen.
DEI: 1 Syntypus, Paris, Bris.
- flava* KRAATZ, 1856 (*Homalota*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 327 - 328)
Syntypen, Süddeutschland, ohne nähere Fundortangaben.
DEI: 1 Syntypus, Graetz; 4 Syntypen, Tirol.
- flava* KRAATZ, 1856 (*Oxyptoda*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 175 - 176)
Syntypen, Österreich.
DEI: 1 Syntypus, Österreich.
- flavicornis* KRAATZ, 1859 (*Coproporus*)
(Arch. Nat. 25, 56 - 57)
Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 1 Syntypus, V. Indien (Etikettierungs- oder Druckfehler?).
- flavicornis* FAUVEL, 1895 (*Neobisnius*)
(Rev. d'Ent. 14, 261)
Syntypen, Birmania, Carin Asciiui Ghécu, 1400 - 1500 m, 3. - 4., leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- flavicornis* KRAATZ, 1856 (*Oxyptoda*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 185 - 186)
Syntypen, Deutschland, Brieselanger Forst, unter feuchtem Laub in Sandgräben, leg. WAGENSCHIEBER.
DEI: 3 Syntypen, Berlin.
- flavipennis* KRAATZ, 1859 (*Leptacinus*)
(Arch. Nat. 25, 111)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: Lectotypus, 7 Paralectotypen, Ceylon, leg. NIETNER, von SMETANA festgelegt.
- flavipennis* KRAATZ, 1859 (*Oxytelus*)
(Arch. Nat. 25, 172 - 173)
Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 3 Lectotypus, India or., von HAMMOND (Syst. Ent. 1, 27 - 28; 1976) festgelegt.
- flavipes* KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)
(Arch. Nat. 25, 88)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 4 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- flavocincta* KRAATZ, 1859 (*Falagria*)
(Arch. Nat. 25, 4 - 5)
Syntypen; Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 11 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER; 3 Syntypen, Ind. post., leg. HELFER.
- flavus* KRAATZ, 1859 (*Sumius*)
(Arch. Nat. 25, 149)
Holotypus, ohne Fundortangabe.
DEI: Holotypus, India or.
- flaviatilis* KRAATZ, 1854 (*Homalota*)
(Stett. Ent. Ztg. 15, 124)
6 Syntypen, Ufer der Ahr.
DEI: 3 Syntypen, Ahrweiler.
- foetidus* CAMERON, 1930 (*Oxytelus*)
(Fauna Brit. Ind. Col. Staph. 1, 230)
Syntypen; United Provinces, Dehra Dun, leg. CAMERON; Bihar, Ranchi; Ceylon, Dikoya, leg. LEWIS.
DEI: 3 Paralectotypen, Dehra Dun, 30. 9. 1922, leg. CAMERON, von HAMMOND festgelegt.
- fontinalis* KIESENWETTER, 1850 (*Lesteva*)
(Stett. Ent. Ztg. 11, 222)
Syntypen, Catalonien, Montserrat.
DEI: 1 Syntypus, Mt. Serrat.
- formosa* KRAATZ, 1856 (*Oxyptoda*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 176 - 177)
Syntypen, mittleres und südliches Deutschland.
DEI: 1 Syntypus, Germ. mer.
- formosae* BERNHAUER, 1922 (*Bledius*)
(Arch. Nat. 88 A 7, 223)
Syntypen, Formosa, Anping und Suisharyo, leg. SAUTER.
DEI: 14 Syntypen, Formosa, Anping, 5. - 7. 1911; 1 Syntypus, Formosa, Taihorin, 7. 12. 1911; alle leg. SAUTER.
- formosae* BERNHAUER, 1922 (*Dibelonetes*)
(Arch. Nat. 88 A 7, 228 - 229)
Syntypen, Formosa, Anping und Tainan, leg. SAUTER.
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Anping, 7. 1911, leg. SAUTER; 1 Syntypus, Formosa, Tainan, 8. 1911, leg. SAUTER.
- formosae* BERNHAUER, 1922 (*Oligota*)
(Arch. Nat. 88 A 7, 237)
Syntypen; Formosa, Takau, in Coll. BERNHAUER; 1 Ex., Formosa, Akau, leg. SAUTER, im DEI.
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Akau, 12. 1907, leg. SAUTER.
- formosae* BERNHAUER, 1922 (*Osorius*)
(Arch. Nat. 88 A 7, 226)
Syntypen, Formosa, Suisharyo und Kosempo, leg. SAUTER.
DEI: 1 Syntypus, Suisharyo, Formosa, 10. 1911, leg. SAUTER.
- formosae* BERNHAUER, 1922 (*Philonthus*)
(Arch. Nat. 88 A 7, 232 - 233)
Syntypen, Formosa, Kankau, Pilam und Alikang, leg. SAUTER.
DEI: 2 Syntypen, Kankau (Koshun), Formosa, 7. 1909, leg. SAUTER; 2 Syntypen, Pilam, Formosa, 1908, leg. SAUTER.

- formosanus* BERNHAUER, 1922 (*Coproporus*)
(Arch. Nat. 88 A 7, 235)
Syntypen, Formosa, Taihorin, leg. SAUTER.
DEI: 4 Syntypen, Formosa, Taihorin, 22. 7. 1911, leg. SAUTER.
- formosanus* BENICK, 1914 (*Stenus*)
(Ent. Mitt. 3, 285–287)
Holotypus, Formosa, Tainan, 1912, leg. SAUTER, im DEI.
fortepunctata EICHELBAUM, 1913 (*Pronomaea*)
(Arch. Nat. 79 A 3, 135)
4 Syntypen, Ost-Afrika, Amani, 7.–9. 1903, leg. EICHELBAUM.
DEI: 1 Syntypus, Amani, 7.–9. 1903, leg. EICHELBAUM.
forticornis KRAATZ, 1853 (*Myllaena*)
(Stett. Ent. Ztg. 14, 373)
Holotypus, Bonn, im DEI.
fossigerum KRAATZ, 1859 (*Cryptobium*)
(Arch. Nat. 25, 120–121)
Syntypen; Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 4 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER; 1 Syntypus, Ostindien.
foveicollis KRAATZ, 1856 (*Homalota*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 296)
Syntypen, Sächsische Schweiz, leg. MÄRKEL.
DEI: 4 Syntypen, Saxonia.
foveicollis KRAATZ, 1859 (*Trogophloeus*)
(Arch. Nat. 25, 180)
Syntypen; Ost-Indien, leg. HELFER; Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 8 Syntypen, Ceylon; 4 Syntypen, India or.
fragilicornis KRAATZ, 1858 (*Homalota*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 202)
2 Syntypen, Ahrufer, leg. KRAATZ.
DEI: 1 Syntypus, Ahrweiler.
fragilis KRAATZ, 1854 (*Homalota*)
(Stett. Ent. Ztg. 15, 125)
Mehrere Syntypen, Ufer der Ahr.
DEI: 3 Syntypen, Ahrweiler.
frater KRAATZ, 1857 (*Bledius*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 827 nota)
Syntypen, bei Nizza, am Ufer des Var, leg. SCHAUM.
DEI: 6 Syntypen, Nizza, leg. SCHAUM.
frater SMETANA, 1965 (*Ocyopus*)
(Reichenbachia 5, 31–33)
♂ Holotypus, 4 Paratypen, Anatolia bor., Abant-Geb., 1100–1500 m, 8. 8. 63, leg. HEINZ, in Sammlung SMETANA;
3 Ex., vom selben Fundort, leg. KORGE; 34 Ex., Abant-Geb., bei Bolu, 30. 5. 1964, leg. KORGE, in Sammlung KORGE; 2 Ex.,
Kulakkaya bei Giresun, 1450 m, 27. 7. 63, leg. HEINZ, in Sammlung SMETANA.
DEI: 2 Paratypen, Abant-Geb., bei Bolu, As.min., 30. 5. 64, leg. KORGE.
fraternus BERNHAUER, 1922 (*Platyprosopus*)
(Arch. Nat. 88 A 10, 150)
Syntypen, Kambodja.
DEI: 5 Syntypen, Kambodja, FRIEDERICHS.
frigidum SAHLBERG, 1880 (*Deliphrum*)
(Sv. Vet. Akad. Handl. N. F. 17 (1879) Nr. 4, 108)
Syntypen, Sibirien, Tolstoinos, 2.–6. 9., in Mus. Helsingfors und in den Sammlungen FAUVEL, HAGLUND, EPPELSHEIM,
KRAATZ und SAHLBERG.
DEI: 1 Syntypus, Tolstoinos.
frontalis FAGEL, 1958 (*Paederus*)
(Explor. Parc Nat. Upemba Miss. DE WITTE, fasc. 51, 415–417, Fig. 319, 346, 347, 356, 359)
♂ Holotypus, ♀ Paratypus, Kwai Usambara, im Inst. royal Sci. nat. Belgique. Paratypen, vom selben Fundort, 1 ♀, im
DEI, 1 ♂, im Mus. Berlin, 1 ♂, 1 ♀, Usambara Mts, Mkusi, 8. 1950, leg. VERCOURT in Coll. LAST.
DEI: 1 ♀ Paratypus, Usambara.
frosti BERNHAUER, 1928 (*Anthobium*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1928, 40)
Syntypen, Massachusetts, Monterey, 22. 7., leg. FROST, im DEI und in Sammlung BERNHAUER.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
fuchsii KRAATZ, 1857 (*Philoterme*)
(Linnaea 11, 15)
Syntypen, Tennessee, leg. MÄRKEL.
DEI: 1 Syntypus, Tennessee, MÄRKEL.
fucicola KRAATZ, 1857 (*Omalium*)
(Stett. Ent. Ztg. 18, 286)
Mehrere Syntypen, Island, Reykjavik, am Seestrande unter faulenden *Fucus*-Arten.
DEI: 1 Syntypus, Island, leg. STAUDINGER.
fulvofasciata BENICK, 1940 (*Megalopsidia*)
(Arb. morph. tax. Ent. 7, 328–330)
♂ Holotypus, Venezuela, Caracas, im DEI.
fumatum KOCH, 1937 (*Achenium*)
(Pubb. Mus. ent. PIETRO ROSSI 2, 129)
Syntypen, Adana, leg. WINKLER, im Mus. ent. Duino; 1 Syntypus, Turcia, leg. BAUDI, im DEI.
DEI: 1 Syntypus, Adana, Asm. 5. 1934, leg. NEUBERT; 1 Syntypus, Turcia, BAUDI.
funebri KRAATZ, 1856 (*Oxyopoda*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 166–167)
Syntypen, Grafschaft Glatz, unter feuchtem Laub und Moos, leg. ZEBE und KRAATZ.
DEI: 1 Syntypus, Schlesien.
fungivora THOMSON, 1867 (*Bessobia*)
(Skandinaviens Coleoptera 9, 260–261)
Syntypen, Schweden, Dahlby bei Lund.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundortangaben.

- fusciceps*** KRAATZ, 1859 (*Isomalus*)
(Arch. Nat. 25, 184)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 2 Syntypen, Ceylon.
- fuscipennis*** KRAATZ, 1859 (*Hoplandria*)
(Arch. Nat. 25, 9–10)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 5 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- fuscipennis*** KRAATZ, 1859 (*Lithocharis*)
(Arch. Nat. 25, 138–139)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 9 Syntypen, Ceylon.
- fuscotestaceus*** CAMERON, 1924 (*Proteinus*)
(Trans. Ent. Soc. London 1924, 162)
Syntypen, Indien, Dehra Dun. U. P.
DEI: 3 Syntypen, Dehra Dun., 4. 3. 1922, leg. CAMERON.
- fuscus*** KRAATZ, 1859 (*Tanygnathus*)
(Arch. Nat. 25, 65)
Holotypus, Ost-Indien, leg. HELFER, im DEI.
- fussii*** KRAATZ, 1859 (*Myrmedonia*)
(Berl. Ent. Ztschr. 3, 53–54)
Holotypus, Rheinland, bei Düsseldorf oder Ahrweiler, leg. FUSS.
DEI: Holotypus, Rheinland, Ahrweiler, leg. FUSS.
- ganglbaueri*** APFELBECK, 1907 (*Leptusa*)
(Sitz. Ber. Akad. Wiss. Wien 116, Abt. 1, 507–508)
Syntypen, Albanien, Merdita, Bulshari bei Oroshi und Munela-Gebirge bei Fandi, unter Eichenlaub, leg. LATIF, 1905 und WINNEGUTH, 1906.
DEI: 2 Syntypen, Merdita, Munela, 1906, leg. WINNEGUTH; 1 Syntypus, Merdita, Bulshari.
- ganglbaueri*** EFFELSHEIM, 1887 (*Leptusa*)
(Wien. Ent. Ztg. 6, 230–231)
Syntypen, Niederösterreich, bei Kirchberg am Wechsel, leg. GANGLBAUER.
DEI: 1 Syntypus, Wechsel, 1884, leg. GGLB.
- garreisi*** BERNHAUER, 1914 (*Thimobius*)
(Münch. Kol. Ztschr. 4, 34)
Mehrere Syntypen, Istrien, Lagunen des Seebades Grado, im feuchten Schlamm, leg. BERNHAUER.
DEI: 2 Syntypen, Grado, leg. BERNHAUER.
- gemellus*** KRAATZ, 1857 (*Paederus*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 731–732)
Syntypen; Wien, leg. Graf von FERRARI; Rauden, leg. ROGER; Schweiz, leg. STIERLIN.
DEI: 4 Syntypen, Austr.
- gemellus*** KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)
(Arch. Nat. 25, 91–92)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 7 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- gemina*** KRAATZ, 1859 (*Myrmedonia*)
(Arch. Nat. 25, 27)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 3 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- geminum*** KRAATZ, 1857 (*Lathrobium*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 673–674)
♂ Holotypus, ohne Fundortangabe.
DEI: Holotypus, Germ.
- geminus*** KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)
(Arch. Nat. 25, 87–88)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 4 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- gemmatus*** FAUVEL, 1895 (*Staxphytinus*)
(Rev. d'Ent. 14, 251–252)
Syntypen, Birma, Carin Cheba, 900–1100 m, 5.–12., leg. FEA.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
- genalis*** FAUVEL, 1895 (*Pinophilus*)
(Rev. d'Ent. 14, 219)
Syntypen; Birma, Bhamo, 8.; Schwego-myo, 10.; Pegou, Palon, 8.–9.; leg. FEA. Siam, Bangkok, leg. DE CASTELNAU. Cambodia, Pnom-Penh; Cochinchine, Mytho, leg. DELAUNEY.
DEI: 1 Syntypus, Birmania, Shwego-myo, 10. 1885, leg. FEA.
- gerhardti*** BENICK, 1915 (*Stenus*)
(Ent. Mitt. 4, 233–234)
Syntypen, Schlesien, Malsch bei Liegnitz, leg. KOLBE.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
- germana*** CAMERON, 1925 (*Pelioptera*)
(Treubia 6, 196–197)
Holotypus, Prinsen Eiland; Paratypen, Tjibodas, Batavia. Die Typenserie besteht aus 7 Ex., aus der Beschreibung ist nicht ersichtlich, wieviel Exemplare von den beiden Fundorten vorlagen.
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Prinsen Eil., 20. 1. 1922, leg. DAMMERMAN.
- gestroi*** FAUVEL, 1895 (*Stenus*)
(Rev. d'Ent. 14, 212)
Syntypen; Birma, Carin Cheba, 500–1000 m, 12.; Carin Asciiui Cheba, 1200–1300 m, 1.; Carin Ghécu, 1300–1400 m, 2.–3.; alle leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Carin Cheba, 500–1000 m, 12. 1887; 1 Syntypus, Asciiui Cheba, Carin, 1. 1888, leg. FEA.
- gestroi*** FAUVEL, 1895 (*Xantholinus*)
(Rev. d'Ent. 14, 243)
Syntypen; Birma, Carin Cheba, 900–1100 m, 5.–12.; Carin Ghecu, 1300–1400 m, 5.; Carin Asciiui Ghecu, 1400–1500 m, 3.–4.; alle leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Carin Ghecu, 1300–1400 m. 5. 1888, leg. FEA.

- geysiri** SCHUBERT, 1909 (*Atheta*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1909, 774)
Syntypen, Island, 1905.
DEI: 2 Syntypen, Island, Geysir, 1905.
- ghilianii** KRAATZ, 1857 (*Philonthus*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 574 nota)
Syntypen, Piemonteser Alpen, leg. GHILLIANI.
DEI: 3 Syntypen, Piemont, leg. GHILLIANI.
- gigantulus** BERNHAUER, 1922 (*Bledius*)
(Arch. Nat. 88 A7, 224)
Syntypen, Formosa, Anping, Taihorin und Suisharyo, leg. SAUTER.
DEI: 9 Syntypen Formosa, Anping, 1911; 4 Syntypen, Formosa, Suisharyo, 12. 1911; alle leg. SAUTER.
- ginyinensis** BERNHAUER, 1935 (*Oxytelus*)
(Ent. Nachrichtenbl. 9, 5)
Syntypen, China, Tempelberg, 900 m, Ginyün b. Bébé, leg. REITTER.
DEI: 1 Paralectotypus, mit den Angaben der Beschreibung, von HAMMOND festgelegt.
- glaber** KRAATZ, 1859 (*Hypocyptus*)
(Arch. Nat. 25, 53)
Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER.
- glabricollis** BERNHAUER, 1940 (*Atheta*)
(Arb. morph. tax. Ent. 7, 161)
Syntypen, Costa Rica, La Caja, 8 km n. von San José, 1934, leg. SCHMIDT, im DEI und in Sammlung BERNHAUER.
DEI: 3 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
- globicollis** BERNHAUER, 1934 (*Tinotus*)
(Ent. Nachrichtenbl. 8, 19–20)
Syntypen; China, Mittel-Szechuan, Hwa-Yin-Shan, 1600 m, leg. REITTER; Madura, Chambaganoor, leg. DONCKIER; Philippinen, Los Banos, Imugan auf der Insel Luzon; Bacuit auf der Insel Palawan.
DEI: 2 Syntypen, Mittelszechuan, Hwa-Yin-Shan, 1600 m, leg. REITTER.
- globulus** CAMERON, 1918 (*Mimocyclus*)
(Trans. Ent. Soc. London 1918, 241–242)
Syntypen, Singapore, Keppel Harbour.
DEI: 1 Syntypus, Keppel Harbour, Singapore, Debris, CAMERON.
- gracile** KRAATZ, 1859 (*Conosoma*)
(Arch. Nat. 25, 62)
Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.
- gracilentum** KRAATZ, 1859 (*Lathrobium*)
(Arch. Nat. 25, 115–116)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 5 Syntypen, Ceylon.
- gracilentus** SCHEERPELTZ, 1953 (*Oligolinus*)
(Beitr. Ent. 3, 603–604)
Holotypus, Guatemala, Calé, 11. 4. 1951; 3 Paratypen, Guatemala, Chocoyos, 19. 5. 1951, leg. BECKER; Holotypus, in Sammlung SCHEERPELTZ, 1 Paratypus, im DEI.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- gracilentus** CAMERON, 1925 (*Philonthus*)
(Treubia 6, 186–187)
7 Syntypen, Java, Tjibodas, 1400 m, 8. 1921; 5. 1922, leg. DAMMERMAN.
DEI: 2 Syntypen, Java, Tjibodas, 1400 m, 1 Ex., 8. 1921, 1 Ex., 23. 5. 1922, leg. DAMMERMAN.
- graciticornis** KRAATZ, 1859 (*Bledius*)
(Arch. Nat. 25, 169)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 5 Syntypen, Ceylon.
- gracitipes** KRAATZ, 1857 (*Stenus*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 750)
Syntypen; Spiegitzer Schneeberg, Mähren, leg. v. KIESENWETTER; Schlesien, Glatzer Schneeberg, leg. KRAATZ; 1 Ex., Kärnten, leg. WALTZ.
DEI: 1 Syntypus, Siles.; 2 Syntypen, Carinth., leg. WALTZ.
- gracilis** KRAATZ, 1859 (*Eucibdelus*)
(Arch. Nat. 25, 71)
Syntypen, Nord-Indien, leg. BACON.
DEI: 2 Syntypen, India spt., leg. BACON.
- gracilis** LETZNER, 1847 (*Philonthus*)
(Übers. Arb. Veränd. Schles. Ges. 1846 (1847), 79–80)
Holotypus, Schlesien, in Sammlung LETZNER, im DEI.
- gracilis** SACHSE, 1852 (*Silusa*)
(Stett. Ent. Ztg. 13, 119)
Syntypen, N. Amerika, Georgia, leg. GERHARDT.
DEI: 1 Syntypus, Georgia, GERH.
- gracilis** KRAATZ, 1859 (*Sumius*)
(Arch. Nat. 25, 147–148)
Holotypus, Ost-Indien, leg. HELFER, im DEI.
- graeca** KRAATZ, 1857 (*Lithocharis*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 717 nota)
Syntypen, Griechenland, leg. v. KIESENWETTER.
DEI: 2 Syntypen, Graecia, leg. v. KIESENWETTER.
- graeus** KRAATZ, 1858 (*Xantholinus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 2, 64–65)
Syntypen; Attica, Nauplia, leg. v. KIESENWETTER; Creta, leg. ZEBE; Athen, leg. v. KIESENWETTER, v. HELDREICH und SCHAUM.
DEI: 1 Syntypus, Graecia; 1 Syntypus, Attica.
- grandiceps** KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)
(Arch. Nat. 25, 95–96)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 2 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

- grandiceps** KRAATZ, 1879 (*Quedius*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 23, 122)
Holotypus, Amur, leg. CHRISTOPH, im DEI.
- granulata** BERNHAUER, 1940 (*Eudera*)
(Arb. morph. tax. Ent. 7, 159)
Syntypen, Costa Rica, La Caja, 8 km w. von San José, 1930, leg. SCHMIDT, im DEI und Sammlung BERNHAUER.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- granulata** CAMERON, 1922 (*Myllaena*)
(Ann. Mag. Nat. Hist. 9, 9, 652)
Holotypus, Paratypen, Jamaica; Holotypus in Sammlung CAMERON.
DEI: 1 Paratypus, Jamaica, W. Indies.
- granulifera** KRAATZ, 1859 (*Gyrophaena*)
(Arch. Nat. 25, 48–49)
Syntypen; Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 9 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER; 3 Syntypen, Indien, leg. HELFER.
- gredleri** KRAATZ, 1870 (*Coryphium*)
(Berl. Ent. Ztschr. 14, 416)
2 Syntypen, Tyrol, Kreuzjoch, leg. GREDLER.
DEI: 1 Syntypus, Kreuzjoch, leg. GREDLER.
- grisea** KRAATZ, 1856 (*Aleochara*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 96–97 nota)
Syntypen, Schweden, leg. THOMSSON.
DEI: 1 Syntypus, Schweden, leg. THOMSSON.
- guineensis** BERNHAUER, 1912 (*Eutissus*)
(Ent. Mitt. 1, 183)
Syntypen, Guinea, im DEI und in Sammlung BERNHAUER.
DEI: 1 Syntypus, Guinea.
- guttalis** FAUVEL, 1895 (*Stenus*)
(Rev. d'Ent. 14, 212)
Syntypen: Birma, Carin Cheba, 900–1100 m, 5.–12.; Carin Asciiui Ghécu, 1400–1500 m, 3.–4.; Tienzo, 5.; Bhamo, 7.; alle leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Birmania, Bhamó, 8. 1885, leg. FEA.
- hackeri** LEA, 1906 (*Suntius*)
(Proc. Linn. Soc. N.S.W. 31, 200)
Syntypen, Australien, Queensland, Cairns, leg. HACKER.
DEI: 9 Syntypen, Mulgrave R., leg. HACKER.
- hadrochera** KRAATZ, 1857 (*Haploglossa*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 1056)
1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Thüringen, leg. KELLNER.
DEI: 1 Syntypus, Thüringen, leg. KELLNER.
- haematopterus** KRAATZ, 1857 (*Lamprinus*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 429–430)
Holotypus, Heidelberg, im Herbst, unter Spreu, im Wald, leg. KRAATZ, im DEI.
- haematopyga** KRAATZ, 1859 (*Aleochara*)
(Arch. Nat. 25, 15)
Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.
- haemoptera** KRAATZ, 1856 (*Aleochara*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 101–102)
Syntypen, Deutschland.
DEI: 1 Syntypus, Cassel; 1 Syntypus, Heidelberg.
- hampei** KRAATZ, 1862 (*Myrmedonia*)
(Berl. Ent. Ztschr. 6, 267)
Syntypen, Croatien, leg. HAMPE.
DEI: 1 Syntypus, Croatien, leg. HAMPE.
- hauseri** BERNHAUER, 1908 (*Falagria*)
(Verh. zool. bot. Ges. Wien 58, 38)
2 Syntypen, Turkestan, Mts. Ghissar, 1898, leg. HAUSER.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- heinz** SMETANA, 1965 (*Ocyopus*)
(Reichenbachia 5, 30–31)
♂ Holotypus, 16 Paratypen, Anatolia bor., Ilgaz-dagl., 1800–2200 m, 23. 7. 63, leg. HEINZ, in Sammlung SMETANA; 15 Ex., mit den selben Angaben, leg. KORGE, in Sammlung KORGE; 12 Ex., Ilgaz-dagliari, 1200 m, „6“, leg. MUCHE, im Mus. Tierkunde Dresden; 2 Ex., Ilgaz Dagh, Paphlag Turc, leg. STANEK, im Mus. Prag.
DEI: 1 Paratypus, Anatolia bor., Ilgaz-dagl., 1800–2200 m, 23. 7. 63, leg. KORGE.
- henricismidti** WASMANN, 1929 (*Xenocephalus*)
(Wien. Ent. Ztg. 46, 81–82)
3 Syntypen, Costarica, La Caja, 8 km westlich von San José, leg. SCHMIDT, im DEI und in Sammlung WASMANN.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
- heterocera** CAMERON, 1925 (*Pelioptera*)
(Treubia 6, 195)
3 Syntypen, Sumatra, Wai Lima.
DEI: 1 Syntypus, Z. Sumatra, Wai Lima, Lampongs No. 59, 11.–12. 1921, leg. KARNY.
- heurni** CAMERON, 1924 (*Prochirus*)
(Nova Guinea Zool. 15, 1, 83, 85)
8 Syntypen, Neu Guinea, Doormanpadbivak, 1410, 10. 1920.
DEI: 3 Syntypen, N. Guinea, Doormanpadbivak, 1410, 10. 1920, leg. VAN HEURN.
- heynei** BERNHAUER, 1915 (*Ctenopeuca*)
(Stett. Ent. Ztg. 76, 300–301)
Mehrere Syntypen, Chanchamayo in Peru, leg. HEYNE.
DEI: 3 Syntypen, Chanchamayo, Peru, leg. HEYNE.
- heynei** WENDELER, 1926 (*Paederus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1926, 202)
Syntypen, Costa Rica, Turrialba, 800 m, in Sammlung WENDELER.
DEI: 1 ♂ Syntypus, Costa Rica, Turrialba, 800 m.

- hilfi** BENICK, 1915 (*Stenus*)
(Ent. Bl. 11, 225–228)
1 ♂, 2 ♀♀ Syntypen, Bulgarien, Samokov, 1911, leg. HILF.
DEI: 2 Syntypen, Bulgarien, Samokov, 1911, leg. HILF.
- hilleri** WEISE, 1877 (*Hadrotus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 21, 93–94)
Syntypen, Japan, Hagi, 6. 1874, leg. HILLER.
DEI: 11 Syntypen, Japan, leg. HILLER.
- hilleri** WEISE, 1877 (*Homalota*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 21, 90)
Syntypen, Japan, Hagi, leg. HILLER.
DEI: 1 Syntypus, Japon., leg. HILLER.
- himalayica** CAMERON, 1924 (*Phyllodrepa*)
(Trans. Ent. Soc. London 1924, 166)
Syntypen, Indien, Chakrata District, 6500–8000 Fuß; Simla Hills, 9000 Fuß.
DEI: 1 Syntypus, Gahan, Simla Hills, 7000 Fuß, 9. 1921, leg. CAMERON.
- hirta** KRAATZ, 1859 (*Acanthoglossa*)
(Arch. Nat. 25, 144–145)
Holotypus, ohne Fundortangaben.
DEI: Holotypus, Ceylon.
- hirta** KRAATZ, 1859 (*Myrmedonia*)
(Arch. Nat. 25, 25)
Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.
- hispidulus** KRAATZ, 1857 (*Bledius*)
(In: ERICSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 825 nota)
Syntypen, Fontainebleau, Compiègne, la Tete, im Sande am Ufer der eisenhaltigen Quellen.
DEI: 2 Syntypen, La Tete.
- hoffmanni** BERNHAUER, 1928 (*Xantholinus*)
(Kol. Rundsch. 14, 11–12)
Syntypen, Tientsin, leg. HOFFMANN, im DEI und Sammlung BERNHAUER.
DEI: 2 Syntypen, Tientsin, leg. HOFFMANN.
- hoptonota** KRAATZ, 1857 (*Myrmedonia*)
(Linnaea 11, 49)
Syntypen, Ceylon, Termitehügel bei Colombo, 1855, leg. NIETNER.
DEI: 6 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- horni** BERNHAUER, 1922 (*Actobius*)
(Arch. Nat. 88 A 7, 231–232)
Syntypen, Formosa, Kankau, leg. SAUTER.
DEI: 5 Syntypen, Formosa, Kankau (Koshun), 7. 1909, leg. SAUTER.
- horni** BERNHAUER, 1927 (*Brachydirus*)
(Mem. Soc. Ent. Ital. 5 (1926), 168–169)
Syntypen, Kolumbien, Magdalena, leg. THIEME, im DEI und in Sammlung BERNHAUER.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- horni** BERNHAUER, 1902 (*Cafius*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1902, 28–29)
Syntypen, Ceylon, Weligama, leg. HORN, in Sammlung BERNHAUER.
DEI: 10 Syntypen, Weligama, 1899, leg. HORN.
- horni** BERNHAUER, 1939 (*Calodera*)
(Arb. morph. tax. Ent. 6, 15)
Syntypen; Isla Calbuco, Süd-Chile, 3. 10. 1937; Puerto Puyuhuapi, leg. SCHWABE, im DEI und in Sammlung BERNHAUER.
DEI: 1 Syntypus, Puerto Puyuhuapi, Süd-Chile, 23. 12. 1937, leg. SCHWABE; 1 Syntypus, Isla Calbuco, Süd-Chile, 6. 11. 1937, leg. SCHWABE.
- horni** BERNHAUER, 1922 (*Coproporus*)
(Arch. Nat. 88 A 7, 234)
Syntypen, Formosa, Kosempo, 7. 7. 1911, leg. SAUTER.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
- horni** BIERIG, 1933 (*Dibelophacis*)
(Rev. d'Ent. 3, 509–511, Fig. 6)
Holotypus, Costa Rica, Vara Blanca, 2000 m, zwischen Barba und Poas, leg. SCHMIDT, im DEI.
- horni** BERNHAUER, 1932 (*Leptusa*)
(Kol. Rundsch. 17 (1931), 236–237)
Syntypen, Schweiz, Rothorn, im DEI und Sammlung BERNHAUER.
DEI: 2 Syntypen, Rothorn.
- horni** BIERIG, 1934 (*Oligota*)
(Mem. Soc. Cubana Hist. Nat. Poey 8, 117–119, Fig. 8)
Holotypus, 1 Paratypus, Costa Rica, La Caja, 1931, leg. SCHMIDT; Holotypus im DEI, Paratypus in Sammlung BIERIG.
DEI: Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- horni** BERNHAUER, 1902 (*Paederus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1902, 38–39)
6 Syntypen, Ceylon, Nalanda, leg. HORN, in Sammlung BERNHAUER.
DEI: 4 Syntypen, Nalanda, 1899, leg. HORN.
- horni** BERNHAUER, 1935 (*Polylobus*)
(Stylops 4, 95)
Syntypen, Chile, ex Coll. SOLIER & FAIRMAIRE, im DEI und in Sammlung BERNHAUER.
DEI: 4 Syntypen, Chile.
- horni** BERNHAUER, 1927 (*Pygostenus*)
(Rev. Zool. Bot. Afr. 15, 232–233)
Syntypen; Togo; Kamerun, Lolodorf, leg. CONRADT, im DEI und in Sammlung BERNHAUER.
DEI: 1 Syntypus, Togo.
- horni** KOCH, 1939 (*Throbalium*)
(Arb. morph. tax. Ent. 6, 111–113)
♂ Holotypus, Sarepta, leg. BECKER, im DEI; 1 ♂ Paratypus, Repetek, Ost-Buchara, in Sammlung FRÉY.
DEI: ♂ Holotypus, Sarepta, leg. BECKER.

- hostilis** BERNHAUER, 1936 (*Oxytelus*)
(Phil. Journ. Sci. 61, 82—83)
Syntypen; Mindoro, Subaan; Luzon, Mount Maquiling, Mount Isarog, Imugan, Balbalan, Bayombong, Los Banos, Limay, Pagsanjan; Mindanao, Surigao; Biliran.
DEI: 1 Paralectotypus, Limay, Luzon; 2 Paralectotypen, Imugan, Luzon; 1 Paralectotypus, Subaan, Mindoro; von HAMMOND festgelegt.
- hubenthalii** BERNHAUER, 1908 (*Leptoglossa*)
(Arch. Nat. 74, 346—347)
Syntypen, Chile, leg. HUBENTHAL.
DEI: 1 Syntypus, Chile, Süd-Amerika.
- humeralis** KRAATZ, 1859 (*Gyrophaena*)
(Arch. Nat. 25, 46—47)
Syntypen; Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 1 Syntypus, Ceylon, leg. NIETNER.
- humeralis** KRAATZ, 1856 (*Homalota*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 278)
Syntypen, Schlesien, Heuscheuer, an Baumstümpfen, an der Unterseite der dort befindlichen Löcherschwämme, leg. KRAATZ.
DEI: 6 Syntypen, Silesia.
- humeralis** ROTTENBERG, 1870 (*Sumius*)
(Berl. Ent. Ztschr. 14, 34)
18 Syntypen, Sizilien, Palermo, 7. 12. 1868—20. 2. 1869, leg. ROTTENBERG.
DEI: 9 Syntypen, Palermo, leg. ROTTENBERG.
- hummleri** BERNHAUER, 1912 (*Anthophagus*)
(Ent. Ztschr. Frankf. a. M. 25, 259)
Zahlreiche Syntypen, Asturien, Cancas, leg. HUMMLER-PAGANETTI.
DEI: 1 Syntypus, Cancas Ast., PAGANETTI.
- hummleri** BERNHAUER, 1914 (*Stenus*)
(Münch. Kol. Ztschr. 4, 265)
Syntypen, Kephallenia, leg. HUMMLER.
DEI: 1 Syntypus, Kephallenia, leg. PAGANETTI.
- idiocerus** KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)
(Arch. Nat. 25, 85)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 5 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- imitator** FAUVEL, 1895 (*Philonthus*)
(Rev. d'Ent. 14, 265—266)
Syntypen; Birma, Carin Asciiui Ghécu, 1400—1500 m, 3.—4., leg. FEA. Sikkim, Darjeeling, leg. CHRISTIE.
DEI: 2 Syntypen, Carin Asciiui Ghécu, 1400—1500 m, 3.—4. 1888, leg. FEA.
- immaculata** BIERIG, 1933 (*Monista*)
(Rev. d'Ent. 3, 505—506)
Holotypus, Costa Rica, Vara Blanca, 2000 m, zwischen Barba und Poas, im DEI; Paratypen, La Caja, bei Sn. José, 1931, leg. SCHMIDT, in Coll. BIERIG.
DEI: Holotypus, 5 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.
- immatura** KRAATZ, 1859 (*Gyrophaena*)
(Arch. Nat. 25, 47—48)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 3 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- immaturus** BERNHAUER, 1922 (*Coproporus*)
(Arch. Nat. 88 A 7, 235)
Syntypen, Formosa, Kosempo, Akau und Takao, leg. SAUTER.
DEI: 10 Syntypen, Formosa, Akau, 12. 1907, leg. SAUTER; 1 Syntypus, Formosa, Takao, 15. 12. 1907, leg. SAUTER.
- impressicollis** KRAATZ, 1857 (*Myrmedonia*)
(Linnaea 11, 53—54)
Syntypen, Ceylon, Termitehügel bei Colombo, 1855, leg. NIETNER.
DEI: 9 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
- improbus** PUTHZ, 1970 (*Stenus*)
(Mem. Nat. Mus. Victoria Melb. 31, 70—71)
♂ Holotypus, Cairns, HACKER, im DEI.
- inaequalis** FAUVEL, 1895 (*Hesperus*)
(Rev. d'Ent. 14, 258—259)
Syntypen; Birma, Carin Cheba, 900—1100 m, 5.—12.; Carin Ghécu, 1300—1400 m, 2.—3.; leg. FEA.
DEI: 12 Syntypen, Carin Ghécu, 1300—1400 m, 2.—3. 1888, leg. FEA.
- incisa** PEYERIMHOFF, 1900 (*Atheta*)
(Bull. Soc. Ent. France 1900, 9—10)
Syntypen; Frankreich Bezirk Digne: Barre des Dourbes, 1600 m; Archaril, 1100 m; Montagne du Cheval Blanc, 2000 m; Forêt de Faillefeu, 1500 m.
DEI: 1 ♀ Syntypus, Besses Alpes.
- incola** FAUVEL, 1904 (*Astilbus*)
(Rev. d'Ent. 23, 63)
Syntypen; Nilghiris, Birma, Carin Cheba, 900—1000 m, 5.—12.; Carin Asciiui Ghécu, 1400—1500 m, 3.—4.; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Carin Asciiui Ghécu, 1400—1500 m, 3.—4. 1888, leg. FEA.
- indica** CAMERON, 1920 (*Apocellagria*)
(Ent. Monthly Mag. 56, 144)
Holotypus, Paratypen, Indien, Nilgiri Hills, leg. ANDREWES; Holotypus in Coll. CAMERON.
DEI: 1 Paratypus, Nilgiris, S. India.
- indica** KRAATZ, 1859 (*Ocalea*)
(Arch. Nat. 25, 12)
Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 3 Syntypen, Ind. post., leg. HELFER.
- indica** KRAATZ, 1859 (*Oligota*)
(Arch. Nat. 25, 44)
Holotypus, Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: Holotypus, Ind. post., leg. HELFER.

- indica* KRAATZ, 1859 (*Phloeopora*)
(Arch. Nat. 25, 42)
Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 1 Syntypus, Ind. post., leg. HELFER.
- indicum* KRAATZ, 1859 (*Cryptobium*)
(Arch. Nat. 25, 121)
Syntypen; Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. BACON.
DEI: 1 Syntypus, Ceylon, leg. NIETNER; 2 Syntypen, Ostindien.
- indicum* KRAATZ, 1859 (*Doliceon*)
(Arch. Nat. 25, 118)
Syntypen; Ceylon, leg. NIETNER; Nord-Indien, leg. BACON.
DEI: 1 Syntypus, India bor.
- indicus* KRAATZ, 1859 (*Cephalochetus*)
(Arch. Nat. 25, 124)
Syntypen; Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 1 Syntypus, Ceylon; 2 Syntypen, India or.
- indicus* KRAATZ, 1859 (*Diochus*)
(Arch. Nat. 25, 113)
Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 3 Syntypen, Ostindien; 1 Syntypus, Indien, leg. HELFER.
- indicus* KRAATZ, 1859 (*Isomalus*)
(Arch. Nat. 25, 183)
Syntypen; Ost-Indien, leg. HELFER; Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 9 Syntypen, Ceylon.
- indicus* KRAATZ, 1859 (*Mitomorphus*)
(Arch. Nat. 25, 107)
Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 2 Syntypen, Ostindien, leg. HELFER.
- indicus* KRAATZ, 1859 (*Palaminus*)
(Arch. Nat. 25, 153–154)
Holotypus, Ost-Indien, leg. HELFER, im DEI.
- indicus* KRAATZ, 1859 (*Staphylinus*)
(Arch. Nat. 25, 75)
Syntypen; Ceylon, leg. NIETNER; Nord-Indien, leg. BACON.
DEI: 1 Syntypus, Ceylon, leg. NIETNER; 1 Syntypus, Ind. bor., leg. BACON; 2 Syntypen, Ostindien (Etikettierungs- oder Druckfehler?).
- indicus* KRAATZ, 1859 (*Sunius*)
(Arch. Nat. 25, 148–149)
Syntypen; Ost-Indien, leg. HELFER; Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: Lectotypus, Ceylon; 3 Paralectotypen, India or., von ISRAELSON (Commentat. biol. 37, 22–23; 1971) festgelegt.
- indicus* KRAATZ, 1859 (*Trogophloeus*)
(Arch. Nat. 25, 179)
Syntypen; Ost-Indien, leg. HELFER; Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 3 Syntypen, India or.; 2 Syntypen, Ceylon.
- inducta* FENYES, 1914 (*Gnypeta*?)
(Arch. Nat. 80 A 2, 49)
Holotypus, Formosa, Akau, leg. SAUTER, det. Nr. 4398, im DEI.
- inermis* CAMERON, 1925 (*Peltoptera*)
(Treubia 6, 196)
13 Syntypen, Java, Tjibodas, 1400 m.
DEI: 3 Syntypen, Java, Tjibodas, 1400 m, leg. DAMMERMAN.
- infans* ROTTENBERG, 1870 (*Bledius*)
(Berl. Ent. Ztschr. 14, 36–37)
Syntypen, Sizilien, Syracus, 6.–21. 4. 1869, leg. ROTTENBERG.
DEI: 3 Syntypen, Syrakus, ROTTENBERG; 3 Syntypen, ohne Fundortangabe.
- infusata* KRAATZ, 1853 (*Myllaena*)
(Stett. Ent. Ztg. 14, 373)
Syntypen, Österreich.
DEI: 6 Syntypen, Austr., leg. FERR.
- infusata* KELLNER, 1844 (*Oxyopoda*)
(Stett. Ent. Ztg. 5, 413–414)
Syntypen, Thüringer Wald, unter Moos und abgefallenem Laub.
DEI: 1 Syntypus, Thüringen, leg. KELLNER.
- infuscatus* BENICK, 1916 (*Stenus*)
(Ent. Mitt. 5, 246–247)
Holotypus, (leicht beschädigt), SO-Brasilien, S. Catharina, Teresopolis, im DEI.
- inhabilis* KRAATZ, 1856 (*Homalota*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 251–252)
Syntypen, Barmen, leg. STACHELHAUSEN.
DEI: 2 Syntypen, Barmen.
- inornata* KRAATZ, 1859 (*Homalota*)
(Arch. Nat. 25, 39)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 1 Syntypus, Ceylon, leg. NIETNER.
- insignis* BIERIG, 1934 (*Lathrobiella*)
(Arb. morph. tax. Ent. 1, 115–116)
♀ Holotypus, Paratypen, Costa Rica, La Caja, 8 km w. San José, 1931, leg. SCHMIDT. Holotypus, 1 Paratypus, im DEI, Paratypen, in Sammlung BIERIG.
DEI: ♀ Holotypus, 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- insperatus* PUTHZ, 1972 (*Stenus*)
(Great Lakes Ent. 5, 14–15, Fig. 3)
♂ Holotypus, Michigan, Grand ledge, ex Coll. HUBBARD & SCHWARZ; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.
DEI: ♂ Paratypus, Amer. bor.

- insularis* FENYES, 1914 (*Aleochara*)
(Arch. Nat. 80 A 2, 53-54)
Holotypus, Formosa, Kosempo, leg. SAUTER, det. Nr. 4364, im DEI; 2 Paratypen, vom selben Fundort.
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Formosa, Kosempo, 5. 1911, leg. SAUTER.
- insularis* FENYES, 1914 (*Myllaena*)
(Arch. Nat. 80 A 2, 45)
Holotypus, Formosa, Anping, leg. SAUTER, det. Nr. 4378, im DEI.
- interposita* BENICK, 1970 (*Atheta*)
(Ent. Bl. 66, 98-99)
♀ Holotypus, 1 ♂, 1 ♀ Paratypen, Bosnia, Bjelasnia planina. Holotypus, in Coll. BENICK, 1 ♂ Paratypus, in Coll. BERNHAUER, 1 ♀ Paratypus, im DEI.
DEI: 1 Paratypus, Bjelasnica planina, Bosnien, Coll. LEONHARD.
- inutilis* KRAATZ, 1859 (*Homalota*)
(Arch. Nat. 25, 35-36)
Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.
- investigatorum* KRAATZ, 1864 (*Oxyptoda*)
(Berl. Ent. Ztschr. 8, 130)
4 Syntypen, Swinemünde, Strand, 20. 9. 1863, leg. KRAATZ, im DEI.
- irregularis* WEISE, 1877 (*Bolitobius*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 21, 93)
Syntypen, Japan, bei Hagi und Yokuhama, in Pilzen.
DEI: 3 Syntypen, Japonia.
- irritans* CHAPIN, 1926 (*Paederus*)
(Arch. Schiffs- u. Trop.-Hygiene 30, 370-371)
♂ Holotypus, 5 ♂♂, 14 ♀♀ Paratypen, Ancon, Santa Elena, St. Elena Peninsula, Ecuador, leg. SARGENT. Holotypus, im U. S. Nat. Mus. Nr. 29095.
DEI: 2 Paratypen, St. Elena nr. Gulf of Guayaquil, Ecu., 2. 1926, leg. SARGENT.
- islandica* KRAATZ, 1857 (*Homalota*)
(Stett. Ent. Ztg. 18, 284)
3 Syntypen, hoher Norden, Island, leg. KRÜPER.
DEI: 2 Syntypen, Island, leg. KRÜPER.
- islandica* KRAATZ, 1857 (*Oxyptoda*)
(Stett. Ent. Ztg. 18, 285)
Mehrere Syntypen, Island, Juni, Juli, unter toten Vögeln.
DEI: 4 Syntypen, Island, leg. STAUDINGER.
- istriensis* BREIT, 1911 (*Mayetia*)
(Wien. Ent. Ztg. 30, 169-170)
Syntypen, Mte. Maggiore bei Abazzia, leg. CURTI und BREIT.
DEI: 4 Syntypen, Mte. Maggiore, Istria, leg. BREIT.
- italicus* BAUDI, 1869 (*Stenus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 13, 397-398 nota)
Syntypen, Pedemonti; 1 Syntypus, Raven na.
DEI: 2 Syntypen, Piemont, leg. BAUDI.
- italiensis* BENICK, 1943 (*Atheta*)
(Ent. Bl. 39, 67)
♀ Holotypus, Italien, Monte Graeco, leg. PAGANETTI, in Coll. LEONHARD, im DEI.
- jarrigei* PUTHZ, 1970 (*Stenus*)
(Mitt. Schweiz. ent. Ges. 43, 111-115)
♂ Holotypus, Spanien, Lerida, Tremp, 15. 6. 1969, leg. COMELLINI; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung. Holotypus, im Mus. Genève, Paratypen in den Mus. Genève, Budapest, Mailand, Prag, München, Berlin, im DEI und in den Sammlungen BENICK, COIFFAIT, FRANZ, JARRIGE und PUTHZ.
DEI: 1 ♂ Paratypus, Andalusien, leg. KRAATZ; 1 ♀ Paratypus, Gallia; 1 ♂, 1 ♀ Paratypen, Gall. mer.
- käufeli* SCHEERPELTZ, 1935 (*Leptusa*)
(Kol. Rundsch. 21, 135-137)
Zahlreiche Syntypen, aus den Kalkalpen und anderen Gebirgen, siehe Originalbeschreibung.
DEI: 2 Syntypen, Reissalpe A. i., unter Buchenkrummholz, 22. 5.-24. 5. 1920, leg. SCHEERPELTZ.
- kahrii* KRAATZ, 1857 (*Compsochilus*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 897 nota)
Syntypen, Dalmatien, leg. KAHR.
DEI: 2 Syntypen, Dalmatien, leg. KAHR.
- kahuziensis* FAGEL, 1954 (*Paederus*)
(Volume Jubilaire VICTOR VAN STAELEN Inst. Royal Sc. Nat. Belg., Bruxelles, Band 2, 915-916)
♂ Holotypus, Congo Belge, Kivu, Gebiet Kalehe, südlich von Kahuzi, 2850 m, 27. 7. 1951, leg. LELEUP, im Mus. Tervueren; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.
DEI: 1 Paratypus, vom Fundort des Holotypus.
- kamerunensis* BERNHAUER, 1912 (*Eleusis*)
(Ent. Mitt. 1, 177-178)
Syntypen, Südost-Kamerun, Lolodorf, leg. CONRADT, im DEI und Coll. BERNHAUER.
DEI: 2 Syntypen, S.O. Kamerun, Lolodorf, 1895, leg. CONRADT.
- karnyi* CAMERON, 1925 (*Gyrophaena*)
(Treubia 6, 188-189)
3 Syntypen, Sumatra, Wai Lima, 11.-12. 1921, leg. KARNY.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, als Typus ausgezeichnet.
- karnyi* CAMERON, 1925 (*Leucocraspedum*)
(Treubia 6, 198)
3 Syntypen, Sumatra, Wai Lima, 11.-12. 1921, leg. KARNY.
DEI: 1 Syntypus, Z. Sumatra, Wai Lima, Lampongs No. 14, 11.-12. 1921, leg. KARNY.
- karnyi* CAMERON, 1925 (*Oligota*)
(Treubia 6, 188)
17 Syntypen, Sumatra, Wai Lima, 11.-12. 1921, leg. KARNY.
DEI: 4 Syntypen, Wai Lima, Z. Sumatra, Lampongs No. 456, 11.-12. 1921, leg. KARNY, 1 Ex., als Typus ausgezeichnet.
- kayseri* BERNHAUER, 1927 (*Sterculia*)
(Mem. Soc. Ent. Ital. 5 (1926), 163)
Syntypen, Venezuela, leg. KAYSER, im DEI und in Sammlung BERNHAUER.
DEI: 1 Syntypus, Venezuela, leg. KAYSER.

- kellneri** KRAATZ, 1875 (*Lithocharis*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 19, 123)
1 ♂, 2 ♀♀ Syntypen, Thüringen, am Ufer der Apfelstedt bei Dietendorf, leg. KELLNER, in Coll. KELLNER, 1 ♀, im DEI.
DEI: 1 Syntypus, Thüring., leg. KELLNER.
- kentiae** LEA, 1925 (*Heterothops*)
(Trans. Proc. R. Soc. S. Austr. 49, 233–239)
Lord Howe Island, Gipfel des Mount Gower, an *Kentia canterburyana*, leg. LEA, Holotypus Nr. I. 12690, Paratypen, im Australian Mus.
DEI: 5 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.
- kiesenwetteri** KRAATZ, 1870 (*Ctenomastax*)
(In: VON HEYDEN, L., Entomologische Reise nach dem südlichen Spanien, 85)
Holotypus, Spanien, Umgebung von Sevilla, leg. KRAATZ, im DEI.
- kiesenwetteri** KRAATZ, 1856 (*Homalota*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 245–246 nota)
Holotypus, Griechenland, leg. V. KIESENWETTER, im DEI.
- kocsii** BERNHAUER, 1910 (*Sipalia*)
(Ent. Bl. 6, 260)
Syntypen, Trencsins, Zsihlavnik, Nagy Szyklas, Szelecz, leg. KOCSI.
DEI: 1 Syntypus, Hung. Trencsen, Zsihlavnik, leg. KOCSI.
- kohle** WASMANN, 1904 (*Dorylomimus*)
(Zool. Jahrb. Suppl. 7, 622–625, Fig. 3a–c)
8 Syntypen, oberer Congo bei Stanleyville, leg. KOHL, aus Zügen von *Anomma wilverthi* EMERY.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
- kosempoensis** BERNHAUER, 1922 (*Bledius*)
(Arch. Nat. 88 A 7, 225)
Syntypen, Formosa, Kosempo, leg. SAUTER.
DEI: 2 Syntypen, Formosa, Kosempo, 4. 1912, leg. SAUTER.
- kosempoensis** BERNHAUER, 1922 (*Paederus*)
(Arch. Nat. 88 A 7, 228)
Syntypen, Formosa, Kosempo, leg. SAUTER.
DEI: 3 Syntypen, Formosa, Kosempo, 1911, leg. SAUTER.
- kraatzii** JACQUELIN DU VAL, 1857–1859 (*Anthobium*)
(Abbildung: Genera Coléoptères d'Europe 2, Taf. 27, Fig. 134.
Beschreibung: BRISOUT, Matériaux pour la Faune Française, p. 43; 1863. In: GRENIER: Catalogue des Coléoptères de France)
Syntypen, Pyrénées-Orientales, ev. leg. DUVAL.
DEI: 1 Syntypus, Ht. Pyren.
- kraatzii** BERNHAUER, 1902 (*Astenus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1902, 36–37)
Zahlreiche Syntypen, Ceylon, Nalanda, Anuradhapura und Trincomalee, leg. HORN, in Coll. BERNHAUER.
DEI: 9 Syntypen, Nalanda; 4 Syntypen, Trincomalee; 1 Syntypus, Anuradhapura; alle 1899, leg. HORN.
- kraatzii** PANDELLE, 1869 (*Bolitobius*)
(Ann. Soc. Ent. France IV. 9, 356)
Syntypen, Hungaria, Sicilia, Corsica.
DEI: 3 Syntypen, Hungaria, leg. KAHR.
- kraatzii** FAUVEL, 1895 (*Calliderma*)
(Rev. d'Ent. 14, 235–236)
Syntypen, Carin Asciiui Ghécu, 3. 4. leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Carin Ghecu, 1300–1400 m, 2. – 3. 1888, leg. FEA.
- kraatzii** FAUVEL, 1878 (*Eleusis*)
(Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova 12, 207, nom. nov. pro *apicipennis* KRAATZ, 1859, Arch. Nat. 25, 183–184)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 3 Syntypen, Ceylon.
- kraatzii** BERNHAUER & SCHUBERT, 1911 (*Osorius*)
(Coleopterorum Catalogus Pars 29, 144, nom. nov. pro *rugiceps* KRAATZ, 1859, Arch. Nat. 25, 166)
Holotypus, Ost-Indien, leg. HELFER, im DEI.
- kraatzii** BERNHAUER, 1908 (*Pinophilus*)
(Arch. Nat. 74, 303–304)
Syntypen, Paraguay, leg. DRAKE.
DEI: 2 Syntypen, Paraguay, DRAKE.
- kraatzii** BERNHAUER, 1908 (*Platyprosopus*)
(Arch. Nat. 74, 326)
Syntypen, Paraguay, leg. DRAKE.
DEI: 2 Syntypen, Paraguay, leg. DRAKE.
- kraatzii** FAUVEL, 1899 (*Pygostenus*)
(Rev. d'Ent. 18, 18)
Syntypen, Nord-Cameroun.
DEI: 2 Syntypen, Kamerun.
- kraatzii** BERNHAUER, 1908 (*Stenaesthetus*)
(Arch. Nat. 74, 300)
Holotypus, Paraguay, leg. DRAKE, im DEI.
- kraatzii** BERNHAUER, 1907 (*Stenopsis*)
(Wien. Ent. Ztg. 26, 287)
Syntypen, Paraguay, leg. DRAKE.
DEI: 1 Syntypus, Paraguay, DRAKE.
- kraatzii** KIRSCH, 1865 (*Xantholinus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 9, 44–45)
Syntypen, Bogota.
DEI: 2 Syntypen, Bogota, leg. KIRSCH.
- kraatzii** FUSS, 1862 (*Borboropora*)
(Berl. Ent. Ztschr. 6, 406)
6 Syntypen, Ahrweiler, 6., 7. 1862, leg. FUSS.
DEI: 2 Syntypen, Ahrweiler.

- kreyenbergi* BERNHAUER, 1928 (*Scopaeus*)
(Kol. Rundsch. 14, 11)
Syntypen, Schantung, Jentschau fu, 22. 5. 1912, leg. KREYENBERG, im DEI und in Coll. BERNHAUER.
DEI: 11 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
- kreyenbergi* BERNHAUER, 1928 (*Trogophloeus*)
(Kol. Rundsch. 14, 8)
Syntypen, Schantung, Jentschau fu, 1911–1912, leg. KREYENBERG, im DEI und in Coll. BERNHAUER.
DEI: 2 Syntypen, Jentschou fu, Schant. 22. 5. 1911–12, leg. KREYENBERG.
- künnemanni* BENICK, 1975 (*Atheta*)
(Stuttgarter Beitr. Naturk. A Nr. 273, 18)
♀ Holotypus, Hérault, Südfrankreich, aus Sammlung KÜNNEMANN, im DEI.
- lacajana* BERNHAUER, 1940 (*Atheta*)
(Arb. morph. tax. Ent. 7, 160–161)
Syntypen, Costa Rica, La Caja bei San José, 1930, leg. SCHMIDT, im DEI und in Coll. BERNHAUER.
DEI: 5 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
- laertiosus* BENICK, 1917 (*Stenus*)
(Ent. Bl. 13, 311–312)
♀ Holotypus, Sumatra, Si-Rambé, 12. 1890 bis 3. 1891, leg. MODIGLIANI, im DEI.
- laesicollis* MÄKLIN, 1852 (*Omalium*)
(Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou 25/2, 322)
Syntypen, Insel Sitkha, leg. PIPPINGSKÖLD, FRANKENHAEUSER & HOLMBERG.
DEI: 1 Syntypus, Sitkha.
- laevicollis* KRAATZ, 1854 (*Gyrophaena*)
(Stett. Ent. Ztg. 15, 186)
3 Syntypen, Heidelberg, an Baumschwämmen.
DEI: 1 Syntypus, Heidelberg.
- laevicollis* KRAATZ, 1859 (*Platyprosopus*)
(Arch. Nat. 25, 114)
Syntypen, Nord-Indien, leg. BACON.
DEI: 2 Syntypen, India or., leg. BACON. (Etikettierungs- oder Druckfehler ?).
- laevigata* KRAATZ, 1859 (*Myrmedonia*)
(Arch. Nat. 25, 26)
Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 1 Syntypus, Ind. post., leg. HELFER.
- laevigatus* FAUVEL, 1895 (*Hesperus*)
(Rev. d'Ent. 14, 259–260)
Syntypen; Birma, Carin Cheba, 900–1100 m, 5.–12., leg. FEA. Pulo-Penang; Malacca; Singapore; Sumatra; Borneo; Java.
DEI: 1 Syntypus, Carin Cheba, 900–1100 m, 5., 12. 1888, leg. FEA.
- laevigatus* KRAATZ, 1859 (*Lispinus*)
(Arch. Nat. 25, 188)
Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.
- laevipennis* KRAATZ, 1859 (*Lispinus*)
(Arch. Nat. 25, 185–186)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 15 Syntypen, Ceylon.
- laminata* KRAATZ, 1859 (*Gyrophaena*)
(Arch. Nat. 25, 45–46)
Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 4 Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.
- languida* SACHSE, 1852 (*Aleochara*)
(Stett. Ent. Ztg. 13, 117–118)
Holotypus, N. Amerika, Georgia, leg. GERHARDT, im DEI.
- lata chinensis* BERNHAUER, 1933 (*Aleochara*)
(Wien. Ent. Ztg. 50, 48)
Syntypen; Ostgrenze Thibet's, Tatsienlu; Tatsienlu, Tjiji, Urwald-Rodungen und Giufu-Shan.
DEI: 1 Syntypus, China Szechuan, Tatsienlu, Tjiji, Urwald-Rodung, leg. REITTER; 2 Syntypen, Tatsien-lu, Grenze Thibet Ost, leg. REITTER.
- lateritia* KRAATZ, 1859 (*Myllaena*)
(Arch. Nat. 25, 50)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 2 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- laticeps* FAUVEL, 1895 (*Eleusis*)
(Rev. d'Ent. 14, 190)
Syntypen; Birma, Carin Cheba, 500–1100 m, 5., 12., leg. FEA. Sumatra, tabacs, leg. GROUVELLE; ile Nias, leg. EPPELSHHEIM.
DEI: 1 Syntypus, Carin Cheba, 500–1000 m, 12. 1887, leg. FEA.
- laticolle* KRAATZ, 1857 (*Omalium*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 993)
Syntypen, Thüringen, unter faulendem Laub, leg. KELLNER.
DEI: 2 Syntypen, Thüring., leg. KELLNER.
- laticollis* MÄKLIN, 1853 (*Micropeplus*)
(Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou 26/III, 199–200)
Zahlreiche Syntypen, Inneres der Halbinsel Kenai, leg. FRANKENHAEUSER.
DEI: 1 Paralectotypus, Kenai, Am. russ. von NOBEL (im Druck) festgelegt.
- laticollis* CAMERON, 1925 (*Scopaeus*)
(Treubia 6, 183–184)
3 Syntypen, Java, Tjibodas, 1400 m, 8. 1921, leg. DAMMERMAN.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- laticornis* KRAATZ, 1856 (*Aleochara*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 88)
Syntypen, Tyrol, leg. KAHR.
DEI: 1 Syntypus, Styria (Fundortverwechslung ?), leg. KAHR.

latus GRIDELLI, 1938 (*Quedius*)

(Bol. Soc. Ent. Ital. 70, 15–16)

Holotypus, Toscana, Lippiano, Arezzo, leg. ANDREINI; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.
 DEI: 9 Paratypen, Calabria, Aspromonte, leg. PAGANETTI; 1 Ex., Ponferrada, leg. PAGANETTI; 2 Ex., Mte. Conero, Prov. di Ancona, leg. PAGANETTI; 1 Ex., San Brasilio, Murgien, leg. PAGANETTI; 2 Ex., Monte Gargano, 17. 4. und 7. 5. 1907, leg. HILF; 1 Ex., Lusitania, Evora V., 1910, leg. SCHATZMAYR; 2 Ex., Sicilia, Ficuzza, leg. LEONHARD; 1 Ex., Sicilia.

latusculus KRAATZ, 1859 (*Oxytelus*)

(Arch. Nat. 25, 176–177)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: ♂ Lectotypus, 3 ♂♂, 2 ♀♀ Paralectotypen, Ceylon, von HAMMOND festgelegt.

latusculus niticeps BERNHAUER, 1935 (*Oxytelus*)

(Ent. Nachrichtenbl. Troppau 9, 5)

Syntypen, C. China, Tempelberg, 900 m, Ginyün bei Bébé, leg. REITTER.

DEI: 5 Paralectotypen, mit den Angaben der Beschreibung, von HAMMOND festgelegt.

lativentris WENDELER, 1926 (*Paederus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 1926, 200)

Syntypen, Nord Palawan, Philippinen, Binaluan, 11. 1913, leg. BOETTCHER, in Coll. WENDELER.

DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

lebioides KRAATZ, 1877 (*Arimimelus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 21, 105–106)

Holotypus, Japan, Hagi, leg. HILLER, im DEI.

leleupi FAGEL, 1955 (*Geomitopsis*)

(Explor. Parc nat. Upemba Miss. DE WITTE, fasc. 39, 83)

♂ Holotypus, Congo Belge, Kivu, Terr. Kabare, Nyakasiba, 1900 m, 6. 1951, leg. LELEUP, im Mus. Congo Belge Tervueren;
 618 Paratypen, siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben des Holotypus.

lenensis POPPIUS, 1908–09 (*Atheta*)

(Oefv. Finska Vet. Soc. Förh. 51 nr. 4, 39–40)

Mehrere Syntypen; bei Bulkur, auf Tundren der unteren Lena, unter Moos, 6. 9. 1901; Insel Tit-ary, 4. 9. 1901; alle leg. POPPIUS.

DEI: 1 Syntypus, Bulkur, Lena arct., leg. POPPIUS.

leonhardi BREIT, 1912 (*Lathrobium*)

(Ent. Mitt. 1, 200–201)

3 Syntypen, Bulgarien, Tschamkorija, 27. 6. und 13. 7. 1911, leg. HILF.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

leonhardi BERNHAUER, 1908 (*Leptusa*)

(Verh. zool. bot. Ges. Wien 53, 37–38)

2 Syntypen, Korsika, Gravonetal, Mte. Renoso, 1400–1500 m, 17. 7. 1905, leg. LEONHARD.

DEI: 1 Syntypus, Corsika, Mte. Renosa, 1905, leg. LEONHARD.

leonhardi BERNHAUER, 1905 (*Niphedodes*)

(Verh. zool.-bot. Ges. Wien 55, 588)

2 Syntypen, Bjelašnica-Planina an der Grenze Bosnien und der Herzegowina, hochalpin, aus Graswurzeln.

DEI: 1 Syntypus, Bosnien, Bjelašnica, Gipfelregion, leg. LEONHARD.

leonhardi BERNHAUER, 1912 (*Ocyusa*)

(Ent. Ztschr. Frankfurt a. M. 25, 263–264)

2 Syntypen, auf Kephallenia am Eleutherios-Pass, 1905, leg. LEONHARD; 1 Ex., in Sammlung BERNHAUER.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

leonhardi BERNHAUER, 1908 (*Sipalia*)

(Münch. Kol. Ztschr. 3, 325–326)

Mehrere Syntypen, am Mte. Gargano, Mte. S. Angelo, 4. 4. 1907, Cagnano, 13. 4. 1907 und So. Offrizzo, 22. 4. 1907, in Kastanienwäldern.

DEI: 2 Syntypen, Monte Gargano, Mte. St. Angelo, 4. 4. 1907; 1 Syntypus, Monte Gargano, So. Offrizzo, 22. 4. 1907;

1 Syntypus, Monte Gargano, Cagnano, 13. 4. 1907; alle leg. HILF.

leonhardi BERNHAUER, 1914 (*Stenus*)

(Münch. Kol. Ztschr. 4, 2)

Mehrere Syntypen, Sizilien, bei Misilmeri, aus Kastanienlaub, 13. 4. 1906, leg. LEONHARD.

DEI: 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

leonhardi BERNHAUER, 1912 (*Zyras*)

(Ent. Bl. 8, 110)

2 Syntypen, Sizilien, Monte Cola, in einer Seehöhe von ca. 800 m, in einer Macchie, 12. 4. 1906, leg. LEONHARD.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

lepida KRAATZ, 1856 (*Homalota*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 309–311)

Syntypen, bei Berlin und in Thüringen, in Pilzen.

DEI: 1 Syntypus, Berlin; 1 Syntypus, Schönwalde; 1 Syntypus, Thüringen; 1 Syntypus, Thüringen, leg. KELLNER.

lepidus WEISE, 1875 (*Stenus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 19, 367–368)

Syntypen, Griechenland, leg. KRÜPER, im DEI.

DEI: 1 Syntypus, Graecia.

letzneri SCHWARZ, 1873 (*Coryphium*)

(Jahres-Ber. Schles. Ges. 1872 (1873), 183–184)

Holotypus, Schlesien, Altvatergebirge, leg. LETZNER, im DEI.

letzneri GERHARDT, 1869 (*Lathrobium*)

(Berl. Ent. Ztschr. 13, 257–258)

Syntypen; Liegnitz; Vorberge der Sudeten; Breslau; Dresden; Magdeburg.

DEI: 10 Syntypen, Liegnitz, leg. LETZNER.

leucocnemis KRAATZ, 1859 (*Metoponus*)

(Arch. Nat. 25, 107–108)

Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.

leucopus KRAATZ, 1859 (*Pinophilus*)

(Arch. Nat. 25, 158)

Holotypus, Tranquebar, WESTERMANN.

DEI: Holotypus, Tranquebar, DOHRN.

- leucopygus** KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)
(Arch. Nat. 25, 90–91)
Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 1 Syntypus, Ostindien.
- leuthneri** BERNHAUER, 1928 (*Gnypeta*)
(Kol. Rundsch. 14, 14)
Syntypen, Syrien, Beirut, 4. 1885, leg. LEUTHNER, im DEI und in Coll. BERNHAUER.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
- limbatum** KRAATZ, 1859 (*Cryptobium*)
(Arch. Nat. 25, 121)
Holotypus, Ost-Indien, leg. HELFER, im DEI.
- limbatus** MÄKLIN, 1852 (*Proteinus*)
(Bull. Soc. Imp. Nat. Moskau 25/II, 323–324)
Syntypen, Insel Sitkha, leg. PIPPINGSKÖLD, FRANKENHAEUSER & HOLMBERG.
DEI: 1 Syntypus, Sitkha.
- limbatus** KRAATZ, 1859 (*Scopaeus*)
(Arch. Nat. 25, 130–131)
Syntypen; Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 9 Syntypen, Ceylon; 5 Syntypen, India orient.
- linearis** KRAATZ, 1859 (*Platyprosopus*)
(Arch. Nat. 25, 115)
Holotypus, Ost-Indien, leg. HELFER, im DEI.
- linearis** KRAATZ, 1857 (*Thinobius*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 883–884)
Syntypen; Baiern, leg. WALTJ; Beaujolais, leg. REY.
DEI: 1 Syntypus, Baiern, leg. WALTJ.
- lineatocollis** KRAATZ, 1859 (*Myrmedonia*)
(Arch. Nat. 25, 26–27)
Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 1 Syntypus, Ind. post., leg. HELFER.
- littorale** KRAATZ, 1857 (*Omalium*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 980)
2 Syntypen, Swinemünde, leg. SCHAUM.
DEI: 1 Syntypus, Swinemünde.
- lituratus** KRAATZ, 1857 (*Anthophagus*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 928–929)
Syntypen, Tirol, leg. KAHR.
DEI: 2 Syntypen, Tirol, leg. KAHR.
- longiceps** BERNHAUER, 1901 (*Paederus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1901, 247)
Syntypen, Margelan.
DEI: 1 Syntypus, Margelan, Centralasien.
- longicornis** KRAATZ, 1857 (*Quedius*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands, Abt. 1, 2, 494–495)
Syntypen; 1 Ex., Pommern; Thüringer Wald, leg. KELLNER.
DEI: 1 Syntypus, Thüringia, leg. KELLNER.
- longimanus** SMETANA, 1965 (*Ocypus*)
(Reichenbachia 5, 33–34)
♂ Holotypus, 6 Paratypen, Anatolia bor., Kulakkaya bei Giresun, 1450 m, 27. 7. 1963, leg. HEINZ, in Coll. SMETANA;
2 Ex., vom selben Fundort, leg. KORGE; 14 Ex., vom selben Fundort, 25. 5. 64; 2 Ex., Akkus bei Ünye, 1400 m, 28. 5. 1964,
leg. KORGE; 1 Ex., Tamdere bei Giresun, 1700 m, 25. 5. 64, leg. KORGE; in den Sammlungen SMETANA und KORGE.
DEI: 1 ♀ Paratypus, Anatolia bor., Kulakkaya bei Giresun, 1450 m, 25. 5. 64, leg. KORGE.
- longipennis** BERNHAUER, 1908 (*Apocellus*)
(Arch. Nat. 74, 287–288)
Syntypen, Paraguay, leg. DRAKE.
DEI: 2 Syntypen, Paraguay, leg. DRAKE.
- longipennis** KRAATZ, 1859 (*Micropeplus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 3, 69)
Syntypen, Germania.
DEI: 2 Syntypen, Bonn.
- longipennis** KRAATZ, 1859 (*Oedichirus*)
(Arch. Nat. 25, 154)
Holotypus, Nord-Indien, leg. BACON.
DEI: Holotypus, India or. (Etikettierungs- oder Druckfehler?).
- longulus** KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)
(Arch. Nat. 25, 99–100)
Syntypen; Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 8 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER; 1 Syntypus, Ostindien.
- lugubris** KRAATZ, 1856 (*Oxyroda*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 166)
Syntypen, Grafschaft Glatz, in sehr feuchtem Laub und Moos, leg. ZEBE und KRAATZ.
DEI: 1 Syntypus, Schlesien.
- luteipennis** KRAATZ, 1859 (*Stilicis*)
(Arch. Nat. 25, 126)
Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.
- luteipennis** FENYES, 1914 (*Tachysida*)
(Arch. Nat. 80 A 2, 47)
Holotypus, Formosa, Hoozan, leg. SAUTER, det. Nr. 4399, im DEI; 2 Paratypen, vom selben Fundort.
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- lygaea** KRAATZ, 1862 (*Aleochara*)
(Berl. Ent. Ztschr. 6, 317)
Syntypen; Rhein, leg. SCRIBA, KRAATZ; Ahrweiler, leg. FUSS.
DEI: 1 Syntypus, Ahrweiler.

- macrocera** THOMSON, 1856 (*Homalota*)
(Öfvers. K. Vet.-Akad. Förh. 1856, 106)
Syntypen, Schweden, Lund.
DEI: 1 Syntypus, Scania, THOMS.
- macropterum** KRAATZ, 1857 (*Anthobium*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 1015 nota)
Syntypen, Piemont, leg. GHILIANI.
DEI: 1 Syntypus, Piemont.
- macropterus** WEISE, 1875 (*Platysthetus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 19, 368)
Syntypen, Malaga, leg. WEHNCKE, in Coll. WEISE.
DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♀ Paralectotypus, Malaga, leg. WEHNCKE, von HAMMOND festgelegt.
- maculiger** WEISE, 1875 (*Stenus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 19 (1-2), 367)
Syntypen, Griechenland, leg. LUDY, im DEI.
DEI: 2 Syntypen, Graecia.
- maculipennis** KRAATZ, 1859 (*Aleochara*)
(Arch. Nat. 25, 17-18)
Syntypen; Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 1 Syntypus, Ceylon, leg. NIETNER; 2 Syntypen, Ind.post., leg. HELFER.
- maculipennis** KRAATZ, 1859 (*Staphylinus*)
(Arch. Nat. 25, 77)
Syntypen, Nord-Indien, leg. BACON.
DEI: 2 Syntypen, India spt., leg. BACON.
- maculipennis** KRAATZ, 1859 (*Sunius*)
(Arch. Nat. 25, 148)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 2 Syntypen, Ceylon.
- märkelii** KRAATZ, 1857 (*Mycetoporus*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 457)
Syntypen, Sächsische Schweiz, leg. MÄRKEL.
DEI: 2 Syntypen, Saxonia.
- magniceps** BERNHAUER, 1927 (*Agerodes*)
(Mem. Soc. Ent. Ital. 5 (1926), 159-160)
Syntypen, Brasilien, S. Catharina, Rio Capivary, 1888, leg. FRUHSTORFER, im DEI und in Coll. BERNHAUER.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- major** BERNHAUER, 1902 (*Arpedium*)
(Verh. zool. bot. Ges. Wien 52, 702-703)
Syntypen, Griechenland, Veluchi, am Rand von Schneefeldern, leg. APFELBECK.
DEI: 3 Syntypen, Veluchi, leg. APFELBECK.
- major** KRAATZ, 1857 (*Thinobius*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 883)
Holotypus, Süddeutschland, ohne nähere Fundortangabe, im DEI.
mandibularis KRAATZ, 1859 (*Leptochirus*)
(Arch. Nat. 25, 189-191)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 11 Syntypen, Ceylon.
- marginatis** KRAATZ, 1857 (*Quedius*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 512)
Syntypen, Freienwalde, leg. CALIX.
DEI: 2 Syntypen, German. b., leg. CALIX.
- marginatum** MÄKLIN, 1853 (*Olophrum*)
(Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou 26/III, 196)
Syntypen; Inneres der Halbinsel Kenai, leg. FRANKENHAUSER; Halbinsel Kenai, Mündung des Flusses Kaktnu, leg. HOLMBERG.
DEI: 1 Syntypus, Kenai.
- marginatus** WEISE, 1877 (*Oxytelus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 21, 96-97)
Syntypen, Japan, Jedo, leg. HILLER.
DEI: Lectotypus, Japonia, leg. HILLER, von HAMMOND festgelegt.
- marginicollis** KRAATZ, 1857 (*Leucoparyphus*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 394 nota)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 5 Syntypen, Ceylon.
- marmorellus** FAUVEL, 1895 (*Staphylinus*)
(Rev. d'Ent. 14, 253-254)
Syntypen: Birma, Carin Cheba, 900-1100 m, 5.-12.; Carin Asciiui Ghécu, 1400-1500 m, 3.-4.; leg. FEA. Sumatra. Ajer Mantior, 8., leg. BECCARI. Java orient. und occid., monts Tengger et Gedé, 1300 m, leg. FRUHSTORFER.
DEI: 6 Syntypen, Carin Cheba, 900-1100 m, 5.-12. 1888, leg. FEA.
- maura** SACHSE, 1852 (*Aleochara*)
(Stett. Ent. Ztg. 13, 117)
Syntypen, Vorgeb. d. g. Hoffnung.
DEI: 1 Syntypus, Cap. b. Esp.
- melanomerus** KRAATZ, 1859 (*Pinophilus*)
(Arch. Nat. 25, 160-161)
Holotypus, Ost-Indien, leg. HELFER, im DEI.
- melanopus** WENDELER, 1942 (*Paederus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 9, 102)
♂ Holotypus, Guatemala, leg. CONRADT, im DEI.
- melanurus** KÜSTER, 1853 (*Sunius*)
(Käf. Eur. 26, 76)
Syntypen; Spanien bei Carthagena; Dalmatien bei Fort Opus.
DEI: Lectotypus, Carthagena, von ISRAELSON (Commentat. biol. 37, 18-19; 1971) festgelegt.

- merditana* APFELBECK, 1907 (*Leptusa*)
(Sitz. Ber. Akad. Wiss. Wien 116 Abt. 1, 509—510)
Syntypen, Merdita, Munela- und Zebia-Gebirge, bei Fandi, unter Rotbuchenlaub.
DEI: 3 Syntypen, Merdita, Munela, 1906, leg. WINNEGUTH.
- metasternalis* EICHELBAUM, 1913 (*Elephrommisa*)
(Arch. Nat. 79 A 3, 156—157)
3 ♂♂, 6 ♀♀ Syntypen, Ost-Afrika, Berg Bomole, 11. & 13. 10. 1903, leg. EICHELBAUM.
DEI: 2 Syntypen, Amani, 10. 1903, leg. EICHELBAUM.
- meyeri* BERNHAUER, 1928 (*Hesperus*)
(Wien. Ent. Ztg. 45, 119)
Syntypen, Uganda, leg. MEYER, im DEI und in Coll. BERNHAUER.
DEI: 2 Syntypen, Uganda, leg. MEYER.
- micans* KRAATZ, 1855 (*Oxyptoda*)
(Stett. Ent. Ztg. 16, 331)
Holotypus, Griechenland, leg. KIESENWETTER, im DEI.
- micans* KRAATZ, 1859 (*Oxytelus*)
(Arch. Nat. 25, 175—176)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Ceylon, von HAMMOND festgelegt.
- micans* KRAATZ, 1857 (*Pelioptera*)
(Linnaea 11, 56)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 9 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- microcerus* KRAATZ, 1858 (*Pygostenus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 2, 362; Taf. 3a, b)
Syntypen, Guinea, Goldküste.
DEI: 1 ♀ Syntypus, Guinea.
- micros* KRAATZ, 1859 (*Scopaeus*)
(Arch. Nat. 25, 132—133)
Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.
- milleri* KRAATZ, 1862 (*Aleochara*)
(Berl. Ent. Ztschr. 6, 316—317)
Syntypen, Wien, leg. MILLER.
DEI: 1 Syntypus, Wien, leg. MILLER.
- minima* KRAATZ, 1853 (*Myllaena*)
(Stett. Ent. Ztg. 14, 374)
Syntypen, Bayern.
DEI: 2 Syntypen, Bavar., leg. WALLEL.
- minus* KRAATZ, 1859 (*Trogophloeus*)
(Arch. Nat. 25, 180—181)
Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.
- minuta* SACHSE, 1852 (*Oxyptoda*)
(Stett. Ent. Ztg. 13, 116—117)
Syntypen, N. Amerika, Georgia, leg. GERHARDT.
DEI: 1 Syntypus, Georgia, leg. GERHARDT.
- minutissima* KRAATZ, 1859 (*Aleochara*)
(Arch. Nat. 25, 19)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 1 Syntypus, Ceylon, leg. NIETNER.
- minutum* BERNHAUER, 1922 (*Leucocraspedum*)
(Arch. Nat. 88 A 7, 236)
Syntypen, Formosa, Anping, 6. 1911, leg. SAUTER.
DEI: 8 Syntypen, Formosa, Anping, 6. 1911, leg. SAUTER.
- mirabilis* KRAATZ, 1899 (*Phocasoma*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1899, 363—364)
Holotypus, Kamerun, Johann Albrechts-Höhe, leg. CONRADT, im DEI.
- misella* KRAATZ, 1856 (*Oxyptoda*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 190)
Syntypen, bei Berlin, unter feuchtem Laub, leg. KRAATZ.
DEI: 1 Syntypus, Berlin.
- modestus* KRAATZ, 1857 (*Quedius*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 509—510)
Syntypen, 1 Ex. Schlesien; einige Ex. aus Norddeutschland.
DEI: 1 Syntypus, Silesia.
- molochinus dalmatinus* KORGE, 1960 (*Quedius*)
(Mitt. dtsh. ent. Ges. 19, 68—69)
♂ Holotypus, Castelnuovo, Dalmatia, 1910, leg. HILF, im DEI.
- monachorum* BERNHAUER, 1912 (*Leptusa*)
(Ent. Ztschr. Frankfurt a.M. 25, 263)
Einige Syntypen, Mazedonien, Berg Athos, leg. SCHATZMAYER.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- montana* KRAATZ, 1856 (*Oxyptoda*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Col. 2, 187)
Syntypen, „in gebirgigen Theilen Oesterreichs“.
DEI: 1 Syntypus, „alpe“.
- montenegrius* PUTHZ, 1972 (*Stenus*)
(Wiss. Mitt. Bosn.-herz. Landesmus. 1 (1971) Nat., 272—273)
♂ Holotypus, 2 ♀♀ Paratypen, Montenegro, Ubli, 1903, leg. LEONHARD, im DEI (auf den Etiketten ist Ubli noch unter der Landesbezeichnung „Herzegovina“ eingetragen).
DEI: ♂ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, Herzegovina, Ubli, 1903, leg. LEONHARD.
- monticola* CAMERON, 1924 (*Ancyrophorus*)
(Trans. Ent. Soc. London 1924, 174—175)
Syntypen, Indien, Simla Hills, Gahan, 7000 Fuß.
DEI: 2 Syntypen, Gahan, 7000 Fuß, Simla Hills, 9. 1921, leg. CAMERON.

- monticola** CAMERON, 1924 (*Lathrimaemum*)
(Trans. Ent. Soc. London 1924, 169–170)
Syntypen, Indien, Chakrata und Simla Distrikt, 7000–9000 Fuß.
DEI: 1 Syntypus, Gahan, Simla Hills, 7000 Fuß, 9. 1921, leg. CAMERON.
- monticola** CAMERON, 1930 (*Phyllocladepa*)
(Fauna Brit. Ind. Col. Staph. 1, 137)
Syntypen, Indien, Chakrata district, Bodyar, 8300 Fuß, leg. CAMERON.
DEI: 1 Syntypus, Chakrata Dist., Bodyar, 8300 Fuß, 3.–12. 5. 1922, leg. CAMERON.
- moratus** L. W. SCHAUFUSS, 1882 (*Espeson*)
(Ann. Soc. Ent. France VI. 2, 45)
Syntypen, St. Thomas.
DEI: 2 Syntypen, S. Thomas.
- morstatti** SCHERPELTZ, 1956 (*Eleusis*)
(Rev. Zool. Bot. Afr. 53, 492)
Holotypus, Paratypen, Kamerun, Franz. Kongo, im DEI.
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Kamerun, Victoria Co., 10. 1929.
- mortuorum** BERNHAUER, 1922 (*Osorius*)
(Arch. Nat. 88 A 7, 226–227)
Syntypen, Formosa, Suisharyo, leg. SAUTER.
DEI: 3 Syntypen, Formosa, Suisharyo, 10. 1911, leg. SAUTER.
- mucronata** KRAATZ, 1859 (*Homalota*)
(Arch. Nat. 25, 29–30)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 6 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- mülleri** BERNHAUER, 1927 (*Holotrochus*)
(Ent. Mitt. 16, 123)
Syntypen, Afrika, Lagos, im DEI und Coll. BERNHAUER.
DEI: 11 Syntypen, Lagos.
- munelensis** APFELBECK, 1907 (*Leptusa*)
(Sitz. Ber. Akad. Wiss. Wien 116 Abt. 1, 508–509)
Syntypen, Albanien, Merdita, Munela-Gebirge bei Fandi, unter Eichenlaub.
DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Merdita, Munela.
- mustela** ROTTENBERG, 1870 (*Myrmedonia*)
(Berl. Ent. Ztschr. 14, 25–26)
3 Syntypen, Sizilien, Catania, am Fuß eines Baumes, in Gesellschaft von Ameisen, 26. 2.–5. 4. 1869, leg. ROTTENBERG.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundortangaben.
- mutator** FAUVEL, 1895 (*Cryptobium*)
(Rev. d'Ent. 14, 236–237)
Syntypen; Birma, Carin Ghècu, 1300–1400 m, 2.–3.; Carin Ascuii Ghècu, 1400–1500 m, 3.–4.; Tienzo, 5.; Tenasserim, Meetan, 4.; alle leg. FEA.
DEI: 2 Syntypen, Carin Ascuii Ghècu, 1400–1500 m, 3.–4. 88, leg. FEA; 1 Syntypus, Teinzo, Birmania, 5. 1886, leg. FEA.
- myagrus** ROTTENBERG, 1870 (*Quedius*)
(Berl. Ent. Ztschr. 14, 29–30)
Syntypen; Sizilien, Syrakus, 6.–21. 4. 1869 und Nicolosi, 9.–13. 5. 1869; Rom; alle leg. ROTTENBERG.
DEI: 2 Syntypen, Nicolosi; 2 Syntypen, Syrakus; 4 Syntypen, Rom; alle leg. ROTTENBERG.
- mycetophaga** KRAATZ, 1856 (*Aleochara*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 102–103)
Syntypen; Grafschaft Glatz, leg. ZEBE und KRAATZ, aus Gichtpilz; Frankreich, leg. AUBÉ.
DEI: 1 Syntypus, Gall., leg. AUBÉ.
- myops** KIESENWETTER, 1850 (*Homalota*)
(Stett. Ent. Ztg. 11, 219)
Syntypen, Pyrenaei orientales.
DEI: 1 Syntypus, Pyren.
- myrmecobia** KRAATZ, 1856 (*Homalota*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 285)
Syntypen, Sachsen, Schlesien, in Gesellschaft von *Formica rufa*.
DEI: 3 Syntypen, Silesia.
- myrmecocephalum** LEA, 1904 (*Cryptobium*)
(Proc. Linn. Soc. N.S.W. 29, 71–72; Taf. 4, Fig. 3)
Syntypen, Australien, N.S.W., Clarence River.
DEI: 1 Syntypus, N.–S. Wales.
- nalandensis** BERNHAUER, 1902 (*Belonuchus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1902, 30)
2 Syntypen, Ceylon, Nalanda, leg. HORN, in Coll. BERNHAUER.
DEI: 1 Syntypus, Nalanda, 1899, leg. HORN.
- nana** KRAATZ, 1859 (*Homalota*)
(Arch. Nat. 25, 36)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 4 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- nevermanni** REICHENSBERGER, 1935 (*Ecitomorpha*)
(Arb. morph. tax. Ent. 2, 211–212)
Holotypus, zahlreiche Paratypen, Costa Rica, Hamburg-Farm, Ebene Limon, bei *Eciton burchelli*, 7.–12. 1933, 1934, leg. NEVERMANN. Holotypus in Coll. REICHENSBERGER, Paratype, im DEI.
DEI: 1 Paratypus, Costa Rica, Hamburg Farm, Reventazon, Ebene Limon, 31. 10. 1934, leg. NEVERMANN.
- nevermanni** BENICK, 1938 (*Stenus*)
(Mitt. Münch. Ent. Ges. 28, 277)
Syntypen; Costa Rica, Hamburgfarm, Reventazon, Ebene Limon, von 1922–1934; Lasmerce des Santa Clara, 300–400 m, 15. 11. 1922; Peralta, 400 m, 26. 1. 33, an *Heliconia*-Blatt, leg. NEVERMANN. (Genauere Beschreibung und Typenfestlegung in Mitt. Münch. Ent. Ges. 29, 623–626).
DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Costa Rica, Lasmercedes, 200–300 m, 15. 6. 1922; 2 Syntypen, Costa Rica, Hamburgfarm, Reventazon, Ebene Limon, 28. 1. & 22. 8. 1933, leg. NEVERMANN.
- nietneri** KRAATZ, 1857 (*Myrmedonia*)
(Linnaea 11, 52–53)
Syntypen, Ceylon, Termitenhügel bei Negombo, 1855, leg. NIETNER.
DEI: 8 Syntypen, Ceylon, Negombo, leg. NIETNER.

- niger* CAMERON, 1925 (*Astilbus*)
(Trebua 6, 194)
16 Syntypen, Pangrango, 2400 m, 8. 1921, leg. DAMMERMAN.
DEI: 6 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, 1 Ex., als Typus von CAMERON ausgezeichnet.
- niger* KRAATZ, 1858 (*Glyphesthus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 2, 365-366, Taf. 3e)
Syntypen, Senegambia, leg. BOCANDÉ.
DEI: 1 Syntypus, Sénégal.
- niger* KRAATZ, 1868 (*Heterothops*)
(Berl. Ent. Ztschr. 12, 352)
Holotypus, Thüringen, unter feuchtem Laub, leg. KELLNER, im DEI.
niger BERNHAUER, 1906 (*Stymgetus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1906, 197-198)
Syntypen; Brasilien, Espirito Santo; Brasilien, ohne nähere Angaben; Paraguay, leg. DRAKE.
DEI: 1 Syntypus, Paraguay, leg. DRAKE; 2 Syntypen, Espirito-Santo, Brasil; 2 Syntypen, Brasil.
- nigerrima* KRAATZ, 1856 (*Aleochara*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 104 nota)
Syntypen, Spanien, leg. HANDSCHUCH.
DEI: 1 Syntypus, Spanien, leg. HANDSCHUCH.
- nigerrima* KRAATZ, 1859 (*Lithocharis*)
(Arch. Nat. 25, 141-142)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 4 Syntypen, Ceylon.
- nigerrimus* KRAATZ, 1859 (*Xantholinus*)
(Arch. Nat. 25, 103-104)
Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 3 Syntypen, Ostindien.
- nigra* KRAATZ, 1859 (*Aleochara*)
(Arch. Nat. 25, 13-14)
Syntypen, Insel Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 4 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- nigra* CAMERON, 1925 (*Amaurodera*)
(Trebua 6, 191-192)
Holotypus, Tjibodas, 1500 m, 8. 7. 1920, leg. DAMMERMAN; Tobameer, Sumatra, 3. 1922, leg. DAMMERMAN. Die Typenserie besteht aus 9 Ex., aus der Beschreibung ist nicht ersichtlich, wieviel Exemplare von den beiden Fundorten vorlagen.
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Tjibodas, 1500 m, 8. 7. 1920, leg. DAMMERMAN.
- nigra* KRAATZ, 1859 (*Gyrophaena*)
(Arch. Nat. 25, 49)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 9 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- nigra* KRAATZ, 1856 (*Homalota*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 287-288)
Syntypen, Deutschland, ohne nähere Fundortangabe.
DEI: 5 Syntypen, Berlin; 1 Syntypus, Barmen; 1 Syntypus, Misdroy.
- nigra* KRAATZ, 1858 (*Lesteva*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 934 nota)
Holotypus, Sicilien, leg. GROHMANN, im DEI.
- nigriceps* KRAATZ, 1859 (*Lithocharis*)
(Arch. Nat. 25, 139)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 6 Syntypen, Ceylon.
- nigriceps* KRAATZ, 1859 (*Myrmedonia*)
(Arch. Nat. 25, 22)
♀ Holotypus, Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: Holotypus, Ind.post., leg. HELFER.
- nigriceps* KRAATZ, 1859 (*Oxytelus*)
(Arch. Nat. 25, 171-172)
Syntypen; Ost-Indien, leg. HELFER; Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: ♂ Lectotypus, 1 Paralectotypus, India or; 5 Paralectotypen, Ceylon, von HAMMOND festgelegt.
- nigriceps* KRAATZ, 1857 (*Quedius*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 510-511)
Syntypen, Crefeld, leg. MINK.
DEI: 3 Syntypen, Germ., Crefeld.
- nigripennis* BERNHAUER, 1936 (*Oxytelus*)
(Phil. Journ. Sci. 61, 82)
Syntypen; Luzon, Los Baños; Mindanao, Surigao und Momungan.
DEI: 2 Paralectotypen, Momungan, Mindanao, von HAMMOND festgelegt.
- nigroaeneus* KRAATZ, 1859 (*Mitomorphus*)
(Arch. Nat. 25, 106-107)
Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.
- nitens* KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)
(Arch. Nat. 25, 82)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 2 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- nitida* PETRI, 1891 (*Lithocharis*)
(Verh. u. Mittlg. Siebenbürg. Ver. Nat. Hermannstadt 41, 14-15)
5 Syntypen, Siebenbürgen, Schäßburg, unter Blättern am Waldrande, 15., 19. 3., leg. PETRI.
DEI: 2 Syntypen, Siebenbürgen.
- nitidula* KRAATZ, 1856 (*Homalota*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 211-212)
Zahlreiche Syntypen; aus ganz Deutschland; Berlin, unter feuchtem Laub und Moos.
DEI: 3 Syntypen, Berlin; 1 Syntypus, Bonn; 2 Syntypen, Rauden; 1 Syntypus, Darmstadt, Klingeth?.
- nitidula* KRAATZ, 1859 (*Myllaena*)
(Arch. Nat. 25, 50)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 6 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

- nitidulus** KRAATZ, 1857 (*Megarthus*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 1028–1029)
Syntypen; Schlesien, Grafschaft Glatz, leg. ZEBE; Cassel, leg. RIEHL.
DEI: 1 Syntypus, Mollenfelde, leg. RIEHL.
- nitouensis** SCHEERPELTZ, 1962 (*Atheta*)
(Beitr. Ent. 12, 600–601)
♀ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, Nitou Tatsienlu, Szechuan, China, leg. REITTER. Holotypus, im DEI, 1 ♀ Paratypus, in Coll. SCHEERPELTZ.
DEI: ♀ Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- nitouensis** BERNHAUER, 1935 (*Oxytelus*)
(Ent. Nachrichtenbl. Troppau 9, 4)
Syntypen; China, Szechuan, Nitou Tatsienlu; Ginyün b. Bébé, Tempelberg, 900 m.
DEI: 1 Paralectotypus, Nitou Tatsienlu, Szechuan, China, leg. REITTER, von HAMMOND festgelegt.
- nodipes** PUTHZ, 1972 (*Stenus*)
(Wiss. Mitt. Bosn.-herz. Landesmus. 1 (1971) Nat., 250–251, Fig. 3)
♂ Holotypus, Bulgarien, Sofia, Sv. Ivan, 5. 8. 08, leg. RAMBOUSEK; 1 ♀ Paratypus, Sofia, leg. APPELBECK; 2 ♂♂, 3 ♀♀, Samokov, 1911, leg. HILF; 1 ♂, Jugoslawien, Strumica, 19. 5. 1937, leg. LIEBMANN, im DEI.
DEI: 1 ♂, 2 ♀♀ Paratypen, Bulg. Samokov, 1911, leg. HILF.
- notabilis** KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)
(Arch. Nat. 25, 79–80)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 3 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER; 1 Syntypus, Ostindien.
- novoteutonicus** WENDELER, 1956 (*Hesperus*)
(Dusenien 7, 232)
Holotypus, Paratypen, Brasilien, Nova Teutonia, aus faulendem Laub von *Phytolacca doica* L. gesiebt, leg. PLAUMANN, in den Sammlungen FRANCKE und WENDELER.
DEI: 1 Paratypus, Brasilien, Nova Teutonia, leg. PLAUMANN.
- novoteutoniensis** WENDELER, 1955 (*Lispinus*)
(Dusenien 6, 191)
Syntypen, Brasilien, Nova Teutonia, in den Sammlungen FRANCKE und WENDELER.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- novigena** KRIESENWITTER, 1861 (*Leptusa*)
(Berl. Ent. Ztschr. 5, 375)
Syntypen, Schweiz, Monte Moro.
DEI: 2 Syntypen, M. Moro.
- obenbergeri** RAMBOUSEK, 1928 (*Lathrobium*)
(Casopis 25, 32, Fig. 5)
Mehrere Syntypen, Montenegro, Maglič, 9. 1913, leg. OBENBERGER.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- obliquestriatus** BERNHAUER, 1920 (*Megalops*)
(Neue Beitr. syst. Insektk. 2, 11)
Syntypen, Caracas.
DEI: 1 ♀ Syntypus, Caracas.
- obscura** BERNHAUER, 1901 (*Eleusis*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1901, 172)
Syntypen, Madagaskar, Port Daufin.
DEI: 1 Syntypus, Madagaskar, Port Daufin, Plason.
- obscura** KRAATZ, 1857 (*Oxyptoda*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 1057)
Syntypen, Thüringer Wald, bei Georghenthal, an Sumpfstelle, leg. KELLNER.
DEI: 2 Syntypen, Thüringen, leg. KELLNER.
- obscuricornis** BENICK, 1949 (*Stenus*)
(Rev. d'Ent. 20, 562–564, Fig. 3)
Syntypen, Brasilien: 1 Ex., Mae d'agua, am Rio Pajehú, vom Grase (Mun. Floresta, Staate Pernambuco), 2. 9. 1937; einige Ex., Rio São Francisco bei Belém (aktual Jatíná), am Ufer vom Grase (Mun. Belém, atual Jatíná, Staate Pernambuco), 3. 9. 1937; einige Ex., vom selben Fundort, auf einer kleinen Insel im Rio São Francisco, vom Gebüsch und Gras, 3. 9. 1937; zahlreiche Ex., Barra da Boa Vista (aktual Coripós), am eintrocknenden Uferand eines Nebenarmes des Rio São Francisco (Mun. Boa Vista, atual Coripós, Staat Pernambuco), 8. 9. 1937; Acude Quixabá, am von Viehtritten durchfurchten Uferand (Mun. Ouricury, Staat Pernambuco), 16. 11. 1937; alle leg. SCHUBART.
DEI: 1 Syntypus, Brasilien, Pernambuco, Boa Vista, 8. 9. 1937, leg. SCHUBART.
- obscurum** KRAATZ, 1859 (*Omalium*)
(Arch. Nat. 25, 181–182)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 12 Syntypen, Ceylon.
- obscurus** SOLIER, 1849 (*Physognathus*)
(In: GAY, Historia fisica y politica de Chile Zoologia 4, 304)
Syntypen, Valdivia.
DEI: 1 Syntypus, Chili, Valdivia.
- ocellata** BENICK, 1937 (*Megalopsidia*)
(Arb. morph. tax. Ent. 4, 81–82)
Holotypus, Costa Rica, La Caja, 8 km w. San José, leg. SCHMIDT, im DEI.
- ochracea** KRAATZ, 1857 (*Hoplandria*)
(Linnaea 11, 6–7)
Syntypen, Georgia, leg. GERHARD.
DEI: 4 Syntypen, Georgia, GERHARD.
- ochraceus** KRAATZ, 1859 (*Sclerochiton*)
(Arch. Nat. 25, 134)
Holotypus, Ost-Indien, leg. HELFER, im DEI.
- ocreatus** PUTHZ, 1970 (*Stenus*)
(Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg. 46 (18), 11–13, Abb. 11)
♂ Holotypus, 4 ♂♂, 3 ♀♀ Paratypen, Indien, Arni Gad, Mussoorie, 16. 10. 1921, leg. CAMERON; Holotypus, Paratypen, im British Mus.; Paratypen im DEI, in Coll. BENICK und PUTHZ.
DEI: 1 ♂ Paratypus, Arni Gad., Mussoorie, 16. 11. 1920, leg. CAMERON.
- ocularis** FENYES, 1914 (*Astilbus*?)
(Arch. Nat. 80 A 2, 50–51)
Holotypus, Formosa, Kankau (Koshun), leg. SAUTER, det. Nr. 4376, im DEI.

- oculorum** BENICK, 1943 (*Atheta*)
(Ent. Bl. 39, 67-68)
♀ Holotypus, Gad pecina, Volujak, O. LEONHARD, im DEI.
- oedypus** ROTTENBERG, 1870 (*Oedichirus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 14, 34-35)
2 Syntypen, Sizilien, Piano di Catania, am Fuß von Weißpappeln, 26. 2. - 5. 4. 1869, leg. ROTTENBERG.
DEI: 1 Syntypus, Catania, leg. ROTTENBERG.
- oertzeni** EPPELSHEIM, 1888 (*Homalota*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 32, 405-406)
Syntypen, Griechenland, Attika und Parnaß.
DEI: 4 Syntypen, Griechenland, Insel Ingistri, leg. v. OERTZEN.
- opaca** FENYES, 1914 (*Homalota*?)
(Arch. Nat. 80 A 2, 46)
♀ ? Holotypus, Formosa, Taihorin, leg. SAUTER, det. Nr. 4392, im DEI; 1 Paratypus, vom selben Fundort.
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- opaca** KRAATZ, 1857 (*Pelicoptera*)
(Linnaea 11, 56)
Syntypen, Ceylon, in Termiten- und Ameisennestern, leg. NIETNER.
DEI: 8 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- opacicolis** KRAATZ, 1859 (*Falagria*)
(Arch. Nat. 25, 4)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 1 Syntypus, Ceylon, leg. NIETNER.
- opacus** KRAATZ, 1857 (*Oxytelus*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 851-852)
1 ♂, 2 ♀♀ Syntypen, Wien, leg. VON FERRARI.
DEI: ♂ Lectotypus, 2 ♀♀ Paralectotypen, Austr., leg. FERRARI, von HAMMOND festgelegt.
- opacus** CAMERON, 1924 (*Phloeonomus*)
(Trans. Ent. Soc. London 1924, 168)
Syntypen, Indien, Chakrata District; Simla Hills, 7000-8000 Fuß.
DEI: 1 Syntypus, Gahan, Simla Hills, 7000 Fuß, 9. 1921, leg. CAMERON.
- oppidana** KRAATZ, 1857 (*Lithocharis*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 711-712)
Mehrere Syntypen, Berlin, Garten von Monbijou, unter feuchtem Laub, leg. MAYER und CALIX.
DEI: 1 Syntypus, Berlin, leg. CALIX; 1 Syntypus, Berlin, leg. MAYER; 1 Syntypus, Umgeb. Berlin.
- oraria** KRAATZ, 1856 (*Homalota*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 209-210 nota)
Syntypen, Ufer des Mittelmeeres.
DEI: 1 Syntypus, Mare mediterr.
- orbis** KIESENWETTER, 1850 (*Philonthus*)
(Stett. Ent. Ztg. 11, 220)
Syntypen, Perpiniacum, Gerona.
DEI: 2 Syntypen, Perpignan.
- oryctopea** KOCH, 1934 (*Schatzmayrina*)
(Bull. Soc. Roy. Ent. Egypte 18, 69-70)
Syntypen, Ägypten, Pyramiden von Ghizeh, 29. 7. 1933; Sykkorah, 15. und 23. 9. 1933; 1 Ex., im Feld unter einem Stein; mehrere Ex., aus Ufererde des Nils geschwemmt.
DEI: 1 Syntypus, Cairo, Pyramidi, 29. 7. 33, leg. WITTMER.
- oxydoides** BRUNDIN, 1952 (*Atheta*)
(Ent. Tidskr. 73, 106-108, Fig. 13-15)
♂ Holotypus, 6 Paratypen, Marokko, leg. ROLPH, im DEI; 3 Paratypen, Oran, Tlemcen, im DEI.
DEI: Holotypus, 6 Paratypen, Marocco, leg. ROLPH; 3 Paratypen, Tlemcen, Oran.
- padana** WEISE, 1878 (*Homalota*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 22, 38-39 nota)
Syntypen, Monte Viso, leg. THIEME.
DEI: 1 ♂ Syntypus, M. Viso, leg. THIEME.
- paganetti** BERNHAUER, 1909 (*Atheta*)
(Ent. Bl. 5, 200-201)
Syntypen, Mittelitalien, Mte. Pagano, leg. HUMMLER PAGANETTI.
DEI: 1 Syntypus, Mte. Pagano, leg. PAGANETTI.
- palawanensis** WENDELER, 1928 (*Priochirus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1928, 120)
Syntypen, Palawan, Binaluan, 11. 1913, leg. BOETTCHER.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- pallidulus** KRAATZ, 1859 (*Scopaeus*)
(Arch. Nat. 25, 131)
Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.
- palliolatus** KRAATZ, 1857 (*Tachinus*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 408-409)
Syntypen; Seligenstadt, leg. SCRIBA; Frankfurt a.M., leg. HAAG.
DEI: ♂ Lectotypus, Germ. mer., hiermit festgelegt.
- pallipes** KRAATZ, 1859 (*Pinophilus*)
(Arch. Nat. 25, 156-157)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 3 Syntypen, Ceylon.
- paludum** KRAATZ, 1858 (*Calodera*)
(Berl. Ent. Ztschr. 2, 50-51)
Syntypen, auf Sumpfwiesen in Nauplia, leg. v. KIESENWETTER.
DEI: 1 Syntypus, Graecia, Nauplia, leg. v. KIESENWETTER.
- pangrangoensis** CAMERON, 1925 (*Atheta*)
(Treubia 6, 192)
4 Syntypen, Pangrango, 300 m.
DEI: 1 ♂ Syntypus, Pangrango, 300 m, 8. 1921.

- pangrangoensis* CAMERON, 1925 (*Stenus*)
(Treubia 6, 179)
11 Syntypen, Pangrango, 3000 m, 8. 1921, 5. 1922, leg. DAMMERMAN.
DEI: 3 Syntypen, Pangrango, 1 Ex., 5. 1922, 2 Ex., 8. 1921, leg. DAMMERMAN.
- papuana* CAMERON, 1924 (*Aleochara*)
(Nova Guinea Zool. 15, 1, 87)
5 Syntypen, Neu Guinea, Doormanpaddbivak, 1410 m, 10. 1920.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
- papuanus* CAMERON, 1931 (*Philonthus*)
(Rec. South Austr. Mus. 4, 362)
Syntypen, Neu Guinea, Mount Lamington, leg. MC.NAMARA.
DEI: 1 Syntypus, Papua.
- papuanus* CAMERON, 1924 (*Priochirus*)
(Nova Guinea Zool. 15, 1, 84, 86)
24 Syntypen, Neu Guinea, Doormanpaddbivak; Mamberano Riv.
DEI: 4 Syntypen, N. Guinea, Doormanpaddbivak, 1410 m, 10. 1920, leg. VAN HEURN; 2 Syntypen, N. Guinea, Mamberano Riv., Pionierbivak, 1 Ex., 1920, 1 Ex., 1. 1921, leg. VAN HEURN.
- paraguayanus* WENDELER, 1942 (*Paederus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 9, 102–103)
♂ Holotypus, Paraguay, im DEI.
- parapicipennis* BRUNDIN, 1954 (*Atheta*)
(Ark. Zool. (N. F.) 5, 386, Fig. 34, 35)
♂ Holotypus, 2 ♂♂ Paratypen, Schweden, Jämtland, Gem. Undersåker, Hottöfjället, 7. 9. 1938, in Elchmist in der oberen Waldregion, leg. BRUNDIN, in Coll. BRUNDIN; 1 ♂, Nordnorwegen, Målselvgebiet, Framnes, leg. STRAND; 1 ♂, Lakselv in Porsanger, leg. STRAND, in Coll. STRAND; Transsylvania, 1887, leg. BRENSKE, im DEI.
DEI: 1 Paratypus, Transsylvania, 1887, leg. BRENSKE.
- parva* KRAATZ, 1859 (*Falagria*)
(Arch. Nat. 25, 6–7)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 3 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- parva* KRAATZ, 1862 (*Oligota*)
(Berl. Ent. Ztschr. 6, 300; nom. nov. pro *pygmaea* KRAATZ, 1858, Berl. Ent. Ztschr. 2, 352)
Syntypen, Rouen.
DEI: Lectotypus, Nevires de Rouen, leg. AUBÉ, von WILLIAMS 1972 (Ent. monthly Mag. 108, 20) festgelegt.
- parviceps* KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)
(Arch. Nat. 25, 86–87)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 6 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- parvicollis* KRAATZ, 1859 (*Myllaena*)
(Berl. Ent. Ztschr. 3, 15–16)
Holotypus, Chile, leg. DEUROLLE, im DEI.
- parvipennis* BERNHAUER, 1908 (*Apocellus*)
(Arch. Nat. 74, 288)
Syntypen, Paraguay, leg. DRAKE.
DEI: 2 Syntypen, Paraguay, leg. DRAKE.
- parvipennis* BERNHAUER, 1922 (*Astenus*)
(Arch. Nat. 88 A 7, 229–230)
Syntypen, Formosa, Takao, leg. SAUTER.
DEI: 1 Syntypus, Takao, Formosa, 12. 1907, leg. SAUTER.
- parvipennis* WENDELER, 1956 (*Medon*)
(Dusenja 7, 224)
Holotypus, Paratypen, Brasilien, Nova Teutonia, leg. PLAUMANN.
DEI: 1 Paratypus, Brasilien, Nova Teutonia, 27°11' B, 52°23' L, 300–500 m, leg. PLAUMAN.
- parvula* BRISOUT, 1863 (*Oxyypoda*)
(In: GRENIER, A., Catalogue des Coléoptères de France, 20–21)
Syntypen, Collioure, leg. DELAROUZEE.
DEI: 2 Syntypen, Collioure.
- parvulus* KRAATZ, 1860 (*Dioclius*)
(Wien. ent. Monatsschr. 4, 27)
Holotypus, Bahia, im DEI.
- pelionerius* KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)
(Arch. Nat. 25, 82–83)
Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.
- pelioptera* KRAATZ, 1859 (*Homalota*)
(Arch. Nat. 25, 30)
Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 2 Syntypen, Ind. post., leg. HELFER.
- peltata* ERICHSON, 1840 (*Aleochara*)
(Genera et Species Staphylinorum, 172)
Syntypen, Mexico.
DEI: 1 Syntypus, Mexico.
- pendleburyi* CAMERON, 1933 (*Paroxypodinus*)
(Journ. Fed. Malay States Mus. 17, 351–352)
130 Syntypen, Brit. N. Borneo, Mount Kinabalu, Kamborangah, 7200 Fuß, 28. 3. 20, 4. 4. 29, leg. PENDLEBURY.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- pensylvanicus* KRAATZ, 1857 (*Philoterme*)
(Linnaea 11, 15)
Syntypen, Pemsylvanien, leg. SCHAUH.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundortangaben.
- peraffinis* FAUVEL, 1895 (*Stenus*)
(Rev. d'Ent. 14, 209–210)
Syntypen, Birma, Carin Aschui Ghécu, 1400–1500 m, 3.–4., leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

- peratus** CAMERON, 1930 (*Stenus*)
(En. Brit. India, Col. Staph. I, 344-345, Fig. 80)
Syntypen, Simla Hills, Chakrata district; Konain; Kanasar, alt. 7000-8000 Fuß.
DEI: 1 Syntypus, Chakrata Distr., Konain, 8000', 24.-30. 5. 1922, leg. CAMERON.
- percisia** ERICHSON, 1840 (*Falagria*)
(Genera et Species Staphylinorum, 52)
Syntypen, Brasilien, in Coll. GERMAR.
DEI: 1 Syntypus, Bras. L.
- peregrina** KRAATZ, 1859 (*Homalota*)
(Arch. Nat. 25, 39-40)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 6 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- pervagata** BENICK, 1975 (*Atheta*)
(Stuttgarter Beitr. Naturk. A Nr. 273, 16-17)
♀ Holotypus, Vöslau, Austria; 1 ♀ Paratypus, Deutschland, Hörter Weserbergland, 8. 8. 56; in Coll. BENICK; 1 ♂ Paratypus, Mte. Gargano, 9. 5. 1907, leg. HILF.
DEI: 1 ♂ Paratypus, Monte Gargano, 6., 7. 5. 1907, leg. HILF.
- peusi** WAGNER, 1949 (*Aleochara*)
(Kol. Ztschr. (Horion) 1, 18-29, Fig. 2, 6, 10, 13)
Einige Ex., Schönefeld, Teltov-Plateau, in Hamsterbauen, 19. 8. 1947, leg. WAGNER; Köthen (Anhalt), in Hamsterbauen, 1921, leg. HEIDENREICH; 2 Ex., Thale im Harz, in Hamsterbau, leg. FEHSE; 1 Ex., Leipzig, coll. HORION. Holotypus, Paratypen in der Märkischen Coleopteren Sammlung der Naturschutzstelle des Magistrats Berlin. Paratypen, in den Sammlungen WAGNER, HEIDENREICH und HORION.
DEI: 1 Paratypus, Mark, Umgebung Schönefeld.
- philippina** BERNHAUER, 1914 (*Eleusis*)
(Verh. zool. bot. Ges. Wien 64, 76-77)
Syntypen, Philippinen, Los Banos, leg. BAKER.
DEI: 1 Syntypus, Los Banos, leg. BAKER.
- picea** KRAATZ, 1858 (*Lithocharis*)
(Bull. Soc. Ent. France III, 6, CXCI-CXCII)
Syntypen, Umgeb. Paris.
DEI: 4 Syntypen, Paris.
- picinus** BERNHAUER, 1901 (*Medon*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1901, 245)
Zahlreiche Syntypen, Margelan und Turkestan, Aulie Ata.
DEI: 1 Syntypus, Margelan, REITTER.
- picipes** CAMERON, 1928 (*Masuria*)
(Ent. Monthly Mag. 64, 52)
Syntypen, Indien, Chakrata district, Sainj Khud, 6500 Fuß.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- picticornis** KRAATZ, 1859 (*Pinophilus*)
(Arch. Nat. 25, 158-159)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 2 Syntypen, Ceylon.
- pictipenne** KRAATZ, 1859 (*Conosoma*)
(Arch. Nat. 25, 63)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 2 Syntypen, Ceylon.
- pilosa** KRAATZ, 1856 (*Homalota*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 241-242)
Syntypen, Schlesien; südliches Deutschland.
DEI: 6 Syntypen, Silesia.
- pilosus** KRAATZ, 1857 (*Philoterme*)
(Linnaea 11, 14)
2 Syntypen, N. Amerika, Tennessee, in Termitennestern, leg. FUCHS.
DEI: 1 Syntypus, Tennessee, MÄRKEL.
- pilus** SCHUBERT, 1911 (*Stenus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1911, 7-8)
Syntypen, D.O. Afrika, Kenia, 2000 m, leg. v. VARENDORFF.
DEI: 2 ♀♀ Paralectotypen, Kenia, 2000 m, VARENDORFF, von PUTHZ (Ent. Abh. Mus. Tierk. Dresden 31, 548; 1965) festgelegt.
- pisciformis** KRAATZ, 1856 (*Homalota*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 317-318)
Syntypen, Norddeutschland, ohne nähere Fundortangaben.
DEI: 1 Syntypus, Misdroy.
- plagiatus** FAUVEL, 1895 (*Conurus*)
(Rev. d'Ent. 14, 282-283)
Syntypen, Birma, Carin Aschui Ghècu, 1400-1500 m, 3.-4., leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- plana** KRAATZ, 1859 (*Lithocharis*)
(Arch. Nat. 25, 136-137)
Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 2 Syntypen, India oriental.
- planaticollis** KRAATZ, 1857 (*Myrmedonia*)
(Linnaea 11, 51-52)
Syntypen, Ceylon, Umgeb. von Negambo, 1855, leg. NIETNER.
DEI: 3 Syntypen, Ceylon, Negambo, leg. NIETNER.
- planicollis** BERNHAUER, 1902 (*Trogophloeus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1902, 45)
3 Syntypen, Ceylon, Anuradhapura, leg. HORN, in Coll. BERNHAUER.
DEI: 2 Syntypen, Ceylon, Anuradhapura, 1899, leg. HORN.
- planifrons robustus** BENICK, 1914 (*Stenus*)
(Ent. Mitt. 3, 151-152)
Syntypen, Syrien, 1 ♀, Kaifa, 1 ♀, Bairut, im DEI, leg. LEUTHNER.
DEI: 1 Syntypus, Beirut, Syrien, 4. 85, leg. LEUTHNER.

- planipenne** MÄKLIN, 1853 (*Omalium*)
(Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou 26 (2), 198)
Syntypen, Insel Sitkha, leg. HOLMBERG und COLLAN; Halbinsel Kenai, leg. FRANKENHAEUSER.
DEI: 1 Syntypus, Sitkha.
- planipennis** BIERIG, 1933 (*Stilomedon*)
(Rev. d'Ent. 3, 489–491)
Holotypus, Paratypus, Costa Rica, La Caja, 1931, leg. SCHMIDT; Holotypus im DEI, Paratypus in Coll. BIERIG.
DEI: Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- planisculus** KRAATZ, 1859 (*Scopaeus*)
(Arch. Nat. 25, 132)
Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 2 Syntypen, India orient.
- platygaster** KRAATZ, 1859 (*Homalota*)
(Arch. Nat. 25, 33)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 4 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- plamanni** REICHENSBERGER, 1935 (*Dinardopsis*)
(Arb. morph. tax. Ent. 2, 216–217)
Holotypus, Paratypen, Nova Teutonia, S. Catherina, Brasilien, in Nestern von *Solenopsis saevissima*, 1934, leg. PLAUMANN.
Paratypus im DEI.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- plicatulus** L. W. SCHAUFUSS, 1877 (*Tetratarsus*)
(Pselaphiden Siams, 25)
Syntypen, Siam.
DEI: ♂ Lectotypus, Siam, Bangkok; 1 ♂ Paralectotypus, Siam; von PUTHZ (Philippia 2, 83–84; 1973) festgelegt.
- polita** KRAATZ, 1857 (*Tetrasticta*)
(Linnaea 11, 55)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 6 Syntypen, Ceylon.
- polita** EICHELBAUM, 1913 (*Pseudotetrasticta*)
(Arch. Nat. 79 A 3, 149–150)
8 Syntypen, Ostafrika, Amani, in Laublagen des Urwaldes, am Fuße des Berges Bomole, 11. u. 13. 10. 1903, leg. EICHELBAUM.
DEI: 2 Syntypen, Amani, 10. 1903.
- polystictipersonii** EICHELBAUM, 1913 (*Gyrophaena*)
(Arch. Nat. 79 A 3, 140–141)
Ca. 50 Syntypen, Ost-Afrika, Amani, nur in *Polystictus personii* FRIES, 4. 10. 1903, leg. EICHELBAUM.
DEI: 1 Syntypus, Amani, 4. 10. 1903.
- polystiptorum** EICHELBAUM, 1913 (*Gyrophaena*)
(Arch. Nat. 79 A 3, 140)
6 Syntypen, Ost-Afrika, Amani, in faulenden Polyporeen, 8. 1903, leg. EICHELBAUM.
DEI: 1 Syntypus, Amani, 8. 1903.
- posticus** FAUVEL, 1895 (*Stenus*)
(Rev. d'Ent. 14, 209)
Syntypen, Birma, Carin Cheba, 900–1100 m, 5.–12.; Carin Asciiui Ghècu, 1400–1500 m, 3.–4., leg. FEA.
DEI: 1 Paralectotypus, Carin Asciiui Ghech, 1400–1500 m, 3. u. 4. 1888, leg. FEA, von PUTHZ (Bull. Inst. r. Sci. nat. Belg. 45 (9), 38; 1969) festgelegt.
- praenobilis** KRAATZ, 1879 (*Bolitobius*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 23, 121; Taf. 2, Fig. 1)
Holotypus, Amur, leg. CHRISTOPH, im DEI.
- pratti** SCHEERPELTZ, 1962 (*Staphylinus*)
(Beitr. Ent. 12, 593–596, Fig. 4)
♂ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, Kiukiang, June 1887, leg. PRATT; Holotypus im DEI, Paratypus, in Coll. SCHEERPELTZ.
DEI: Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- princeps** FAUVEL, 1895 (*Medon*)
(Rev. d'Ent. 14, 227)
Syntypen, Birma, Carin Cheba, 500–1000 m, 12.; Carin Asciiui Ghècu, 1400–1500 m, 3.–4., leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Carin Asciiui Ghech, 1400–1500 m, 3.–4. 1888, leg. FEA.
- procera** KRAATZ, 1856 (*Homalota*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 307–308)
Syntypen, Thüringen, leg. KELLNER.
DEI: 1 Syntypus, Thüringen, leg. KELLNER.
- procera** KRAATZ, 1859 (*Myrmedonia*)
(Arch. Nat. 25, 20–21)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 2 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- procerus** KRAATZ, 1879 (*Oxyporus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 23, 122; Taf. 2, Fig. 3)
Holotypus, Amur, leg. CHRISTOPH.
DEI: Holotypus, Amur, 1877, leg. CHRISTOPH.
- procerus** KRAATZ, 1859 (*Scopaeus*)
(Arch. Nat. 25, 127)
Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 2 Syntypen, India orient.
- productus** KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)
(Arch. Nat. 25, 89)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 6 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- profundepunctatus** BENICK, 1916 (*Stenus*)
(Ent. Mitt. 5, 241–242)
Holotypus, S-O-Kamerun, Lolodorf, 1895, leg. CONRADT, im DEI.
- prolongatum** ROTTENBERG, 1873 (*Lathrimaeum*)
(Berl. Ent. Ztschr. 17, 203–204)
Syntypen, Schlesien, Riesengebirge, Melzer-Grund, 5. 1871, leg. ROTTENBERG; 1 Ex., Breslau, Sommer 1871, leg. SCHWARZ; Schlesien, Altvater-Gebirge.
DEI: 1 Syntypus, Altvater.

- prosequens** REICHENSPERGER, 1935 (*Tetradonia*)
(Arb. morph. tax. Ent. 2, 215–216)
Holotypus, mehrere Paratypen, Costa Rica, Hamburg-Farm und Ramal, Parismia, S. Clara, im Zuge von *E. hamatum*, 8. 26, 8. 28, leg. NEVERMANN. Paratypen im DEI.
DEI: 1 Paratypus, Costa Rica, Hamburgfarm, Reventazon, Ebene Limon, 28. 8. 1926, leg. NEVERMANN.
- proxima** KRAATZ, 1856 (*Homalota*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 314–315)
Syntypen, Süddeutschland, ohne nähere Fundortangaben.
DEI: 1 Syntypus, Germ.m.
- proximus** KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)
(Arch. Nat. 25, 80)
Holotypus, Nord-Indien, leg. BACON.
DEI: Holotypus, India or., leg. BACON (Druck- oder Schreibfehler?).
- proximus** KRAATZ, 1855 (*Tachinus*)
(Stett. Ent. Ztg. 16, 25)
Syntypen; Habitat in Germania, prope Bonn, (ipse legi); in Galliae montosis, leg. REY.
DEI: 1 Syntypus, Cassel; 1 Syntypus, Barmen.
- pruinosa** KRAATZ, 1856 (*Homalota*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 228–229 nota)
Syntypen, Ufer des Mittelmeeres, besonders an der italienischen Küste.
DEI: 1 Syntypus, Sicil.?, leg. SCHÖDTE.
- pruinosis** CAMERON, 1925 (*Stilicis*)
(Treubia 6, 182)
7 Syntypen, Java, Tjibodas, 1400 m, 23. 5. 1922, leg. DAMMERMAN.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
- pseudopalpestris** SCHEERPELTZ, 1935 (*Leptusa*)
(Kol. Rundsch. 21, 142–143)
Syntypen, Südalpen, Mte. Cadria, Mte. Pari, leg. STRUPI; Mte. Tenera.
DEI: 1 Ex. Mt. Guglielmo, I. b. Breit, von SCHEERPELTZ als *Cotypus* ausgezeichnet, aber in der Originalbeschreibung nicht extra aufgeführt.
- pseudococuleus** PUTHZ, 1970 (*Stenus*)
(Mem. Nat. Mus. Victoria Melb. 31, 70)
♂ Holotypus, 5 ♂♂, 8 ♀♀ Paratypen, Cairns, HACKER, BALOGH, WILLIAMS und CHUI CHONG; 2 ♂♂, 2 ♀♀ Paratypen, Hambleton, 11. 1921, PEMBERTON; 2 ♂♂, Babinda, 18. 4. 1919, WILLIAMS; 1 ♀, Eungai, N.S.W., 11. 1928, CARTER und DEANE; 3 ♂♂, 1 ♀, New Guinea, N.E. Papua, Mt. Lamington, 1300–1500 ft, Mc.NAMARA; 1 ♀, Cairns district, LEA (SAM). Holotypus, im DEI.
DEI: ♂ Holotypus, 3 ♀♀ Paratypen, Cairns, HACKER.
- pseudopsina** FAUVEL, 1895 (*Oxytelopsis*)
(Rev. d'Ent. 14, 201)
Syntypen; Birma, Carin Asciiui Ghécú, 1400–1500 m, 3.–4., leg. FEA. Malacca, Perak, leg. STAUDINGER. Borneo, Sarawak, leg. WALLACE. Java, Kemangle, Tegal, 7., Mus. Leiden.
DEI: 1 Syntypus, Carin Asciiui Ghecú, 1400–1500 m, 3.–4. 1888, leg. FEA.
- pseudotruncorum** FAGEL, 1959 (*Afrosorius*)
(Explor. Parc Nat. Garamba, Miss. DE SAEGER, fasc. 12, 92–93)
♂ Holotypus, Congo Belge, Parc National de la Garamba, Morubia, 8.–14. 6. 1951, leg. DE SAEGER im Inst. des Parcs Nationaux du Congo Belge; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.
DEI: 2 Paratypen, SO Kamerun, Lolodorf, 1895, leg. CONRADT.
- perobrachys** GEMMINGER & HAROLD, 1868 (*Stenus*)
(Catalogus Coleopterorum 2, 639: nom. nov. pro *brevipennis* MÄKLIN, 1852, Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou 25, 318)
Syntypen, Insel Sitkha, leg. FRANKENHAUSER und HOLMBERG.
DEI: 1 Syntypus, Sitkha, MÄKLIN.
- pubicollis truncoloides** WASMANN, 1911 (*Atemeles*)
(Mem. Congr. internat. Ent. Brüssel 2 (1910), 270)
Syntypen, Westfalen, Lippspringe, 1909, leg. WASMANN.
DEI: 1 Syntypus, Lippspringe, 8. 09, leg. WASMANN.
- puellaris** BERNHAUER, 1899 (*Atheta*)
(Verh. zool. bot. Ges. Wien 49, 21)
Syntypen, Dalmatien, Castelnuovo, leg. PAGANETTI-HUMMLER.
DEI: 1 Syntypus, Dalmatien.
- puellaris** HAMPE, 1863 (*Leptusa*)
(Wien. Ent. Monatsschr. 7, 285)
Syntypen, Agram, leg. HAMPE.
DEI: 2 Syntypen, Croat.
- pulchellum** KRAATZ, 1859 (*Lathrobium*)
(Arch. Nat. 25, 116)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 4 Syntypen, Ceylon.
- pulchellum** KRAATZ, 1859 (*Leucocraspedon*)
(Arch. Nat. 25, 53)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 6 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- pulchellus** KRAATZ, 1859 (*Bledius*)
(Arch. Nat. 25, 169–170)
Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.
- pulchellus** KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)
(Arch. Nat. 25, 92–93)
Syntypen; Ost-Indien, leg. HELFPER; Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 6 Syntypen, Ostindien; 2 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- pulchellus** KRAATZ, 1859 (*Sumius*)
(Arch. Nat. 25, 147)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 9 Syntypen, Ceylon.
- pulcher** BERNHAUER, 1908 (*Bolitoobius*)
(Verh. zool. bot. Ges. Wien 58, 35)
2 Syntypen, Turkestan, Mts. Karateghin, Sary-pul, 1482 m, leg. HAUSER, 1 Ex., in Coll. BERNHAUER.
DEI: 3 Syntypen (an einer Nadel), mit den Angaben der Beschreibung.

- pulchra* KRAATZ, 1856 (*Homalota*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 321)
Syntypen, Österreich; Rheingegend; Parnaß, leg. V. KIESENWETTER.
DEI: 1 Syntypus, Austr.; 1 Syntypus, Crefid?
- pulla* ROTTENBERG, 1870 (*Myrmedonia*)
(Berl. Ent. Ztschr. 14, 26)
Holotypus, Sicilien, Catania, im DEI.
- pumila* KRAATZ, 1856 (*Homalota*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 258—259)
Syntypen, Berlin und Leipzig.
DEI: 2 Syntypen, Berlin; 1 Syntypus, Leipzig.
- punctatissima* KRAATZ, 1857 (*Myrmedonia*)
(Linnaea 11, 52)
Holotypus, Ceylon, Termitenhügel bei Negambo, 1855, leg. NIETNER, im DEI.
- puncticeps* KRAATZ, 1858 (*Ocalea*)
(Berl. Ent. Ztschr. 2, 50)
Syntypen, Aetolisches Gebirge, an einem Waldstrom, leg. V. KIESENWETTER.
DEI: 1 Syntypus, Aetol. Alp., leg. V. KIESENWETTER.
- puncticeps* KRAATZ, 1859 (*Oxytelus*)
(Arch. Nat. 25, 176)
Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.
- puncticeps* KRAATZ, 1859 (*Scopaeus*)
(Arch. Nat. 25, 132)
Holotypus, Ost-Indien, leg. HELFER, im DEI.
- puncticollis* WEISE, 1875 (*Anthophagus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 19, 364)
Syntypen, Ungarn, in einem Bach bei Luhy.
DEI: 1 Syntypus, Ungarn, Luhy.
- puncticollis* KRAATZ, 1857 (*Coenonica*)
(Linnaea 11, 46—47)
Syntypen, Ceylon, bei Colombo, in Termitenhügeln, 1855, leg. NIETNER.
DEI: 3 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- puncticollis* KRAATZ, 1858 (*Homoceruus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 2, 363)
Syntypen, Senegambia, leg. BOCANDE.
DEI: 1 Syntypus, Sénégal.
- puncticollis* BENICK, 1942 (*Megalopsidia*)
(Arb. morph. tax. Ent. 9, 140—142)
Holotypus, Costa Rica, La Caja, 8 km westlich von San José, 1930, leg. SCHMIDT, im DEI.
DEI: ♀ Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- puncticollis* KRAATZ, 1859 (*Osorius*)
(Arch. Nat. 25, 168)
Syntypen, Ost-Indien, leg. BACON.
DEI: 1 Syntypus, India or., leg. BACON.
- punctipennis* KRAATZ, 1859 (*Coproporus*)
(Arch. Nat. 25, 57)
Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 1 Syntypus, Indien, leg. HELFER.
- punctipennis* BIERIG, 1934 (*Ehomalotinus*)
(Mem. Soc. Cubana Hist. Nat. Poey 8, 18—20; Taf. 1, Fig. 8)
Holotypus, Paratypen, Costa Rica, Vara Blanca, 2000 m, zwischen Barba und Poas, leg. SCHMIDT. Holotypus und Paratypen, im DEI; Paratypus, in Coll. BIERIG.
DEI: Holotypus, 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.
- punctipennis* THOMSON, 1860 (*Gyrophaena*)
(Skandinavien Coleoptera II, 269—270)
Syntypen, Glimåkra im nordöstlichen Skåne, leg. THOMSON.
DEI: 1 Syntypus, Scania, leg. THOMSON.
- punctipennis* KRAATZ, 1856 (*Homalota*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 231—232)
1 Syntypus, bei Crefeld, leg. MNK; 1 Syntypus, Thüringen, leg. KELLNER.
DEI: 1 Lectotypus, Crefeld, leg. MNK, von LIKOVSKY (Ac. Rer. Natur. Mus. Slov. Bratislava 21, 159; 1975) festgelegt.
- punctipennis* FAUVEL, 1895 (*Osorius*)
(Rev. d'Ent. 14, 195)
Syntypen; Birma, Carin Ghécú, 1300—1400 m, 2., 3.; Carin Cheba, 900—1100 m, 1.; Carin Ascuii Cheba, 800—1400 m, 12.; alle leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Carin Ghécú, 1300—1400 m, 5. 1888, leg. FEA.
- punctiventris* KRAATZ, 1859 (*Aleochara*)
(Arch. Nat. 25, 18—19)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 4 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- punctiventris* KRAATZ, 1857 (*Philonthus*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 578)
Syntypen, Bayern, leg. WALT.
DEI: 1 ♀ Syntypus, Bavar., leg. WALT.
- punctus* BERNHAUER, 1922 (*Osorius*)
(Arch. Nat. 88 A 7, 226)
Syntypen, Formosa, Suisharyo und Fuhosho, leg. SAUTER.
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Suisharyo, 10. 1911, leg. SAUTER; 1 Syntypus, Formosa, Fuhosho, 7. 9., leg. SAUTER.
- pusillimus* KRAATZ, 1859 (*Leptacinus*)
(Arch. Nat. 25, 112)
Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.
- pusillimus* KRAATZ, 1859 (*Oxytelus*)
(Arch. Nat. 25, 177)
Syntypen, Indien, leg. BACON.
DEI: ♂ Lectotypus, 1 Paralectotypus, India or., von HAMMOND festgelegt.

- pustulatus** BERNHAUER, 1904 (*Trogophloeus*)
(Verh. zool. bot. Ges. Wien 54, 20-21)
Mehrere Syntypen, Annam, Phuc-Son, 11., 12., leg. FRUHSTORFER.
DEI: 12 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
- putrida** KRAATZ, 1856 (*Homalota*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 300)
Syntypen, Deutschland, ohne nähere Fundortangabe.
DEI: 2 Syntypen, Bavar., leg. WALTZ.
- putridula** KRAATZ, 1859 (*Homalota*)
(Arch. Nat. 25, 35)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 7 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- pygiale** KRAATZ, 1859 (*Cryptobium*)
(Arch. Nat. 25, 121-122)
Syntypen; Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 5 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER; 1 Syntypus, Ostindien.
- pygmaea** KRAATZ, 1859 (*Falagria*)
(Arch. Nat. 25, 7)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 7 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- pygmaea** KRAATZ, 1859 (*Gyrophaena*)
(Arch. Nat. 25, 49-50)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 4 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- pygmaea** KRAATZ, 1859 (*Placusa*)
(Arch. Nat. 25, 44)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 2 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- pygmaea** KRAATZ, 1859 (*Thinocharis*)
(Arch. Nat. 25, 143)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 4 Syntypen, Ceylon.
- pygmaeus** KRAATZ, 1859 (*Coproporus*)
(Arch. Nat. 25, 58)
Syntypen; Ceylon, leg. NIETNER; Ostindien, leg. HELFER.
DEI: 8 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- pygmaeus** KRAATZ, 1857 (*Hypocyptus*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 388)
Syntypen, bei Berlin, leg. KRAATZ.
DEI: 2 Syntypen, Berol.
- pygmaeus** KRAATZ, 1859 (*Leptochirus*)
(Arch. Nat. 25, 191)
Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 1 Syntypus, India or.
- pygmaeus** KRAATZ, 1859 (*Oxytelus*)
(Arch. Nat. 25, 176)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: ♂ Lectotypus, 4 Paralectotypen, Ceylon, von HAMMOND festgelegt.
- pygmaeus** KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)
(Arch. Nat. 25, 93)
Syntypen; Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 4 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER; 3 Syntypen, Ostindien.
- pygmaeus** KRAATZ, 1859 (*Stilicis*)
(Arch. Nat. 25, 126-127)
♂ Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER.
- quadratus** KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)
(Arch. Nat. 25, 96)
Syntypen, India boreali, leg. BACON.
DEI: 2 Syntypen, Ostindien (Etikettierungs- oder Druckfehler?).
- quadrilobulata** CAMERON, 1925 (*Pelioptera*)
(Treubia 6, 195)
6 Syntypen, Java, Tjibodas, 1400 m.
DEI: 1 Syntypus, Tjibodas, 1400 m.
- quedenfeldti** WEISE, 1879 (*Platysthetus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 23, 147)
Syntypen, Japan.
DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♂, 2 ♀♀ Paralectotypen, Japan, von HAMMOND festgelegt.
- quinquedentata** EICHELBAUM, 1913 (*Pronomaea*)
(Arch. Nat. 79 A 3, 134)
8 ♂♂, 2 ♀♀ Syntypen, Ost-Afrika, Amani, am Berg Bomole, 11. und 13. 10. 1903, leg. EICHELBAUM.
DEI: 1 Syntypus, Amani, 10. 1903, leg. EICHELBAUM.
- quinquemaculatus** BERNHAUER, 1920 (*Megalops*)
(Neue Beitr. syst. Insektenk. 2, 10)
Syntypen, Caracas, Bittagebirge, in einem moorigen Baume, leg. THIEME, in Sammlung BERNHAUER und im DEI.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung; 1 Syntypus, Caracas.
- recondita** KRAATZ, 1856 (*Oxyopoda*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 182)
Holotypus, Misdroy, leg. HABELMANN, im DEI.
- regalis** BERNHAUER, 1915 (*Eurycnemus*)
(Ann. Mus. Nat. Hung. 13, 150)
♂ Holotypus, Kamerun.
DEI: Holotypus, Kamerun, Lolodorf, 95, leg. CONRADT.

- reissi* BENICK, 1936 (*Atheta*)
(Kol. Rundsch. 22, 41–42)
Holotypus, zahlreiche Paratypen: Lechtaler Alpen, Krabachjoch, 30. 7. 1933, 16. 9. 1934; Krabachtal, 3. 10. 1934; Stubaier Alpen, Berglas, 17. 9. 1933, 9. 9. 1934; Villergrube, 24. 9. 1934; Silvretta, Getschner Kar, 2. 9. 1935; alle in Murmeltierbauen, leg. PECHLANER; Berglas, 25. 9. 1933, leg. WÖRNDLE. Holotypus, in Coll. BENICK, Paratypen, in Coll. PECHLANER.
DEI: 1 Paratypus, Nordtirol, Stubai-Alpen, Murmeltier, 25. 9. 1933, leg. WÖRNDLE.
- reitteri* EPPELSHEIM, 1879 (*Leptusa*)
(Verh. zool. bot. Ges. Wien 29, 38–39)
Syntypen, Croatien, Capella-Gebirge, leg. REITTER.
DEI: 3 Ex., vielleicht Typen, Croatien.
- reitteri* BERNHAUER, 1933 (*Piestoneus*)
(Wien. Ent. Ztg. 50, 25)
Syntypen, Szetschwan, Tatsienlu Tjiji, Urwald-Rodung.
DEI: 1 Syntypus, Szechuan, China, Tatsienlu Tjiji, Urwald-Rodung, leg. REITTER.
- reitteri* WEISE, 1875 (*Stenus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 19, 357–358)
Syntypen, Ungarn, an feuchten Felsblöcken, in den Bächen der Marmarosch.
DEI: 1 Syntypus, „Hoverla“?; 2 Syntypen, „Raho“?.
- renkoneni* PUTHZ, 1964 (*Stenus*)
(Ann. Ent. Fem. 30, 227–229, Abb. 1, 2)
♂ Holotypus, Herzegowina, Capinja doljne blato, coll. RENKONEN; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.
DEI: 1 Paratypus, Dalmatien, Almissa, 1911, leg. SCHATZMAYR.
- retiogatus* PUTHZ, 1970 (*Stenus*)
(Mem. Nat. Mus. Victoria Melb. 31, 61)
♂ Holotypus, N. W. Old. Charters Towers, W. of Hughenden, HACKER; 1 ♂, 1 ♀ Paratypen, Adelaide R., N. T. im BM; Holotypus im DEI.
- DEI: ♂ Holotypus, Queensland, Chartas Towers, Hughenden, HACKER.
- rhysoptera* KRAATZ, 1859 (*Homalota*)
(Arch. Nat. 25, 37–38)
Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 2 Syntypen, Ind. post., leg. HELFER.
- ripicola* KRAATZ, 1854 (*Lithocharis*)
(Stett. Ent. Ztg. 15, 127)
Syntypen, Ufer der Ahr, unter Steinen.
DEI: 1 Syntypus, Germ.; 1 Syntypus, Ahrweil.
- robustum* KRAATZ, 1859 (*Doliceon*)
(Arch. Nat. 25, 117)
Holotypus, Tranquebar, leg. WESTERMANN, im DEI.
- robustus* BERNHAUER, 1902 (*Medon*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1902, 33–34)
10 Syntypen, Ceylon, Trincomalee und Nalanda, leg. HORN, in Coll. BERNHAUER.
DEI: 6 Syntypen, Trincomali, 1899, leg. HORN.
- rogeri* KRAATZ, 1857 (*Stenus*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 764)
Einige ♂♂ Syntypen, Oberschlesien, unweit Rauden, leg. ROGER.
DEI: 2 Syntypen, Oberschlesien, leg. ROGER.
- rotundicollis* KRAATZ, 1859 (*Pinophilus*)
(Arch. Nat. 25, 160)
Holotypus, Ost-Indien, leg. HELFER, im DEI.
- rubricollis* KRAATZ, 1857 (*Myrmedonia*)
(Linnaea 11, 51)
Syntypen, Ceylon, Umgeb. von Negambo, 1855, leg. NIETNER.
DEI: 1 Syntypus, Ceylon, leg. NIETNER.
- rubricollis* MOTSCHULSKY, 1858 (*Philonthus*)
(Bull. Mosc. 31 (1), 665)
Syntypen, Indes orientales.
DEI: 1 Syntypus, Ind.or.
- rufa* KRAATZ, 1859 (*Acanthoglossa*)
(Arch. Nat. 25, 146)
Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.
- rufa* KRAATZ, 1859 (*Eccoptogenia*)
(Arch. Nat. 25, 9)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 7 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- rufa* CAMERON, 1925 (*Mimozypoda*)
(Treubia 6, 190–191)
8 Syntypen, Wai Lima, Sumatra, 11. und 12. 1921, leg. KARNY.
DEI: 1 Syntypus, Z. Sumatra, Wai Lima, Lampongs No 385, 11.–12. 1921, leg. KARNY.
- rufa* KRAATZ, 1856 (*Oxyroda*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 170)
Syntypen; Österreich; Thüringen.
DEI: 1 Syntypus, Österreich.
- rufescens* KRAATZ, 1856 (*Calodera*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 144)
Syntypen, bei Berlin, an feuchten Orten, leg. KRAATZ.
DEI: 1 Syntypus, Berlin.
- rufescens* KRAATZ, 1856 (*Oxyroda*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 186)
Holotypus, Sächsische Schweiz, leg. MAERKEL, im DEI.
- ruficeps* CAMERON, 1925 (*Conosoma*)
(Treubia 6, 187)
8 Syntypen, Java, Tribodas, 1400 m, 8. 1921, 5. 1922, leg. DAMMERMAN.
DEI: 3 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, 2 Ex., 3. 1921, 1 Ex., 23. 5. 1922.
- ruficeps* KRAATZ, 1859 (*Oedichirus*)
(Arch. Nat. 25, 155–156)
Holotypus, Ost-Indien, leg. HELFER, im DEI.

- ruficeps** KRAATZ, 1857 (*Tachyporus*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 422-423)
Syntypen, bei Berlin, leg. WEIDENHASE; bei Wien, leg. Graf v. FERRARI und SCHEFFLER.
DEI: 1 Syntypus, Berol.; 2 Syntypen, Umgebung Berlin.
- ruficollis** KRAATZ, 1857 (*Lithocharis*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 717-718)
Syntypen, Berlin, Garten von Monbijou, leg. MAYER und CALIX.
DEI: 5 Syntypen, Umgebung Berlin.
- ruficollis** KRAATZ, 1859 (*Tanygnathus*)
(Arch. Nat. 25, 64-65)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 4 Syntypen, Ceylon.
- ruficornis** KRAATZ, 1857 (*Mycetoporus*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 461-462)
Syntypen, Sachsen und Schlesien.
DEI: 2 Syntypen, Saxonia; 1 Syntypus, Silesia.
- ruficoxis** KRAATZ, 1859 (*Paederus*)
(Arch. Nat. 25, 151-152)
Syntypen, Ceylon.
DEI: 6 Syntypen, Ceylon.
- rufipennis** FAUVEL, 1895 (*Anisolinus*)
(Rev. d'Ent. 14, 271)
Syntypen, Birma, Rangon, 3.; Tainzo, 5.; Bhamo, 6.; Shwego-myo, 10.; alle leg. FEA. Cochinchine, Long-Xuyen, leg. DOR.
DEI: 1 Syntypus, Birmania, Shwego-myo, 10. 1885, leg. FEA.
- rufipennis** KRAATZ, 1858 (*Glyphesithus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 2, 365)
Holotypus, Senegambia, leg. BOCANDE, im DEI.
- rufipennis** KRAATZ, 1858 (*Oligota*)
(Berl. Ent. Ztschr. 2, 352)
Syntypen, Lyon, leg. REY.
DEI: 1 Syntypus, Gall. m., leg. REY (als *brunneipennis* m. *apicata* mihi (olim) von KRAATZ ausgezeichnet); 1 Syntypus, ohne Fundortangaben.
- rufipes** KRAATZ, 1857 (*Hypocyptus*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 386)
Syntypen, bei Berlin, leg. KRAATZ.
DEI: 2 Syntypen, Berol.
- rufipes** KRAATZ, 1859 (*Pinophilus*)
(Arch. Nat. 25, 155-156)
Syntypen, Nordindien, östlicher Teil, leg. BACON.
DEI: 2 Syntypen, India orient.
- rufobasalis** BERNHAUER, 1935 (*Atheta*)
(Ent. Nachrichtenbl. Troppau 9, 10-11)
Syntypen, China, Ginyün bei Bébé, Tempelberg, 900 m. leg. REITTER.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
- rufomarginatus** KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)
(Arch. Nat. 25, 90)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 10 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- rufula** KRAATZ, 1859 (*Lithocharis*)
(Arch. Nat. 25, 140-141)
Holotypus, Ost-Indien, leg. HELFER, im DEI.
- rufulus** WEISE, 1884 (*Eudectus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1884, 270-271)
(als var. von WEISE bereits 1877 in Berl. Ent. Ztschr. 21, 96, beschrieben)
Syntypen, Japan.
DEI: 1 Syntypus, Japonia, leg. HILLER.
- rufus** KRAATZ, 1859 (*Coproporus*)
(Arch. Nat. 25, 59)
Holotypus, Ost-Indien, leg. HELFER, im DEI.
- rufus** KRAATZ, 1856 (*Ityobates*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 135-136)
Syntypen, mittleres und südliches Deutschland.
DEI: 1 Syntypus, Germ., leg. v. BRUCK.
- rufus** KRAATZ, 1859 (*Oxytelus*)
(Arch. Nat. 25, 174)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 3 Lectotypus, 6 Paralectotypen, Ceylon, von HAMMOND festgelegt.
- rugatipennis** KRAATZ, 1859 (*Homalota*)
(Arch. Nat. 25, 40-41)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 2 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- rugatipennis** KRAATZ, 1855 (*Oxyopoda*)
(Stett. Ent. Ztg. 16, 332-333)
Holotypus, leg. MONTPELLIER.
DEI: Holotypus, Gall. mer., leg. MONTPELLIER.
- rugicollis** KRAATZ, 1859 (*Osorius*)
(Arch. Nat. 25, 167-168)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 8 Syntypen, Ceylon.
- rugicollis** KRAATZ, 1856 (*Oxyopoda*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 183)
Syntypen, Österreich.
DEI: 1 Syntypus, Österreich.

rugicollis KRAATZ, 1859 (*Stenus*)
(Arch. Nat. 25, 162)Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 2 Syntypen, India or.**rugifons** BERNHAUER, 1900 (*Plathysthetus*)
(Wien. Ent. Ztg. 19, 55)Einige Syntypen, Bulghar Maaden, leg. v. BODEMEYER.
DEI: 1 ♂, 1 ♀ Paralectotypen, Asia minor, Bulghar Maaden, leg. v. BODEMEYER, von HAMMOND festgelegt.**rugosa** WENDELER, 1930 (*Diestota*)
(Neue Beitr. syst. Insektenk. 4, 250)Syntypen Philippinen, Mindanao, Mommugan, 3. 1915; Tabla, 26. 10. 1916, leg. BÖTTCHER, in Coll. WENDELER.
DEI: 1 Syntypus, Philippinen, Tabla, 26. 10. 1916, leg. BOETTCHER.**rugulosa** KRAATZ, 1856 (*Oxyptoda*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 179–180)

Syntypen, bei Berlin und Leipzig.

DEI: 1 Syntypus, Saxon.

rutilipennis KRAATZ, 1859 (*Aleochara*)
(Arch. Nat. 25, 17)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 1 Syntypus, Ceylon, leg. NIETNER.

sachtlebeni BRUNDIN, 1954 (*Atheta*)

(Ark. Zool. (N. S.) 5, 389–390, Fig. 40, 41)

♂ Holotypus, 1 ♂ Paratypus, Sizilien, im DEI.

sachtlebeni BERNHAUER, 1935 (*Pinophilus*)
(Kol. Rundsch. 21, 42)

Syntypen, Formosa, Taihorin, Sokutsu, leg. SAUTER, im DEI und Coll. BERNHAUER.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Banshoryo Distr., Sokutsu, 1912, leg. SAUTER.

sacrimontis PUTHZ, 1970 (*Stenus*)
(Beitr. Ent. 20, 590–592)

♂ Holotypus, 2 ♂♂, 5 ♀♀ Paratypen, Mazedonien, Athos, leg. SCHATZMAYR; 1 ♂, 1 ♀ Paratypen, Saloniki, leg. SCHATZMAYR; 3 ♂♂ Paratypen, Calcidice; Holotypus, Paratypen, im DEI; Paratypen, im Mus. Milano, Mus. Berlin und Coll. PUTHZ.

DEI: ♂ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, Macedonia, Athos, leg. SCHATZMAYR; 1 ♂, 1 ♀ Paratypen, Saloniki, leg. SCHATZMAYR.

saegeri FAGEL, 1959 (*Neosorius*)

(Explor. Parc Nat. Garamba Miss. DE SAEGER, fasc. 12, 130–132)

♂ Holotypus, Congo Belge, Parc National de la Garamba, Bagbele, 16. 12. 1949, leg. DE SAEGER, im Inst. des Parcs Nationaux du Congo Belge; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 Paratypus, SO Kamerun, Lolodorf, 1895, leg. CONRADT.

saizi PUTHZ, 1972 (*Stenus*)

(Studies on the Neotropical Fauna 7, 125–128, Fig. 14)

♂ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, Chile, Reed, ex Coll. FRY; 2 ♀♀, Concepcion, P. HERBST, 1903; 1 ♀, Umg. Coyhaique (SA 59), leg. FRANZ, Coll. FRANZ; 1 ♂, Nuble, 40 km E. of San Carlos, 24. 12. 1950, leg. ROSS & MICHELbacher (CAS).

DEI: 1 ♀ Paratypus, Chile, Concepc., 1903, leg. HERBST.

sallei KRAATZ, 1858 (*Cyrtothorax*)

(Berl. Ent. Ztschr. 2, 367–368; Taf. III, h)

Syntypen, Mexico, leg. SALLÉ.

DEI: 5 Syntypen, Mexico, leg. SALLÉ.

samoensis BERNHAUER, 1922 (*Osorius*)
(Arch. Nat. 88 A 10, 149)

Syntypen, Samoa, Apia.

DEI: 5 Syntypen, Samoa, Apia.

samojeda POPPIUS, 1909 (*Atheta*)

(Acta Soc. Fn. Flor. Fenn. 31, nr. 8, 24–25)

Syntypen; Nord-Kanin: Bugranitzka, 4. und 6. 7.; Sasariha, 9. 7.; Tarhanowa, 11. 7.; Kanin Noss, 13. 7.; Krinka, 6. 8.; Kambalnitzka, 20. 7.; alle 1903, leg. POPPIUS, im Mus. Helsinki.

DEI: 2 Syntypen, Kanin, leg. POPPIUS.

sanctus SCHEERPELTZ, 1962 (*Oxytelus*)

(Beitr. Ent. 12, 565–567)

♂ Holotypus, 1 ♂ Paratypus, Tempelberg, 900 m, Ginyün bei Bébé, C. China, RTRR.; Holotypus, im DEI, Paratypus, in Coll. SCHEERPELTZ.

DEI: Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung.

sangu inipennis KRAATZ, 1859 (*Aleochara*)

(Arch., Nat. 25, 17)

Syntypen, Ceylonninn Nestern von Termiten, leg. NIETNER.

DEI: 11 Syntype, Ceylon, leg. NIETNER.

sardoum SCHEERPELTZ, 1961 (*Lathrimaevum*)

(Mitt. Münch. Ent. Ges. 51, 92–95)

♂ Holotypus, wenige Paratypen, Monte Genargentu, Sardinien, leg. KRÜGER, in Coll. SCHEERPELTZ.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

sardous KRAATZ, 1857 (*Stenus*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 786 nota)

Syntypen, Sardinien, leg. GENÉ & STAUDINGER.

DEI: 1 Syntypus, Sardinien, leg. STAUDINGER.

sauteri BERNHAUER, 1922 (*Astenus*)

(Arch. Nat. 88 A 7, 229)

Syntypen, Formosa, Akau, leg. SAUTER.

DEI: 4 Syntypen, Formosa, Akau, 12. 1907, leg. SAUTER.

sauteri BERNHAUER, 1922 (*Bledius*)

(Arch. Nat. 88 A 7, 224)

Syntypen, Formosa, Anping, Taihorin und Suishadryo, leg. SAUTER.

DEI: 5 Syntypen, Formosa, Anping, 5. 1911; 1 Syntypus, Formosa, Suisharyo, 12. 1912?

sauteri BERNHAUER, 1922 (*Paragonus*)

(Arch. Nat. 88 A 7, 225–226)

Syntypen, Formosa, Kankau (Koshun), 7. 1909, leg. SAUTER.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

- sautteri** BERNHAUER, 1935 (*Pinophilus*)
(Kol. Rundsch. 21, 42)
Syntypen, Formosa, Takao, leg. SAUTTER (!) Druckfehler.
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kosempo (Fundortverwechslung ?), leg. SAUTTER (!) Druckfehler.
- scabriusculum** KRAATZ, 1857 (*Omalium*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 988—989)
Syntypen, 1 Ex., Oberbayern, leg. WALTZ; 1 Ex., Schlesien, Grafschaft Glatz, leg. ZEBE.
DEI: 1 Syntypus, Silesia.
- scabrosus** KRAATZ, 1859 (*Trogophloeus*)
(Arch. Nat. 25, 179—180)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 1 Syntypus, Ceylon.
- schaumi** KRAATZ, 1860 (*Diochus*)
(Wien. Ent. Monatsschr. 4, 27)
Syntypen, Louisiana, leg. SCHAUUM; Georgia, leg. GERHARD.
DEI: Lectotypus, Louisiana; 2 Paralectotypen, Louisiana; 1 Paralectotypus, Georgia; 1 Paralectotypus, Amer. bor., von SMETANA festgelegt.
- schedti** SCHEERPELTZ, 1956 (*Eleusis*)
(Rev. Zool. Bot. Afr. 53, 492, 497—498)
Holotypus, Paratypen, Süd-Nigeria, Kamerun, leg. FRANZ und Belg. Kongo. Holotypus, Paratypen, im Musée Tervuren; Paratypen, aus Kamerun, im DEI.
DEI: 1 Paratypus, Kamerun, leg. CONRADT.
- schenklingsi** BERNHAUER, 1922 (*Astenus*)
(Arch. Nat. 88 A 10, 149)
Syntypen, Indochina.
DEI: 1 Syntypus, Indochina, leg. FRIEDERICHs.
- schenklingsi** BERNHAUER, 1922 (*Phytosus*)
(Arch. Nat. 88 A 7, 236—237)
Syntypen, Formosa, Alikang, leg. SAUTER.
DEI: 2 Syntypen, Formosa, Alikang, 7. 8. 1810, leg. SAUTER.
- schenklingsi** BERNHAUER, 1912 (*Tympanophorus*)
(Ent. Mitt. 1, 204)
Syntypen, Südost-Kamerun, Lolodorf, 1895, leg. CONRADT, im DEI und Coll. BERNHAUER.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- schmidti** BERNHAUER, 1929 (*Apocellus*)
(Wien. Ent. Ztg. 46, 188—189)
Syntypen, Costa-Rica, San José, leg. SCHMIDT, im DEI und Coll. BERNHAUER.
DEI: 6 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
- schmidti** BIERIG, 1933 (*Dibelonetes*)
(Rev. d'Ent. 3, 514—515)
Holotypus, Paratypen, Costa Rica, Vara Blanca, 2000 m, zwischen Barba und Poas, leg. SCHMIDT; Holotypus, im DIE, Paratypen, in Coll. BIERIG.
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- schmidti** BIERIG, 1934 (*Oligota*)
(Mem. Soc. Cubana Hist. Nat. Poey 8, 116—117, Fig. 4)
Holotypus, 2 Paratypen, Costa Rica, La Caja, 8 km westlich von San José, 1931, leg. SCHMIDT; Holotypus, 1 Paratypus, im DEI, 1 Paratypus, in Coll. BIERIG.
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- schuberti** BERNHAUER & SCHENKLING, 1926 (*Oxyptoda*)
(Coleopterorum Catalogus Staphylinidae VI, p. 765)
[nom. nov. pro *cingulata* SCHUBERT, Dtsch. Ent. Ztschr. 1911, 38—39; 1911]
Holotypus, Chile, Concepcion, im DEI.
- schuberti** SCHEERPELTZ, 1933 (*Trogophloeus*)
(In: JUNG & SCHENKLING, Coleopterorum Catalogus VI, 1088)
[nom. nov. pro *aapicalis* SCHUBERT, Dtsch. Ent. Ztschr. 1911, 7; 1911]
3 Syntypen, Paraguay, leg. FIEBERIG.
DEI: 2 Syntypen, Paraguay.
- schusteri** BERNHAUER, 1908 (*Polytochara*)
(Verh. zool. bot. Ges. Wien 58, 35—36)
Syntypen, Tunis, Ain Draham, leg. SCHUSTER.
DEI: 1 Syntypus, Ain Draham, Tunis.
- schwabei** BERNHAUER, 1939 (*Atheta*)
(Arb. morph. tax. Ent. 6, 14—15)
Syntypen, Puerto Puyuhuapi, Süd-Chile, 12. 1937, 1. 1938, leg. SCHWABE, im DEI und Coll. BERNHAUER.
DEI: 19 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
- schwabei** BERNHAUER, 1939 (*Trogophloeus*)
(Arb. morph. tax. Ent. 6, 12)
Syntypen, Puerto Puyuhuapi, Süd-Chile, 5. 1. 1938, leg. SCHWABE, im DEI und Coll. BERNHAUER.
DEI: 3 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
- scissus** PUTHZ, 1968 (*Stenus*)
(Ark. Zool. 20, 448—451, Fig. 6—8)
♂ Holotypus, 5 ♂♂, 8 ♀♀ Paratypen, Brasilien, Sta. Catharina, Nova Teutonia, 12. 1938, leg. PLAUMANN; 8 ♂♂, 5 ♀♀ Paratypen, ibidem, 11. 1938; ♂ Paratypus, ibidem, ohne Datum; ♂ Paratypus, Brasilien, Petropolis, 3. 1928, leg. PLAUMANN; ♀ Paratypus, Brasilien, leg. SAHLBERG. Holotypus, Paratypen, im Mus. Stockholm; Paratypen, in Coll. KORGE, BENICK, PUTHZ und im British Mus.
DEI: 1 ♂ Paratypus, Sta. Catharina, Nova Teutonia, Brasil., 11. 1938, leg. PLAUMANN.
- scitulus** WEISE, 1877 (*Erchomus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 21, 91—92)
Syntypen, Japan, Hagi unter Baumrinde, leg. HILLER.
DEI: 1 Syntypus, Japan, leg. HILLER.
- scrobicollis** KRAATZ, 1859 (*Homalota*)
(Arch. Nat. 25, 31—32)
Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 1 Syntypus, Ind.post., leg. HELFER.

- sculpticollis** KRAATZ, 1859 (*Eupiestus*)
(Arch. Nat. 25, 182–183)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 11 Syntypen, Ceylon.
- sculptipennis** KRAATZ, 1859 (*Psilotrachelus*)
(Arch. Nat. 25, 125)
Holotypus, Ost-Indien, leg. HELFER, im DEI.
- sculptus** KRAATZ, 1859 (*Lispinus*)
(Arch. Nat. 25, 188–189)
Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.
- sejugatus** BENICK, 1929 (*Stenus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1929, 263–264)
Syntypen; Philippinen, 69 Ex., Montalba; 26 Ex., Luzon, Los Baños; 4 Ex., Luzon, Zambales; 1 Ex., Luzon, Subuagn; 1 Ex., Aroroy; 1 Ex., Palawan, Bacuit.
DEI: 2 Syntypen, Philippin., Montalban.
- semibrunnea** KRAATZ, 1859 (*Oligota*)
(Arch. Nat. 25, 45)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 1 Syntypus, Ceylon, leg. NIETNER.
- semichalceus** HELLER, 1910 (*Leucitus*)
(Abh. u. Ber. Zool. Mus. Dresden 13, Nr. 3, 9)
8 Syntypen, Kaiser-Wilhelmsland, Torricellengebirge, 1. 9. – Mitte 11. 1909, leg. SCHLAGINHAUFEN.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- semifuscus** KRAATZ, 1859 (*Scopaeus*)
(Arch. Nat. 25, 128)
Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.
- seminigrum** KRAATZ, 1859 (*Lathrobium*)
(Arch. Nat. 25, 117)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 3 Syntypen, Ceylon.
- semipurpureus** KRAATZ, 1859 (*Staphylinus*)
(Arch. Nat. 25, 73–74)
Holotypus, Nord-Indien, leg. BACON, im DEI.
- semirufus** FAUVEL, 1895 (*Leptocheirus*)
(Rev. d'Ent. 14, 181)
Syntypen Birma, Carin Cheba, 900–1100 m, 5., 12.; Asciiu Cheba, 12.; alle leg. FEA.
DEI: 3 Syntypen, Carin Cheba, 900–1100 m, 5. 12. 1888, leg. FEA.
- semistriatum** SCHEERPELTZ, 1962 (*Lathrobium*)
(Beitr. Ent. 12, 577–580, Fig. 1)
♂ Holotypus, 2 ♀♀ Paratypen, Jentschoufu, Schantung, 12., 22. 5. 1911, leg. KREYENBERG. Holotypus, 1 ♀ Paratypus, im DEI, 1 ♀, in Coll. SCHEERPELTZ.
DEI: ♂ Holotypus, 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- sericca** KRAATZ, 1856 (*Ocalea*)
(In: ERICHSOHN, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 53 nota)
Holotypus, Sicilien, im DEI.
- serraticornis** KRAATZ, 1857 (*Myrmedonia*)
(Linnaea 11, 48–49)
2 Syntypen, Ceylon, in Gesellschaft von Termiten, 1855, leg. NIETNER.
DEI: 8 Ex. Ceylon, leg. NIETNER. Neben den 2 Syntypen sind weitere 6 Exemplare vom gleichen Fundort vorhanden. Da alle 8 Tiere als „Cotypus“ bezettelt sind, ist nicht feststellbar, welche beiden Tiere KRAATZ bei der Beschreibung vorgelegen haben.
- serrulata** BERNHAUER, 1935 (*Atheta*)
(Ent. Nachrichtenbl. Troppau 9, 9–10)
Syntypen, China, Szechuan, Nitou Tatsienlu; Ginyün bei Bébé, Tempelberg, 900 m, leg. REITTER.
DEI: 1 Syntypus, Nitou Tatsienlu, Szechuan, China, leg. REITTER. Das Exemplar wurde von SCHEERPELTZ zum Holotypus von *Atheta nitouensis* (siehe diese) gewählt.
- sharpi** FAUVEL, 1895 (*Cryptobium*)
(Rev. d'Ent. 14, 238)
Syntypen, Birma, Bhamo, 4., 7.; Sennigion, 2.; alle leg. FEA. Bengalen, Barway, Mus. Brüssel.
DEI: 1 Syntypus, Bhamo, Birmania, 6. 1888, leg. FEA.
- sibiricus** SAHLBERG, 1880 (*Stenus*)
(Kongl. Svenska Vetensk. Akad. Handl. (N. F.) 17, nr. 4, 79–80)
Syntypen, Novo Saljevsk, leg. TRYBOM; Imbatsk; Tolstoinos, leg. TRYBOM; Kurejka; Turuchansk; Alinsk; Sortenge; Spirina; in zahlreichen Museen und Sammlungen.
DEI: 1 Syntypus, Kurejka; 1 Syntypus, Imbatsk.
- sicula** KRAATZ, 1857 (*Lithocharis*)
(In: ERICHSOHN, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 716–717 nota)
Holotypus, Sicilien, leg. GROHMANN, im DEI.
- siculus** ROTTENBERG, 1870 (*Atemeles*)
(Berl. Ent. Ztschr. 14, 24–25)
2 Syntypen, Sizilien, Catania, bei Ameisen unter einem Stein, 26. 2.–5. 4. 1868, leg. ROTTENBERG.
DEI: 1 Syntypus, Catania, leg. ROTTENBERG.
- siculus** STIERLIN, 1867 (*Stenus*)
(Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 2, 221–222)
Syntypen, Sicilien.
DEI: 2 ♂♂, 2 ♀♀ Syntypen, Sicilien.
- siebersi** CAMERON, 1925 (*Medon*)
(Treubia 6, 183)
4 Syntypen, Kei Eil., 1922, leg. SIEBERS.
DEI: 1 Syntypus, Kei Eil., 22, leg. SIEBERS.
- silvestris** CAMERON, 1918 (*Trogophloeus*)
(Trans. Ent. Soc. London 1918, 61–62)
Syntypen, Singapore, Bukit Timah, Mandai und Sembawang.
DEI: 1 Syntypus, Mandai, Singapore, leg. CAMERON.

- silvicola** FUSS, 1868 (*Homalota*)
(Berl. Ent. Ztschr. 12, 353—354)
Syntypen, 1 Ex., Ahreggend; ca. 10 Ex., Cleve, unter feuchtem Laub, in Waldgräben.
DEI: 1 Syntypus, Cleve, 1868.
- similis** CAMERON, 1925 (*Pelioptera*)
(Treubia 6, 197)
15 Syntypen, Java, Tjibodas, 1400 m.
DEI: 4 Syntypen, Java, Tjibodas, 1400 m, leg. DAMMERMAN.
- simoni** EPPELSHEIM, 1878 (*Leptusa*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 22, 211—212)
Syntypen, Schwarzwald, Kniebis bei Buhlbach, 2600—2700 Fuß, 11. 1877, leg. SIMON.
DEI: 1 Syntypus, Schwarzwald, Buhlbach, 8. 12. 1877, leg. SIMON.
- simplex** BAUDI, 1869 (*Leptusa*)
(Berl. Ent. Ztschr. 13, 372—373 nota)
Syntypen, Hügel bei Turin.
DEI: 13 Syntypen, Coll. Taurin.
- singulare** KRAATZ, 1859 (*Omalium*)
(Arch. Nat. 25, 181)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 4 Syntypen, Ceylon.
- socius** BERNHAUER, 1922 (*Platyprotopus*)
(Arch. Nat. 88 A 10, 150)
Syntypen; Kambodja; 1 Ex., Phnom-Penh.
DEI: 13 Syntypen, Kambodja; 1 Syntypus, Kambodja, Phnom-Penh; leg. FRIEDERICH.
- sodale** KRAATZ, 1857 (*Lathrobium*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 687—688)
Holotypus, Baiern, leg. WALTZ, im DEI.
- solarii** BERNHAUER, 1902 (*Sipalia*)
(Verh. zool. bot. Ges. Wien 52, 696—697)
Syntypen, Süditalien, Vallo Lucania, leg. SOLARI.
DEI: 1 Syntypus, Vallo Lucano, leg. SOLARI.
- solenopsis** WASMANN, 1909 (*Myrmecosaurus*)
(Zool. Anz. 34, 767, 3 Fig.)
Zahlreiche Syntypen, Brasilien, Staat S. Catharina, Joinville.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
- solieri** BERNHAUER, 1925 (*Apocellus*)
(Arch. Nat. 91 A 12, 232)
Syntypen, Chile, leg. FAIRMAIRE, ex Coll. KRAATZ, im DEI und Coll. BERNHAUER.
DEI: 13 Syntypen, Chile, leg. FAIRMAIRE et SOLIER.
- solitaria** KRAATZ, 1856 (*Oxyptoda*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 180)
Syntypen, Österreich und Baiern.
DEI: 1 Syntypus, Österreich.
- sordida** KRAATZ, 1856 (*Homalota*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 268)
Syntypen, Österreich.
DEI: 1 Syntypus, Austria.
- sordida** KRAATZ, 1859 (*Myrmedonia*)
(Arch. Nat. 25, 23—24)
Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.
- sordidulum** KRAATZ, 1857 (*Anthobium*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 1013—1014)
5 Syntypen, Umgebung von Bonn, leg. KRAATZ.
DEI: 2 Syntypen, Bonn.
- sordidus** CAMERON, 1930 (*Oxytelus*)
(Fauna Brit. Ind. Col. Staph. 1, 216—217)
Syntypen, Dehra Dun; Bihar, Pusa; Assam, Naga Hills, 3000 Fuß.
DEI: 1 Paralectotypus, Dehra Dun, 7. 10. 1922, leg. CAMERON, von HAMMOND festgelegt.
- soror** KRAATZ, 1856 (*Homalota*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 257)
Holotypus, Bonn, leg. KRAATZ, im DEI.
- sororcula** KRAATZ, 1859 (*Lithocharis*)
(Arch. Nat. 25, 140)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 5 Syntypen, Ceylon.
- sparsipennis** BERNHAUER, 1927 (*Oedichirus*)
(Mem. Soc. Ent. Ital. 5 (1926), 155—156)
Syntypen, Brasilien, S. Catharina, Theresopolis, 1887, leg. FRUHSTORFER, im DEI und Coll. BERNHAUER.
DEI: 1 Syntypus, S. Catharina, Theresopolis, 1887, leg. FRUHSTORFER.
- sparsus** CAMERON, 1924 (*Priochirus*)
(Nova Guinea Zool. 15, 1, 84, 86)
12 Syntypen, Neu Guinea, Mamberamo Riv., Idenburg Riv.
DEI: 2 Syntypen, N. Guinea, Mamberamo Riv., Pionierbivak, 5.—6. 1920, leg. VAN HEURN; 1 Syntypus, N. Guinea, Idenburg Riv., Prauwenbivak, 9. 1920, leg. VAN HEURN.
- sparsuta** CAMERON, 1925 (*Gyrophaena*)
(Treubia 6, 188)
Syntypen, Sumatra, Wai Lima, 11. und 12. 1921, leg. KARNY.
DEI: 3 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, davon 1 Ex. als Typus ausgezeichnet.
- spatuloides** BENICK, 1939 (*Atheta*)
(Norsk Ent. Tidsskrift 5 (1938), 104)
♂ Holotypus, Rundhaug, Mälseiv, 24. 6. 1937, leg. STRAND; 1 ♀ Paratypus, Hinter Raut b. Gramais, Lechtal, Tirol, an totem Kalb, 20. 8. 1934, leg. KNAEL, in Sammlung BENICK.
DEI: 1 ♀ Paratypus?, Rundhaug M. elv, leg. STRAND.

- spectabile** KRAATZ, 1859 (*Cryptobium*)
(Arch. Nat. 25, 118–119)
♂ Holotypus, Nord-Indien, leg. BACON.
DEI: ♂ Holotypus, Ostindien (Etikettierungs- oder Druckfehler?).
- spectabilis** KRAATZ, 1857 (*Bledius*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 821 nota)
Syntypen, Griechenland, leg. ZEBE.
DEI: 1 Syntypus, Creta, leg. ZEBE; 5 Syntypen, Graecia.
- spectabilis germanicus** WAGNER, 1935 (*Bledius*)
(Ent. Bl. 31, 109)
Syntypen, Mark Brandenburg, Mellen.
DEI: 5 Syntypen, Mark, Mellensee; 3 Syntypen, Umgeb. Sperenberg.
- spectabilis** KRAATZ, 1859 (*Coproporus*)
(Arch. Nat. 25, 55–56)
Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 4 Syntypen, India or., leg. HELFER.
- spectabilis** KRAATZ, 1859 (*Lithocharis*)
(Arch. Nat. 25, 135)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 7 Syntypen, Ceylon; 3 Syntypen, Ost-Indien.
- spectabilis** KRAATZ, 1859 (*Platysthetus*)
(Arch. Nat. 25, 170)
Syntypen, Indien or. und bor., leg. BACON.
DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♂ Paralectotypus, India spt., leg. BACON, von HAMMOND festgelegt.
- speculifrons** KRAATZ, 1857 (*Oxytelus*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 862 nota)
Syntypen, Hyères, leg. REY.
DEI: ♀ Lectotypus, Gall., leg. REY, von HAMMOND festgelegt.
- speculiventris** SCHEERPELTZ, 1962 (*Atheta*)
(Beitr. Ent. 12, 596–598)
♀ Holotypus, Hwayin-Shan, Mittelszechuan, 1600 m, leg. REITTER, im DEI.
- speculum** KRAATZ, 1856 (*Homalota*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 246–247 nota)
Syntypen, Griechenland, leg. v. KIESENWETTER.
DEI: 1 Syntypus, Graecia, leg. v. KIESENWETTER.
- spenicollis** KRAATZ, 1862 (*Homalota*)
(Berl. Ent. Ztschr. 6, 267–268)
Syntypen, Croatien, leg. HAMPE.
DEI: 7 Syntypen, Croatien, leg. HAMPE.
- spinifer** FAUVEL, 1895 (*Eupiestus*)
(Rev. d'Ent. 14, 186–187)
Syntypen, Birma, Carin Ghéou, 1300–1400 m, 2., 3.; Carin Cheba, 900–1000 m, 5., 12.; Carin Asciiui Cheba, 1200–1300 m, 12.; alle leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Carin Asciiui Chebá, 1200–1300 m, 12. 1887, leg. FEA.
- spinigera** KRAATZ, 1859 (*Placusa*)
(Arch. Nat. 25, 43)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 10 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- spinosa** SCHEERPELTZ, 1962 (*Atheta*)
(Beitr. Ent. 12, 601–603, Fig. 5)
♂ Holotypus, 2 ♀♀ Paratypen, Tempelberg, 900 m, Ginyün bei Bébé, C. China, leg. REITTER; Holotypus, 1 Paratypus, im DEI; 1 Paratypus, in Coll. SCHEERPELTZ.
DEI: ♂ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- splendens** KRAATZ, 1856 (*Homalota*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 246–247)
Syntypen, Deutschland, ohne nähere Angaben.
DEI: 1 Syntypus, Misdroy.
- splendida** KRAATZ, 1859 (*Homalota*)
(Arch. Nat. 25, 38)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 1 Syntypus, Ceylon, leg. NIETNER.
- squamosus** BENICK, 1917 (*Stenus*)
(Ent. Bl. 13, 312–313)
♀ Holotypus, Columbien, im DEI.
DEI: ♀ Holotypus, Nov. Gran.
- stagophitum** KRAATZ, 1856 (*Lathrobium*)
(Verh. zool. bot. Ges. Wien 6, 626)
Holotypus, Krain, leg. SCHMIDT, im DEI.
- staphylinoides** KRAATZ, 1859 (*Lithocharis*)
(Arch. Nat. 25, 134–135)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 3 Syntypen, Ceylon.
- staudingeri** KRAATZ, 1860 (*Diachus*)
(Wien. ent. Monatsschr. 4, 27)
Holotypus, Andalusia, leg. STAUDINGER, im DEI.
- stenocephalus** EPPELSHEIM, 1881 (*Othius*)
(Verh. zool. bot. Ges. Wien 30 (1880), 506)
Syntypen, Kaukasus, Helenendorf, leg. LEDER.
DEI: 1 Syntypus, Kaukas., Helenendorf, leg. LEDER.
- stercovaria** KRAATZ, 1856 (*Homalota*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 319–320)
Zahlreiche Syntypen, Bonn, im Mist.
DEI: 3 Syntypen, Bonn.

- stramineum** KRAATZ, 1857 (*Anthobium*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 1015–1016)
Syntypen, Thüringen, auf Apfelblüten, leg. KELLNER; Bonn, leg. KRAATZ.
DEI: 4 Syntypen, Bonn.
- stricta** ERICHSON, 1840 (*Falagria*)
(Genera et Species Staphylinorum, 51–52)
Syntypen, Columbien, Caracas, in Coll. MORITZ.
DEI: 1 Syntypus, Caracas.
- stricticollis** FAUVEL, 1895 (*Osorius*)
(Rev. d'Ent. 14, 196)
Syntypen, Birma, Carin Ghécu, 1300–1400 m, 2., 3.; Tenasserim, mont Mooleyit, 1800–1900 m, 3.; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Tenasserim, M. Mooleyit, 1800–1900 m, 2.–3. 1887.
- strigella** FAUVEL, 1895 (*Stilicopsis*)
(Rev. d'Ent. 14, 223)
Syntypen, Birma, Carin Ascini Ghécu, 1400–1500 m, 3.–4., leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- strigicollis** BERNHAUER, 1928 (*Xantholinus*)
(Ent. Tidskr. 49, 46–47)
Syntypen, Brasilien, S. Catharina, Hammonia, 8. 1910, leg. LÜDERWALDT; Santos, leg. METZ; S. Paulo, Ribeirão Preto Penteadó, 3.–7. 1899, leg. RIEDEL; Bahia, Iguassú, 7.–8., leg. ROMAN; Petropolis, 2. 1849, leg. SAHLBERG.
DEI: 2 Syntypen, Santos, leg. METZ.
- strigipenne** MÄKLIN, 1852 (*Omalium*)
(Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou 25/II, 320–321)
Syntypen, Insel Sitkha, leg. FRANKENHAUSER & HOLMBERG.
DEI: 1 Syntypus, Sitkha.
- strigiventris** KRAATZ, 1859 (*Lispinus*)
(Arch. Nat. 25, 186)
Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 1 Syntypus, India or.
- styriaca** SCHEERPELTZ, 1957 (*Leptusa*)
(Carinthia II 67, 133–135)
Syntypen, Bachergebirge; Koralpe, leg. MANDEL; südöstliche Teile des Koralpen-Massives, leg. HÖLZEL & STRUPI.
DEI: 1 Syntypus, Koralpe, Styr., Hochalpin, 2000 m, leg. MANDEL.
- subcostatum** MÄKLIN, 1852 (*Lathrimaemum*)
(Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou 25/II, 320)
Syntypen, Insel Sitkha, leg. PIPPINGSKÖLD, FRANKENHAUSER & HOLMBERG.
DEI: 1 Syntypus, Sitkha.
- subcylindricus** SCRIBA, 1870 (*Stenus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 14 (Beiheft), 83–84)
Syntypen, „Dom. de Heyden legit 2 ♀ prope Santas Albas“.
DEI: 1 ♂ Lectotypus, Albas, 18. 7., von PUTZ (Eos 42 (1966), 535; 1967) festgelegt.
- subdepressus** KRAATZ, 1859 (*Coproporus*)
(Arch. Nat. 25, 57–58)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 5 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- subfasciatus** KRAATZ, 1859 (*Scopaeus*)
(Arch. Nat. 25, 129–130)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 3 Syntypen, Ceylon; 1 Syntypus, India orient.
- subglaber** BERNHAUER, 1922 (*Coproporus*)
(Arch. Nat. 88 A 7, 234)
Syntypen, Formosa, Hoozan, 1. 1910; Kankau (Koshun), 7. 1909; leg. SAUTER.
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Hoozan, 1. 1910, leg. SAUTER; 1 Syntypus, Formosa, Kankau (Koshun), 7. 1909, leg. SAUTER.
- subirideus** KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)
(Arch. Nat. 25, 81–82)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 7 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- subirideus** KRAATZ, 1859 (*Staphylinus*)
(Arch. Nat. 25, 78)
Holotypus, Ost-Indien, leg. HELFER, im DEI.
- sublinearis** KRAATZ, 1856 (*Homalota*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 275–276)
Syntypen, Deutschland, ohne nähere Fundortangaben.
DEI: 4 Syntypen, Barmen; 1 Syntypus, Germ.
- sublucens** FAUVEL, 1895 (*Lispinus*)
(Rev. d'Ent. 14, 184–185)
Syntypen, Tenasserim, Kawkareet, 1., 2., leg. FEA; Ile Bengkalis, leg. MAINDRON; Java, Teibodas, 10., leg. BECCARI; Pengalengan, 1300 m, leg. FRUHSTORFER.
DEI: 1 Syntypus, Tenasserim, Kawkareet, 2. 1887, leg. FEA.
- submarginatus** BERNHAUER, 1922 (*Stenus*)
(Arch. Nat. 88 A 7, 227)
Syntypen, Formosa, Taihoku, leg. SAUTER.
DEI: 1 Syntypus, Taihoku, Formosa, 1912, leg. SAUTER.
- subnivalis** ROUBAL, 1911 (*Leptusa*)
(Casopsis 8, 13–15)
Syntypen, Kaukasus, Krasnaja Poljana, 1910.
DEI: 1 Syntypus, Caucasus occ., Krasnaja Poljana, 7. 1910, leg. ROUBAL.
- subopacus** KRAATZ, 1859 (*Lispinus*)
(Arch. Nat. 25, 187–188)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 3 Syntypen, Ceylon.
- subrugosa** KRAATZ, 1859 (*Falagria*)
(Arch. Nat. 25, 5)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 7 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

- substriatus** KRAATZ, 1859 (*Homalotrichus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 3, 16)
Holotypus, Chile.
DEI: Holotypus, Chile, leg. DEYROLLE.
- subtile** KRAATZ, 1857 (*Omalium*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 987—988)
Holotypus, Sächsische Schweiz, leg. SCHÖNBACH.
DEI: Holotypus, Saxon.
- subtilegranulata** SCHEERPELTZ, 1958 (*Parapisalia*)
(Mitt. Münch. Ent. Ges. 48, 55—56)
Holotypus, Gebiet der Rattendorfer Alm, Karnische Alpen, 1948, leg. STRUPI & HÖLZEL, in Coll. SCHEERPELTZ; Paratypen, von der gesamten Kette der Karnischen Alpen, aber nur im Subalpinum und Alpinum.
DEI: 1 Paratypus, Karn. Alp., Zottachkopf, leg. STRUPI.
- subtilicornis** BENICK, 1943 (*Atheta*)
(Ent. Bl. 39, 66)
♂ ? Holotypus, Bulgarien, Rilakloster, 1911, leg. HILF, im DEI.
- subtilissima** KRAATZ, 1854 (*Homalota*)
(Stett. Ent. Ztg. 15, 126)
Syntypen; 1 Ex., Ufer der Ahr; Kassel; Bayern; Leipzig; Lyon.
DEI: 2 Syntypen, Cassel, leg. RIEHL.
- subviridipennis** BERNHAUER, 1912 (*Pedinolinus*)
(Ent. Mitt. 1, 203)
Syntypen, Usambara, im DEI und Coll. BERNHAUER.
DEI: 2 Syntypen, Usambara.
- sudanensis** BERNHAUER, 1928 (*Paederus*)
(Verh. zool. bot. Ges. Wien 77 (1927), 113—114)
Syntypen, Ägyptischer Sudan, Ambadj-See, 2. 3. 1913, im DEI und in Coll. BERNHAUER.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- sulcata** KIESENWETTER, 1850 (*Tachyusa*)
(Stett. Ent. Ztg. 11, 218)
Syntypen, Perpiniaicum, Venetia.
DEI: 1 Syntypus, Venedig, leg. v. KNW.
- sulcicollis** BERNHAUER, 1932 (*Leptusa*)
(Kol. Rundsch. 17 (1931), 236)
2 Syntypen, Sardinien, Mte. Genargentu, Aritzo, leg. KRÜGER, in Coll. BERNHAUER und LEONHARD.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- sulcifer** BERNHAUER, 1934 (*Atheta*)
(Ent. Nachrichtenbl. Troppau 8, 18)
Syntypen, China, Mittel-Szechuan, Hwa-Yin-Shan, 1600 m, leg. REITTER.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
- sumatrensis** L. W. SCHAUFFUSS, 1887 (*Edaphus*)
(Horae Soc. Ent. Ross. 21, 110)
Syntypen, Sumatra.
DEI: ♀ Lectotypus, 1 ♀ Paralectotypus, Sumatra, Tabak, von PUTHZ (Philippia 2, 88; 1974) festgelegt.
- suturalis** KRAATZ, 1859 (*Scopaeus*)
(Arch. Nat. 25, 130)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 11 Syntypen, Ceylon; 2 Syntypen, India orient.
- syvicola** KRAATZ, 1856 (*Oxyropa*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 173—174)
Zahlreiche Syntypen, Brieselanger Forst bei Berlin, unter feuchtem Laub, leg. KRAATZ.
DEI: 6 Syntypen, Berlin.
- syriacus** REITTER, 1889 (*Paederus*)
(Ent. Nachr. 15, 170)
Syntypen, Syrien.
DEI: 1 Syntypus, Mesopotam., Assur.
- tachyporoides** KRAATZ, 1859 (*Coproporus*)
(Arch. Nat. 25, 60)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 5 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- tardus** KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)
(Arch. Nat. 25, 84)
Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.
- tatsienluensis** SCHEERPELTZ, 1962 (*Atheta*)
(Beitr. Ent. 12, 598—600)
♀ Holotypus, Nitou Tatsienlu, Szechuan, China, leg. REITTER, im DEI.
- temporalis** FAUVEL, 1895 (*Eupiestus*)
(Rev. d'Ent. 14, 188)
Syntypen, Birma, Carin Ghécú, 1300—1400 m, 2., 3.; Carin Asciiui Ghécú, 1400—1500 m, 3., 4., leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Carin Asciiui Ghécú, 1400—1500 m, 3.—4. 1888, leg. FEA.
- temporalis** APFELBECK, 1907 (*Sipalia*)
(Sitz. Ber. Akad. Wiss. Wien 116, Abt. 1, 511—512)
Syntypen, Albanien, bei Oroshi, im Miriditengebiet, aus Eichenlaub gesiebt, 1905, leg. APFELBECK.
DEI: 1 Syntypus, Merdita, Bulschari.
- tenellus** BENICK, 1916 (*Stenus*)
(Ent. Mitt. 5, 244—245)
Holotypus, Usambara, im DEI.
- tenuis** WEISE, 1877 (*Homalium*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 21, 95)
Syntypen, Japan, Hagi, leg. HILLER.
DEI: 1 Syntypus, Japonia.
- tenuicornis** KRAATZ, 1856 (*Aleochara*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 89 nota; nom. nov. pro *rufipes* MULSANT & REY, 1853, Opuscules Entomologiques 2, 63—64)
Syntypen, Languedoc, Provence.
DEI: 1 Syntypus, Gall.

- tenuicornis* BERNHAUER, 1912 (*Coproporus*)
(Ent. Mitt. 1, 207)
Syntypen, Südost-Kamerun, Lolodorf, 1895, leg. CONRADT, im DEI und Coll. BERNHAUER.
DEI: 1 Syntypus, S.O. Kamerun, Lolodorf, 1895, leg. CONRADT.
- tenuicornis* KRAATZ, 1857 (*Hypocyptus*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 388 nota)
Holotypus, Griechenland, leg. VON KIESENWETTER.
- tenuicornis* KRAATZ, 1859 (*Leistotrophus*)
(Arch. Nat. 25, 68)
Holotypus, Nord-Indien, leg. BACON, im DEI.
- tenuicornis* KRAATZ, 1859 (*Lispinus*)
(Arch. Nat. 25, 187)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 2 Syntypen, Ceylon.
- tenuipes* KRAATZ, 1858 (*Haematodes*)
(Berl. Ent. Ztschr. 2, 363)
Syntypen, Brasilien, im Mus. DEYROLLE und im DEI.
DEI: 1 Syntypus, Brasil.
- terrestris* KRAATZ, 1856 (*Oxyptoda*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 184—185)
Syntypen, Schönhausen bei Berlin, unter Spreu, leg. KRAATZ.
DEI: 1 Syntypus, Berlin.
- testacea* KRAATZ, 1859 (*Bolitochara*)
(Arch. Nat. 25, 7—8)
Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 1 Syntypus, Ind. post., leg. HELFER.
- testacea* KRAATZ, 1859 (*Oligota*)
(Arch. Nat. 25, 44)
3 Syntypen, Ceylon, unter faulenden Früchten, leg. NIETNER.
DEI: 2 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- testaceipennis* KRAATZ, 1859 (*Acanthoglossa*)
(Arch. Nat. 25, 145—146)
Holotypus, Ost-Indien, leg. HELFER, im DEI.
- testaceum* KRAATZ, 1859 (*Cryptobium*)
(Arch. Nat. 25, 120)
Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 4 Syntypen, Ostindien, leg. HELFER.
- testaceum* KRAATZ, 1857 (*Lathrobium*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 682—683)
Syntypen; Österreich, leg. Graf v. FERRARI; 1 Ex., Tirol, leg. GRIMMER, in Coll. SCHAUM.
DEI: 1 Syntypus, Austr., leg. FERRARI.
- testaceus* KRAATZ, 1859 (*Lispinus*)
(Arch. Nat. 25, 188)
Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.
- testaceus* KRAATZ, 1859 (*Mycetoporus*)
(Arch. Nat. 25, 64)
Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 1 Syntypus, Ost-Indien.
- tetragonocephalus* NOTMAN, 1924 (*Philonthus*)
(Techn. Publ. N.Y. State Coll. For. Syrac. Univ. 17, 271—272)
Holotypus, Cranberry Lake, N.Y. C 110, 6. 25—1922, leg. HATCH, in Coll. NOTMAN; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.
DEI: 1 Paratypus, Cranberry Lake, N.Y., 3. 7. 1922, leg. HATCH.
- thinobioides* KRAATZ, 1854 (*Homalota*)
(Stett. Ent. Ztg. 15, 125)
Mehrere Syntypen, Leipzig; bei Lyon, leg. REY.
DEI: 3 Syntypen, Leipzig.
- thoracicus* BAUDI, 1857 (*Sunius*)
(Berl. Ent. Ztschr. 1, 105)
Zahlreiche Syntypen, Cypern, leg. TRUQUI.
DEI: 1 Syntypus, Cypern.
- thulea* POPPIUS, 1909 (*Atheta*)
(Acta Soc. Fn. Flor. Fenn. 31, nr. 8, 25—26)
Zahlreiche Syntypen; Halbinsel, Kanin: Gorby, 24. 6.; Konuschin, 30. 6.; Bugranitza, 4., 6. und 8. 7.; Tarhanowa, 11. 7.; Kanin Noss, 13. 7.; Krinka, 15. 7. und 6. 8.; Madoha, 16. 7.; Kambalnitza, 19., 20. und 22. 7.; Ribnaja, 24. 7.; Mikulkin, 26. 7.; alle 1903, leg. POPPIUS, im Mus. Helsinki.
DEI: 2 Syntypen, Kanin, leg. POPPIUS.
- torrentum* CAMERON, 1924 (*Lesteva*)
(Trans. Ent. Soc. London 1924, 171)
Syntypen, Mussoorie District, 6500—7000 Fuß.
DEI: 1 Syntypus, Kemti Falls, Mussoorie, 25. 3. 1921, leg. CAMERON.
- torrentum* CAMERON, 1930 (*Trogophloeus*)
(Fauna Brit. Ind. Col. Staph. 1, 196—197)
Syntypen, Mussoorie district, Arni Gad.
DEI: 2 Syntypen, Arni Gad., Mussoorie, 12. 6. 1921, leg. CAMERON.
- toxopei* WENDELER, 1926 (*Paederus*)
(Treubia 7, 329—330)
Syntypen; 1 ♂, Buru, Station 7, 800—1300 m, 26. 3. 1921; 1 ♂, Station 13, 31. 8. 1921; 1 ♀, 28. 2.—3. 3. 1922; 1 ♀, Mt. Efrarat, 1300 m, 3. 1922; 5 ♂♂, 4 ♀♀, Station 17, 22.—30. 10. 1921.
DEI: 1 Syntypus, Buru, Station 17, 22.—23. 10. 1921, leg. TOXOPEUS.
- transadriaticus* BREIT, 1911 (*Octavius*)
(Wien. Ent. Ztg. 30, 170—171)
Syntypen, Mte. Maggiore bei Abazzia, leg. BREIT und CURTI.
DEI: 5 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

transitoria BENICK, 1940 (*Atheta*)

(Ent. Bl. 36, 186)

♂ Holotypus, zahlreiche Paratypen, Tirol, Lechtal, Gramais, leg. KNABL, in Coll. BENICK; 1 Paratypus, Tirol, Hoher Tauern, Naßfeld, Quellmoos, 10. 6. 1936, leg. BERNHAUER.

DEI: 1 Paratypus, Gramais, Tirol, Hirschlesbrücke, Miomoos ?, leg. KNABL.

translucidum KRAATZ, 1857 (*Omalium*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 998–999)

Syntypen, mittleres und südliches Deutschland, ohne nähere Fundortangabe.

DEI: 2 Syntypen, Silesia.

transylvanicus WEISE, 1875 (*Quedius*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 19 (1–2), 356–357)

Syntypen, Ungarn, am Hoverla und Mencil.

DEI: 4 Syntypen, Carpathen, Hoverla.

transversicollis LUZE, 1905 (*Olophrum*)

(Verh. zool. bot. Ges. Wien 55, 41)

20 Syntypen, Osttirol, Taufers, 850 m, leg. LUZE.

DEI: 1 Syntypus, Taufers, Tir., leg. LUZE.

triangulum KRAATZ, 1856 (*Homalota*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 273–274)

Syntypen, am Ufer des Mittelmeeres und der Ostsee.

DEI: 3 Syntypen, Mare mediterr.

tricarinatus KRAATZ, 1859 (*Stenus*)

(Arch. Nat. 25, 164–165)

Holotypus, Ost-Indien, leg. HELFER, im DEI.

tricolor KRAATZ, 1859 (*Leptacinus*)

(Arch. Nat. 25, 110–111)

Syntypen; Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. HELFER.

DEI: Lectotypus, 2 Paralectotypen, Ceylon, leg. NIETNER; 2 Paralectotypen, Ostindien, leg. HELFER, von SMETANA festgelegt.

tricuspidata KRAATZ, 1857 (*Myrmedonia*)

(Linnaea 11, 49–50)

Syntypen, Ceylon, Termitenhügel bei Negambo, 1855, leg. NIETNER.

DEI: 15 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

tridentata KRAATZ, 1859 (*Homalota*)

(Arch. Nat. 25, 31)

Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.

trigemina EPPELSHEIM, 1880 (*Homalota*)

(Verh. zool. bot. Ges. Wien 29 (1879), 459–460)

♂♀ Syntypen, Kaukasus, Ach-Bulach, von LEDER erhalten.

DEI: 1 Syntypus, Kaukasus, LEDER.

trigonocephalus KRAATZ, 1859 (*Leptacinus*)

(Arch. Nat. 25, 109–110)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: Lectotypus, 8 Paralectotypen, Ceylon, leg. NIETNER, von SMETANA festgelegt.

trinidadensis BERNHAUER, 1915 (*Paede*)

(Stett. Ent. Ztg. 76, 296)

Syntypen, Trinidad, Caparo, leg. HEYNE.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

trinotata KRAATZ, 1856 (*Homalota*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 272–273)

Syntypen, ohne Fundortangaben.

DEI: 5 Syntypen, Berlin.

trinotatus KRAATZ, 1859 (*Sumius*)

(Arch. Nat. 25, 149–150)

Holotypus, Ceylon, leg. NIETNER, im DEI.

trivialis KRAATZ, 1859 (*Aleochara*)

(Arch. Nat. 25, 18)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 9 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

trivialis KRAATZ, 1857 (*Stenus*)

(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 760–761)

Mehrere Syntypen, Tirol, leg. KAHR.

DEI: 3 Syntypen, Austr., leg. KAHR.

truncatus CAMERON, 1925 (*Osorius*)

(Treubia 6, 177)

Holotypus, 3 Paratypen, Verloten Eiland, 4. 1920; 2 Paratypen, Krakatau, 4. 1920, leg. DAMMERMAN.

DEI: 1 Paratypus, Krakatau, 4. 1920.

tuberculata KRAATZ, 1859 (*Homalota*)

(Arch. Nat. 25, 32)

Holotypus, India orientali, leg. HELFER. — DEI: Holotypus, Ind. post., leg. HELFER.

tubercuticollis KRAATZ, 1859 (*Homalota*)

(Arch. Nat. 25, 33–34)

Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

DEI: 4 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

tuberiventris KRAATZ, 1859 (*Aleochara*)

(Arch. Nat. 25, 14)

Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.

DEI: 1 Syntypus, Ind. post., leg. HELFER.

turkestanicum KORGE, 1968 (*Cryptobium*)

(Ent. Bl. 64, 56–57)

♂ Holotypus, Mts. Karateghin, Sary-pul, 1482 m, 1898, leg. HAUSER, im DEI.

turrialbanus WENDELER, 1927 (*Paederus*)

(Neue Beitr. syst. Insektenk. 4, 2, Fig. 1–3)

Syntypen, Costa Rica, Turrialba, 800 m, in Coll. WENDELER.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Costa Rica, Turrialba, 900 m.

- tylocephalus** KRAATZ, 1857 (*Stenus*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 761–762 nota)
Holotypus, Dalmatien oder Tyrol, leg. KAHR, im DEI.
tyrrhenius DODERO, 1908 (*Leptotyphlus*)
(Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova 3, 638)
Syntypen, Monte Argentano, Isola del Giglio e dintorni di Grosseto; Toscana meridionale.
DEI: 1 Syntypus, Is. Giglio, G. Doria.
umbilicata FAUVEL, 1895 (*Stilicopsis*)
(Rev. d'Ent. 14, 223–224)
Syntypen; Carin Asciiui Ghécù, 1400–1500 m, 3.–4., leg. FEA. Pulo Penang, leg. RAFFRAY. Philippines, Dolores, Antipolo, leg. SIMON. Sumatra.
DEI: 3 Syntypen, Carin Asciiui Ghécù, 1400–1500 m, 3.–4. 1888, leg. FEA.
umbricus BAUDI, 1869 (*Stenus*)
(Berl. Ent. Ztschr. 13, 395)
Syntypen, Umbrien, Trasimenischer See.
DEI: 3 Paralectotypen, Lac. Trasimenus, von PUTHZ (Boll. Soc. ent. Ital. 102, 171; 1970) festgelegt.
umbrina KRAATZ, 1857 (*Hoplandria*)
(Linnaea 11, 5–6)
Syntypen, Columbien, leg. MORITZ.
DEI: 1 Syntypus, MORITZ.
unicolor KRAATZ, 1859 (*Lathrobium*)
(Arch. Nat. 25, 117)
Syntypen, Ost-Indien, leg. BACON.
DEI: 5 Syntypen, India orient.
usambarae BERNHAUER, 1912 (*Coproporus*)
(Ent. Mitt. 1, 207–208)
Syntypen, Usambara, im DEI und Coll. BERNHAUER.
DEI: 3 Syntypen, Usambara, Nguelo.
usambarae BERNHAUER, 1912 (*Eleusis*)
(Ent. Mitt. 1, 177)
Syntypen, Usambara, im DEI und Coll. BERNHAUER.
DEI: 1 Syntypus, Usambara.
uvita KRAATZ, 1859 (*Lithocharis*)
(Arch. Nat. 25, 138)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 7 Syntypen, Ceylon.
vagans CAMERON, 1930 (*Trogophloeus*)
(Fauna Brit. Ind. Col. Staph. 1, 198–199)
Syntypen; Dehra Dun, Nun Nadi; Mussoorie, Ringal Gad; Almora, Dwarakhet, 5000–6000 Fuß.
DEI: 1 Syntypus, Kaligad, Dehra Dun, 10. 7. 1921, leg. CAMERON.
vagepunctata KRAATZ, 1856 (*Aleochara*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 99 nota)
Syntypen, Ungarn, leg. FRIWALDSKY.
DEI: 1 Syntypus, Ungarn, leg. FRIWALDSKY.
valida KRAATZ, 1856 (*Homalota*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 274)
3 ♀♀ Syntypen, Kärnthner Alpen, im DEI.
validiuscula KRAATZ, 1856 (*Homalota*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 261)
Syntypen, Sächsische Schweiz, leg. MÄRKEL.
DEI: 1 Syntypus, Saxonia, leg. MÄRKEL.
validum KRAATZ, 1857 (*Omalium*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 977–978)
Syntypen; 1 Ex., Schlesien, Grafschaft Glatz, leg. ZEBBE, in Coll. KRAATZ; 1 Ex., Sachsen, leg. MÄRKEL, „in den Königl. Sammlungen“ (Dresden).
DEI: 1 Syntypus, Silesia, Glatz.
variceps KRAATZ, 1859 (*Paederus*)
(Arch. Nat. 25, 152)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 7 Syntypen, Ceylon.
varicornis KRAATZ, 1856 (*Homalota*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 292–293)
Syntypen, Deutschland, ohne nähere Fundortangaben.
DEI: 4 Syntypen, Hessen.
varicornis KRAATZ, 1859 (*Leptusa*)
(Arch. Nat. 25, 13)
Einige Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 2 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
varipennis KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)
(Arch. Nat. 25, 85–86)
Syntypen; Ceylon, leg. NIETNER; Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 7 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER; 2 Syntypen, Ostindien.
variolosus FAUVEL, 1895 (*Leptochirus*)
(Rev. d'Ent. 14, 183)
Syntypen; Birma, Carin Cheba, 500–1100 m, 1., 12.; Carin Asciiui Cheba, 1200–1300 m, 12.; Carin Ghécù, 1300–1400 m, 2., 3.; leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Carin Asciiui Chebà, 1200–1300 m, 12. 1887, leg. FEA.
varipennis KRAATZ, 1859 (*Oxytelus*)
(Arch. Nat. 25, 172)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: ♀ Lectotypus, 3 ♀♀ Paralectotypen, Ceylon, von HAMMOND festgelegt.
variventris KRAATZ, 1859 (*Homalota*)
(Arch. Nat. 25, 34)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 4 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.

- velebiticus** BENICK, 1915 (*Stenus*)
(Ent. Bl. 11, 230–231)
Zahlreiche Syntypen, Velebit, Ostaria, 1910, leg. HILF.
DEI: 10 Syntypen, Velebit, Ostaria, 1910, leg. HILF.
- velox** KRAATZ, 1856 (*Homalota*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 201)
Syntypen; Ufer der Ahr, leg. KRAATZ; Thüringen, Tirol, Baiern und Österreich.
DEI: 2 Syntypen, Ahrweiler, leg. KRAATZ; 1 Syntypus, Thur., leg. MÜLLER; 1 Syntypus, Styria, leg. KAHR.
- velutinus** FAUVEL, 1895 (*Stilicis*)
(Rev. d'Ent. 14, 226)
Syntypen; Birma, Carin Asciiui Cheba, 1200–1300 m, 1.; Carin Asciiui Ghécu, 1400–1500 m, 3.–4., leg. FEA. Sikkim, Darjeeling, leg. CHRISTIE.
DEI: 1 Syntypus, Birma, Carin Cheba, 1888, leg. FEA.
- verberans** ERICHSON, 1840 (*Aleochara*)
(Genera et Species Staphylinorum, 164)
Syntypen, Brasilien und Columbien.
DEI: 1 Syntypus, Bahia L.
- vexans** FENYES, 1914 (*Atheta*)
(Arch. Nat. 80 A 2, 50)
Holotypus, Formosa, Taihorin, leg. SAUTER, det. Nr. 4431, im DEI; 1 Paratypus, vom selben Fundort; 2 Paratypen, Formosa, Kosempo, leg. SAUTER.
DEI: Holotypus, Formosa, Taihorin, 7. 1911, leg. SAUTER; 1 Paratypus, Formosa, Kosempo, 1911, leg. SAUTER.
- viatica** FAUVEL, 1904 (*Aleochara*)
(Rev. d'Ent. 23, 67)
Syntypen; Nilghiris, Birma, Shwego-myo, 8.; Carin Asciiui Ghecu, 1400–1500 m, 3., 4.; Carin Asciiui Cheba, 1200–1300 m, 12.; alle leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Carin Asciiui Ghecu, 1400–1500 m, 3.–4. 1888, leg. FEA.
- vicaria** KRAATZ, 1859 (*Homalota*)
(Arch. Nat. 25, 38–39)
Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
DEI: 5 Syntypen, Ceylon, leg. NIETNER.
- vicina** KRAATZ, 1856 (*Homalota*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 286–287)
Syntypen, bei Berlin und Leipzig, an feuchten Localitäten.
DEI: 1 Syntypus, Freienwalde; 1 Syntypus, Leipzig.
- vicina** KRAATZ, 1859 (*Lithocharis*)
(Arch. Nat. 25, 137)
Holotypus, Ost-Indien, leg. HELFER, im DEI.
- vicina** KRAATZ, 1858 (*Oxyropa*)
(Berl. Ent. Ztschr. 2, 51; nom. nov. pro *soror* KRAATZ, Stett. Ent. Ztg. 16, 331–332; 1855)
Holotypus, Griechenland, leg. V. KIBSENWETTER, im DEI.
- vicinum** KRAATZ, 1859 (*Dolichaeon*)
(Arch. Nat. 25, 118)
Holotypus, India orientali., leg. HELFER, im DEI.
- viennense** SCHEERPELTZ, 1930 (*Olophrum*)
(Verh. zool. bot. Ges. Wien 79 (1929), 90–94; Taf. 3, Fig. 23)
♂ Holotypus, Mariabrunn bei Wien, leg. SKALITZKY in Coll. SCHEERPELTZ; zahlreiche Paratypen aus Österreich, Südmähren, Slowakei, Nordwestungarn, Neusiedler-See.
DEI: 2 Paratypen, Neusiedler See, leg. BERNHAUER.
- vietus** PUTHZ, 1974 (*Edaphus*)
(Philippia 2, 85)
♂ Holotypus, 12 ♂♂, 23 ♀♀ Paratypen, Vietnam, Provinz Quang Tri, 7 mi. W of Dong Ha, Cam Lo, 17. 6. 1970, leg. GILLOGLY; 15 ♂♂, 42 ♀♀ Paratypen, 1 mi N Quang Tri, 7., 8. 1970, leg. GILLOGLY. Holotypus, Paratypen, im Mus. Genf, Paratypen, in Coll. PUTHZ und im DEI.
DEI: 1 ♂, 1 ♀ Paratypen, Vietnam, Quang Tri Prov., 1 mi. N. Quang Tri, 30. 7. und 24. 8. 1970, leg. GILLOGLY.
- vilis** KRAATZ, 1859 (*Falagria*)
(Arch. Nat. 25, 5–6)
Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 1 Syntypus, Ind. post., leg. HELFER.
- vilis** KRAATZ, 1859 (*Lithocharis*)
(Arch. Nat. 25, 139)
Syntypen Ceylon, leg. NIETNER; Ostindien, leg. HELFER.
DEI: 6 Syntypen, Ceylon; 2 Syntypen, India or.
- vilis** KRAATZ, 1859 (*Oxyropa*)
(Arch. Nat. 25, 28)
Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 1 Syntypus, Ind. post., leg. HELFER.
- villipennis** KRAATZ, 1859 (*Creophilus*)
(Arch. Nat. 25, 67)
Syntypen Nord-Indien, leg. BACON; Süd-Indien, Decan, leg. SAUNDERS.
DEI: 3 Syntypen, India sept., leg. BACON; 1 Syntypus, Decan, leg. SAUNDERS.
- villosula** KRAATZ, 1856 (*Homalota*)
(In: ERICHSON, Naturgesch. Insekten Deutschlands Abt. 1, 2, 305–306)
Syntypen, Steiermark, leg. KAHR.
DEI: 1 Syntypus, Styria.
- virgula** FAUVEL, 1895 (*Stenus*)
(Rev. d'Ent. 14, 210)
Syntypen; Birma, Carin Cheba, 900–1100 m, 5.–12.; Carin Ghécu, 1300–1400 m, 2., 3., 4.; Carin Asciiui Ghécu, 1400 bis 1500 m, 3.–4.; alle leg. FEA. Bengale, Kurseong, Sikkim, Darjeeling, leg. CHRISTIE.
DEI: 2 Syntypen, Carin Asciiui Ghecu, 1400–1500 m, 3.–4. 1888, leg. FEA.
- virgulatus** FAUVEL, 1895 (*Staphylinus*)
(Rev. d'Ent. 14, 254–255)
Syntypen; Birma, Carin Cheba, 500–1000 m, 12.; Carin Asciiui Ghécu, 1400–1500 m, 3.–4., leg. FEA.
DEI: 1 Syntypus, Carin Asciiui Ghecu, 1400–1500 m, 3.–4. 1888, leg. FEA.

- viridans* FAUVEL, 1895 (*Eleusis*)
(Rev. d'Ent. 14, 189–190)
Syntypen; Birma, Carin Cheba, 900–1100 m, 5.–12.; Carin Ascitui Cheba, 1200–1300 m, 1., 3., 4.; Tenasserim, Thagata, 4.; leg. FEA. Java, Teibodas, 10., leg. BECCARI; Pengalengan, 1300 m, leg. FRUHSTORFER.
DEI: 1 Syntypus, Carin Ascitui Cheba, 1200–1300 m, 1. 1888, leg. FEA.
- vittatus* KRAATZ, 1859 (*Tachinomorphus*)
(Arch. Nat. 25, 55)
Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: Lectotypus, India orient., von ULLRICH ausgewählt, hiermit festgelegt.
- vulcanus* WENDELER, 1926 (*Paederus*)
(Dtsch. Ent. Ztschr. 1926, 203)
Syntypen, Costa Rica, Turrialba, 800–900 m, in Coll. WENDELER, ex Coll. HEYNE.
DEI: 1 ♀ Syntypus, Costa Rica, Turrialba, 800 m, ex Coll. HEYNE.
- wagneri* BENICK, 1917 (*Stenus*)
(Ent. Mitt. 6, 262–264: als var. zu *ampliventris* SAHLBERG beschrieben)
Holotypus, 1 Paratypus, Mark Brandenburg, am Rande eines Hochmoores bei Chorin-Teeröfen, 16. 4. 1916, leg. WAGNER;
Holotypus, in Coll. BENICK, Paratypus, in Coll. WAGNER.
DEI: 1 Paratypus, Mark, Umgeb. Chorin, 16. 4. 16, Coll. NERESHEIMER.
- wagneri* SCHEERPELTZ, 1962 (*Sudanus*)
(Beitr. Ent. 12, 590–593, Fig. 2, 3)
♂ Holotypus, Aegypt. Sudan, Bahr el Zerat, 12. 3. 1913; 2 ♀♀ Paratypen, Ägypt. Sudan, Bahr el Ghazal b. Bahr el Arab, 4. 3. 1913; Holotypus, 1 ♀ Paratypus, in DEI, 1 ♀ Paratypus, in Coll. SCHEERPELTZ.
DEI: ♂ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- weiratheri* BENICK, 1943 (*Atheta*)
(Ent. Bl. 39, 5–6)
♂ Holotypus, Tsumerka; zahlreiche Paratypen, epirotischer Pindus, im Hochgebirge bei Prevesa und Tsumerka; Veluchi-Gebirge, 7. 1936; leg. WEIRATHER; 1 ♀ Paratypus, Veluchi-Gebirge; 1 ♀ Paratypus, Parnaß alpin, 1. 7. 1909, leg. RAMBOUSEK.
DEI: 1 Paratypus, Griechenland, epir. Pindus, Tsumerka, 1936, Platz Nr. 197, Grundbach, leg. WEIRATHER.
- wendeleri* PAGEL, 1958 (*Pachypaederus*)
(Explor. Parc nat. Upemba Miss. DE WITTE, fasc. 51, 77–78, Fig. 46, 56)
♂ Holotypus, Durban, 1900, im Inst. roy. Sci. nat. Belgique; 1 ♂, 1 ♀ Paratypen, Natal, in Coll. SCHEERPELTZ; 1 ♀, Natal, im Mus. Berlin; 1 ♀, Natal, in DEI; 1 ♀, Natal, in Coll. WENDELER; 1 ♀, Natal, im Mus. München; 1 ♀, Delagoa Bay; 1 ♀, Natal, Kloof, 1500 ft., 8. 1926, leg. TURNER, im Mus. London; 1 ♂, Harding, Natal; 2 ♀♀, Natal, im Inst. roy. Sci. nat. Belgique.
DEI: 1 ♀ Paratypus, Nat.
- xanthocephalus* KRAATZ, 1859 (*Staphylinus*)
(Arch. Nat. 25, 74–75)
Syntypen, Nord-Indien, leg. SCHAUM und BACON.
DEI: 1 Syntypus, Himalaya, leg. SCHAUM; 1 Syntypus, Ostindien (Etikettierungs- oder Druckfehler?).
- xanthomerus* KRAATZ, 1859 (*Philonthus*)
(Arch. Nat. 25, 83)
Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 1 Syntypus, Ostindien.
- xanthoptera* KRAATZ, 1859 (*Homalota*)
(Arch. Nat. 25, 30)
Syntypen, Ost-Indien, leg. HELFER.
DEI: 1 Syntypus, Ind.post., leg. HELFER.
- xanthopyga* KRAATZ, 1858 (*Oligota*)
(Berl. Ent. Ztschr. 2, 351)
Syntypen, bei Paris, leg. AUBÉ.
DEI: Lectotypus, Paris, AUBÉ, von WILLIAMS (Ent. monthly Mag. 108, 19; 1972, als *xanthophaga*) festgelegt.
- zosteræ* THOMSON, 1856 (*Homalota*)
(Oefv. Svenska Vet.-Akad. Förh. 1856, 103–104)
Syntypen, an der Küste von Lomma in Skåne.
DEI: 1 Syntypus, Scania.

Wahrscheinlich nicht beschrieben!

- alpigena* SCHEERPELTZ (*Leptusa*)
DEI: 1 ♀, Grenze zw. Steger Hütte und Hartl-Alm, Nordost-Fuß d. Gamsstein, aus den Dunstlöch. am steir. nied.-öst., 16.–18. 6. 1924, ca. 1100 m, leg. KÄUFEL, als *Cotypus* ausgezeichnet.
- alpigra* SCHEERPELTZ (*Leptusa*)
DEI: 1 Ex., Lechtaler Alpen, Umg. Gramais, ob. Otterbachtal, unter Weidenlaub, ca. 1700 m, leg. KNABL, als *Cotypus* ausgezeichnet.
- alpina* SCHEERPELTZ (*Leptusa*)
DEI: 1 ♀, N. Steiermark, Hochlantsch, als *Cotypus* ausgezeichnet.
- angusticeps* BERNHAUER (*Cryptobium*)
DEI: 1 Ex., Muzo, Columbien, leg. THIEME, als Typus ausgezeichnet.
- aspera* FAUVEL (*Placusa*)
DEI: 1 Ex., Amazonas, als Typus ausgezeichnet.
- atriventris* BERNHAUER (*Scopaeus*)
DEI: 1 Ex., Concepc., 6. 1903, als Typus ausgezeichnet.
- australensis* BERNHAUER (*Coenonica*)
DEI: 1 Ex., Cairns, 7. 05, als Typus ausgezeichnet.
- autaretana* SCHEERPELTZ (*Leptusa*)
DEI: 1 Ex., Col Lautaret Dauph. STRUPI, als *Cotypus* ausgezeichnet.
- biarmatum* BERNHAUER (*Cryptobium*)
DEI: 2 Ex., Venezuela, Cuman, leg. v. BRUCK, als Typen ausgezeichnet.
- bicallosus* BERNHAUER (*Astilbus*)
DEI: 1 Ex., Mexiko, als Typus ausgezeichnet.
- bifoveicollis* BERNHAUER (*Hoptandria*)
DEI: 1 Ex., Sr. Durango, Mexico, coll. SPEYER, als Typus ausgezeichnet.
- bogotæ* BERNHAUER (*Oxytelus*)
DEI: 1 Ex., bei Bogota, als Typus ausgezeichnet.
- brasilianus* BERNHAUER (*Lispinus*)
DEI: 4 Ex., S. Catharina, Theresopolis, 188?, FRUHSTORFER; 1 Ex., Brasilia, St. Catharina als, Paratypen ausgezeichnet.
- brasilianus* BERNHAUER (*Palaminus*)
DEI: 2 Ex., S. Catharina, Theresopolis, leg. FRUHSTORFER, als Typen ausgezeichnet.
- brevicornis* DODERO (*Leptotyphlus*)
DEI: 2 Ex., Aritzo, Sand, 8. 1911, leg. DODERO, als Typen ausgezeichnet.
- bulgarica* BENICK (*Atheta*)
DEI: 2 Ex., Bulg. Seimen, Marica, 21. 3. 1903, leg. RAMBOUSEK, als Typus und *Cotypus* ausgezeichnet.

- cadorica* SCHEERPELTZ (*Leptusa*)
 DEI: 1 ♀, Dolomiten, Marmolata, Nordhang, Zwergstrauchheide auf Felsen, 2200 m, Sommer 1955, leg. MOREUZZI, als Cotypus ausgezeichnet.
- californicus* BERNHAUER (*Stilicis*)
 DEI: 1 Ex., Californien, als Typus ausgezeichnet.
- carpathicola* SCHEERPELTZ (*Leptusa*)
 DEI: 1 ♂, Bucsas?, Siebenbürgen, als Cotypus ausgezeichnet.
- castaneus* BERNHAUER (*Belonuchus*)
 DEI: 1 Ex., Nov. Gran., als Typus ausgezeichnet.
- caucasica* BENICK (*Atheta*)
 DEI: 3 Ex., Caucasus occ., Krasnaja poljana, 7. 1910, leg. ROUBAL, als Cotypus ausgezeichnet.
- chilense* BERNHAUER (*Lathrimaeum*)
 DEI: 1 Ex., Chile, als Typus ausgezeichnet.
- chilensis* BERNHAUER (*Neoleptoglossa*)
 DEI: 9 Ex., Chili, als Typen ausgezeichnet.
- christinae* BRUNDIN (*Atheta*)
 DEI: 1 Ex., Calabria, Sta. Christina, leg. PAGANETTI, als Typus ausgezeichnet.
- clara* BERNHAUER (*Atheta*)
 DEI: 1 Ex., Passa Quatro, Minas Zikan, als Typus ausgezeichnet.
- comparabilis* LEA (*Homalota*)
 DEI: 1 Ex., N. Australia, als Cotypus ausgezeichnet.
- covradti* BERNHAUER (*Ontholestes*)
 DEI: 1 Ex., S. O. Kamerun, Lolodorf, 1895, leg. CONRADT, als Typus ausgezeichnet.
- covradti* BERNHAUER (*Gyrophaena*)
 DEI: 1 Ex., S. O. Kamerun, Lolodorf, 1895, leg. CONRADT, als Typus ausgezeichnet.
- costaricensis* BERNHAUER (*Cryptobium*)
 DEI: 1 Ex., C. R., Vara Blanca, zwischen Barba und Poas, 2000 m, leg. SCHMIDT, als Typus ausgezeichnet.
- costaricensis* BERNHAUER (*Medon*)
 DEI: 1 Ex., C. R., Vara Blanca, zwischen Barba und Poas, 2000 m, leg. SCHMIDT, als Typus ausgezeichnet.
- costaricensis* BERNHAUER (*Oxytelus*)
 DEI: 4 Ex., San José, C. R., leg. SCHMIDT, als Typen ausgezeichnet.
- cribrellus* BERNHAUER (*Lispinus*)
 DEI: 2 Ex., Sikora, Madagaskar, Annanarivo, als Typen ausgezeichnet.
- cubae* BERNHAUER (*Belonuchus*)
 DEI: 1 Ex., Cuba, DOHRN, als Typus ausgezeichnet.
- densior* BERNHAUER (*Neoleptoglossa*)
 DEI: 2 Ex., Chile, FAIRMAIRE, als Typen ausgezeichnet.
- densiventris* BERNHAUER (*Hopländria*)
 DEI: 1 Ex., Luzon-Benguet, Baguio, 2170 m, leg. BOETTCHER, als Paratypus ausgezeichnet.
- dentiventris* BERNHAUER (*Palaminus*)
 DEI: 7 Ex., S. Catharina, Theresopolis, leg. FRUHSTORFER, als Typen ausgezeichnet.
- distinctiventris* ROUBAL (*Apimela*)
 DEI: 1 Ex., Ca. b. Kluchor, 7. 1912, leg. ROUBAL, als Typus ausgezeichnet.
- diversiceps* BERNHAUER (*Medon*)
 DEI: 4 Ex., North-Queensland, Cairns, 7/05, als Typus und Paratypen ausgezeichnet.
- diversipunctus* BERNHAUER (*Philonthus*)
 DEI: 2 Ex., Malay. Ins., als Typen ausgezeichnet.
- domingoensis* BERNHAUER (*Medon*)
 DEI: 1 Ex., San Domingo, als Typus ausgezeichnet.
- excisus* BERNHAUER (*Palaminus*)
 DEI: 5 Ex., S. Catharina, Theresopolis, leg. FRUHSTORFER, als Typen ausgezeichnet.
- fischeri* BERNHAUER (*Xantholinus*)
 DEI: 1 Ex., Ctr.-Brasil., R. FISCHER, als Typus ausgezeichnet.
- flavicauda* BERNHAUER (*Aleochara*)
 DEI: 4 Ex., S. Catharina, Rio Capivary, 1888, leg. FRUHSTORFER, als Typen ausgezeichnet.
- foveolicauda* SCHEERPELTZ (*Leptusa*)
 DEI: 1 ♀, Eisenkappel, Kärnten, Jevan, 1400 m, Farngeriehe, 25. 7. 1942, leg. SCHEERPELTZ, als Cotypus ausgezeichnet.
- frater* BERNHAUER (*Phloeonomus*)
 DEI: 5 Ex., Queensland, Cairns, als Paratypen ausgezeichnet.
- fruhstorferi* BERNHAUER (*Belonuchus*)
 DEI: 8 Ex., Lombok, Sapit, 2000', 4. 1896, leg. FRUHSTORFER, als Typus und Paratypen ausgezeichnet.
- fusca* BAUDI (*Leptusa*)
 DEI: 5 Ex., Alp.mar., als Cotypen ausgezeichnet.
- gerlitzensis* SCHEERPELTZ (*Leptusa*)
 DEI: 1 ♂, Gerlitz, 1900 m, Ossachersee, Cr., 6. 1954, leg. MANDL, als Cotypus ausgezeichnet.
- gracilis* STIERLIN (*Oxyopus*)
 DEI: 2 Ex., Sizilien, als Typen ausgezeichnet.
- granadensis* BERNHAUER (*Xantholinus*)
 DEI: 1 Ex., Nov. Gran., Carac., als Typus ausgezeichnet.
- grata* BERNHAUER (*Atheta*)
 DEI: 1 Ex., Insel St. Thomas, als Typus ausgezeichnet.
- grignaensis* SCHEERPELTZ (*Leptusa*)
 DEI: 1 ♀, Lago di Como, Grigna, 6. 7. 57, leg. LIEBMAN, als Cotypus ausgezeichnet.
- guatemalensis* BERNHAUER (*Paederomimus*)
 DEI: 1 Ex., Guatemala, leg. CONRADT, als Typus ausgezeichnet.
- guttula* BERNHAUER (*Zyras*)
 DEI: 1 Ex., La Caja, 8 km w. San José, C. R., 1934, leg. SCHMIDT, als Typus ausgezeichnet.
- hackeri* BERNHAUER (*Acyllophorus*)
 DEI: 1 Ex., Cairns, leg. HACKER, als Typus ausgezeichnet.
- hackeri* BERNHAUER (*Medon*)
 DEI: 1 Ex., Mulgrave R., leg. HACKER, als Typus ausgezeichnet.
- hackeri* BERNHAUER (*Philonthus*)
 DEI: 1 Ex., Coen District, Cape York, Queensland, leg. HACKER, als Typus ausgezeichnet.
- hemingsi* SCHEERPELTZ (*Xantholinus*)
 DEI: 14 Ex., Mark, Umgeb. Nied-Neuendorf; 1 Ex., Umgebung Berlin, Hohen Neuendorf; 1 Ex., Mark, Umgeb. Mittenwalde; alle coll. NERESHEIMER, als Cotypen ausgezeichnet.

- horni* BERNHAUER (*Holotrochus*)
DEI: 1 Ex, Sikora, Madagaskar, Annanarivo, als Typus ausgezeichnet.
- horni* BERNHAUER (*Medon*)
DEI: 3 Ex., Cairns, 7./05, als Typen ausgezeichnet.
- horni* BERNHAUER (*Paragyrophaena*)
DEI: 1 Ex., La Caja, 8 km w. San José, C. R., 1934, leg. SCHMIDT, als Typus ausgezeichnet.
- horni* BERNHAUER (*Pinophilus*)
DEI: 1 ♀, N.S. Wales, als Typus ausgezeichnet.
- horni* BERNHAUER (*Plociopterus*)
DEI: 2 Ex., Callanga, Peru, als Typus und Paratypus ausgezeichnet.
- horni* BERNHAUER (*Stilicis*)
DEI: 2 Ex., C. R., Vara Blanca, zwischen Barba und Poas, 2000 m, leg. SCHMIDT, als Typen ausgezeichnet.
- horni* BERNHAUER (*Tomoxelia*)
DEI: 1 Ex., Annanarivo, Sikora, C. SCHAUFUSS, als Typus ausgezeichnet.
- idahoensis* BERNHAUER (*Bledius*)
DEI: 1 ♀, Moscow Mt ID, 14. 5. 1921, leg. MELANDER, als Typus ausgezeichnet.
- insularis* BERNHAUER (*Belonuchus*)
DEI: 1 Ex., S. Domingo, als Typus ausgezeichnet.
- insularis* BERNHAUER (*Oligolinus*)
DEI: 1 Ex., S. Domingo, als Typus ausgezeichnet.
- iriventris* BERNHAUER (*Philonthus*)
DEI: 1 Ex., Mexico, Chiapas, als Typus ausgezeichnet.
- jureceki* RAMBOUSEK (*Homoeusa*)
DEI: 1 Ex., As. or. 919, Wladivostok, leg. JUREČEK, als Typus ausgezeichnet.
- kaiseri* SCHEERPELTZ (*Leptusa*)
DEI: 1 ♂, Karawanken, Pelzen, Traventa und Stiege, 20. – 21. 7. 1942, leg. SCHEERPELTZ, als Cotypus ausgezeichnet.
- kamerunensis* BERNHAUER (*Aleochara*)
DEI: 1 Ex., S. O. Kamerun, Lolodorf, 1895, leg. CONRADT, als Typus ausgezeichnet.
- kraatzii* BERNHAUER (*Stilicis*)
DEI: 2 Ex., Malay. Inseln, als Typus und Cotypus ausgezeichnet.
- krügeri* BRUNDIN (*Atheta*)
DEI: 3 Ex., Italia centr., Camerata Nuova, 1909, leg. KRÜGER, als Typus und Paratypen ausgezeichnet.
- laticeps* SCHEERPELTZ (*Leptusa*)
DEI: 1 Ex., Alp. Bergam., Oltre il Colle, als Cotypus ausgezeichnet.
- leai* BERNHAUER (*Conosoma*)
DEI: 2 Ex., N. Queensland, Cairns, 7. 05, als Typus ausgezeichnet.
- liepolti* BERNHAUER (*Paederus*)
DEI: 3 Ex., Bahia, Brasil., 1937, leg. BONDAR, als Paratypen ausgezeichnet.
- linkeiana* SCHEERPELTZ (*Meotica*)
DEI: 1 Ex., Dübener Heide, Wöllnau, Winkelmühler Moor, 2. 1. 1965, leg. LINKE, als Cotypus ausgezeichnet.
- longelytrata* BERNHAUER (*Atheta*)
DEI: 1 Ex., Valdivia, Chile, als Typus ausgezeichnet.
- longicollis* BERNHAUER (*Aleochara*)
DEI: 1 Ex., S. O. Kamerun, Lolodorf, 1895, leg. CONRADT, als Typus ausgezeichnet.
- lucidus* FAUVEL (*Polylobus*)
DEI: 1 ♂, 1 ♀, Madagas., als Typen ausgezeichnet.
- major* FAUVEL (*Placusa*)
DEI: 1 Ex., Peru, Schanusi, als Typus ausgezeichnet.
- malayicus* BERNHAUER (*Belonuchus*)
DEI: 1 Ex., Malay. Ins., als Typus ausgezeichnet.
- monticola* SCHEERPELTZ (*Leptusa*)
DEI: 1 ♀, Wechsel, Austr. inf., als Cotypus ausgezeichnet.
- murrayi* BERNHAUER (*Homoiobrachida*)
DEI: 1 Ex., Port. Philipp., leg. MURRAY, als Typus ausgezeichnet.
- obliquelobatus* BERNHAUER (*Palaminus*)
DEI: 2 Ex., Caracas, Columb., leg. THIEME, als Typus ausgezeichnet.
- opacellus* BERNHAUER (*Eumalus*)
DEI: 1 Ex., Sta Cruz. Mts. Cal, als Paratypus ausgezeichnet.
- opacicollis* BERNHAUER (*Neoptoglossa*)
DEI: 2 Ex., Chili, als Typen ausgezeichnet.
- pacificum* BERNHAUER (*Anthobium*)
DEI: 1 Ex., Californien, Rivers, als Paratypus ausgezeichnet.
- pallidipennis* BERNHAUER (*Oligolinus*)
DEI: 1 Ex., Chile, als Typus ausgezeichnet.
- paradoxa* BERNHAUER (*Falagria*)
DEI: 1 Ex., Brisbane, leg. HACKER, als Typus ausgezeichnet.
- paraguayana* BERNHAUER (*Atheta*)
DEI: 1 Ex., Paraguay, als Typus ausgezeichnet.
- parvicollis* BERNHAUER (*Atheta*)
DEI: 4 Ex., Sitkha; 1 Ex., Kadjak; leg. HOLMBERG, als Typus und Paratypen ausgezeichnet.
- pelionensis* SCHEERPELTZ (*Sipalia*)
DEI: 1 Ex., Pelien, Thessalien, als Cotypus ausgezeichnet.
- perulata* BERNHAUER (*Atheta*)
DEI: 1 Ex., Tempelberg, 900 m, Ginyün, bei Bébé, C. China, REITTER, als Cotypus ausgezeichnet.
- piceorufa* BERNHAUER (*Oxyopoda*)
DEI: 1 Ex., Chili, FAIRMAIRE et SOLIER, als Typus ausgezeichnet.
- piceus* KRAATZ (*Pygostenus*)
DEI: 1 Ex., ohne Fundortangaben, als Typus ausgezeichnet.
- provincialis* SCHEERPELTZ (*Thinobius*)
DEI: 2 Ex., Emilia, It. b. Reno; 1 Ex., Bazzaro, Italia, leg. REITTER; als Cotypen ausgezeichnet.
- pseudodichroa* BERNHAUER (*Atheta*)
DEI: 4 Ex., Cuman, als Typen ausgezeichnet.
- puncticollis* WENDELER (*Pinophilus*)
DEI: 1 Ex., Costarica, Vulkan Turialba, 10 km NÖ v. Irazu, als Paratypus ausgezeichnet.
- purpurascens* BERNHAUER (*Philonthus*)
DEI: 1 Ex., (L.F.S.), als Typus ausgezeichnet.

- pusilla* SCHEERPELTZ (*Leptusa*)
 DEI: 2 Ex., Alp. Bergam., Oltre il Colle, als Cotypen ausgezeichnet.
- quadripunctatus* EPPELSHEIM (*Philonthus*)
 DEI: 2 Ex., Kaukasus, LEDER, als Typen ausgezeichnet.
- queenlandicus* BERNHAUER (*Philonthus*)
 DEI: 3 Ex., Queensland, Cairns, 7. 05, als Typen ausgezeichnet.
- rhaetonorica* SCHEERPELTZ (*Leptusa*)
 DEI: 1 Ex., Obersberg bei Schwarzan i./G. A. i., Felsen nächst Almwiesen, 1300 m, 27. 8. 1919, leg. KÄUFEL, als Cotypus ausgezeichnet.
- rivulorum* SCHEERPELTZ (*Thinobius*)
 DEI: 4 Ex., Gailtaler Alpen, als Cotypen ausgezeichnet.
- robustus* KRAATZ (*Apocellus*)
 DEI: 1 Ex., Mexico St., als Typus ausgezeichnet.
- roubaliella* BRUNDIN (*Atheta*)
 DEI: 1 Ex., Caucasus occ., Krasnaja Poljana, 7. 1910, leg. ROUBAL, als Typus ausgezeichnet.
- ruficeps* BERNHAUER (*Cryptobium*)
 DEI: 1 Ex., Caracas, Columbien, leg. THIEME, als Typus ausgezeichnet.
- rufotestacea* BERNHAUER (*Atheta*)
 DEI: 1 Ex., Insel St. Thomas, als Typus ausgezeichnet.
- rufotestaceus* BERNHAUER (*Lithocharodes*)
 DEI: 1 Ex., Columbien, Honda a. Magdalena, als Typus ausgezeichnet.
- schaufussi* BERNHAUER (*Atheta*)
 DEI: 2 Ex., Sikora, Madagaskar, Annanarivo, als Typen ausgezeichnet.
- schmidti* BERNHAUER (*Atheta*)
 DEI: 2 Ex., C. R., Vara Blanca, zwischen Barba und Poas, 2000 m, leg. SCHMIDT; 1 Ex., C. R., La Caja, 8 km w. San Jose, 1930, leg. SCHMIDT; als Typen ausgezeichnet.
- schmidti* BERNHAUER (*Paederus*)
 DEI: 2 Ex., Vara Blanca, zwischen Barba und Poas, C. R., 2000 m, leg. SCHMIDT, als Typen ausgezeichnet.
- semilivida* BERNHAUER (*Atheta*)
 DEI: 1 Ex., N. Amerika, MORITZ, als Typus ausgezeichnet.
- semitestacea* BERNHAUER (*Silusa*)
 DEI: 1 Ex., Chile, FAIRMAIRE, als Typus ausgezeichnet.
- seticollis* BERNHAUER (*Atheta*)
 DEI: 1 Ex., Insel St. Thomas, als Typus ausgezeichnet.
- sharpi* WEISE (*Philonthus*)
 DEI: 1 Ex., Japonia, HILLER, als Typus ausgezeichnet.
- siamensis* BERNHAUER (*Acanthoglossa*)
 DEI: 1 Ex., Siam, Muok-Lek, 1000', leg. FRUHSTORFER, als Typus ausgezeichnet.
- siciliana* BRUNDIN (*Atheta*)
 DEI: 2 Ex., Sicilia, Nicolosi, 1906, als Typus und Paratypus ausgezeichnet.
- sikorae* BERNHAUER (*Leptusa*)
 DEI: 1 Ex., Sikora, Madagaskar, Annanarivo, 1922, leg. SCHAUFUSS, als Typus ausgezeichnet.
- sikorae* BERNHAUER (*Lispinus*)
 DEI: 1 Ex., Sikora, Madagaskar, Annanarivo, als Typus ausgezeichnet.
- solieri* BERNHAUER (*Calodera*)
 DEI: 1 Ex., Chile, coll. FAIRMAIRE, als Typus ausgezeichnet.
- solieri* BERNHAUER (*Silusa*)
 DEI: 2 Ex., Chili, FAIRMAIRE et SOLIER, als Typen ausgezeichnet.
- spectabilis* BERNHAUER (*Placusa*)
 DEI: 8 Ex., Brasilien, St. Catharina, als Typen ausgezeichnet.
- sphaericollis* SCHUBERT (*Algon*)
 DEI: 2 Ex., Pingshiang, Süd-China, leg. KREYENBERG, als Typus und Paratypus ausgezeichnet.
- subopacus* BERNHAUER (*Phloeonomus*)
 DEI: 1 Ex., Queensland, Cairns, als Paratypus ausgezeichnet.
- subremota* BRUNDIN (*Atheta*)
 DEI: 8 Ex., Hispania, Astorga, leg. PAGANETTI, als Typus und Paratypen ausgezeichnet.
- subtilealutacea* SCHEERPELTZ (*Leptusa*)
 DEI: 2 ♂♂, 3 ♀♀, Gerlitz, 1900 m, Ossiachersee, Cr., 6. 1954, leg. MANDL, als Cotypen ausgezeichnet.
- sumatrensis* BERNHAUER (*Astilbus*)
 DEI: 2 Ex., N. O. Sumatra, Tebing-tinggi, leg. SCHULTHEISS, als Typen ausgezeichnet.
- sydneyense* BERNHAUER (*Conosoma*)
 DEI: 2 Ex., Sydney, 17. 6. 06, als Typus ausgezeichnet.
- sylvicola* BAUDI (*Leptusa*)
 DEI: 2 Ex., Fréjus, Gall., als Cotypus ausgezeichnet.
- tahoensis* BERNHAUER (*Atheta*)
 DEI: 2 Ex., Tahoe Cy Cal. leg. FENYES, als Typen ausgezeichnet.
- thiemei* BERNHAUER (*Stilicis*)
 DEI: 1 Ex., Columb., Gebirge b. Bogota, 5000', als Typus ausgezeichnet.
- turrialbanus* WENDELER (*Pimophilus*)
 DEI: 1 Ex., Costa Rica, Turrialba, 800 m, als Paratypus ausgezeichnet.
- venezolana* BERNHAUER (*Atheta*)
 DEI: 2 Ex., Caracas; 1 Ex., MORITZ; als Typen ausgezeichnet.
- venezolanus* BERNHAUER (*Medon*)
 DEI: 1 Ex., Carac. S., als Typus ausgezeichnet.
- venezolanus* BERNHAUER (*Quedius*)
 DEI: 2 Ex., Caracas, als Typus und Paratypus ausgezeichnet.
- vicarium* SAHLBERG (*Delphrum*)
 DEI: 1 Ex., Tolstoino, leg. SAHLBERG, als Typus ausgezeichnet.
- weisei* KRAATZ (*Pygostenus*)
 DEI: 1 Ex., Kwai, 3. 99, als Typus ausgezeichnet.
- wendleri* BERNHAUER (*Hoplandria*)
 DEI: 1 Ex., Luzon-Benguet, Baguio, 2170 m, leg. BOETTCHER, als Paratypus ausgezeichnet.

Zusammenfassung

Vorliegender Katalog beinhaltet die Coleopteren-Typen der Staphylinidae, die in den Sammlungen der Abteilung Taxonomie der Insekten des Institutes für Pflanzenschutzforschung, Bereich Eberswalde (ehemals Deutsches Entomologisches Institut), aufbewahrt werden.

Summary

This is a catalogue of the types of the Coleoptera of Staphylinidae preserved in the collections of the Department of Taxonomy of Insects of the Institute of Plant Protection Research, Eberswalde (former Deutsches Entomologisches Institut).

Резюме

Данный каталог содержит типы Coleoptera Staphylinidae, хранящиеся в коллекциях отдела таксономии насекомых Научно-исследовательского института защиты растений, Эберсвальдский филиал (бывший Немецкий энтомологический институт).

Besprechungen

Tembrock, G. Grundriß der Verhaltenswissenschaften. Eine Einführung in die allgemeine Biologie des Verhaltens. VEB GUSTAV FISCHER Verlag, Jena, 1980; 17 × 24,5 cm; 336 S., 141 Abb. Preis 23,70 M.

Der Text wurde stark überarbeitet, die Konzeption neu gestaltet, so daß dieses Buch als Einführung in die allgemeine Verhaltensbiologie angelegt ist. Völlig neu sind Kapitel über Methoden der Verhaltensforschung und angewandte Verhaltensbiologie. Zahlreiche Abbildungen wurden ausgewechselt, neue sind hinzugekommen. Der Organismus-Umwelt-Zusammenhang bestimmt die Gesamtdarstellung; der Systemanalyse als Werkzeug der modernen Biologie wird besondere Bedeutung beigemessen. — Das Werk führt in die allgemeine Verhaltensbiologie ein. Dabei wird dem Verfahren der modernen Systemanalyse für den Erkenntnisgewinn besondere Bedeutung beigemessen und das Wirkungsgefüge des Verhaltens unter diesen Gesichtspunkten dargestellt. Ausführlich werden die Umweltsprüche der Tiere und die Umweltklassen behandelt. Die Darstellung basiert auf einem allgemeinen Organismus-Umwelt-Konzept. Besonders berücksichtigt sind auch die Vorgänge der Informationsverarbeitung und die Prozesse im Organismus, die dem Verhalten zugrunde liegen. Ein Hauptabschnitt befaßt sich mit den Aspekten der Verhaltensforschung, Struktur und Funktion, Information sowie dem Entwicklungsaspekt. Das Verhalten wird in seinem Gesamtverlauf als Prozeß dargestellt, hier ist auch das Lernen eingeschlossen.

MORGE

Holloway, J. D. A survey of the Lepidoptera, biogeography and ecology of New Caledonia. Series Entomologica, Vol. 15. Dr. W. JUNK B. V. Publishers, The Hague-Boston-London. 1979; 16 cm × 25 cm; xii & 588 S., 153 Abb. im Text und 87 Phototafeln. Preis 175,00 Hfl.

Der Verfasser verbrachte 1971 mehrere Monate auf Neukaledonien mit dem Ziel einer quantitativen Erfassung der nachtaktiven Macrolepidopteren durch Lichtfallenfänge. Die Auswertung des Materials führte zur Beschreibung einer großen Anzahl neuer Arten (allein fast 60 bei den Noctuiden und 45 bei den Geometriden) und bereicherte so ganz wesentlich die Kenntnis der Macroheterocera eines Gebietes, aus dem bisher kaum mehr als hundert Arten bekannt waren. Besonders zu begrüßen sind die Informationen über die Geologie, die Phytogeographie, die Vegetation (mit instruktiven Photos) und die allgemeinen zoogeographischen Erkenntnisse über dieses Gebiet bei anderen Tiergruppen, die der Autor als Basis seiner speziellen lepidopterologischen Forschung in den ersten Kapiteln seines Buches behandelt. Den Beschreibungen der Arten sind einfache Strichzeichnungen der männlichen und weiblichen Kopulationsapparate beigegeben. Auf Tafeln werden die Falter (rechtseitig) photographisch dargestellt. Das Werk ist eine willkommene Ergänzung unserer Kenntnisse über die Macroheterocera dieser Region, besonders im Hinblick auf die kurz vorher von G. S. ROBINSON auf den Fiji-Inseln durchgeführten Untersuchungen.

PETERSEN

Nowak, E. Die Ausbreitung der Tiere. Die Neue BREHM-Bücherei 480. A. ZIEMSEN Verlag, Wittenberg-Lutherstadt. 1977; 14,7 cm × 20,8 cm; 144 S., 38 Abb. Preis 12,40 M.

Ausbreitungsvorgänge bei Tieren sind in neuerer Zeit nicht nur für die Zoogeographie von wissenschaftlichem Interesse. Sie haben vor allem in Natur- und Umweltschutz und oft auch in der land- und forstwirtschaftlichen Praxis Aufmerksamkeit erregt. Der Autor versucht in diesem Heft für das Gebiet Europas die Arealverschiebungen am Beispiel von 28 Tierarten (darunter acht Insektenarten) allgemeinverständlich darzustellen. Der Text wird durch einfache Kartenskizzen ergänzt. Weiterführende Literatur ist in einer Auswahl von Publikationen aus den letzten Jahren am Schluß angeführt.

PETERSEN

Schütte, F. Integrierte Bekämpfung von Rapsschädlingen durch Vermeidung des Zusammentreffens mit ihren Wirtspflanzen. Heft 22 der „Monographien zur angewandten Entomologie“; Beihefte zur „Zeitschrift für angewandte Entomologie“. Verlag PAUL PAREY, Hamburg und Berlin. 1979; 25 × 16,5 cm; 63 S., 15 Abb., 14 Tab. Preis 38,00 DM (für Bezieher der Zeitschrift 34,20 DM).

Bei vermehrtem Rapsanbau steigt auch die Bedeutung der Rapsschädlinge, unter ihnen vor allem die der Kohlschotenmücke (*Dasineura brassicae*), für deren Massenvermehrung der Kohlschotenrüssler (*Ceutorhynchus assimilis*) Wegbereiter ist. Besonders der in Schleswig-Holstein (BRD) von 1969 bis 1973 trotz mehrfacher Insektizideinsätze pro Jahr rasch angewachsene und mit erheblichen Ertragsseinbußen verbundene Mückenbefall hat zusammen mit der Notwendigkeit, den Insektizidgebrauch drastisch zu senken, die Entwicklung integrierter Bekämpfungsmöglichkeiten gefördert. — Die in dieser Publikation veröffentlichten Untersuchungen sollten klären, ob und unter welchen Bedingungen eine wirtschaftlich vertretbare Bekämpfung von Kohlschotenrüssler und Kohlschotenmücke dadurch möglich wird, daß man das zeitlich genau aufeinander abgestimmte Zusammentreffen vermehrungsbereiter Insekten und anfälliger Stadien der Wirtspflanzen künstlich verhindert. Dazu bietet sich zum Beispiel der früher allgemein übliche Fruchtwechsel an, mit dem sich die Dichte ortstreuer Schadorganismen gut regeln läßt. — Bei der flugfähigen Kohlschotenmücke und dem noch aktiveren Kohlschotenrüssler sollte die einjährige Unterbrechung des Winterrapsanbaus allerdings gleichzeitig auf möglichst sämtlichen Feldern eines geschlossenen Anbaugesbietes erfolgen. Weil das nicht überaus leicht sein wird, läßt sich alternativ auch der Termin der Rapsblüte verzögern, und zwar durch mechanisches „Köpfen“ oder durch Wachstumsregulatoren, die in stärkerer Konzentration allerdings ihrerseits den Ertrag mindern können. Als Ausweg bietet sich eine schwächere Dosierung an, verbunden mit den einmaligen Insektizideinsatz gegen Kohlschotenmücke, Kohlschotenrüssler und Rapsglanzkäfer. — Beide Prinzipien zur Regulierung der Populationsdichte von Schadorganismen (die einheitliche Handhabung auf einer großen, möglichst isoliert liegenden Fläche und der Einsatz von Hemmstoffen zur Verzögerung des Pflanzenwachstums) eignen sich zur Bekämpfung auch anderer Schädlinge. Die hier mitgeteilten Resultate werden deshalb nicht nur als Ausgangspunkt für weitere Forschungen dienen, sondern auch die praktische Durchführung von Schädlingbekämpfungsmaßnahmen erleichtern.

MORGE