

Institut für Pflanzenschutzforschung  
der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR zu Berlin  
Bereich Eberswalde  
Abteilung Taxonomie der Insekten  
Eberswalde-Finow (DDR)

HELGA DÖBLER

Katalog der in den Sammlungen  
der Abteilung Taxonomie der Insekten  
des Institutes für Pflanzenschutzforschung,  
Bereich Eberswalde  
(ehemals Deutsches Entomologisches Institut),  
aufbewahrten Typen — XX

(Coleoptera: Lycidae, Lampyridae, Cantharidae, Phengodidae, Drilidae,  
Malachiidae, Karumiidae, Dasytidae, Melyridae, Cleridae, Lymexylonidae,  
Derodontidae)

Lycidae

**abjectus** KLEINE, 1926 (*Dihammatus*)  
(Philipp. Journ. Sc. 31, Nr. 1, 69–70, Taf. 2, Fig. 54, 55)

Mehrere Ex.: Luzon, Provinz Laguna, Mount Banahao, 2000 ft., leg. BAKER und BÖTTCHER; Mount Maquiling, leg. BAKER;  
San Miguel, Provinz Samar; Mindoro, Calapan; leg. BÖTTCHER; Holotypus, Paratypen, im Museum Dresden und in Coll.  
KLEINE.

DEI: 1 Paratypus, Luzon, Mt. Banahao.

**abnormis** KLEINE, 1926 (*Dilophotes*)  
(l.c., 75–76, Taf. 3, Fig. 12–14)

42 ♂♂, 20 ♀♀, Syntypen, Luzon, Mount Banahao, Provinz Bataan, Mount Limay, Subprovinz Benguet, Baguio; leg. BAKER;  
Subprovinz Amburayan, Butac, 1400 m, leg. BÖTTCHER; Mindanao, Provinz Surigao, Surigao, Provinz Lanao, Kolambungan,  
leg. BAKER; Momungan, leg. BÖTTCHER; Sibuyan; Negros, Cuernos Gebirge; leg. BAKER; in Coll. KLEINE.  
DEI: Syntypen, Luzon; 2 Ex. Surigao, 1 Ex. Amburayan.

**absonus** KLEINE, 1926 (*Trichalus*)  
(l.c., 108, Taf. 4, Fig. 45, 46)

20 Syntypen; Luzon, Provinz Laguna, Mount Maquiling, Los Baños, leg. BAKER; Provinz Bataan, Lamao, leg. SCHULTZE  
und BÖTTCHER; Provinz Nueva Vizcaya, Imugan, 4000 ft.; Mindoro, Calapan, Mashbate, Aroroy; leg. BÖTTCHER; Sibuyan;  
Panay; Negros, Cuernos Gebirge; leg. BAKER; in Coll. KLEINE.

DEI: 1 Syntypus, Luzon, Mt. Makiline, leg. BAKER.  
Im Gegensatz zu den in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Mount Maquiling“ steht auf dem Etikett  
„Mt. Makiline“.

**acerbus** KLEINE, 1925 (*Leptotrichalus*)  
(l.c. 28, Nr. 2, 303–304, Taf. 1, Fig. 9, 11, 12)

Philippinen, Imugan, Provinz Nueva Vizcaya, Luzon, leg. BAKER; ♂ Holotypus, im Museum Dresden, 27 Paratypen, in  
Coll. KLEINE und Coll. BAKER.  
DEI: Paratypen, Luzon: 2 Ex. Mt. Banabas, 1 Ex. Imugan, 1 Ex. Lubwagan.

**acutus** KLEINE, 1925 (*Leptotrichalus*)  
(l.c., 302–303, Taf. 1, Fig. 10, Taf. 2, Fig. 9)

1 ♂, 3 ♀♀, Philippinen, Los Baños, Mount Maquiling, Provinz Laguna, Luzon, Mount Banahao, leg. BAKER; Holotypus,  
Paratypen, im Museum Dresden und in Coll. KLEINE.  
DEI: 1 ♀, Paratypus, Luzon, Mt. Banahao.

**adjunctus** KLEINE, 1925 (*Leptotrichalus*)  
(l.c., 307–308, Taf. 1, Fig. 18, Taf. 2, Fig. 17)

10 Syntypen, Philippinen, Mount Banahao, Luzon, Baguio, Provinz Benguet, Sibuyan, leg. BAKER, im Museum Dresden.  
DEI: 1 Syntypus, Luzon, Imugan.

**adventicius** KLEINE, 1926 (*Bulenides*)  
(I.c. 31, Nr. 1, 84—85, Taf. 3, Fig. 36)

24 ♂♂, 18 ♀♀, Syntypen: Mindanao, Provinz Surigao, Surigao, leg. BAKER, BÖTTCHER, Provinz Lanao, Kolambungan, Iligan, leg. BAKER, Momungan, leg. BÖTTCHER; Panaon, leg. BÖTTCHER: in Coll. KLEINE.  
DEI: 2 Syntypen, Mindanao, Momungan.

**adversarius** KLEINE, 1925 (*Leptotrichalus*)  
(I.c. 28, Nr. 2, 299, 301—302, Taf. 2, Fig. 5, 6)

Holotypus, Sumatra, im DEI [Coll. KRAATZ].<sup>1</sup>

**affictus** KLEINE, 1926 (*Ditoneces*)  
(I.c. 31, Nr. 1, 61—62, Taf. 2, Fig. 21)

ca. 100 Syntypen: Luzon, Provinz Laguna, Mount Maquiling; Mindanao, Provinz Davao, Davao, Provinz Surigao, Surigao, Provinz Bukidnon, Tangkulan, Provinz Agusan, Butuan, Provinz Lanao, Kolambungan, Iligan, Provinz Zamboanga Dapitan; Negros, Cuernos Gebirge; Samar; leg. BAKER; Mindoro, Calapan; Mindanao, Momungan; leg. BÖTTCHER: in Coll. KLEINE.

DEI: 1 Syntypus, Luzon, Mt. Bulavan.

**amicus** KLEINE, 1929 (*Trichalus*)  
(Treubia 10, 477, Fig. 9, 68)

Syntypen, Nord-Queensland: 1 ♂, Cairns, leg. HACKER, im DEI, 1 ♀, Kuranda, leg. BRYANT, im Britischen Museum.  
DEI: 1 ♂, Syntypus, Cairns, leg. HACKER, Coll. HACKER.

**amoenus** KLEINE, 1929 (*Trichalus*)  
(I.c., 479, Fig. 10)

1 ♂, 4 ♀♀, Syntypen, Nord-Queensland, Kuranda, leg. BRYANT, im Britischen Museum und DEI.  
DEI: 1 ♀, Syntypus, Kuranda, leg. HACKER, Coll. HACKER.

**angustus** KLEINE, 1929 (*Trichalus*)  
(I.c., 480, Fig. 17, 32)

Mehrere Syntypen, Queensland.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, Coll. HACKER.

**animosus** KLEINE, 1929 (*Trichalus*)  
(I.c., 477, Fig. 31, 66, 71)

Mehrere Syntypen, Australien, ex Coll. KRAATZ, im DEI.  
DEI: 1 Syntypus, Australien, Coll. KRAATZ.

**apparatus** KLEINE, 1929 (*Trichalus*)  
(I.c., 481, Fig. 19, 20, 28, 77)

Mehrere Syntypen, Queensland, Coen Distr., Cape York, Cooktown, leg. HACKER, im DEI.  
DEI: 2 Ex. Cooktown, 8 Ex. Queensland, Coen Distr., Cape York; leg. HACKER, Coll. HACKER, Syntypen.

**atricollis** KRAATZ, 1879 (*Dictyoptera*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr. 23, 125)

♀ Holotypus, Amur.

DEI: Der Holotypus ist verloren gegangen!

**atricollis** PIC, 1926 (*Dilophotes*)  
(Ent. Mitt. 15, 68)

Holotypus, Formosa, leg. SAUTER, im DEI [Kosempo, 22. V. 1912].

**bakeri** KLEINE, 1926 (*Metanoeas*)  
(Philipp. Journ. Sc. 31, Nr. 1, 99—100, Taf. 4, Fig. 38, 39)

70 ♂♂, 18 ♀♀, Luzon: Provinz Laguna, Mount Maquiling, Los Baños; Subprovinz Benguet, Baguio; leg. BAKER; Subprovinz Bontoc, Mount Polis, 2400 ft.; Subprovinz Kalilinga, Balbalasan, 4000—5000 ft.; Provinz Sorsogon, Mount Bulusan; leg. BÖTTCHER; Mindanao: Provinz Agusan, Butuan; Iligan; Provinz Zamboanga, Zamboanga; Dapitan; Provinz Davao, Davao; leg. BAKER; Provinz Lanao, Kolambungan; Provinz Surigao, Surigao; leg. BAKER, BÖTTCHER; Momungan, Port Banga, leg. BÖTTCHER; Negros: Cuernos Gebirge, leg. BAKER; Basilan, leg. BAKER, BÖTTCHER; Dinagat, Leyte, Burauen, Santa Cruz, leg. BÖTTCHER: in Coll. KLEINE, Syntypen.  
DEI: 2 Syntypen, Surigao.

**bardus** KLEINE, 1926 (*Libnetis*)  
(I.c., 72—73, Taf. 3, Fig. 1—3)

2 ♂♂, 2 ♀♀, Syntypen: Luzon, Subprovinz Benguet, Baguio, leg. BAKER; Pauai, Haight's Place, leg. BÖTTCHER: in Coll. KLEINE.

DEI: 1 Syntypus, Luzon, Haightoplace.

**böttcheri** KLEINE, 1926 (*Metriorrhynchus*)  
(I.c., 80—81, Taf. 3. Fig. 25, 26)

13 ♂♂, 11 ♀♀, Syntypen, Luzon, Provinz Nueva Vizcaya, Imugan, 4000 ft., leg. BÖTTCHER, in Coll. KLEINE.  
DEI: 1 Syntypus, Luzon, Imugan.

**brevis** KLEINE, 1926 (*Xylobanus*)  
(I.c., 91—92, Taf. 4, Fig. 6—8)

21 Syntypen: Luzon, Provinz Laguna, Mount Maquiling, leg. BAKER; Los Baños, leg. VILLEGRAS; Mindanao, Provinz Lanao, Kolambungan; Iligan, Surigao, Surigao; leg. BAKER; Provinz Zamboanga, Port Banga, leg. BÖTTCHER; Negros, Cuernos Gebirge; Samar; leg. BAKER: in Coll. KLEINE.  
DEI: 1 Syntypus, Mindanao, Momungan.

<sup>1</sup> In [ ] wurden die Angaben gesetzt, die sich auf den Etiketten befanden, in der Originalbeschreibung aber fehlten.

**camerunus** KLEINE, 1930 (*Xylobanus*)  
 (Rev. Zool. Bot. Afr. 19, 175–176, Fig. 7–10)

Mehrere Syntypen, Kamerun: Mundame, leg. ROHDE; Joh. Albrechtshöhe, leg. CONRADT; Sierra Leone, Njala, X. 1926, leg. HARGRAVES; Gold Coast, Aburi, 1912–13, leg. PATTERSON; Belg. Congo: Ituri, La Moto, Madyu, leg. BURGEON; Kindu, leg. BURGEON; Kibombo, 2.–11. X., leg. BEQUAERT; Seke, 26. VI. 1911, Eala, IX. 1912, leg. MAYNÉ; Kasai, Ngombe, 14. XI. 1921, leg. SCHOUTEDEN; Stanleyville à Kilo, leg. BURGEON; Kikwit, XI. 1920, Kisantu, leg. VANDERIJST; Mayumba, Tshela, 30. III. 1924, Tshenge-Kwimba, 4. X. 1924, leg. COLLART; Région de Sassa, leg. SAGONA; Beni, leg. BONNEVIE; Bas-Uelé, Koteli, I. 1925, Aribé, Mondo-Mabé, 25.–28. VII. 1925, leg. SCHOUTEDEN; Congo da Lemba, leg. MAYNÉ; Ukaika-Mawambi, leg. GRAUER; Ituri, Medje, IV. 1914, leg. CHRISTY; Mayumba, Makala N'Tete-Tuevo, 25. XI. 1915, Ganda-Sundi, VII. 1911, leg. MAYNÉ; Kasai, Ipamu, leg. VANDERIJST; Sandoa, 1. XI. 1920, leg. OVERLAET; Haut-Uelé, Moto, II.–III. 1923, leg. BURGEON.

DEI: Syntypen, Kamerun, Coll. KRAATZ: 11 Ex. Mundame, leg. ROHDE, 4 Ex. Johann.-Albrechtshöhe, 1896, leg. CONRADT.

**captiosus** KLEINE, 1927 (*Xylobanus*)  
 (Treubia 9, 303–304)

♀ Holotypus, Java, G. Papandajan, leg. DRESCHER und FRUHSTORFER, im DEI [Coll. KRAATZ].

**castigatus** KLEINE, 1927 (*Xylobanus*)  
 (l.c., 304–305)

♀ Holotypus, Sumatra, Coll. KRAATZ, im DEI.

**cereus** KLEINE, 1925 (*Leptotrichalus*)  
 (Philipp. Journ. Sc. 28, Nr. 2, 301, Taf. 2, Fig. 4)

4 ♂♂, Syntypen, Philippinen, Mindanao, Butuan, Surigao, Kolambungan, leg. BAKER.  
 DEI: 1 Syntypus, Mindanao, Momungan.

**circumscriptus** KLEINE, 1925 (*Leptotrichalus*)  
 (l.c., 307, Taf. 1, Fig. 17, Taf. 2, Fig. 15)

1 ♂, 5 ♀♀, Syntypen, Philippinen, Surigao, Mindanao, Butuan, leg. BAKER, in Coll. KLEINE.  
 DEI: 2 ♀♀, Syntypen, Surigao.

**cognatus** KLEINE, 1926 (*Metanoeus*)  
 (l.c. 31, Nr. 1, 100, Taf. 4, Fig. 40)

14 ♂♂, 14 ♀♀, Syntypen; Mindanao, Provinz Lanao, Kolambungan; Sibulan; Negros, Cuernos Gebirge; Nordwest Panay; leg. BAKER, in Coll. KLEINE.  
 DEI: 1 Syntypus, Island Sibulan, leg. BAKER.

**commendabilis** KLEINE, 1926 (*Libnetis*)  
 (l.c., 71–72, Taf. 2, Fig. 58–60)

ca. 200 Syntypen: Luzon; Mount Banahao, 2000 ft., Provinz Camarines Sur, Mount Isarog, 4000 ft., Provinz Sorsogon, Mount Bulusan, Provinz Nueva Vizcaya, Imugan, 4000 ft., Subprovinz Kalinga, Lubuagan; leg. BÖTTCHER; Provinz Laguna, Mount Maquiling, Los Baños; Mindanao; Provinz Lanao, Iligan, Provinz Zamboanga, Zamboanga; leg. BAKER, in Coll. KLEINE.  
 DEI: 1 Syntypus, Luzon, Imugan.

**confertus** KLEINE, 1926 (*Protaaphes*)  
 (Sarawak Museum Journ. 3, 364, Fig. 1–3)

3 ♂♂, 3 ♀♀, Syntypen, Philippinen, Surigao, Mindanao, Butuan, Iligan, Coll. BAKER, in Coll. KLEINE.  
 DEI: 1 Syntypus, Mindoro.

**conradti** KLEINE, 1926 (*Cautires*)  
 (Arch. Naturg. 92, A 12, 132, Taf. 2, Fig. 56, 57)

1 ♂, 2 ♀♀, Syntypen, Kamerun, Mundame, leg. ROHDE, CONRADT, im DEI.  
 DEI: 2 Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

**associatus** KLEINE, 1926 (*Xylobanus*)  
 (Philipp. Journ. Sc. 31, Nr. 1, 97, Taf. 4, Fig. 33, 34)

Mehrere ♀♀, Syntypen: Luzon, Provinz Bataan, Lamas, leg. BÖTTCHER; Mindanao, Provinz Agusan, Butuan, leg. BAKER; Mindoro, Calapan, leg. BÖTTCHER; in Coll. KLEINE.  
 DEI: 1 Syntypus, Luzon, Lubuagan.

**conveniens** KLEINE, 1926 (*Calochromus*)  
 (l.c., 41–42, Taf. 1, Fig. 3–8)

ca. 100 Syntypen; Luzon: Provinz Laguna, Mount Maquiling; Mount Banahao; Provinz Rizal, Montalban; Provinz Nueva Vizcaya, Imugan, 4000 ft.; Bayombong, 1000 ft.; Provinz Camarines Sur, Mount Isarog, 4000 ft.; Provinz Bataan, Limay; leg. BÖTTCHER; Sibulan; leg. BÖTTCHER; Panaon, leg. BÖTTCHER; Negros, leg. BÖTTCHER; Cuernos Gebirge, leg. BAKER; Nakalang, leg. BANKS; Mindanao: Provinz Surigao, Surigao, leg. BAKER, BÖTTCHER; Provinz Lanao, Iligan, leg. BAKER; Kolambungan, leg. BAKER, BÖTTCHER; Momungan, leg. BÖTTCHER; Provinz Zamboanga, Dapitan, leg. BAKER; Port Banga, leg. BÖTTCHER; Provinz Agusan, Butuan, leg. BAKER; San Miguel, Provinz Samar, leg. BÖTTCHER; in Coll. KLEINE.  
 DEI: 2 Syntypen, Cuernos Mts., Negros, leg. BAKER.

**croceus** KLEINE, 1926 (*Metriorrhynchus*)  
 (l.c., 79, Taf. 3, Fig. 21–23)

20 Syntypen: Mindanao, Provinz Agusan, Butuan, Provinz Lanao, Kolambungan, leg. BAKER; Momungan, leg. BÖTTCHER; Provinz Surigao, Surigao, leg. BAKER, BÖTTCHER; Provinz Zamboanga, Dapitan, leg. BAKER; in Coll. KLEINE.  
 DEI: 2 Syntypen, Surigao.

**debilis** KLEINE, 1926 (*Libnetis*)  
 (l.c., 74, Taf. 3, Fig. 11)

27 Syntypen, Luzon: Provinz Laguna, Paete; Mindanao: Provinz Lanao, Momungan; leg. BÖTTCHER; Provinz Surigao, Surigao; Samar; leg. BAKER; in Coll. KLEINE.  
 DEI: 1 Syntypus, Luzon, Anoburayan.

**diffusimaculatus** KLEINE, 1928 (*Metriorrhynchus*)  
(Ent. Mitt. 17, 122, Fig. 10–14)

♀ Holotypus, Australien, Tam Mts., leg. HACKER, im DEI; 1 ♀, Paratypus, dto., in Coll. KLEINE.  
DEI: ♀ Holotypus, Tam Mts., I. 1907, Coll. HACKER.

**discolor** KLEINE, 1928 (*Metriorrhynchus*)  
(Nova Guinea 15, 112, Fig. 60)

♂ Holotypus, 1 ♀, Paratypus, Neu-Guinea, Coll. KRAATZ, im DEI.

**dolosus** KLEINE, 1936 (*Plateros*)

(Arb. morph. tax. Ent. 3, 135–136, Fig. 11, 12)

Mehrere Syntypen, Java, K. O. Blawan, Idjen Plateau, 900–1500 m, III. 1934, leg. LUCHT, in Coll. KLEINE und im DEI.  
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 7. XII. 1933 (Datum nicht erwähnt).

**dubitabilis** KLEINE, 1925 (*Leptotrichalus*)

(Philipp. Journ. Sc. 28, Nr. 2, 302, Taf. 1, Fig. 6, Taf. 2, Fig. 7)

19 Syntypen, Philippinen: Sibuyan, Mount Maquiling; Luzon, Cuernos Gebirge; Negros, Polillo; leg. BAKER; Iligan, Butuan, Kolambungan, Zamboanga, Surigao, Dapitan; Mindanao, Nordwestliches Panay, Nueva Vizcaya; Basilan, Baguio, Benguet; in Coll. KLEINE.  
DEI: 2 Syntypen, Luzon, Mt. Banahao.

**elutus** KLEINE, 1926 (*Metriorrhynchus*)

(Nova Guinea 15, 100, Fig. 14, 15)

Mehrere Syntypen: Neu-Guinea, Pauwi, leg. MOSZKOWSKI; Deutsch Neu-Guinea, Kaiser Wilhelmsland, Hatzfeldhafen, leg. GRABOWSKY, Mäanderberg, 21.–30. VIII. 1913, Lager am Lehmfluß, IV.–V. 1913, Hauptlager bei Malu, 2. II. 1913; leg. BÜRGERS; Holl. Neu-Guinea, Kapaur, leg. FRUHSTORFER, Bivak Eiland, 1. X., leg. LORENTZ; Roon, leg. FRUHSTORFER, Aru-Inseln, Ureinung, leg. RIBBE; im Museum Natura Artis Magistra und im DEI.  
DEI: Syntypen, Coll. KRAATZ: 1 Ex. Neu-Guinea, 1 Ex. Roon, ex Coll. FRUHSTORFER; 2 Ex. Holl. N. Guinea, Kapaur, leg. FRUHSTORFER.

**enganicus** KLEINE, 1939 (*Metriorrhynchus*)

(Treubia 17, 5)

15 ♀, Enggano, V.–VII. 1936, leg. DE JONG; Holotypus, im Museum Leiden, Paratypen, in Coll. KLEINE.  
DEI: 1 ♀, Paratypus, Enggano I., alt V.–VII. 1936, Meok, leg. DE JONG.

**exornatus** KLEINE, 1926 (*Metriorrhynchus*)

(Nova Guinea 15, 105, Fig. 32, 33)

1 ♂, 2 ♀, Holotypus, Paratypen, Neu-Guinea, Coll. KRAATZ, im DEI und in Coll. KLEINE.  
DEI: ♂ Holotypus, 1 ♀, Paratypus, Neu-Guinea, Coll. KRAATZ.

**explicatus** KLEINE, 1926 (*Hemiconderis*)

(l.c., 162–163, Fig. 224)

♂ Holotypus, Neu-Guinea, Coll. KRAATZ, im DEI.

**exploratus** KLEINE, 1926 (*Cautires*)

(Philipp. Journ. Sc. 31, Nr. 1, 82–83, Taf. 3, Fig. 30, 31)

10 ♂, 3 ♀, Syntypen: Luzon, Subprovinz Bontoc, Mount Polis, 2400 ft., Subprovinz Kalinga, Balbalasan, 5000 ft., leg. BÖTTCHER; Provinz Nueva Vizcaya, Imugan, 4000 ft.; Mindanao, Provinz Surigao, Surigao; leg. BAKER, BÖTTCHER; Samar, leg. BAKER; in Coll. KLEINE.  
DEI: 1 Syntypus, N. Luzon, Bontoc.

**femoralis** KLEINE, 1925 (*Leptotrichalus*)

(l.c. 28, Nr. 2, 309, Taf. 1, Fig. 22–24)

29 ♂, 3 ♀, Syntypen, Philippinen; Mindanao, Surigao, Kolambungan, Iligan, Butuan, leg. BAKER, in Coll. KLEINE.  
DEI: Syntypen: 2 Ex. Mindanao, Momungan, Surigao; 1 Ex. Fundort nicht lesbar.

**formosanus** PIC, 1926 (*Metaneus*)

(Ent. Mitt. 15, 67–68)

♂ Holotypus, Formosa, leg. SAUTER, im DEI [Taihorin, 22. VII.].

**formosanus** PIC, 1921 (*Plateros*)

(Echange, Nr. 405, hors texte 7)

Mehrere Syntypen, Formosa.

DEI: Syntypen, Formosa, leg. SAUTER: 3 Ex. Banshoryo-Distr., Sokutsu, 7. VII., 7. VIII. 1912; 3 Ex. Kankau, Koshun, V., VII. 1912.

**fragilis** KLEINE, 1926 (*Cladophorus*)

(Philipp. Journ. Sc. 31, Nr. 1, 81–82, Taf. 3, Fig. 27, 28)

25 ♂, 20 ♀, Syntypen: Mindanao, Provinz Lanao, Iligan, Provinz Zamboanga, Dapitan, Provinz Bukidnon, Provinz Zamboanga, Zamboanga; leg. BAKER; Kolambungan, Provinz Surigao, Surigao, leg. BAKER, BÖTTCHER; Provinz Agusan Cabadabayan, leg. WEBER; Port Banga, leg. BÖTTCHER; Basilan, leg. BAKER; Samar, Catbalogan, leg. BAKER, BÖTTCHER; Negros, Cuernos Gebirge, leg. BAKER; in Coll. KLEINE.  
DEI: 1 Syntypus, Surigao.

**fragilis** KLEINE, 1936 (*Plateros*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 3, 136, Fig. 14, 15)

Mehrere Syntypen, Java, K. O. Blawan, Idjen Plateau, 900–1500 m, V. 1934, leg. LUCHT, in Coll. KLEINE und im DEI.  
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 20.–26. V. 1934.

***franklinmülleri*** KLEINE, 1928 (*Metriorrhynchus*)  
(Ent. Mitt. 17, 121, Fig. 1–4)

♂ Holotypus, 3 ♀♀, Paratypen, Queensland, ex Coll. F. MÜLLER, im DEI und in Coll. KLEINE.  
DEI: ♂ Holotypus, 1 ♀, Paratypus, Queensland, Coll. F. MÜLLER.

***frivolus*** KLEINE, 1926 (*Lycostomus*)

(Philipp. Journ. Sc. 31, Nr. 1, 43–44, Taf. 1, Fig. 10–12)

210 ♂♂, 126 ♀♀, Syntypen: Luzon, Provinz Camarines Sur, Mount Isarog, 4000 ft., Provinz Nueva Vizcaya, Bayombong, 1000 ft., leg. BÖTTCHER; Provinz Laguna, Los Baños, Mount Maquiling, leg. BAKER; Mindanao, Provinz Davao, Davao, Provinz Surigao, Surigao, leg. BAKER; Provinz Lanao, Momungan, leg. BÖTTCHER; Samar, leg. BAKER; San Miguel, Provinz Samar, leg. BÖTTCHER: in Coll. KLEINE.  
DEI: 2 Syntypen, San Miguel.

***fumosus*** KLEINE, 1926 (*Eniclasses*)

(Nova Guinea 15, 182, Fig. 271)

Mehrere Syntypen, Neu-Guinea, Taura, 4.–17. VII. 1910, leg. MOCZKOWSKY, Kapaur, leg. FRUHSTORFER.  
DEI: 1 Syntypus, Holl. N. Guinea, Kapaur, leg. FRUHSTORFER, Coll. KRAATZ.

***hackeri*** KLEINE, 1928 (*Metriorrhynchus*)

(Ent. Mitt. 17, 121, Fig. 5–9)

1 ♂, 8 ♀♀, Australien, Tam. Mts., leg. HACKER; Holotypus, Paratypen, im DEI und in Coll. KLEINE.  
DEI: ♂ Holotypus, 5 ♀♀, Paratypen, Tam. Mts., II. 1906, Coll. HACKER.

***hackeri*** KLEINE, 1933 (*Xylobanus*)

(Stett. Ent. Ztg. 94, 11, Fig. 76–79)

♂ Holotypus, Australien, Tam. Mts., Blackall, leg. RANGE, im DEI; 1 ♂, Paratypus, dto.  
DEI: ♂ Holotypus, Tam. Mts., XI. 1906, Nr. 491, Coll. HACKER.

***hirsutus*** KLEINE, 1926 (*Trichalus*)

(Nova Guinea 15, 173, Fig. 247)

Holotypus, mehrere Paratypen; Neu-Guinea, Coll. KRAATZ; Südost Neu-Guinea, Fiume Purari, I. 1914, leg. LORIA.  
DEI: 1 Paratypus, Neu-Guinea, Coll. KRAATZ.

***hogeui*** PIC, 1930 (*Calopteron*)

(Ann. Soc. Ent. Fr. 99, 323)

Mehrere Syntypen, Mexico, leg. HOGE, Coll. KRAATZ, im DEI.  
DEI: 1 Syntypus, Mexico, leg. HOGE, Coll. KRAATZ.

***humeralis*** KLEINE, 1926 (*Cladophorus*)

(Nova Guinea 15, 130–131, Fig. 123–126)

Mehrere Syntypen, Holl. Neu-Guinea, Kapaur, leg. FRUHSTORFER.  
DEI: 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

***ignotus*** KLEINE, 1936 (*Trichalus*)

(Arb. morph. taxon. Ent. 3, 133–135)

Mehrere Syntypen, Java, G. Tangkoeban Prahoe, 4000–5000', Preanger, leg. DRESCHER, in Coll. KLEINE und im DEI.  
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 24. IV.–9. V. 1933.

***impressicollis*** KLEINE, 1926 (*Cautires*)

(Arch. Naturg. 92, A 12, 140, Taf. 3, Fig. 85, 86)

1 ♂, 3 ♀♀, Syntypen, Usambara, im DEI.  
DEI: 1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Usambara, Coll. KRAATZ.

***irregularis*** KLEINE, 1926 (*Cautires*)

(Arch. Naturg. 92, A 12, 132–133, Taf. 2, Fig. 58–60)

5 ♂♂, 1 ♀, Syntypen, Kamerun, Mundame, leg. ROHDE, CONRADT, im DEI.  
DEI: 3 Ex. Kamerun, leg. CONRADT, 5 Ex. Kamerun, Mundame, leg. ROHDE; Coll. KRAATZ (nur 2 Ex. wurden vom Autor als Typen gekennzeichnet); Syntypen.

***javanus*** KLEINE, 1926 (*Leptotrichalus*)

(Treubia 9, Nr. 4, 313, Taf. 7, Fig. 70)

2 ♂♂, 4 ♀♀, Syntypen; Java, Tjibodas, 1400–1500 m, im Museum Buitenzorg, Preanger, leg. SJTHOFF, im Museum Leiden.  
DEI: Tjibodas, 1400 m, VIII. 1921, No. 270, ex Museum Buitenzorg, 1 Syntypus.

***lateapicale*** PIC, 1932 (*Mesopteron*)

(Rev. Soc. Ent. Argent. 7, Nr. 21, 3)

Holotypus, Bolivie, Yungas, durch GERMAIN, Coll. KRAATZ, im DEI.

***longepilosus*** KLEINE, 1928 (*Metriorrhynchus*)

(Ent. Mitt. 17, 122–123, Fig. 15–18)

1 ♂, 5 ♀♀, Queensland, Coen Distr., Cape York, leg. HACKER; Holotypus, Paratypen, im DEI und in Coll. KLEINE.  
DEI: ♂ Holotypus, 1 ♀, Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. HACKER.

***longissimum*** PIC, 1931 (*Mesopteron*)

(Echange 56, Nr. 443, hors texte 95)

Holotypus, Bolivien, Yungas, durch GERMAIN, Coll. KRAATZ; im DEI.

***longithorax*** KLEINE, 1926 (*Cautires*)

(Arch. Naturg. 92, A 12, 140, Taf. 3, Fig. 81, 82)

♂ Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI; 1 ♂, Paratypus, dto.  
DEI: ♂ Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

**malignus** KLEINE, 1936 (*Calochromus*)  
(Arb. morph. taxon. Ent. 3, 139–140, Fig. 31)

Mehrere Syntypen, Java, G. Tangkoeban Prahoe, 4000–5000', Preanger, IV. 1934, leg. DRESCHER, in Coll. KLEINE und im DEI.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, IV. 1936 (nicht 1934!).

**marcidus** KLEINE, 1926 (*Trichalus*)  
(Nova Guinea 15, 175, Fig. 252, 253)

2 ♂♂, 6 ♀♀, Holotypus, Paratypen, Neu-Guinea, Dilo, VI.–VII., leg. LORIA, im Museum Genua, in Coll. KLEINE und Coll. KRAATZ.

DEI: 4 Paratypen, Neu-Guinea, Coll. KRAATZ.

**melzeri** PIC, 1935 (*Haplobothris*)  
(Mél. Exot. Ent. 66, 6)

Mehrere Syntypen, Brésil, São Paulo, via MELZER an KLEINE.

DEI: 1 Syntypus, Bras., São Paulo, durch MUUS und MELZER.

**micans** KLEINE, 1926 (*Cladophorus*)  
(Nova Guinea 15, 136–137, Fig. 150)

Holotypus, 1 Paratypus, Neu-Guinea, Astrolabe Bay, Roon, leg. FRUHSTORFER, im Museum Berlin.

DEI: ♀ Holotypus, N. Guinea, Astrolabe-B., durch ROHDE.

**minutus** PIC, 1932 (*Emblectus*)  
(Rev. Soc. Ent. Argent. 7, 5)

Holotypus, Bolivie, Yungas, durch GERMAIN, Coll. KRAATZ, im DEI.

**nanus** KLEINE, 1933 (*Cladophorus*)  
(Stett. Ent. Ztg. 94, 7, Fig. 42–44)

♂ Holotypus, 2 ♂♂, Paratypen, Kamerun, leg. CONRADT, in Coll. KLEINE.

DEI: 1 Paratypus, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

**nigricauda** KLEINE, 1928 (*Metriorrhynchus*)  
(Ent. Mitt. 17, 123–124, Fig. 24–27)

2 ♀♀, Holotypus, Paratypus, Queensland, Cape York, Coen District, leg. HACKER, im DEI und in Coll. KLEINE.

DEI: ♀ Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung.

**nigricolle** PIC, 1932 (*Cyrtopteron*)  
(Rev. Soc. Ent. Argent. 7, Nr. 21, 2)

Holotypus, Bolivie, Yungas, durch GERMAIN, Coll. KRAATZ; im DEI.

**nigrimembris** PIC, 1922 (*Xylobanus*)  
(Echange, Nr. 407, hors texte 16)

Mehrere Syntypen, Formosa.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Taihorin, leg. SAUTER.

**nigroapicalis** PIC, 1935 (*Haplobothris*)  
(Mél. Exot. Ent. 66, 7)

Mehrere Syntypen, Brésil, São Paulo, ex MELZER, via KLEINE an PIC.

DEI: 1 Syntypus, Bras., São Paulo, leg. MUUS und MELZER.

**nigrostriatus** KLEINE, 1936 (*Ditoneces*)  
(Arb. morph. taxon. Ent. 3, 136–137, Fig. 16, 17, 19)

Mehrere Syntypen, Java, G. Tangkoeban Prahoe, 4000–5000', Preanger, III.–IV. 1934, leg. DRESCHER, in Coll. KLEINE und im DEI.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, VI. 1934 (Datum nicht erwähnt!).

**nigrostriatus** KLEINE, 1926 (*Parapyropterus*)  
(Stett. Ent. Ztg. 87, 104)

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Formosa, Hoozan, III. 1910, Kosempo, VII. 1909, leg. SAUTER.

DEI: 1 ♀, Syntypus, Formosa, Kosempo, VII. 1909, leg. SAUTER.

**opacus** PIC, 1921 (*Libnetis*)  
(Mél. Exot. Ent. 33, 14)

Mehrere Syntypen, Formosa.

DEI: 13 Syntypen, Sokotsu, Banshoryo Distr., 7. VI. 1912, leg. SAUTER.

**ordinarius** KLEINE, 1926 (*Plateros*)  
(Philipp. Journ. Sc. 31, Nr. 1, 47, Taf. 1, Fig. 18–19)

18 Ex., Luzon; Provinz Laguna, Mount Maquiling, leg. BAKER; Mindanao; Provinz Davao, Davao, leg. BAKER; Provinz Surigao, Surigao, leg. BAKER; BÖTTCHER; Provinz Lanao, Kolambungan, Provinz Agusan, Butuan; leg. BÖTTCHER; Leyte, Santa Cruz; leg. BÖTTCHER; Holotypus, Paratypen, in Coll. KLEINE.

DEI: 1 Paratypus, Mindanao, Surigao.

**pallens** KLEINE, 1926 (*Clautires*)  
(Arch. Naturg. 92, A 12, 126, Taf. 1, Fig. 36)

3 ♀♀, Kamerun, leg. CONRADT; Paratypen, Holotypus, im DEI.

DEI: ♀ Holotypus, 1 ♀, Paratypus, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

**paradoxa** MJÖBERG, 1925 (*Duliticola*)  
(Psyche 32, 134–135, Fig. 1, Taf. 3, Fig. 2a, 2b, Taf. 4)

Mehrere Syntypen, Sarawak, Mt. Batu Gading near Lundu, 1500–3000 ft., 1924, leg. MJÖBERG.

DEI: 1 ♂, Syntypus, Sarawak, Mt. Batu Gading near Lundu, 1500–3000 ft.

**paululus** KLEINE, 1926 (*Xylobanus*)  
(Philipp. Journ. Sc. 31, Nr. 1, 93–94, Taf. 4, Fig. 15–18)

Mehrere Ex.; Luzon, Provinz Laguna, Paete, leg. BÖTTCHER; Mount Maquiling, leg. BAKER; Mindanao, Provinz Lanao, Momungan, leg. BÖTTCHER; Negros, Canlaon Volkan, leg. BANKS; Paratypen, Holotypus, in Coll. des Bureau of Science zu Manila und in Coll. KLEINE.  
DEI: 1 Paratypus, Luzon, Mt. Banahao.

**pectinicornis** KRAATZ, 1879 (*Cerceros*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr. 23, 127, Taf. 2, Fig. 2b)

Mehrere ♂♂, Syntypen, Amur.  
DEI: 2 ♂♂, Syntypen, Amur, Coll. KRAATZ.  
Syn. zu *flabellatus* MOTSCHULSKY, 1860.

**pilosus** KLEINE, 1926 (*Stereotrichalus*)  
(Nova Guinea 15, 185, Fig. 277, 278)

♂ Holotypus, Holl. Neu-Guinea, Kapaur, leg. FRUHSTORFER, im DEI [Coll. KRAATZ].

**pinguis** KLEINE, 1937 (*Merolyceus*)  
(Ann. Mus. Congo 3, sect. 2, fasc. 6, 97, Fig. 232, 233)

Holotypus, Congo, Albertville, XII. 1918, leg. MAYNÉ, im Musée du Congo; mehrere Paratypen, Eala, leg. CORBISIER, Poko, leg. FLORIDON, Kwesi à Kilo, leg. BAYER, Lusuku, leg. QUARRÉ, Kaniama, leg. MASSART.  
DEI: 1 Paratypus, Kwesi à Kilo, 10.–19. IV. 1911, leg. BAYER, Musée du Congo, Nr. 2425.

**pusillus** KLEINE, 1926 (*Cautires*)  
(Arch. Naturg. 92, A 12, 133, Taf. 2, Fig. 62, 63)

8 ♂♂, 2 ♀♀, Syntypen, Kamerun, Togo, leg. CONRADT, Usambara, Nguelo.  
DEI: Syntypen: 1 Ex. Kamerun, 1 Ex. Togo; leg. CONRADT; 7 Ex. Usambara, Nguelo; Coll. KRAATZ.

**pusillus** KLEINE, 1928 (*Metriorrhynchus*)  
(Ent. Mitt. 17, 124–125, Fig. 28–31)

5 ♂♂, Queensland, Coen District, Cape York, leg. HACKER; Holotypus, Paratypen, im DEI und in Coll. KLEINE.  
DEI: ♂ Holotypus, 3 ♂♂, Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

**queenslandicus** KLEINE, 1928 (*Metriorrhynchus*)  
(l.c., 123, Fig. 19–23)

Holotypus, 1 Paratypus, Süd-Queensland, Blackal, im DEI und in Coll. KLEINE.  
DEI: Holotypus, Blackal, Range, Nr. 495, Coll. HACKER.

**rarus** KLEINE, 1936 (*Dihammatus*)  
(Arb. morph. taxon. Ent. 3, 138, Fig. 26)

Mehrere Syntypen, Java, G. Tangkoeban Prahoe, 4000–5000', III.–XI. 1933, Preanger, leg. DRESCHER, in Coll. KLEINE und im DEI.  
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

**reducens** KLEINE, 1936 (*Plateros*)  
(l.c., 135, Fig. 7, 8)

Mehrere Syntypen, Java, K. O. Blawan, Idjen Plateau, 900–1500, I. 1934, leg. LUCHT, in Coll. KLEINE und im DEI.  
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 8. I. 1934.

**reticulatus** KLEINE, 1926 (*Cladophorus*)  
(Nova Guinea 15, 143, Fig. 172, 173)

♀ Holotypus, 1 ♀, Paratypus, Batjan, leg. FRUHSTORFER, im DEI.  
DEI: ♀ Holotypus, Batjan, VIII.–IX., ex Coll. FRUHSTORFER, Coll. KRAATZ.

**rufiventris** KRAATZ, 1879 (*Dictyoptera*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr. 23, 125; nom. praeocc. = *kraatzi* BOURGEOIS, 1882, Abeille 20, 117)

Mehrere Syntypen, Amur, Külek, leg. CHRISTOPH, durch LEDER.  
DEI: 1 Syntypus, Külek, Coll. KRAATZ.

**rusticus** KLEINE, 1936 (*Plateros*)  
(Arb. morph. taxon. Ent. 3, 135)

Mehrere Syntypen, Java, K. O. Blawan Idjen Plateau, 900–1500 m, 20.–26. V. 1934, leg. LUCHT, in Coll. KLEINE und im DEI.  
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

**sanguinosus** KLEINE, 1951 (*Calochromus*)  
(Ent. Bl. 45–46 (1949–50), 24)

Holotypus, mehrere Paratypen, China, Provinz Fukiien, 27, 40° n. Br., 117, 40° ö. L., 2300 m Seehöhe, Kuatun, 22. III., 15. IV. 1938, leg. KLAPPERICH, im Museum KOENIG, Bonn und im DEI.  
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, 22. III. 1938.

**siccus** KLEINE, 1936 (*Xylobanus*)  
(Arb. morph. taxon. Ent. 3, 133)

Mehrere Syntypen, Java, G. Raoeng „Bajoeckidoel“, 450–700 m, I.–II. 1933, leg. LUCHT, in Coll. KLEINE und im DEI.  
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 1.–20. II. 1932.

**similis** KLEINE, 1926 (*Cautires*)  
(Arch. Naturg. 92, A 12, 137, Taf. 3, Fig. 71)

1 ♂, 7 ♀♀, Kamerun, Mundame, leg. ROHDE, CONRADT; Usambara; im DEI, Syntypen.  
DEI: Syntypen, Coll. KRAATZ: 3 Ex. Kamerun, leg. CONRADT, 2 Ex. Kamerun, Mundame, leg. ROHDE, 1 Ex. Usambara.

**sirambeanus** KLEINE, 1933 (*Ditoneces*)  
(Stett. Ent. Ztg. 94, 16–17, Fig. 127–129)

1 ♂, 2 ♀, Sumatra, Si Rambé, leg. MODIGLIANI; Paratypen, Holotypus, in Coll. KLEINE und im DEI.  
DEI: 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung, XII, 1890–III. 1891, Coll. KRAATZ.

**sondanicus** KLEINE, 1927 (*Calochromus*)  
(Treubia 9, 293, Taf. 6, Fig. 2, 6, 7, 9)

♂ Holotypus, 2 ♀, Paratypen, Sunda-Inseln, in Coll. KLEINE und im Museum Buitenzorg.  
DEI: 1 Paratypus, Java, ex Museum Buitenzorg.

**suturalis** KLEINE, 1926 (*Procautires*)  
(Nova Guinea 15, 159, Fig. 213–215)

♂ Holotypus, 2 ♂, Paratypen, Neu-Guinea, Astrolabe-Bay, leg. ROHDE, Coll. KRAATZ, in Coll. KLEINE und im DEI.  
DEI: Paratypen, Coll. KRAATZ: 1 ♂, Neu-Guinea, 1 ♂, N. Guinea, Astrolabe-B., leg. ROHDE.

**tenebricosus** KLEINE, 1928 (*Metriorrhynchus*)  
(Ent. Mitt. 17, 125, Fig. 32–34)

♀ Holotypus, 1 ♀, Paratypus, Queensland, Coen District, Cape York, leg. HACKER, im DEI und in Coll. KLEINE.  
DEI: ♀ Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung.

**tenuis** KLEINE, 1936 (*Xylobanus*)  
(Arb. morph. taxon. Ent. 3, 133)

Mehrere Syntypen; Java, Kendeng Geb., VI. 1932; K. O. Blawan, Idjen Plateau, 900–1500 m, VI. 1933; leg. LUCHT, in Coll. KLEINE und im DEI.  
DEI: 1 Syntypus, Java, K. O. Blawan, Idjen Plateau, 900–1500 m, VI. 1933, leg. LUCHT.

**transversithorax** KLEINE, 1936 (*Libnetis*)  
(l.c., 187, Fig. 21)

Mehrere Syntypen, Java, G. Raoeng, „Bajoekidoel“, 450–700 m, leg. DRESCHER, in Coll. KLEINE und im DEI.  
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 15. I. 1933.

**versicolor** KLEINE, 1926 (*Eniclasses*)  
(Nova Guinea 15, 182, Fig. 270)

♂ Holotypus, Neu-Guinea; im DEI, Coll. KRAATZ.

**wittei** KLEINE, 1937 (*Acantholyucus*)

(Expl. Parc Nat. Albert, Miss. DE WITTE, 8, 7, Fig. 10, 11)

Holotypus, 32 Paratypen, Congo, Rutshuru, 1.285 m, 22. V.–1. VI., 12.–16., 20.–24. VI. 1934/1.–15. I., 7.–24. VI. 1935, Miss. DE WITTE, im Museum Congo und in Coll. KLEINE.  
DEI: 1 Paratypus, Rutshuru, 17.–20. VI. 1934, leg. DE WITTE, Parc Nat. Albert, ex Musée du Congo, Nr. 438.

### Wahrscheinlich nicht beschriebene Arten

**absurdus** KLEINE (*Trichalus*)

DEI: 1 ♂, 1 ♀, Typen, Sumatra, Siboga, X. 1890–III. 1891, leg. MODIGLIANI, Coll. KRAATZ.

**atrithorax** PIC (*Lycus*)

DEI: 1 Typus, Mexico, Coll. KRAATZ.

**bilineaticollis** PIC (*Metapteron*)

DEI: 1 Typus, Amazon, Coll. KRAATZ.

**flavus** PIC (*Lycus*)

DEI: 1 Typus, Mexico, Coll. KRAATZ.

**kraatzi** PIC (*Emplectus*)

DEI: 1 Typus, Peru, Vilcanota, Coll. KRAATZ.

**longepectinalis** PIC (*Calleros*)

DEI: 1 Typus, Bolivien, Yungas, durch GERMAIN, Coll. KRAATZ.

### Lampyridae

**consors** OLIVIER, 1909 (*Lucidota*)

(Bull. Soc. Ent. Fr., 35)

Mehrere Syntypen, Peru, Marcapata, Brasilien, Espirito Santo.  
DEI: 2 Syntypen, Peru, Marcapata, Coll. KRAATZ.

**filiformis** OLIVIER, 1913 (*Luciola*)

(Ent. Mitt. 2, 271)

Mehrere Syntypen, Formosa, Kosempo, Kankau, leg. SAUTER.  
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kosempo, 7. VI. 1912, leg. SAUTER.

**impolita** OLIVIER, 1913 (*Luciola*)

(l.c., 271)

Mehrere Syntypen, Formosa, Koshun, leg. SAUTER.  
DEI: 4 Syntypen, Formosa, Kankau, Koshun, VII. 1912, leg. SAUTER.

**mundula** OLIVIER, 1913 (*Luciola*)  
(L.c., 271)

Holotypus, Formosa, Kankau, leg. SAUTER; im DEI [Koshun, VII. 1912].

**tristicolor** OLIVIER, 1909 (*Lucidota*)  
(Bull. Soc. Ent. Fr., 36)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Espirito Santo.  
DEI: 1 Syntypus, Espirito Santo, Coll. KRAATZ.

### Wahrscheinlich nicht beschriebene Arten

**nanus** SCHAUFUSS (*Photinus*)

DEI: 3 Typen, N. Granada, Coll. SCHAUFUSS.

**reitteri** HICKER (*Pyrocaelia*)

DEI: 3 Typen, N. W. China, Tienmuschan, RTT.

### Cantharidae

**albithorax** PIC, 1915 (*Chauliognathus*)  
(Bull. Soc. Zool. Fr., 40, 95)

Mehrere Syntypen, Nouvelle-Guinée.  
DEI: 1 Syntypus, D. N. Guinea, Deutsch-holländ. Grenze.

**albocincticolle** PIC, 1936 (*Discodon*)  
(Arb. morph. taxon. Ent. 3, 131)

Mehrere Syntypen, Costa Rica, La Caja, bei San José, leg. H. SCHMIDT, im DEI und in Coll. PIC.  
DEI: 1 Syntypus, C. R., La Caja, San José, 8 k/w, 1934.

**anatolica** BOURGEOIS, 1900 (*Cantharis*)  
(In: BODEMEYER, E. v.: Quer durch Kleinasien in den Bulghar Dagh, 152–153)

Mehrere Syntypen, Biledjek, Eski-Chehir.  
DEI: 1 ♂, Asia minor, Biledjek, 1 Ex. Eski-Chehir; leg. v. BODEMEYER, Coll. LEONHARD, Syntypen.

**anatolica** DAHLGREN, 1968 (*Rhagonycha*)  
(Ent. Bl. Biol. Syst. Käf. 64, 110–111, Fig. 8 A, B)

Holotypus, Kleinasien, Amasia, 1888, leg. KORB, Coll. KRAATZ, im DEI.

**apicicornis** PIC, 1911 (*Plectonotum*)  
(Echange 27, Nr. 323, 179–180)

Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI und in Coll. PIC.  
DEI: 2 Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, Coll. KRAATZ.

**astur** HEYDEN, 1880 (*Cantharis*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr. 24, 298)

5 ♂♂, 2 ♀♀, Syntypen, Arvas Asturia, 1879, leg. GETSCHMANN, in Coll. V. HEYDEN.  
DEI: 3 Syntypen, Asturia, 1879, leg. GETSCHMANN.

**atripennis** PIC, 1922 (*Malthinus*)  
(Mél. Exot. Ent. 36, 30; nom. praeocc. = *nigripennis* PIC, 1938, Bull. Soc. Ent. Fr., 121)

Mehrere Syntypen, Formosa.  
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Hokuto, III. 1912, leg. SAUTER.

**atropaculus** PIC, 1937 (*Athemus*)  
(Ent. Bl. 33, 62–63)

Holotypus, Formosa, Chosokei, leg. SAUTER, im DEI [1914].

**bifurcatus** KIESENWETTER, 1852 (*Malthodes*)  
(Lin. Ent. 7, 297–298, Taf. 2, Fig. 17)

Mehrere Syntypen, Sicilien, leg. SCHÖDTE und ZELLER.  
DEI: Syntypen, Coll. STIERLIN: 2 Ex. Sicilien, 1 Ex. ohne Fundort.

**bilateralis** PIC, 1927 (*Polemius*)  
(Ent. Mitt. 16, 250)

Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI und in Coll. PIC.  
DEI: 1 Syntypus, Bolivien, leg. GERMAIN.

**bodemeyeri** BOURGEOIS, 1900 (*Cantharis*)  
(In: BODEMEYER, E. v.: Quer durch Kleinasien in den Bulghar Dagh, 152–153)

Mehrere Syntypen, Burna, Bulghar-Dagh.  
DEI: 1 ♀, Syntypus, Asia minor, Bulghar-Dagh, leg. v. BODEMEYER.

**bodemeyeri** DAHLGREN, 1968 (*Rhagonycha*)  
(Ent. Bl. Syst. Käf. 64, 115, Fig. 14 C, D)

Holotypus, Asia minor, Burna, Taurus, 1899, leg. v. BODEMEYER, im DEI.

***boicus*** KIESENWETTER, 1863 (*Malthodes*)

(In: ERICHSON: Nat. Gesch. Ins. Dtschl. Abt. 1, 4, 723 - 724)

Mehrere Syntypen, um Kreuth, bayerische Alpen, leg. v. KIESENWETTER.  
DEI: 1 Syntypus, Kreuth, Coll. STIERLIN.***boliviensis*** PIC, 1927 (*Polemius*)

(Ent. Mitt. 16, 250)

Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI und in Coll. PIC.  
DEI: 2 Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN.***boliviensis*** PIC, 1927 (*Malthodes*)

(l.c., 253)

Holotypus, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI.

***boliviensis*** PIC, 1927 (*Oontelus*)

(l.c., 252 - 253)

Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI und in Coll. PIC.  
DEI: 5 Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN.***bourgeoisi*** REITTER, 1888 (*Malchinus*)

(Wien. Ent. Ztg. 7, 210)

Mehrere Syntypen, Circassien, 1887, durch LEDER.  
DEI: Caucas. occ., Circassien, REITTER, 1 Paralectotypus; von BRANCUCCI designiert.***brachypterus*** KIESENWETTER, 1863 (*Malthodes*)

(Nat. Gesch. Ins. Dtschl. Abt. 1, 4, 725 - 726)

Mehrere Syntypen, Südtirol, um Bozen, leg. v. KIESENWETTER.  
DEI: 1 ♀, Syntypus, Botzen, Coll. STIERLIN.  
Syn. zu *lobatus* KIESENWETTER, 1852.***brunneipennis*** HEYDEN, 1889 (*Cantharis*)

(Horae Soc. Ent. Ross. 23, 673 - 674)

2 Syntypen, Shan-si, 9. VI. 1884, Kan-ssu, 5. VII. 1885, leg. POTANIN.  
DEI: 1 Syntypus, Shan-si, 1884, leg. POTANIN.***chosokeiensis*** PIC, 1937 (*Athemus*)

(Ent. Bl. 33, 63)

Holotypus, Formosa, Chosokei, leg. SAUTER, im DEI [1914].

***cilicius*** PIC, 1904 (*Cantharis*)

(Echange 20, Nr. 230, 9)

Mehrere Syntypen, Cilicischer Taurus, Coll. PIC.  
DEI: 1 Syntypus, Asia-Minor, Bozanti-Thal, leg. v. BODEMEYER, Coll. LEONHARD.***claricolle*** PIC, 1927 (*Discodon*)

(Ent. Mitt. 16, 252)

♀ Holotypus, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI.

***consociata*** HEYDEN, 1883 (*Rhagonycha*)

(Dtsch. Ent. Ztschr. 27, 311 - 312)

Holotypus, auf dem Asiatischen Olymp, leg. MERKL; im DEI.

***costatipennis*** PIC, 1937 (*Malthodes*)

(Ent. Bl. 33, 65)

Holotypus, occ. Java, Tjibodas, im DEI [1400 m, 1923, leg. KARNY, No. 9, ex Museum Buitenzorg].

***cruciatus*** BAUDI, 1859 (*Malthodes*)

(Berl. Ent. Ztschr. 3, 301)

Mehrere Syntypen, Sardinia, im Museum Turin.  
DEI: 1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Sardinia, leg. BAUDI, Coll. STIERLIN.***esikii*** STILLER, 1926 (*Cantharis*)

(Rovart. Lap. 26, 136 - 137)

Mehrere Syntypen, Croatian, Bahnhstation Plase und Zlobin, M. V., leg. STILLER.  
DEI: 1 Syntypus, Croatian, Plase, V. 1916, leg. STILLER, Nr. 22.***cypnorurus*** KIESENWETTER, 1861 (*Malthinus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 5, 383)

Mehrere Syntypen, Monte Rosa, Macugnaga, Sommer 1861, leg. v. KIESENWETTER.  
DEI: 1 Syntypus, Macugnaga, Coll. STIERLIN.***denticollis*** SCHUMMEL, 1844 (*Cantharis*)

(Übers. Arb. Veränd. Schles. Ges. (1843), 194 - 195)

2 Ex. Schlesien, Gesenke oder Altvater, an der Hungerlehne, A. VIII. 1843, leg. SCHUMMEL; 1 Ex. Gesenke, in Coll. LETZNER: Syntypen.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, leg. SCHUMMEL, Coll. KRAATZ.

***denticornis*** WITTMER, 1952 (*Podabrus*)

(Ent. Bl. 47 (1951), 96 - 97, Fig. 2)

Holotypus, mehrere Paratypen, China-Fukien, Kuautun, 2300 m, 8. V. - 30. V. 1938, leg. KLAPPERICH, im Museum A. KOENIG, Bonn und in Coll. KLAPPERICH.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, 10. V. 1938.

**deserticola** WITTMER, 1969 (*Boveycantharis*)  
(Verh. Nat. Ges. Basel 80, 83, Fig. 34, 35)

Holotypus, Paratypen: Jordanien, Dehbeen b/Jerash, 29. III. 1964, Wadi Scheib, 10. III. 1967; leg. KLAPPERICH; Palestina, Jerusalem, 10. III. 1933, leg. SCHATZMAYR; in Coll. WITTMER.  
DEI: 3 Paratypen, Jordan, Dehbeen b. Jerash, 29. IV. 1964, leg. KLAPPERICH (nicht 29. III. 1964!).

**dimidiatus malatiensis** HEYDEN, 1886 (*Cantharis*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr. 30, 279)

Mehrere Syntypen, im südlichen Kleinasiens, Malatia.  
DEI: Lectotypus, (Nr. 711), 5 Paralectotypen, Malatia, Mesopotam., 1885, leg. STAUDINGER, Coll. v. HEYDEN; von WITTMER designiert.

**divisa** DAHLGREN, 1972 (*Rhagonycha*)  
(Ent. Bl. 68, 144)

♂ Holotypus, Palencia, leg. PAGANETTI; 1 ♂, dto.; 1 ♂, Cuenca, 22. IV. 1896, leg. KORB; 1 ♂, Jaen, leg. KRAATZ; 1 ♂, Hispania, Sz, Coll. v. SEIDLITZ: Paratypen.  
DEI: ♂ Holotypus, Palencia, leg. PAGANETTI, Coll. LEONHARD.

**dryocoetes** ROTTENBERG, 1870 (*Malthinus*)  
(Berl. Ent. Ztschr. 14, 242–243)

Mehrere Syntypen, Sicilien, Catania.  
DEI: 5 Syntypen, Catania, leg. v. ROTTENBERG.

**ensifer** KIESENWETTER, 1871 (*Malthodes*)  
(l.c. 15, 80)

Mehrere Syntypen, Sardinia, leg. RAYMOND.  
DEI: 3 ♂♂, Syntypen, Sardinia, Coll. STIERLIN.

**eurynota** BOURGEOIS, 1900 (*Cantharis*)  
(In: BODEMEYER, E. V.: Quer durch Kleinasiens in den Bulghar Dagh, 153)

Mehrere Syntypen, Biledjik, Bos-Dagh.  
DEI: 2 Syntypen, Asia minor, Biledjik, Bos-Dagh, leg. v. BODEMEYER, Coll. LEONHARD (1 Ex. ohne Caput).

**fibulatus** KIESENWETTER, 1852 (*Malthodes*)  
(Linn. Ent. 7, 300–302)

Mehrere Syntypen, Leipzig, leg. SACHSE und v. KIESENWETTER.  
DEI: 1 Syntypus, Leipzig, Coll. STIERLIN.

**flavonotaticeps** PIC, 1937 (*Athemus*)  
(Ent. Bl. 33, 63–64)

Holotypus, Formosa, Chosokei, leg. SAUTER, im DEI [1914].

**forticornis** HEYDEN, 1885 (*Cantharis*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 287)

Holotypus, Turkestan, Namagan, leg. STAUDINGER; im DEI [1885].

**ganglbaueri** WITTMER, 1974 (*Malthinus*)  
(Ent. Arb. Mus. FREY 25, 419, Abb. 96)

Holotypus, 9 Paratypen, Griechenland, Athos, leg. SCHATZMAYR, im Museum Wien, Museum Basel und DEI.  
DEI: 1 ♂, 3 Ex., Paratypen, Macedonia, Athos, leg. SCHATZMAYR, Coll. LEONHARD.

**geniculatus** KIRSENWETTER, 1859 (*Malthinus*)  
(Berl. Ent. Ztschr. 3, 27–28)

Mehrere Syntypen, Griechenland, Zante, IV., leg. v. KIESENWETTER.  
DEI: 2 Syntypen, Zante, Coll. STIERLIN.

**genistae** KIRSENWETTER, 1865 (*Cantharis*)  
(Berl. Ent. Ztschr. 9, 392–393)

Mehrere Syntypen, Spanien, Castilisches Gebirge, in *Genista*, Guadarrama, leg. v. KIESENWETTER und SEIDLITZ.  
DEI: 1 Syntypus, Guadarhama, Coll. STIERLIN.

Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Guadarrama“ steht auf dem Etikett „Guadarhama“.

**germaini** PIC, 1927 (*Chauliognathus*)  
(Ent. Mitt. 16, 252)

Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI und in Coll. PIC.  
DEI: 1 Syntypus, Bolivien, leg. GERMAIN.

**germaini** PIC, 1927 (*Maronius*)  
(l.c., 253)

Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI und in Coll. PIC.  
DEI: 1 Syntypus, Bolivien, leg. GERMAIN.

**germaini** PIC, 1911 (*Plectronotum*)  
(Echange 27, 179–180)

Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI.  
DEI: 4 Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, Coll. KRAATZ.

**germaini** PIC, 1927 (*Polemius*)  
(Ent. Mitt. 16, 251)

Mehrere Syntypen, Bolivien, Jungas, leg. GERMAIN, im DEI und in Coll. PIC.  
DEI: 12 Ex. Bolivien, 1 Ex. dto., Yungas (nicht Jungas!), Coll. KRAATZ; leg. GERMAIN, Syntypen.

**hellenica** HEYDEN, 1883 (*Cantharis*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr. 27, 310)

Holotypus, Griechenland, bei Veluchi, leg. KRÜPER, Coll. v. HEYDEN, im DEI.

**horni** PIC, 1927 (*Discodon*)  
(Ent. Mitt. 16, 251)

Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI und in Coll. PIC.  
DEI: 3 Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN.

**iliacus** MARSEUL, 1864 (*Telephorus*)  
(L'Abéille 1, 41)

Mehrere Syntypen, Klein-Asien.  
DEI: 1 Ex. Asia minor, Sultan Dagh, 1 Ex. Goeck-Dagh; leg. v. BODEMEYER, Coll. LEONHARD, Syntypen.

**klapperichi** WITTMER, 1952 (*Malthinus*)  
(Ent. Bl. 47 (1951), 101)

Holotypus, China-Fukien, Kuatun, 2300 m, IV. 1938, leg. KLAPPERICH, 2 Ex. dto., 1 Ex. Tschung-sen, im Museum A. KOENIG, Bonn und in Coll. KLAPPERICH: Paratypen.  
DEI: 1 Paratypus, China, Fukien, Kuatun, 2300 m, 10. IV. 1938, leg. KLAPPERICH.

**korbi** PIC, 1912 (*Cantharis*)  
(Echange 28, 82)

Mehrere Syntypen, Sibirien.  
DEI: 1 Syntypus, Sibiria orient., Sorka-Gora, leg. v. BODEMEYER, Coll. LEONHARD.

**kraatzii** PIC, 1927 (*Discodon*)  
(Ent. Mitt. 16, 251)

Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI und in Coll. PIC.  
DEI: 1 Syntypus, Bolivien, leg. GERMAIN.

**kuatunensis** WITTMER, 1952 (*Malthodes*)  
(Ent. Bl. 47 (1951), 102, Fig. 5, 5a)

Holotypus, mehrere Paratypen, China-Fukien, Kuatun, 2300 m, IV./VI. 1938, leg. KLAPPERICH, im Museum A. KOENIG, Bonn und in Coll. KLAPPERICH.  
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

**luteolimbatus** PIC, 1902 (*Cantharis*)  
(Echange 18, 47)

Mehrere Syntypen, Sibiria, Amour, Coll. PIC.  
DEI: 1 Syntypus, Sibiria orient., Sorka-Gora, leg. v. BODEMEYER, Coll. LEONHARD.

**mackenziei** MCKEEY-FENDER, 1950 (*Cantharis*)  
(Pan-Pacific Ent. 26, 69–70, Fig. 4)

♂ Holotypus, 1 ♀, L. Arrowhead, California, 3. VII. 1941, leg. MACKENZIE (Calif. Acad. Sci.); 34 Ex. dto., 3.–5. VII. 1941/11. VII. 1942/23. VII. 1944/2.–6. VII. 1945; 9 Ex. Forest Home, San Bernardino Co., 14. VI. 1928, 3 Ex. 15. VI. 1928, 1 Ex. 10. VI. 1926; 1 Ex. Tahquitz Cr., Riverside Co., 30. VI. 1928, 5 Ex. Idyllwild, 3. VII. 1928/21. VI. 1940; leg. VAN DYKE; 1 Ex. San Jacinto Mts., 1932, leg. WINTERS; 1 Ex. Santa Rosa Mts., San Jacinto Mts., 31. V. 1940, *Quercus*, leg. RINDGE, 1 Ex. 15. VI. 1946, leg. D. J. und J. N. KNULL; Paratypen.  
DEI: 1 Paratypus, Calif., L. Arrowhead, 7. IV. 1945, leg. MACKENZIE.

**manubriatus** KIESENWETTER, 1863 (*Malthodes*)  
(Berl. Ent. Ztschr. 7, 430, Taf. 5, Fig. 8)

Mehrere Syntypen, bei Ascoli in Mittelitalien, leg. PIRAZZOLI.  
DEI: 2 Syntypen, Mittelitalien.

**m-signatus** PIC, 1919 (*Tripherus*)  
(Echange 35, 24)

Mehrere Syntypen, Formosa.  
DEI: 4 Syntypen, Formosa, Hokuto, Taihorin, 1911/III. 1912, leg. SAUTER.

**nuristanus** HICKER, 1937 (*Themus*)  
(Arb. morph. taxon. Ent. 4, 180–181)

Holotypus, Afghanistan, Nuristan, Schlucht oberhalb Schuker, im Schuk-Tal, ca. 2600 m, 24. VI. 1935, Hindukusch-Exped., SCHEIBE; im DEI.  
Syn. zu *subannulicornis* PIC, 1915.

**paganettii** FLACH, 1907 (*Thelephorus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 16)

Mehrere Syntypen, Calabria, Antonimina, leg. HUMMLER, ex Coll. PAGANETTI-HUMMLER.  
DEI: 4 Syntypen, Calabria, Antonimina, 1905, Coll. PAGANETTI — Coll. F. MÜLLER.

**paulinoi** KIESENWETTER, 1870 (*Cantharis*)  
(Berl. Ent. Ztschr. 14, Beihft, 125)

♂ Holotypus, Portugal, bei Coimbra, leg. PAULINO D' OLIVEIRA, in Coll. v. HEYDEN; im DEI.

**piceovittatum** PIC, 1927 (*Discodon*)  
(Ent. Mitt. 16, 251–252)

Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI und in Coll. PIC.  
DEI: 1 Syntypus, Bolivien, leg. GERMAIN.

**pictipennis** PIC, 1903 (*Malthodes*)  
 (Echange 19, 156)

Mehrere Syntypen; Umgebung Algier, Provinz Constantine, leg. DESBROCHERS und PIC; Tafaria, leg. THÉRY; Tunisie, leg. PIC.

DEI: 4 Syntypen, Tunis, Oasis Gafsa, durch v. BODEMEYER, Coll. LEONHARD.

**plagiata** HEYDEN, 1889 (*Cantharis*)  
 (Horae Soc. Ent. Ross. 23, 675)

Syntypen: 3 Ex. Kan-ssu, 2., 17., 18. VI. 1885, leg. POTANIN, 1 Ex. Korea, leg. HERZ.

DEI: Syntypen: 1 Ex. Kan-ssu, 1885, leg. POTANIN, 1 Ex. Korea, leg. HERZ-SIEVERS, Nr. 204.

**pubicollis** HEYDEN, 1889 (*Cantharis*)  
 (l.c., 674–675)

2 Syntypen, Kan-ssu, 18. VI. 1885, leg. POTANIN.

DEI: 1 Syntypus, Kan-ssu, 1885, leg. POTANIN, Coll. v. HEYDEN.

**pumilio** HEYDEN, 1885 (*Cantharis*)  
 (Dtsch. Ent. Ztschr. 29, 288)

Holotypus, Turkestan, Namagan, leg. STAUDINGER; im DEI [1885].

**reductelineatus** PIC, 1922 (*Malthinus*)  
 (Mél. Exot. Ent. 36, 30)

Mehrere Syntypen, Formosa.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Hokuto, III. 1912, leg. SAUTER.

**reductum** PIC, 1927 (*Discodon*)  
 (Ent. Mitt. 16, 251)

Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI und in Coll. PIC.

DEI: 9 Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN.

**reinii** HEYDEN, 1879 (*Podabrus*)  
 (Dtsch. Ent. Ztschr. 23, 351–352)

♀ Holotypus, Japan, Prov. Mino, 1874–1875, leg. REIN; im DEI, Coll. v. HEYDEN.

Syn. zu *heydeni* KIESENWETTER, 1879.

**rufescens** LETZNER, 1847 (*Cantharis*)  
 (Übers. Arb. Veränder. schles. Ges. (1846), 76)

Holotypus, Schlesien, im Gesenke, 1842, leg. LETZNER; im DEI, Coll. LETZNER.

Syn. zu *translucida* KRYNICKI, 1832.

**rufostestacea** LETZNER, 1845 (*Cantharis*)  
 (l.c. (1844), 72)

2 Ex. Schlesien, Gesenke, in den Hundstagen, 3. Ex. dto., 1844, leg. LETZNER: Syntypen.

DEI: 2 Syntypen, ohne Fundort, Coll. KRAATZ.

**sauteri** PIC, 1912 (*Cantharis*)  
 (Echange 28, 46)

Holotypus, Formosa, Taihorinsho, leg. SAUTER, Coll. KRAATZ; im DEI [X. 1909].

**sauteri** PIC, 1926 (*Cantharis*)  
 (Ent. Mitt. 15, 68–69)

Holotypus, Formosa, leg. SAUTER, im DEI. [Taihorinsho, 7. IX].

**sauteri** PIC, 1911 (*Drilosilis*)  
 (Dtsch. Ent. Nat. Bibl. 2, 188)

Mehrere Syntypen, Formosa, Kosempo, Taihorinsho, leg. SAUTER, im DEI und in Coll. PIC.

DEI: 2 Syntypen, Formosa, Kosempo, Taihorinsho, IX. 1887–1909, leg. SAUTER.

**sauteri** PIC, 1937 (*Ichthyurus*)  
 (Ent. Bl. 33, 65; nom. praeocc. = *pici* DELKESKAMP, 1939, Cat. Col. 165, 210)

Holotypus, mehrere Paratypen, Formosa, Maruyama, leg. SAUTER, im DEI und in Coll. PIC.

DEI: Holotypus, 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, IV. 1914.

**saxicola** KRAUSS, 1894 (*Absidia*)  
 (Wien. Ent. Ztg. 13, 181–182)

Mehrere ♂♂, Syntypen, Santhaler-Alpen, Steiner-Sattel, leg. PENECKE.

DEI: 2 Syntypen, Santhaler-Alpen, 12. VII. 1893.

Syn. zu *birnbacheri* KRAUSS, 1894.

**similis** WITTMER, 1952 (*Podabrus*)  
 (Ent. Bl. 47 (1951), 97–98)

Holotypus, 2 Paratypen, China-Fukien, Kuatun, 2300 m, 29. IV.–29. V. 1938, leg. KLAPPERICH, im Museum A. KOENIG, Bonn und in Coll. KLAPPERICH.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, 20. V. 1938.

**simplicicolle** PIC, 1911 (*Pletonotum*)  
 (Echange 27, 180)

Holotypus, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI [Coll. KRAATZ].

**subacuminatus** PIC, 1936 (*Chauliognathus*)  
 (Ent. Anz. 16, 2)

Mehrere Syntypen, Paraguay, Brésil, Coll. HICKER — Coll. PIC.

DEI: 4 Syntypen, Brasilia, Rio Gr do Sul, Coll. HICKER.

**subdilaticornis** PIC, 1927 (*Polemius*)  
(Ent. Mitt. 16, 250)

Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI und in Coll. PIC.  
DEI: 1 Syntypus, Bolivien, leg. GERMAIN.

**sudetica** LETZNER, 1847 (*Cantharis*)  
(Übers. Arb. Veränder. schles. Ges. (1846), 75–76)

2 Syntypen, Schlesien, an der Südostlehne des schwarzen Berges, ca. 2600' über dem Meere, 4. VI. 1846, leg. LETZNER.  
DEI: 6 Syntypen, Schlesien, leg. LETZNER; 4 Ex. mit dem gleichen Fundort sind in der Beschreibung nicht genannt, aber als Typen ausgezeichnet.

**taurigrada** BOURGEOIS, 1900 (*Metacantharis*)  
(In: BODEMEYER, E. v.: Quer durch Kleinasiyen in den Bulghar Dagh, 154)

Mehrere Syntypen, Burna.  
DEI: 1 ♂, Syntypus, Asia minor, Burna, leg. v. BODEMEYER.

**testacea** PIC, 1910 (*Silis*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 54, 414)

Mehrere Syntypen, Sumatra, Djampang, Coll. PIC.  
DEI: 1 Syntypus, Djampang.

**testaceiceps** PIC, 1927 (*Maronius*)  
(Ent. Mitt. 16, 258; nom. praeocc. = *kraatzi* PIC, 1938, Echange 54, 158)

Holotypus, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI.

**testaceoprolongatus** PIC, 1937 (*Malthodes*)  
(Ent. Bl. 33, 64–65)

Holotypus, occ. Java, Tjibodas, im DEI [400 m, 1923, FULMEK 32].

**tetraglyphus** HICKER, 1953 (*Malthodes*)  
(Stud. tentini 30, 130, Fig.)

Mehrere Ex.; Adamello-Gebiet, am Piz Arera, 1500 m, leg. NISSL; 30 Ex. am Passo di Croce Domini, Brescianer Vorbergen, ca. 1900 m, leg. MANDL; mehrere Ex. am Monte Arere und Oltre il colle, leg. STOLZ; ♂ Holotypus, Paratypen, in Coll. HICKER und Coll. MANDL.  
DEI: 1 ♂, 1 ♀, Paratypen, Lombardei, Adamello-Gebiet, 28. VI.–6. VII. 1952, Passo di Croce Domini, ca. 1900 m, leg. MANDL.

**triangulifer** PIC, 1931 (*Polemius*)  
(Ann. Soc. Ent. Fr. 100, 86)

Holotypus, Bolivia, Coll. KRAATZ [Yungas].

**trinotaticollis** PIC, 1937 (*Silis*)  
(Ent. Bl. 33, 62)

Holotypus, Guatemala, leg. CONRADT, im DEI [Coll. KRAATZ].

**vaucheri** PIC, 1901 (*Malthinus*)  
(Bull. Soc. Ent. Fr., 111)

Mehrere Syntypen, Marokko, Tanger.

DEI: 2 Syntypen, Maroc., Coll. STIERLIN.

### Wahrscheinlich nicht beschriebene Arten

**banghaasi** PIC (*Chauliognathus*)

DEI: 1 Type, Espirito Santo, STAUDINGER & BANG-HAAS, dedic.

**blanchardi** BOURGEOIS (*Psilorrhynchus*)

DEI: 1 Type, Peru, Callanga, Coll. KRAATZ.

**heterocerus** BOURGEOIS (*Discodon*)

DEI: 2 Typen, Bolivien, Peru, Pachitea; Coll. KRAATZ.

**heteronota** BOURGEOIS (*Cantharis*)

DEI: 1 Type, Bolivien, Coll. KRAATZ.

**toxophorus** GANGLBAUER (*Malthodes*)

DEI: 2 Typen, Venedig, Veneto, Grazepa, 30. VI. 1929, leg. FIORI, Coll. STIERLIN.

**trinacrius** GANGLBAUER (*Malthodes*)

DEI: 5 Typen, Palermo, leg. HOLDHAUS, Nr. 5856.

### Phengodidae

**atricolor** PIC, 1937 (*Phengodes*)

(Ent. Bl. 33, 58; als var. von *fusca* GORHAM beschrieben)

Holotypus, Costa Rica, Turrialba, leg. SCHILD, im DEI [III., 900 m, HEYNE].  
Von WITTMER 1976 als Art erhoben, in Ent. Arb. Mus. FREY 27, 423.

## Drilidae

*fischeri* PIC, 1937 (*Phrixothrix*)  
(Ent. Bl. 33, 58–59)

Holotypus, Brésil, Rio de Janeiro, leg. FISCHER, im DEI [27. XI. 1918].

*opacus* PIC, 1937 (*Phrixothrix*)  
(l.c., 58)

Holotypus, Peru, Callanga, im DEI [Coll. KRAATZ].

*subspinosus* PIC, 1910 (*Laemoglyptus*)  
(Naturaliste 32, 259)

Mehrere Syntypen, Formosa, Coll. PIC.

DEI: 1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Formosa, Taihorinsho, X. 1909/22. VIII., leg. SAUTER:

*testaceonotatus* PIC, 1937 (*Monocladius*)  
(Ent. Bl. 33, 59)

Holotypus, Indes or., im DEI [Coll. KRAATZ].

## Malachiidae

*akbesianus* PIC, 1898 (*Malachius*)  
(Misc. Ent. 6, 138)

Mehrere Syntypen, Hte Syrie, Akbes, Coll. DELAGRANGE.  
DEI: 1 Syntypus, Akbes, Coll. KRAATZ.

*apicalis* PIC, 1912 (*Sphinginopalpus*)  
(Col. Rundsch., 53)

Holotypus, Rhodesia, leg. BODONG, im DEI.

*artvinensis* WITTMER, 1974 (*Malachius*)  
(Fragmenta Ent. 10, 15–16, Abb. 18)

Holotypus, mehrere Paratypen, Türkei, Anatolien, Prov. Artvin, Şavşat (Shavshat), 3.–11. VI. 1972, leg. HOLZSCHUH,  
im Museum Basel und in Coll. HOLZSCHUH.  
DEI: 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

*banghaasi* PERRIN, 1900 (*Malachius*)  
(Bull. Acad. Mars., 16; Separat)

Mehrere Syntypen, Turkestan, Buchara, ex STAUDINGER.  
DEI: 6 Ex. Ost-Buchara, Tschitschantan, 1898, leg. HAUSER, Coll. LEONHARD; 1 Ex. Buchara, Coll. KRAATZ: Syntypen.

*bipicialis* PIC, 1937 (*Attalus*)  
(Ent. Bl. 33, 60)

♀ Holotypus, Afrique occ., Kamerun, leg. CONRADT, im DEI [Coll. KRAATZ].

*bispinus* WITTMER, 1935 (*Cephaloncus*)  
(Eos 11, 181–182)

Mehrere Syntypen, Sinai, Wadi Feran, 4. III. 1935, Wadi Hebran, 6. III. 1935, Exped. von TORRE und TASSO.  
DEI: 2 Syntypen, Sinai, Wadi Feran, 4. III. 1935, durch WITTMER, Coll. Museo ent., „PIETRO ROSSI“ Duino.

*brevelineatus* PIC, 1937 (*Philhedonus*)  
(Ent. Bl. 33, 60)

♀ Holotypus, Afrique, Usambara, im DEI [Coll. KRAATZ].

*brevicornis* KRAATZ, 1862 (*Malachius*)  
(Berl. Ent. Ztschr. 6, 270)

♂ Holotypus, Andalusien, leg. STAUDINGER; im DEI [Coll. KRAATZ].

*bucharicus* PIC, 1907 (*Attalus*)  
(Echange 23, No. 265, 97–98)

Mehrere Syntypen, Buchara, Repetek, in Coll. HAUSER und Coll. PIC.  
DEI: 2 Syntypen, Buchara, Repetek, IV. 1900, Coll. HAUSER-Coll. LEONHARD.

*caeruleicolor* PIC, 1927 (*Attalus*)  
(Ent. Mitt. 16, 255)

Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, in Coll. PIC und im DEI.  
DEI: 4 Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN.

*coeruleus* KRAATZ, 1895 (*Hadrocnemus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 60–61)

Mehrere Syntypen, (Togo) Bismarckburg, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.  
DEI: 7 Syntypen, Togo, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

Syn. zu *azureus* ERICHSON, 1840.

*conradti* PIC, 1937 (*Ebaeus*)  
(Ent. Bl. 33, 61)

♂ Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI [Coll. KRAATZ].

Syn. zu *malachioides* FAIRMAIRE, 1887.

**conradii** KRAATZ, 1895 (*Hadrocnemus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 60)

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, (Togo) Bismarckburg, leg. CONRADT, in Coll. KRAATZ; im DEI.

**corniculatus** KRAATZ, 1864 (*Anthodytes*)  
(Berl. Ent. Ztschr. 8, 308—309, Taf. 5, Fig. 1)

♂ Holotypus, Graecia; im DEI, Coll. KRAATZ.

**crassicornis** WITTMER, 1975 (*Charopus*)  
(Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 48, 266—267, Fig. 9)

Holotypus, mehrere Paratypen, Türkei, Anatolien, 30 km östlich von Bingöl, 1200 m, 20. VI. 1972, leg. HOLZSCHUH, im Museum Basel und in Coll. HOLZSCHUH.  
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

**diversicollis** CHOBAUT, 1898 (*Attalus*)  
(Rev. Ent. Caen 17, 77—78)

15 ♂♂, 18 ♀♀, Syntypen, Algerien, Ghardaïa, Plateau Chebka, leg. BAYONNE.  
DEI: 2 Syntypen, Ghardaïa, V. 1897, durch CHOBAUT, Coll. KRAATZ.

**drakei** PIC, 1937 (*Attalus*)  
(Ent. Bl. 33, 61)

Holotypus, Paraguay, leg. DRAKE, im DEI [188..., Coll. KRAATZ].

**dux** ABEILLE, 1890 (*Anthocomus*)  
(Rev. Ent. 9, 44—45)

Mehrere Syntypen, Afghanistan, Kischlak, via v. HEYDEN an A.B. EILLE.  
DEI: 5 Syntypen, Afghanistan, Kischlak, durch DIECK, Coll. v. HEYDEN.

**flavonotatus** PIC, 1937 (*Attalus*)  
(Ent. Bl. 33, 60—61)

♀ Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI [Coll. KRAATZ].

**graecus** KRAATZ, 1862 (*Malachius*)  
(Berl. Ent. Ztschr. 6, 122)

Mehrere Syntypen, Griechenland, leg. KRÜPER.  
DEI: 3 Syntypen, Graecia, leg. KRÜPER, Coll. KRAATZ.

**heydeni** ABEILLE, 1887 (*Attalus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr. 31, 447—448)

2 ♀♀, Syntypen, Marocco, Mogador, 1872, leg. FRITSCH und REIN, via v. HEYDEN an ABEILLE.  
DEI: 1 ♀, Syntypus, Amsmid bis Mogador, 14.—20. VI. 1872, leg. FRITSCH und REIN, Coll. v. HEYDEN.

**horni** PIC, 1937 (*Carphurus*)  
(Ent. Bl. 33, 62)

Holotypus, Ceylon, Kandy, leg. HORN, im DEI [Nr. 7, 1899].

**kraatzi** PIC, 1927 (*Dromanthus*)  
(Ent. Mitt. 16, 254—255)

Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, in Coll. PIC und im DEI.  
DEI: 4 Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN.

**lateapicalis** PIC, 1937 (*Pseudocolotes*)  
(Ent. Bl. 33, 62)

Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI [Coll. KRAATZ].

**latefasciatus** PIC, 1919 (*Laius*)  
(Mél. Exot. Ent. 30, 12)

Mehrere Syntypen, Formosa.  
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Anping, VIII. 1911, leg. SAUTER.

**lineaticollis** PIC, 1917 (*Malachius*)  
(l.c. 26, 6)

Mehrere Syntypen, Formosa.  
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Hokuto, III. 1912, leg. SAUTER.

**quadripustulatus** KRAATZ, 1895 (*Hadrocnemus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 272)

♂ Holotypus, Niger-Benue, Coll. KRAATZ, im DEI.  
(Auf dem handschriftlichen Determinationszettel von KRAATZ steht *quadrimaculatus*!).  
Syn. zu *nobilis* ERICHSON, 1843.

**ragusae** SCHAUFUSS, 1870 (*Axinotarsus*)  
(Nunq. otios. 1, 157—158)

Mehrere Syntypen, Palermo, leg. RAGUSA, via METZNER an SCHAUFUSS.  
DEI: 1 Syntypus, Palermo.

**rufaoapicalis** PIC, 1917 (*Attalus*)  
(Mél. Exot. Ent. 26, 6)

Mehrere Syntypen, Formosa.  
DEI: 3 Syntypen, Formosa, Hokuto, III. 1912, leg. SAUTER.

**schenklingi** PIC, 1927 (*Attalus*)  
(Ent. Mitt. 16, 255)

Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI und in Coll. PIC.  
DEI: 1 Syntypus, Bolivien, leg. GERMAIN.

**servifer** PIC, 1911 (*Malachius*)  
(Echange 27, No. 314, 107, Note 2)

Mehrere Syntypen, Persien, Luristan, via v. BODEMEYER an PIC, in Coll. PIC.  
DEI: 1 Syntypus, Persien, Luristan, durch v. BODEMEYER.

**spectabilis** KRAATZ, 1895 (*Hadrocnemus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 271; nom. praeocc. = *constrictipes* CHAMPION, 1920, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) 6, 192)

Mehrere Syntypen, Niger-Benue, ex Coll. RICHTER.  
DEI: 3 Syntypen, Niger-Benue, Exp., Coll. KRAATZ.

**srnkae** KRAATZ, 1895 (*Hadrocnemus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 60)

♂ Holotypus, Africa orient., Mombasa, leg. CONRADT, via SRNKA an KRAATZ; im DEI.

**sublunulatus** PIC, 1937 (*Laius*)  
(Ent. Bl. 33, 59)

Mehrere Syntypen, Australie, Queensland, im DEI.  
DEI: 10 Syntypen, Queensland, Coll. HACKER.

**tenellus** KRAATZ, 1862 (*Malachius*)  
(Berl. Ent. Ztschr. 6, 123)

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Griechenland, leg. KRÜPER; im DEI.  
Syn. zu *labiatus* BRULLÉ, 1832.

**tenuicornis** KRAATZ, 1895 (*Hadrocnemus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 62)

♀ Holotypus, Bismarckburg, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ; im DEI [Togo].

**trimaculatus** PIC, 1937 (*Attalus*)  
(Ent. Bl. 33, 61)

Holotypus, Guatemala, im DEI [Nr. 58, Coll. KRAATZ].

**varitarsis** KRAATZ, 1862 (*Anthocomus*)  
(Berl. Ent. Ztschr. 6, 270–271)

Mehrere Syntypen, Italien, leg. KAHR.  
DEI: 1 Syntypus, Italien, leg. KAHR, Coll. KRAATZ.

**viridis** KRAATZ, 1895 (*Hadrocnemus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 62; nom. praeocc. = *fissipes* CHAMPION, 1920, Ann. Mag. Nat. Hist. (9) 6, 258)  
2 ♀♀, Bismarckburg, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ; im DEI [Togo].

### Wahrscheinlich nicht beschriebene Art

**bodemeyeri** REITTER (*Malachius*)

DEI: 2 Typen, Persien, Luristan, durch v. BODEMEYER, Coll. LEONHARD.

### Karumiidae

**holzschuhii** MANDL (1978 ?) (*Paulusiella*)

(soll in Koleopt. Rundsch. 54 veröffentlicht werden)

DEI: 1 Paratypus, Iran, Kashun, 25.–27. V. 1976, leg. HOLZSCHUH/RESSL.

**richteri** MANDL, 1974 (*Paulusiella*)

(Verh. Natur. Ges. Basel 84, 641–642)

♂ Holotypus, Iran, Belutschistan, Iranshar, 800 m, 11.–21. IV. 1954; 15 Ex. dt.; 3 Ex. Iran, Makran, am Kahuran bei Putab, 25. III. 1954; leg. RICHTER und SCHÄUFFELE, Paratypen; im Museum Stuttgart, in Coll. WITTMER und Museum Basel.

DEI: 1 Paratypus, Iran, Belutschistan, Iranshar, 800 m, 11.–21. IV. 1954, leg. RICHTER und SCHÄUFFELE.

### Dasytidae

**abietum** KIESENWETTER, 1859 (*Haploclnemus*)

(Berl. Ent. Ztschr. 3, 171–172)

Mehrere Syntypen, Griechenland, Parnes bei Athen und Gebirge Aetoliens, leg. v. KIESENWETTER.  
DEI: 2 Syntypen, Graecia, Coll. STIERLIN.

**acutus** SCHILSKY, 1895 (*Dasytes*)

(In: KÜSTER, H. C.: Käfer Europas 31, Nr. 9)

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Algier, Bongie, leg. KOBELT, ex Coll. v. HEYDEN.

DEI: 1 ♀, Syntypus, Bougie, 1884, leg. KOBELT, Coll. v. HEYDEN. Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Bongie“, steht auf dem Etikett „Bougie“.

Syn. zu *acutipennis* BAUDI, 1873.

**aplocnemiformis** PIC, 1915 (*Dasytes*)  
(Bull. Soc. Zool. Fr. 40, 97)

Mehrere Syntypen, Indes, Khasia Hills.  
DEI: 3 Ex. Assam, Khasia Hills, 2 Ex. Khasia, 1898; Coll. KRAATZ, Syntypen.

**binotaticollis** PIC, 1927 (*Dasytes*)  
(Ent. Mitt. 16, 254)

Holotypus, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI.

**dasytoides** KRAATZ, 1882 (*Chaetomalachius*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr. 26, 97)

Mehrere Syntypen, Margelan, in Coll. KRAATZ und Coll. v. HEYDEN.  
DEI: 1 Ex. Margelan, 2 Ex. ohne Fundort, Coll. KRAATZ, 1 Ex. Turkestan, Coll. v. HEYDEN: Syntypen.

**emarginatus** SCHILSKY, 1895 (*Dasytes*)  
(In: KÜSTER, H. C.: Käfer Europas 31, Nr. 8)

Mehrere Syntypen, Marokko, Mogador, leg. FRITSCH und REIN, in Coll. v. HEYDEN.  
DEI: 1 Ex. Marokko, durch v. HEYDEN, Nr. 6070, Coll. KOLTZE; 7 Ex. Amsmid bis Mogador, 14. – 20. VI. 1872; 2 Ex. Mogador nach Djebel Hadid; 4 Ex. Untere Reraya Thal und Berg, 10. VI. 1872; leg. FRITSCH und REIN, Coll. v. HEYDEN;  
Syntypen.

**kiesenwetteri** HEYDEN, 1870 (*Danacea*)  
(Span. Reise, 127; ex Berl. Ent. Ztschr., 1870)

Mehrere Syntypen, Andalusien, Ronda, leg. v. HEYDEN.  
DEI: 3 Syntypen, Andalusien, Ronda, 1869, leg. v. HEYDEN, Coll. STIERLIN, Coll. v. HEYDEN.

**raatzii** SCHILSKY, 1894 (*Dasytes*)  
(In: KÜSTER, H. C.: Käfer Europas 30, Nr. 12)

Mehrere Syntypen, Marokko, Setlat, Mogador, V., VI.  
DEI: 1 Syntypus, Marokko, durch v. HEYDEN, Nr. 6062, Coll. KOLTZE.

**limbipennis** KIESENWETTER, 1865 (*Haplocnemus*)  
(Berl. Ent. Ztschr. 9, 383)

Mehrere Syntypen, Spanien, Andalusisches Gebirge, Excursion, Sommer 1865.  
DEI: 2 Syntypen, Spanien, Jaen, Coll. STIERLIN.

**longula** DESBROCHERS, 1889 (*Amauromnia*)  
(Bull. Soc. Ent. Fr. (6) 9, 185)

Mehrere Syntypen, Algerien, Téniet-el-Haad.  
DEI: 2 Syntypen, Téniet-el-Haad, 1889, durch DESBROCHERS, Coll. STIERLIN.

**luctuosa** DESBROCHERS, 1889 (*Danacea*)  
(l.c., 185)

Mehrere Syntypen, Algerien, Téniet-el-Haad.  
DEI: 4 Syntypen, Téniet-el-Haad, durch DESBROCHERS, Nr. 102, Coll. STIERLIN.

**lusitana** HEYDEN, 1870 (*Danacea*)  
(Ent. Reise Span., 127 – 128; ex Berl. Ent. Ztschr., 1870)

2 Syntypen, Portugal, Coimbra, leg. v. HEYDEN; im DEI [1869].

**marginatus** ROTTENBERG, 1870 (*Haplocnemus*)  
(Berl. Ent. Ztschr. 14, 243)

♀ Holotypus, Catania, leg. v. ROTTENBERG; im DEI.  
Syn. zu *rufomarginatus* PERRIS, 1869.

**medius** ROTTENBERG, 1870 (*Dasytiscus*)  
(l.c., 244)

Mehrere Syntypen, Sizilien, bei Syr., leg. v. ROTTENBERG.  
DEI: 3 Syntypen, Syrakus, leg. v. ROTTENBERG.

**nigritus** KIESENWETTER, 1859 (*Dasytes*)  
(l.c. 3, 169)

Mehrere Syntypen, Griechenland.  
DEI: 2 Syntypen, Graecia, Coll. STIERLIN.

**oertzeni** SCHILSKY, 1896 (*Trichocuble*)  
(In: KÜSTER, H. C.: Käfer Europas 32, Nr. 91)

Mehrere Syntypen, Creta, leg. v. OERTZEN.  
DEI: 4 Syntypen, Creta, leg. v. OERTZEN, Coll. LEONHARD.

**opaciceps** PIC, 1927 (*Haplamaurus*)  
(Ent. Mitt. 16, 254)

Holotypus, Bolivien, leg. GERMAIN, im DEI.

**picticollis** HEYDEN, 1899 (*Aphyctus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 328)

2 Syntypen, Turkestan, Taschkent, via HAUSER an v. HEYDEN.  
DEI: 1 ♀, Syntypus, Taschkent, durch HAUSER, Nr. 92.

**pristocerus** KIESENWETTER, 1859 (*Haplocnemus*)  
(Berl. Ent. Ztschr. 3, 170–171)

Mehrere Syntypen, Griechenland.  
DEI: 2 Syntypen, Graecia.

**scheibeii** BLAIR, 1937 (*Eulobonyx*)  
(Arb. morph. taxon. Ent. 4, 181–182)

Holotypus, 41 Paratypen, Afghanistan, Gadu im Ramgul-Tal, 5. VII. 1935, Hindukusch-Expedition, im DEI und Britischen Museum.  
DEI: 3 Holotypus, 24 Paratypen, Afghan, Nuristan, Gadu im Ramgul-Tal, 5. VII. 1935, Expedit. SCHEIBE.

**subdepressus** SCHILSKY, 1895 (*Dasytes*)  
(In: KÜSTER, H. C.: Käfer Europas 31, Nr. 7)

Mehrere Syntypen, Nord-Afrika, Djebel-Aures, im Museum Berlin und in Coll. v. HEYDEN.  
DEI: 3 Syntypen, Djebel-Aures, 1875, durch OBERHÜR, Coll. v. HEYDEN (1 Ex. ohne Abdomen).

**timidus** BAUDI, 1873 (*Dasytes*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr. 17, 318)

Mehrere Syntypen, Cypern, leg. TRUQUI.  
DEI: 1 Syntypus, Cypro, Coll. STIERLIN.

**turkestanicus** KRAATZ, 1882 (*Eulobonyx*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr. 26, 98)

Mehrere Syntypen, Margelan, in Coll. KRAATZ und Coll. v. HEYDEN.  
DEI: 1 Ex. Margelan, 2 Ex. ohne Fundort, Coll. KRAATZ; 3 Ex. Turkestan, durch STAUDINGER-KRAATZ, Coll. v. HEYDEN:  
Syntypen.

**valida** HEYDEN, 1877 (*Danacea*)  
(Verh. Nat. Ver. Brünn 16, 215)

2 Syntypen, Kaukasus, Mikwena am Rien, IV., Katharinengrad, V.; 1874, leg. LEDER.  
DEI: 1 Syntypus, Kaukas., leg. LEDER, Nr. 140.

### Wahrscheinlich nicht beschriebene Arten

**aheneus** SCHAUFUSS, (*Dasytes*)  
DEI: 2 Typen, Callistoga, IV., Coll. SCHAUFUSS.

**australis** SCHAUFUSS (*Dasytes*)  
DEI: 2 Typen, Australien, Coll. SCHAUFUSS.

**paganettii** PIC (*Trichoceble*)  
DEI: 3 Typen, Zelenika, leg. PAGANETTI, Coll. LEONHARD.

**serricornis** KÜSTER (*Dasytes*)  
DEI: 1 Type, Sardinien, Coll. KRAATZ.

**serrimargo** SCHAUFUSS (*Dasytes*)  
DEI: 2 Typen, S. Mateo, VI.

### Melyridae

**amatiae** HEYDEN, 1886 (*Melyris*)  
(Senckenb. Naturf. Gesellsch., 56)

Holotypus, Algier, Prov. Constantine, nahe El Kantara, 1884, leg. KOBELT; Coll. v. HEYDEN, im DEI.  
Syn. zu *ruficrus* FAIRMAIRE, 1882.

**atricolor** PIC, 1927 (*Melyrodes*)  
(Ent. Mitt. 16, 254)

Mehrere Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN, in Coll. PIC und im DEI.  
DEI: 3 Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN.

**banghaasi** PIC, 1902 (*Astylus*)  
(Echange 18, Nr. 210, 34–35)

Mehrere Syntypen, Bolivien, in Coll. PIC.  
DEI: 3 Syntypen, Bolivien, leg. GERMAIN.

**obscuritarsis** PIC, 1912 (*Zygia*)  
(Kol. Rundsch. 1, 53)

Holotypus, Panzani-Fälle, im DEI [Coll. KRAATZ].

**reitteri** HEYDEN, 1890 (*Zygia*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 73)

2 Syntypen, Tripolis, leg. QUEDENFELDT; im DEI.

**rubrolimbata** PIC, 1909 (*Zygia*)

(Echange 25, Nr. 294, 142)

Mehrere Syntypen, Küste von Somalis Berbera, durch ROLLE, Coll. PIC.  
DEI: 2 Syntypen, Abessynien, Dire Dasua, Coll. KRAATZ.

**turkestanicus** HEYDEN, 1886 (*Anthodromius*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr. 30, 186)

Syntypen: 1 Ex. Turkestan, Alai Gebirge, 1 Ex. Namagan, leg. STAUDINGER, in Coll. v. HEYDEN.

DEI: 1 ♂, Turkestan, Alai, Nr. 276, 1 Ex. Namangan, 1885, leg. STAUDINGER; Syntypen.

Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Namagan“ steht auf dem Etikett „Naman-  
gan“.

### Wahrscheinlich nicht beschriebene Art

**apicalis** SCHAUFUSS (*Zygia*)

DEI: 2 Typen, Zambesi, Coll. SCHAUFUSS, HEYNE comm. 1912.

### Cleridae

**abdominalis** KRAATZ, 1899 (*Tenerus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 101)

Holotypus, N. Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT; im DEI [1896, Coll. KRAATZ].

**abruptepunctatus** SCHENKLING, 1932 (*Orthrius*)  
(Mitt. Dtsch. Ent. Ges. 3, 24–25)

2 ♂♂, 2 ♀♀, Holotypus, Paratypen, südl. Provinz China, Yunnan, Gebirge bei Mengtze, in Coll. HAUSER und im DEI.  
DEI: 1 ♂, Paratypen, China, Prov. Yunnan, Gebirge bei Mengtze.

**abyssinicus** GORHAM, 1883 (*Gyponyx*)  
(Ann. Mus. Genova 18, 604–605)

Mehrere Syntypen, Abyssinien, Scioa, Giagaguè, Let-Marefia, Mahal-Uonz, leg. ANTINORI, im Museum Genua.  
DEI: 1 Syntypus, Scioa, Giagaguè, 1881, leg. ANTINORI, Coll. SCHENKLING.

**adustus** KRAATZ, 1899 (*Tenerus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 104)

Mehrere Syntypen, Westafrica, Togo, leg. CONRADT.  
DEI: 2 Syntypen, Togo, Coll. KRAATZ.

**aeneicollis** SCHENKLING, 1907 (*Hydnocera*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 306)

Mehrere Syntypen, Mexico, Guerrero, Chilpancingo, 4000 ft., Amula, 6000 ft., VII.–VIII., leg. SMITH, im Britischen Mu-  
seum, Museum Berlin und DEI.  
DEI: 1 Ex. Mexico, Guerrero; 2 Ex. Guerrero, Amula, 6000 ft., leg. SMITH: Syntypen.

**aestivus** SCHENKLING, 1906 (*Clerus*)  
(l.c., 274)

Holotypus, mehrere Paratypen, Brasilien, im DEI.  
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Brasilien, Coll. KRAATZ.

**albolineata** SCHENKLING, 1906 (*Lemidia*)  
(l.c., 302)

Holotypus, Queensland, Kuranda, leg. DODD, im DEI [XI. 1904].

**amoenus** SCHENKLING, 1906 (*Cleronomus*)  
(l.c., 263, Taf. 2, Fig. 5)

Holotypus, mehrere Paratypen, Magdalenenstrom, im DEI.  
DEI: ♂ Holotypus, Magdalenenfluss, Coll. KRAATZ.  
Syn. zu *viridipennis* SPINOLA, 1844.

**amoenus** KRAATZ, 1899 (*Leptoclerus*)  
(l.c., 83)

Holotypus, Nord-Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT; im DEI.

**andamanensis** SCHENKLING, 1906 (*Orthrius*)  
(l.c., 268)

Holotypus, Andamanen, im DEI [Coll. KRAATZ].  
Syn. zu *binotatus* FISCHER, 1829.

**andresi** SCHENKLING, 1913 (*Phloeocopus*)  
(Bull. Soc. Ent. Egypte 5 (1912), 38–39)

Holotypus, Unter-Aegypten, Dessoures, VII. 1909, leg. ANDRES, im DEI.

**andrewesi** SCHENKLING, 1908 (*Callimerus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 366)

Holotypus, Nilgiri Hills, leg. ANDREWES, im DEI.

**angulata** SCHENKLING, 1900 (*Priocera*)  
(l.c., 387–388)

Holotypus, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. SCHENKLING; im DEI [durch DONCKIER].

**angustefasciatus** PIO, 1947 (*Philocalus*)  
(Diversites ent. 1, 5)

Holotypus, Rhodesia; im DEI [Plumtree, 5. II. 1909, to light].

**angusticollis** SCHENKLING, 1902 (*Orthrius*)  
(Not. Leyd. Mus. 23, 126–127)

4 Syntypen, West-Java, leg. PASTEUR und SJTHOFF, im Museum Leiden.  
DEI: 1 Syntypus, West-Java, Toegoe.

**angustus** SCHENKLING, 1908 (*Gyponyx*)  
(In: SJÖSTEDT, Y.: Ergebn. Schwed. Zool. Exped. Kilimandjaro 7, 7, 73–74, Taf. 2, Fig. 7)

Syntypen, Kilimandjaro, leg. SJÖSTEDT: 3 Ex. Kibonoto, untere Kulturzone, 23., 27., 30. IV. 1906; 2 Ex. dto., Kulturzone, 13. III., 16. IV. 1906.  
DEI: 1 Syntypus, Kilimandjaro, Kibonoto, 1000–1200 m, 23. IV. 1906, leg. SJÖSTEDT.

**annulipes** SCHENKLING, 1906 (*Cephaloclerus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 300)

Holotypus, mehrere Paratypen, Britisch Ostafrika, im DEI.  
DEI: Holotypus, 2 Paratypen, Britisch Ostafrika, leg. STAUDINGER, Coll. KRAATZ.

**antennata** SCHENKLING, 1916 (*Ichnea*)  
(Ent. Mitt. 5, 151–152)

Holotypus, Jatahy, Goyaz, via DONCKIER an SCHENKLING, im DEI [Coll. SCHENKLING].

**apicalis** KRAATZ, 1899 (*Placocerus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 84–85)

Mehrere Ex. Nord-Kamerun, 1 Ex. Togo, leg. CONRADT; Syntypen.  
DEI: 3 Ex. N. Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, 1896, 1 Ex. Togo; leg. CONRADT, Coll. KRAATZ, Syntypen.

**apicornis** SCHENKLING, 1908 (*Phaeocyclotomus*)  
(I.c., 482–483)

Holotypus, Angola, Benguella, an Rinde von *Berlinea* spec., in Gesellschaft von Ameisen, leg. WELLMANN, im DEI [Nr. 57, 27. II. 1906].

**araneipes** CORPORAAL, 1925 (*Clerus*)  
(Ent. Mitt. 14, 394–395)

Holotypus, mehrere Paratypen, Costa Rica, Turrialba und San José, im Museum Amsterdam und DEI.  
DEI: 1 Paratypus, Costa Rica, Turrialba, 1922, durch HEYNE.

**arrowi** SCHENKLING, 1907 (*Clerus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 313)

Mehrere Syntypen, Amazon, leg. BATES, Ega, Peru, im Britischen Museum und DEI.  
DEI: 1 Syntypus, Ega, 1906, ex Britisch. Museum.

**banksi** SCHENKLING, 1913 (*Dasyceroderus*)  
(Phil. Journ. Sci. 8, No. 4, 304)

Holotypus, No. 12364, Palawan, Bacuit, leg. WEBER, in Coll. des Bureau of Science, Manila; Paratypen, dto., im DEI.  
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, ex Bu. of Sci., P. J.

**basalis** SCHENKLING, 1900 (*Axina*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 389)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Jatahy, Minas Geraes, in Coll. FAIRMAIRE, Coll. GRANDJEAN, Coll. KRAATZ und Coll. SCHENKLING.  
DEI: 2 Syntypen, Brasilien, Goyaz, leg. DONCKIER, Coll. SCHENKLING, Coll. KRAATZ.

**basalis** KRAATZ, 1899 (*Phaeocyclotomus*)  
(I.c., 93–94)

Mehrere Ex. SO.-Kamerun, Lolodorf, leg. CONRADT, 1 Ex. Gabun, leg. STAUDINGER; Syntypen.  
DEI: 6 Syntypen, SO.-Kamerun, Lolodorf, 1895, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

**basiventralis** SCHENKLING, 1902 (*Thaleroenemis*)  
(Bull. Mus. Paris 8, 328–329)

Mehrere Syntypen, Nouvelle-Guinée, Dorey, 1878, leg. RAFFRAY und MAINDRON, im Museum Paris.  
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. SCHENKLING.

**bellus** SCHENKLING, 1898 (*Clerus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 365)

Mehrere Syntypen, Bolivia, leg. STAUDINGER.  
DEI: 2 Syntypen, Bolivia, leg. STAUDINGER.

**bennigseni** SCHENKLING, 1912 (*Ommadius*)  
(Ent. Mitt. 1, 308–309)

2 Syntypen, Neuguinea, Sattelberg, Coll. v. BENNIGSEN; im DEI.

**bennigseni** HINTZ, 1907 (*Phloeocopus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 26)

2 Syntypen, Deutsch-Ostafrika, Kionga.  
DEI: 1 Syntypus, Kionga, Coll. v. BENNIGSEN.

**bicarinatus** GORHAM, 1882 (*Clerus*)  
(Biol. Centr.-Amer. 3(2), 152)

Mehrere Syntypen; Nicaragua, Chontales, leg. BELT; Panama. Volcan de Chiriquí, leg. CHAMPION.  
DEI: 1 Syntypus, Bugaba, 800—1500 ft., leg. CHAMPION.

**bicolor** SCHENKLING, 1906 (*Lemidia*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 301)

Holotypus, Australien, im DEI [N. Holl.].

**bifasciatus** KRAATZ, 1900 (*Thanasimus*)  
(I.c., 191)

Holotypus, Ceylon, Dambulla, leg. HORN; im DEI [Coll. KRAATZ].

**bimaculata** KRAATZ, 1899 (*Epiclimes*)  
(I.c., 87—88)

Holotypus, Nord-Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT; im DEI [1896, Coll. KRAATZ].

**bipartitus** SCHENKLING, 1915 (*Clerus*)  
(Ent. Mitt. 4, 314)

Holotypus, Ecuador, Coca, leg. HAENSCH, im DEI [Coll. SCHENKLING].

**bipunctata** SCHENKLING, 1900 (*Isolemidia*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 309)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. KRAATZ und Coll. SCHENKLING.  
DEI: 1 Syntypus, Brasilien, Goyaz, leg. DONCKIER, Coll. SCHENKLING.

**birmanicum** GORHAM, 1892 (*Stigmaticum*)  
(Ann. Mus. Civ. Genova (2) 12, 740)

4 Syntypen, Burma, Carin Hills, Chebà, 900—1100 m, in Coll. FEA.  
DEI: 1 Syntypus, Carin Chebà, 900—1100 m, 5. XII. 1888, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

**blackburni** HINTZ, 1908 (*Phlogistus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 711, 714)

7 Syntypen, Australia, Peak Downs, Victoria, Sidney, in Coll. HINTZ und im DEI.  
DEI: 1 Syntypus, Peak Downs, Museum Godeffroy, Coll. SCHENKLING.

**blackburni** SCHENKLING, 1906 (*Phlogistus*)  
(I.c., 279—280)

Holotypus, Australien, im DEI [N. Holl., Coll. KRAATZ].

**brevis** SCHENKLING, 1908 (*Apteroclerus*)

(In: SJÖSTEDT: Ergebni. Schwed. Zool. Exped. Kilimandjaro 7, 7, 71, Taf. 2, Fig. 4)

4 Syntypen, Kilimandjaro, Kiboscho, 3000—3500 m, 15. II. 1906, leg. SJÖSTEDT.  
DEI: 1 Syntypus (Ex. verliehen, konnte nicht überprüft werden).

**bruchi** SCHENKLING, 1908 (*Hydnocera*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 701)

3 Syntypen, Argentina, Prov. Catamarca und Tucuman, via BRUCH an SCHENKLING, im La Plata Museum und DEI.  
DEI: 1 Syntypus, Argentina, Prov. Catamarca, 4. III. 1907, leg. BRUCH.

**bruchi** SCHENKLING, 1908 (*Pelonium*)  
(I.c., 705)

2 Syntypen, Argentina, Prov. Santiago de Estero, via BRUCH an SCHENKLING, im DEI.  
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, II. 1908, durch BRUCH.

**bruchi** SCHENKLING, 1916 (*Pyticeropsis*)  
(Ent. Mitt. 5, 154)

Holotypus, Argentina, Prov. San Luis, leg. BRUCH, via BRUCH an SCHENKLING, im DEI [XII. 1911].

**brunnea** SCHENKLING, 1906 (*Axina*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 254)

Holotypus, Nordperu, Prov. Tumbes, via DONCKIER an SCHENKLING, im DEI [Grao, durch BAER, Coll. SCHENKLING].

**brunneopunctatus** HINTZ, 1902 (*Gyponyx*)  
(I.c., 398)

2 Syntypen, Capland, Natal, Bedford.

DEI: 1 Syntypus, Capland, Bedford, Coll. SCHENKLING.

**brunniceps** SCHENKLING, 1902 (*Tenerus*)  
(Stett. Ent. Ztg. 63, 374—375)

Syntypen, Sumatra, leg. DOHRN; mehrere Ex. Soekaranda, 3 Ex. Palembang, in Coll. SCHENKLING.  
DEI: 2 Syntypen, Sumatra, Palembang, Coll. KRAATZ.

**caffer** BOHEMAN, 1851 (*Opetiopalpus*)  
(Ins. Cafraria 1, 516)

Mehrere Syntypen, Cafraria, leg. WAHLBERG.

DEI: 1 Syntypus, Cafraria, leg. WAHLBERG.

**carinatum** SCHENKLING, 1908 (*Pelonium*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 704—705)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Goyaz, leg. DONCKIER und leg. BAER, im DEI.  
DEI: 1 Ex. Goyaz, Jatahy, Coll. KRAATZ; 1 Ex. Brésil, Goyaz, Rio verde, Coll. SCHENKLING; Syntypen.

**carinulatus** SCHENKLING, 1908 (*Tillus*)  
(l.c., 364)

Mehrere Syntypen, Mindoro, Brit. Museum, im DEI.  
DEI: 1 Syntypus, Mindoro, Nr. 95–226.

**caucasicus** KRAATZ, 1882 (*Trichodes*)  
(l.c. 26, 320–321)

Mehrere Syntypen, Caucasus, via STAUDINGER an KRAATZ.  
DEI: 1 Ex. Caucasus, Coll. KRAATZ, 1 Ex. Caucasus, durch STAUDINGER, in Coll. v. HEYDEN; Syntypen.  
Syn. zu *armeniacus* BAUDI, 1873.

**caviceps** KRAATZ, 1899 (*Neohydnus*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 43, 216)

Holotypus, Südwest Sumatra, leg. WEYERS; im DEI [Coll. KRAATZ].

**celebensis** SCHENKLING, 1899 (*Phaeocyclotomus*)  
(Ann. Mus. Genova (2) 20, 144–145)

Mehrere Syntypen, Celebes, Kandari, 1874, leg. BECCARI, im Museum Genua.  
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, III., Coll. SCHENKLING.

**centrimaculata** SCHENKLING, 1900 (*Axina*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 388)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Coll. BRANCSIK und Coll. SCHENKLING.  
DEI: 1 Syntypus, Brasilien, Goyaz, durch DONCKIER, Coll. SCHENKLING.  
Syn. zu *bifasciata* CHEVROLAT, 1876.

**centurio** SCHENKLING, 1906 (*Phaeocyclotomus*)  
(l.c., 293)

Holotypus, mehrere Paratypen, Sumatra, Palembang, im DEI.  
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Sumatra, Palembang, Coll. SCHENKLING.

**ceylonicum** KRAATZ, 1900 (*Stigmatium*)  
(l.c., 190–191)

2 Syntypen, Ceylon, bei Weligama, leg. HORN.  
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, 1899, Coll. KRAATZ.

**ceylonicus** KRAATZ, 1900 (*Thanasimus*)  
(l.c., 191–192)

Holotypus, Ceylon, Kanthalay-See, leg. HORN; im DEI [Coll. KRAATZ].

**chinensis** SCHENKLING, 1915 (*Callimerus*)  
(Ent. Mitt. 4, 111–112)

Mehrere Syntypen, Südchina, Kweitschou, Kiangsi, Kanton, im DEI.  
DEI: 3 Ex. China, Kweitschou, 1 Ex. Canton, durch STAUDINGER (PLASON!); Syntypen.

**cicatricosa** LEA, 1907 (*Lemidia*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 51, 334, 344)

Mehrere Syntypen; Tasmania, leg. GRIFFITH, Launceston, George Town, West Tamar, leg. SIMSON, Mount Wellington, Hobart, Frankford, leg. LEA; King Island, leg. KERSHAW und LEA; Victoria, leg. FRENCH; N. S. Wales, Otford, im Macleay Museum.  
DEI: 2 Syntypen, Tasmania, King Island, leg. LEA, Coll. HACKER.

**cinctus** SCHENKLING, 1915 (*Clerus*)  
(Ent. Mitt. 4, 315)

Holotypus, Peru, Vilcanota, im DEI [leg. STAUDINGER, Coll. SCHENKLING].

**cinereum** GORHAM, 1878 (*Stigmatium*)  
(Trans. Ent. Soc. London, 165)

Mehrere Syntypen; New Guinea, Dorey, leg. WALLACE; Andaman Isles; in Coll. FRY und Coll. GORHAM.  
DEI: 1 Syntypus, Dorey, leg. WALLACE, Coll. SCHENKLING.

**circumcineta** SCHENKLING, 1906 (*Lemidia*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 302)

Holotypus, mehrere Paratypen, Queensland, Kuranda, leg. DODD, im DEI.  
DEI: Holotypus, Queensland, Kuranda, leg. DODD; 6 Paratypen, dto., VII., VIII. 1904.

**circumductus** SCHENKLING, 1915 (*Clerus*)  
(Ent. Mitt. 4, 314–315)

Holotypus, Amazonas, im DEI [Coll. KRAATZ].

**coccineus** SCHENKLING, 1906 (*Clerus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 272, Taf. 2, Fig. 7)

Holotypus, mehrere Paratypen, Nord-Mexiko, Tsuque, im DEI.  
DEI: Holotypus, 2 Paratypen, Nord-Mexiko, Tsuque, Coll. KRAATZ.

**conspicua** SCHENKLING, 1900 (*Axina*)  
(l.c., 390)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. GRANDJEAN und Coll. SCHENKLING.  
DEI: 4 Syntypen, Brasilien, Goyaz, durch DONCKIER, Coll. SCHENKLING.

***cribrata*** SCHENKLING, 1916 (*Eleale*)  
(Ent. Mitt. 5, 148—149)

Mehrere Syntypen, N. S.-Wales, im DEI.  
DEI: 1 Ex. Belmore, leg. TAYLOR, Coll. HACKER; 2 Ex. N. Holl., Coll. KRAATZ; 1 Ex. Collect. PLASON; Syntypen.

***cribratus*** SCHENKLING, 1908 (*Callimerus*)  
(Rec. Ind. Mus. 2, 4, 387)

Holotypus, Bengal, Berhampur, Murshidabad District, leg. LLOYD, ex Museum Indian; im DEI [1. I. 1908].

***cribricollis*** SCHENKLING, 1915 (*Cladiscus*)  
(Ent. Mitt. 4, 108)

Holotypus, Tonkin, Sept Pagodes, durch LE MOULT, im DEI.

***criripennis*** SCHENKLING, 1916 (*Tarsostenodes*)  
(l.c. 5, 154—155)

9 Syntypen, Australia, Kuranda, Herberton, im DEI.  
DEI: 4 Ex. Quld., Kuranda, leg. DODD, 1 Ex. dito., leg. HACKER, Coll. HACKER; 2 Ex. Herberton, I., II. 1911, 3700 ft., leg. DODD; Syntypen.

***cruciger*** SCHENKLING, 1906 (*Orthrius*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 269)

Holotypus, mehrere Paratypen, Queensland, Kuranda, leg. DODD, im DEI.  
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

***curticollis*** SCHENKLING, 1906 (*Tenerus*)  
(l.c., 305—306, Taf. 2, Fig. 12)

Holotypus, Nepal, im DEI [leg. WEBER, Coll. KRAATZ].

***cuspidata*** SCHENKLING, 1902 (*Pallenis*)  
(Bull. Mus. Paris 8, 317—318)

Mehrere Syntypen, Madagascar, baie d' Antongil, 1898, leg. MOCQUERYS, im Museum Paris.  
DEI: 2 Syntypen, S. de la baie d' Antongil, Coll. SCHENKLING, Coll. KRAATZ.

***cyanella*** GORHAM, 1878 (*Dolichopsis*)  
(Trans. Ent. Soc. London, 155—156)

Mehrere Syntypen, Prom. Bon. Spei., Coll. GORHAM, im Museum SAUNDERS.  
DEI: 1 Syntypus, Cap. Bon. Spei., Coll. SCHENKLING.

***cyanescens*** KRAATZ, 1899 (*Cephaloclerus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 106)

1 Ex. Togo, leg. CONRADT, 1 Ex. Gabun, leg. WEBER; Syntypen.  
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. KRAATZ.

***cyanipennis*** GORHAM, 1883 (*Hydnocera*)  
(Biol. Centr.-Amer. 3, 2, 175)

Mehrere Syntypen, Guatemala, Calderas, Capetillo, Quiche Mountains, leg. CHAMPION.  
DEI: 2 Syntypen, Guatemala, Calderas, leg. CHAMPION.

***cyanipennis*** PIC, 1948 (*Enoplionomorpha*)  
(Tijdschr. Ent. (1946), 181)

Holotypus, Africa centralis, Bangui, im DEI [Dubangui-Chari-Tchad].

***cylindricollis*** GORHAM, 1886 (*Hydnocera*)  
(Biol. Centr.-Amer. 3, 2 (Suppl.), 343)

Mehrere Syntypen; Nicaragua, Chontales, leg. JANSON; Panama, Bugaba, David, Volcan de Chiriqui below 4000 ft., leg. CHAMPION.

DEI: 1 Ex. Panama, Bugaba, leg. CHAMPION, 1 Ex. Teapa, Tabasco, leg. JAN. H. H. S.; Syntypen.

***dalmatinus*** OBENBERGER, 1916 (*Corynetes*)  
(Neue Beitr. Syst. Insekt. 1, 22)

Mehrere Syntypen, Dalmatien, Krivošija, Coll. OBENBERGER.  
DEI: 1 Syntypus, Crkvica, Krivošije.

***dealbatus*** KRAATZ, 1879 (*Pseudoclerops*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr. 23, 128—129)

Mehrere Syntypen, Amur, leg. CHRISTOPH.  
DEI: 3 Syntypen, Amur, leg. CHRISTOPH, Coll. KRAATZ.

***defletum*** SCHENKLING, 1902 (*Pelonium*)  
(Not. Leyd. Mus. 23, 129—130)

4 Syntypen, N. O. Sumatra, Tandjong Morawa, Serdang, leg. HAGEN, im Museum Leyden:  
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. SCHENKLING.

***difficilis*** SCHENKLING, 1912 (*Opilo*)  
(Ent. Mitt. 1, 324—325)

Holotypus, Formosa, Taihorinsho, IX. 1909, leg. SAUTER; im DEI.

**dimidiata** SCHENKLING, 1915 (*Pallenis*)  
(l.c. 4, 109–110)

Holotypus, Madagascar, Tananarivo, im DEI.

**dimidiatipennis** SCHENKLING, 1899 (*Ommadius*)  
(Ann. Mus. Genova (2) 20, 155–156)

Mehrere Syntypen, Ins. Aru, Wokan, 1873, leg. BECCARI, im Museum Genua.  
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. SCHENKLING.

**dimidiatus** SCHENKLING, 1907 (*Clerus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 304–305)

15 Syntypen, Zentral-Amerika, Guerrero, Chilpancingo, 4600 ft., Amula, 6000 ft., VI.–IX., leg. SMITH, im Britischen  
Museum, Museum Berlin und DEI.  
DEI: 1 Ex. Guerrero, Chilpancingo, 2 Ex. dto., durch HÖGE; 1 Ex. dto., 4600 ft., VI., leg. SMITH; Syntypen.

**dimidiatus** SCHENKLING, 1922 (*Stenocylidrus*)  
(Trans. Linn. Soc. London 18, 1, 326–327, Fig. 2)

5 Syntypen, Seychelles Inseln, Silhouette, Wald nahe Mare bis Cochons, über 1000 ft., Hochwald 1000–2000 ft., VIII. bis  
IX. 1908, PERCY SLADEN TRUST Exped.  
DEI: 1 Syntypus, Silhouette, 1908, Exp. Seychelles.

**discoidalis** SCHENKLING, 1908 (*Diplophorus*)  
(In: SJÖSTEDT, Y.: Ergebn. Schwed. Zool. Exped. Kilimandjaro 7, 7, 70, Taf. 2, Fig. 3)

Mehrere Syntypen, Deutsch-Ostafrika, Kilimandjaro, 1905–1906, leg. SJÖSTEDT.  
DEI: 1 Syntypus, Kilimandjaro, Kibonoto, 1300 m, 1905–1906, leg. SJÖSTEDT.

**distinguendus** SCHENKLING, 1908 (*Opilo*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 477)

Mehrere Syntypen, Nilgiri Hills, Hulikal, 6000 ft., X., leg. ANDREWES, im DEI.  
DEI: 1 Syntypus, Nilgiri Hills.

**diversipes** SCHENKLING, 1916 (*Stigmatium*)  
(Arch. Naturg. 82, A 5, 118)

Holotypus, Formosa, Hoozan, III. 1910, leg. SAUTER; im DEI.

**dorsalis** SCHENKLING, 1902 (*Orthrius*)  
(Bull. Mus. Paris 8, 323–324)

Mehrere Syntypen, Dardjiling, 1890, leg. HARMAND, im Museum Paris.  
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

**drescheri** SCHENKLING, 1915 (*Callimerus*)  
(Ent. Mitt. 4, 111)

Holotypus, Java, Noesa Kembangan, leg. DRESCHER, im DEI [I. 1910].

**duodecimpustulatus** SCHENKLING, 1912 (*Callimerus*)  
(l.c. 1, 323–324)

7 Syntypen, Formosa, Kankau, IV.–V. 1912, Kosempo, V. 1912, Banshoryo, VI. 1912, leg. SAUTER.  
DEI: 6 Ex. Formosa, Kankau, Koshun, IV., V. 1912, 1 Ex. Kosempo, V. 1912, 1 Ex. Kankau, 7. IV. 1912, 1 Ex. Banshoryo  
Distr., Sokutsu, VI. 1912; leg. SAUTER, Syntypen.  
2 als Typen ausgezeichnete Ex. desselben Fundortes werden in der Beschreibung nicht genannt.

**elegans** SCHENKLING, 1907 (*Gyponyx*)  
(Ann. South Afr. Mus. 5, 198)

Mehrere Syntypen, Transvaal, Lydenburg District, im South African Museum.  
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

**elegantulus** SCHENKLING, 1902 (*Clerus*)  
(Bull. Mus. Paris 8, 325)

Mehrere Syntypen, Venezuela, La Victoria, 1896, leg. GEAY, im Museum Paris.  
DEI: 1 Syntypus, Venezuela, La Victoria, IX., 33–96, leg. GEAY, ex Museum Paris, Coll. SCHENKLING.

**eliminata** SCHENKLING, 1900 (*Ichnea*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 400)

Holotypus, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. SCHENKLING; im DEI [leg. DONCKIER].

**elongatus** HINTZ, 1908 (*Phlogistus*)  
(l.c., 710, 713)

Holotypus, N. S. Wales, im DEI [durch STAUDINGER, Coll. SCHENKLING].

**elongatus** SCHENKLING, 1906 (*Thaneroclerus*)  
(l.c., 278)

Holotypus, Yunnan, durch DONCKIER, im DEI.

**equestris** SCHENKLING, 1906 (*Priocera*)

(l.c., 257)

Holotypus, Brasilien, Jatahy, im DEI [Goyaz, Coll. SCHENKLING].

**erinaceus** SCHENKLING, 1908 (*Dasycoelurus*)

(l.c., 481–482)

Mehrere Syntypen, Nilgiri Hills, Ouchterlony Valley, 3500 ft., X.–II., leg. ANDREWES, im DEI.  
DEI: 3 Syntypen, Nilgiri Hills.

*erymanthoides* SCHENKLING, 1906 (*Pelonium*)  
(l.c., 313)

Holotypus, mehrere Paratypen, Brasilien, Jatahy, im DEI.  
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Brasilien, Goyaz, leg. DONCKIER, Coll. SCHENKLING.

*escherichi* KRAATZ, 1894 (*Trichodes*)  
(l.c., 132, Taf. 1, Fig. 12b)

Mehrere Syntypen, Turkestan, Bairam-Ali, leg. HAUSER, im DEI.  
DEI: 1 Syntypus, Transasp., Bairam-Ali, Coll. KRAATZ.  
Syn. zu *rectilinea* REITTER, 1894.

*escherichi* REITTER, 1893 (*Trichodes*)  
(Wien. Ent. Ztg. 12, 303–304)

Mehrere Syntypen, Turkestan, Kulab, leg. STAUDINGER und BANG-HAAS.  
DEI: 1 Syntypus, Turkestan, Mts. Ghissar, 1893, durch HAUSER, Coll. LEONHARD.

*farinosus* SCHENKLING, 1915 (*Callimerus*)  
(Ent. Mitt. 4, 114)

Mehrere Syntypen, Süddindien, Wallardi bei Travancore, im DEI.  
DEI: 1 Ex. Travancore, Wallardi, Coll. LE MOULT; 1 Ex. Wallardi, Coll. RONCHETTI: Syntypen.

*fasciatus* SCHENKLING, 1908 (*Cladiscus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 362–363)

Holotypus, Westl. Himalaya, Kulu, leg. ROST, im DEI [Beasfluss].

*fasciatus* SCHENKLING, 1900 (*Clerus*)  
(l.c., 394–395)

Mehrere Syntypen, Amazonas, Coll. KRAATZ und Coll. SCHENKLING.  
DEI: 3 Ex. Amazon., 1 Ex. Amazon. Strom, Coll. KRAATZ, Coll. SCHENKLING.

*fasciatus* SCHENKLING, 1915 (*Orthrius*)  
(Ent. Mitt. 4, 248)

2 Syntypen, N. S. Wales, im DEI [Coll. HACKER].

*fasciatus* KRAATZ, 1899 (*Phaeocyclotomus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 98–99)

Mehrere Syntypen, Nord-Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT.  
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, 1896, Coll. KRAATZ.

*fasciicollis* SCHENKLING, 1900 (*Clerus*)  
(l.c., 393–394)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Espirito Santo, Coll. SCHENKLING.  
DEI: 1 Syntypus, Espirito Santo, Coll. SCHENKLING.

*fasciicollis* SCHENKLING, 1906 (*Erenus*)  
(l.c., 299–230, Taf. 2, Fig. 11)

Holotypus, Madagaskar, im DEI [Coll. KRAATZ].

*faustus* GORHAM, 1892 (*Callimerus*)  
(Ann. Mus. Genova (2) 12, 724–725)

Mehrere Syntypen, Burma, Carin Hills, Cheba, 900–1100 m, in Coll. FEA.  
DEI: 1 Syntypus, Carin Cheba, 900–1100 m, 5. XII. 1888, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

*faustus* SCHENKLING, 1900 (*Clerus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 395–396)

Mehrere Syntypen, Peru, Callanga, Coll. KRAATZ und Coll. SCHENKLING.  
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, durch STAUDINGER.

*femoralis* SCHENKLING, 1915 (*Callimerus*)  
(Ent. Mitt. 4, 112)

Mehrere Syntypen, Süddindien, Wallardi bei Travancore, im DEI.  
DEI: 2 Syntypen, Wallardi, durch LE MOULT.

*fenestratus* PIC, 1953 (*Opilo*)  
(Beitr. Ent. 3, 321)

Holotypus, Ost-Asien, China, Shan-Hai-Kouan, im DEI.

*flavangulus* KRAATZ, 1899 (*Tenerus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 103)

Holotypus, Togo, leg. CONRADT; im DEI [Coll. KRAATZ].

*flavipennis* KRAATZ, 1899 (*Neohydinus*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 43, 216)

Holotypus, Südwest Sumatra, leg. WEYERS; im DEI [Coll. KRAATZ].

*flavipes* SCHENKLING, 1899 (*Ommadius*)  
(Ann. Mus. Genova (2) 20, 342–343)

Mehrere Syntypen, Ins. Mentawai, Sipora, 1894, leg. MODIGLIANI, im Museum Genoa.  
DEI: 1 Syntypus, Mentawai, Sipora, Sereinu, V.–VI. 1894, leg. MODIGLIANI, Coll. SCHENKLING.

*flavus* CHAPIN, 1919 (*Callimerus*)  
(Proc. Biol. Soc. Washington 32, 233–234)

♂ Holotypus, Luzon, P. J., Mt. Banahao, leg. BAKER, in Coll. BAKER, Nr. 7278; 1 ♀, Paratypus, dto., No. 8290.  
DEI: 1 Paratypus, P. J. Mt. Banahao, leg. BAKER.

*floccosus* SCHENKLING, 1898 (*Opilo*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 363–364)

Mehrere Syntypen, Australia.  
DEI: 1 Syntypus, Austral., leg. HEYNE.

*formosanum* SCHENKLING, 1912 (*Pelonium*)  
(Ent. Mitt. 1, 329–330)

Holotypus, Formosa, Kankau, IV. 1912, leg. SAUTER; im DEI [Koshun].

*formosanus* SCHENKLING, 1912 (*Opilo*)  
(l.c., 324)

3 Syntypen, Formosa, Taihorin, VI. 1911, leg. SAUTER; im DEI.

*formosanus* SCHENKLING, 1912 (*Tenerus*)  
(l.c., 329)

Holotypus, Formosa, Kosempo, VIII. 1911, leg. SAUTER; im DEI.

*fossipenne* SCHENKLING, 1917 (*Pelonium*)  
(l.c. 6, 282–283)

Mehrere Syntypen, Argentinien, Mendoza, via JENSEN-HAARUP an SCHENKLING, in Coll. JENSEN-HAARUP und im DEI.  
DEI: 2 Syntypen, Mendoza, Santa Rosa.

*frater* KRAATZ, 1893 (*Trichodes*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 80)

Mehrere Syntypen, Klein-Asien, leg. v. HAUSER.

DEI: 4 Ex. Asia minor, Coll. KRAATZ, 1 Ex. Asia minor, leg. v. HAUSER, in Coll. v. HEYDEN; Syntypen.

*fraternus* SCHENKLING, 1907 (*Clerus*)  
(l.c., 311–312)

Mehrere Syntypen, Amazon, Ega, leg. BATES, im Britischen Museum und DEI.

DEI: 2 Syntypen, Amazon, leg. BATES, 1905, Nr. 100, Coll. FRY.

*fritzi* PIC, 1947 (*Opetiopalpus*)  
(Divers. ent. 1, 5)

Mehrere Syntypen, Afr. mer.  
DEI: 3 Syntypen, D.S.-Westafrika, durch FRITZ, Swakopmund.

*fulta* KRAATZ, 1899 (*Aphelochroa*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 86–87)

Mehrere Syntypen, Niger-Benoe, ex Coll. RICHTER.  
DEI: 4 Syntypen, Niger-Benoe, Coll. KRAATZ.

*fulvipennis* SCHENKLING, 1898 (*Hydnocera*)  
(l.c., 366–367)

Holotypus, Guatemala; im DEI [leg. HEYNE, Coll. SCHENKLING].

*fulvus* KRAATZ, 1899 (*Paradoxocerus*)  
(l.c., 84)

Holotypus, Nord-Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT [1896, Coll. KRAATZ].

*furcata* GORHAM, 1886 (*Hydnocera*)  
(Biol. Centr.-Amer. Col. 3, 2, Suppl. 342, Taf. 13, Fig. 14)

Ca. 12 Syntypen, Mexico, Northern Sonora, leg. MORRISON, via MORRISON an SCHENKLING.

DEI: 1 Syntypus, Mexico, N. Sonora, leg. MORRISON, Coll. SCHENKLING.

Syn. zu *discoidea* LECONTE, 1852.

*furcatus* SCHAEFFER, 1904 (*Colyphus*)  
(Journ. New York Ent. Soc. 12, 218)

4 Syntypen, Texas, Brownsville, San Tomas, Esperanza Ranch, im Museum Brooklyn Institute of Arts and Sciences.  
DEI: 1 Syntypus, Texas, Brownsville, Esperanza Rch., 30. VII.

*gahani* SCHENKLING, 1907 (*Clerus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 311)

Mehrere Syntypen, Amazon, leg. BATES, im Britischen Museum und DEI.  
DEI: 1 Syntypus, Amazon, leg. BATES, 1905, Nr. 100, Coll. FRY.

*gemellatus* SCHENKLING, 1907 (*Gyponyx*)  
(Ann. South Afr. Mus. 5, 198)

Mehrere Syntypen, Cape Colony, Ookiep, im South African Museum.  
DEI: 1 Syntypus, Ookiep, 1880.

*geminum* SCHENKLING, 1900 (*Pelonium*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 409)

Mehrere Syntypen, Peru, Callanga, Coll. SCHENKLING.  
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

**gestroi** SCHENKLING, 1899 (*Xestonotus*)  
(Ann. Mus. Genova (2) 20, 142—143)

Mehrere Syntypen, Brit. Neu Guinea; Mt. Astrolabe; Ighibirei, 1890 u. 1893, leg. LORIA; Fly River, 1876—77, leg. D'ALBERTIS.  
DEI: 1 Syntypus, Neu Guinea, Fly River, 1876—77, leg. D'ALBERTIS.

**glaber** SCHENKLING, 1922 (*Stenoxytidrus*)  
(Trans. Linn. Soc. London 18, 1, 327—328, Fig. 3)

6 Syntypen, Seychelles Inseln, Mahé, Gegend oberhalb Port Glaud, ca. 500—1000 ft., XI. 1908; nahe Morne Blanc, ca. 1000 ft., PERCY SLADEN TRUST Exped.  
DEI: 1 Syntypus, Mahé, 1908—1909; 1921, Exp. Seychelles, Mus. Cambridge (SCOTT).

**gorhami** WOLCOTT, 1910 (*Hydnocera*)  
(Publ. Field. Mus. Chicago 7, 378, Taf. 5, Fig. 8)

Holotypus, Mexico, Cuernavaca, Morelos, in Coll. WICKHAM, 5 Paratypen, dto., in Coll. WOLCOTT.  
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, ex Coll. WOLCOTT.

**gorhami** SCHENKLING, 1898 (*Lemidia*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 174—175)

Mehrere Syntypen, Australia.  
DEI: 2 Syntypen, N. Holl., Coll. SCHENKLING und Coll. KRAATZ.

**gorhami** SCHENKLING, 1906 (*Tenerus*)  
(l.c., 306)

Holotypus, Morty, leg. WALLACE, im DEI [Coll. SCHENKLING].

**gracilis** SCHENKLING, 1898 (*Lemidia*)  
(l.c., 178)

Holotypus, Tasmania; im DEI [Emu Bay, Coll. SCHENKLING].

**gracilis** SCHENKLING, 1906 (*Priocera*)  
(l.c., 257)

Holotypus, Brasilien, Jatahy, im DEI [Goyaz, Coll. SCHENKLING].

**grandis** SCHENKLING, 1902 (*Strotocera*)  
(Not. Leyd. Mus. 23, 124—125)

Syntypen: 1 Ex. Java, Mons Tjikorai, 1892, leg. FRUHSTORFER, 2 Ex. Borneo, leg. SIJTHOFF; im Museum Leiden; 1 Ex. Südost-Borneo, Tandjong, 1894, leg. SUCK, im Museum Hamburg; 1 Ex. Holländisch-Borneo, Pontianak, via DONCKIER an SCHENKLING, in Coll. SCHENKLING.  
DEI: 1 Syntypus, Holl. Borneo, Pontianak, Coll. SCHENKLING.

**grandis** STIERLIN, 1868 (*Opilus*)  
(Mitt. Schweiz. Ent. Ges. 2, 346—347)

Mehrere Syntypen, Bagdad, leg. SCHLÄFLI.  
DEI: 3 Syntypen, Bagdad, VII. 1862, Coll. STIERLIN.

**grandjeani** SCHENKLING, 1901 (*Callimerus*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 45, 104—105)

Mehrere Syntypen, Bengal, Himalaya, Barway, im Museum Brüssel und in Coll. GRANDJEAN.  
DEI: 1 Syntypus, Barway, durch CARDON, Coll. SCHENKLING.

**grosssepunctatus** FAIRMAIRE, 1902 (*Opilo*)  
(Ann. Soc. Ent. Fr. 71, 555)

Mehrere Syntypen, Madagascar, Umgebung von Suberberville, leg. PERRIER.  
DEI: 1 Syntypus, Madagascar, leg. PERRIER (FAIRM.), Coll. SCHENKLING.

**hackeri** LEA, 1907 (*Lemidia*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 51, 334, 356)

Mehrere Syntypen, Queensland, Coen River, leg. HACKER.  
DEI: 2 Syntypen, Queensland, Coen District, Cape York, leg. HACKER, Coll. HACKER.

**hackeri** SCHENKLING, 1915 (*Phaeocyclotomus*)  
(Ent. Mitt. 4, 317—318)

Mehrere Syntypen; Süd-Queensland, Cairns, Coll. HACKER; Nord-Queensland, Kuranda, leg. DODD; im DEI.  
DEI: 4 Syntypen, Süd-Queensland, Cairns, Coll. HACKER.

**haemorrhoidalis** SCHENKLING, 1906 (*Orthrius*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 268, Taf. 2, Fig. 6)

Holotypus, Ceylon, im DEI [leg. LEWIS, Coll. KRAATZ].

**heynei** SCHENKLING, 1915 (*Cladiscus*)  
(Ent. Mitt. 4, 108)

Holotypus, India mer., Shembaganur, durch HEYNE, im DEI.

**hirsutus** SCHENKLING, 1906 (*Tenerus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 306—307)

Holotypus, Sumatra, Tebing tinggi, im DEI [leg. SCHULTHEISS, Coll. KRAATZ].

**horni** KRAATZ, 1900 (*Callimerus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 189–190)

3 Syntypen, Ceylon, bei Anuradhapura und Dambulla, leg. HORN.  
DEI: 1 Ex. Ceylon, Anuradhapura, 1 Ex. Dambulla, leg. HORN, Coll. KRAATZ; Syntypen.

**hydnoceroides** GORHAM, 1893 (*Callimerus*)  
(Proc. Zool. Soc. London, 574–575)

Mehrere Syntypen, Burmah, Ruby Mines, leg. DOHERTY.  
DEI: 1 Syntypus, Upper Burmah, Ruby Mines, 7500 ft., Coll. KRAATZ.

**hypocaustus** GORHAM, 1892 (*Opilo*)  
(Ann. Mus. Genova (2) 12, 730)

Mehrere Syntypen, Burma, Carin Hills, Cheba, in Coll. FEA.  
DEI: 1 Syntypus, Carin Cheba, 900–1100 m, 5. XII. 1888, leg. FEA, Coll. SCHENKLING.

**illaesicollis** KRAATZ, 1899 (*Tenerus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 101–102)

Holotypus, N. Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT; im DEI [1896, Coll. KRAATZ].

**imitans** SCHENKLING, 1908 (*Orthopleuroides*)  
(l.c., 706–707)

Holotypus, Natal, leg. O'NEIL, im DEI [1908].

**impressipennis** GORHAM, 1903 (*Opilo*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 47, 334–335)

Mehrere Syntypen; India, Nilgiri Hills, Beating, Upper Slopes, leg. ANDREWES, in Coll. ANDREWES.  
DEI: 1 Syntypus, Nilgiri Hills, Coll. SCHENKLING.

**impressus** FAIRMAIRE, 1902 (*Opilo*)  
(Ann. Soc. Ent. Fr. 51, 557)

Mehrere Syntypen, Madagascar, Anchahitira, leg. PERRIER, Nossi-Bé, leg. COQUEREL.  
DEI: 1 Syntypus, Madagascar, leg. PERRIER (FAIRM.), Coll. SCHENKLING.

**inaequalicolle** SCHENKLING, 1902 (*Pelonium*)  
(Bull. Mus. Paris 8, 331–332)

Syntypen: 1 Ex. Amérique méridionale, 1845, leg. CASTELNAU, im Museum Paris; Saint-Paul, in Coll. SCHENKLING (Ex. ?).  
DEI: 1 Syntypus, S. Paulo, Coll. SCHENKLING.

**inaequalis** PIO, 1947 (*Necrobinus*)  
(Diversites ent. 1, 5)

Mehrere Syntypen, Afr., Le Cap.  
DEI: 1 Syntypus, Capland, Willowmore, durch BRAUNS.

**insignis** SCHENKLING, 1915 (*Cymatodera*)  
(Ent. Mitt. 4, 110–111)

Mehrere Syntypen, San José, Costa Rica, durch H. SCHMIDT, im Museum Hamburg und DEI.  
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, vend. 31. VIII. 1911.

**israelicus** WINKLER, 1963 (*Trichodes*)  
(Beitr. Ent. 13, 890–893, Abb. 1–3)

♂ Holotypus, Palestine, Hadi Ramon, leg. BYTINSKI-SALZ, im DEI; 1 ♀, Paratype, dto., in Coll. BYTINSKI-SALZ.  
DEI: Holotypus (Ex. verliehen, konnte nicht überprüft werden).

**jacobsoni** SCHENKLING, 1915 (*Callimerus*)  
(Ent. Mitt. 4, 113)

3 Syntypen, Java, Samarang, leg. JACOBSON, via VETH an SCHENKLING, in Coll. VETH und im DEI.  
DEI: 1 Syntypus, Java, Samarang, VI. 1910, leg. JACOBSON.

**jocosum** SCHENKLING, 1908 (*Pelonium*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 705–706)

Holotypus, N. O. Australien, Kuranda, leg. DODD, im DEI.

**jucundum** SCHENKLING, 1900 (*Pelonium*)  
(l.c., 404–405)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. SCHENKLING.  
DEI: 2 Ex. Brasilien, Goyaz, 1 Ex. dto., leg. DONCKIER, Coll. SCHENKLING, Syntypen.

**kelecsenyi** GEBIEN, 1899 (*Necrobia*)  
(Ent. Nachr. 25, 97)

Mehrere Syntypen, Hamburg.  
DEI: 1 Syntypus, Kuhwärder, 1897, leg. GEBIEN.

**kolbei** SCHENKLING, 1907 (*Cymatodera*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 303)

2 ♂♂, 1 ♀, Syntypen, Mexiko, Tepic, Navarrete, Coll. FLOHR, im Museum Berlin und in Coll. SCHENKLING.  
DEI: 1 Syntypus, Mexiko, Tepic, Coll. FLOHR.

**kraatzi** SCHENKLING, 1900 (*Pelonium*)  
(l.c., 408–409)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. KRAATZ, Coll. GRANDJEAN, Coll. SCHENKLING.  
DEI: 4 Ex. Brasilien, Goyaz, leg. DONCKIER, Coll. SCHENKLING, 3 Ex. Prov. Goyaz, Jatahy, IX.–XI. 1897, Coll. KRAATZ;  
Syntypen.

**kuntzeni** SCHENKLING, 1929 (*Callimerus*)  
(Wien. Ent. Ztg. 46, 82—84, Fig.)

1 Ex. Indien, Hyderabad, bei Bangalore, leg. MAHDIHASSAN, via MAHDIHASSAN an SCHENKLING, 1 Ex. Calcutta, im DEI; Syntypen.

**laterimaculatus** KRAATZ, 1900 (*Tenerus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 192)

Holotypus, Ceylon, Dambulla, leg. HORN; im DEI [Coll. KRAATZ].

**lateripunctatum** SCHENKLING, 1906 (*Pelonium*)  
(l.c., 314—315)

Holotypus, mehrere Paratypen, Columbien, Muzo, Los Tibayer, Paso del Aniedin, im DEI.  
DEI: Holotypus, Columbia, Las Tibayer, 1 Paratypus, Muzo; Coll. KRAATZ.

**laterisignatus** SCHENKLING, 1922 (*Pallenis*)  
(Trans. Linn. Soc. London 18, 1, 325—326, Fig. 1)

6 Syntypen, Seychelles Inseln; Silhouette, Wald nahe Mont Pot-a-eau, ca. 1500 ft., VIII. 1908, Wald nahe Plateau von Mare aux Cochons, über 1000 ft., VIII.—IX. 1908; Mahé, Hochwald von Morne Blanc und Pilot, ca. 1500—2000 ft., XI. 1908; PERCY SLADEN TRUST Exped.  
DEI: 1 Syntypus, Silhouette, 1908, Seychelles Exp., Mus. Cambridge (SCOTT), 1921.

**latesellatus** SCHENKLING, 1900 (*Clerus*)  
(Mitt. Mus. Hamburg 15, 8—9, Separat)

Mehrere Syntypen, Mexico, in Coll. KRAATZ, Coll. GORHAM, Coll. GRANDJEAN, Coll. SCHENKLING und im Museum Hamburg.  
DEI: 1 Syntypus, Mexico, leg. STAUDINGER, Coll. SCHENKLING.

**lividipenne** SCHENKLING, 1912 (*Pelonium*)  
(Ent. Mitt. 1, 330)

7 Syntypen, Formosa, Hoozan, V. 1910, Kosempo, VII., VIII. 1911, leg. SAUTER.  
DEI: 3 Ex. Formosa, Kosempo, VIII. 1911, 1 Ex. Hoozan, V. 1910; leg. SAUTER, Syntypen.

**longipes** SCHENKLING, 1907 (*Clerus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 303—304)

5 Syntypen, Zentral-Amerika, Temax, N. Yucatan, leg. GAUMER, im Britischen Museum.  
DEI: 2 Syntypen, Tenax, N. Yucatan, leg. GAUMER.

**longula** SCHENKLING, 1906 (*Priocera*)  
(l.c., 256)

Holotypus, Brasilien, Jatahy, im DEI, mehrere Paratypen, dto.  
DEI: Holotypus, Brasilien, Prov. Goyaz, IX.—XI. 1897, Coll. KRAATZ.

**longulus** SCHENKLING, 1906 (*Ommadius*)  
(l.c., 295—296)

Holotypus, mehrere Paratypen, Borneo, Pontianak, via STAUDINGER an SCHENKLING, im DEI.  
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Holl. Borneo, Pontianak, Coll. SCHENKLING.

**macer** SCHENKLING, 1902 (*Callimerus*)  
(Not. Leyd. Mus. 23, 125—126)

4 Syntypen, Java, Simpar bei Tagal, 1890, leg. LUCASSEN, im Museum Leiden.  
DEI: 1 Syntypus, Java, Simpar, leg. LUCASSEN, ex Museum Leiden.

**maculata** SCHENKLING, 1899 (*Chlorocnemis*)  
(Ann. Mus. Genova (2) 20, 141—142)

Mehrere Syntypen; Neu Guinea, Geelvink Bai, Ansus, 1875, leg. BECCARI; Brit. Neu Guinea, Paumomu Fluss, 1892, leg. LORIA; im Museum Genua.  
DEI: 2 Syntypen, N. Guinea, Ansus, IV. 1875, leg. BECCARI, Coll. SCHENKLING.

**maculata** SCHENKLING, 1902 (*Lemidia*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 160)

Mehrere Syntypen, Australien, Victoria.  
DEI: 1 Syntypus, Austral., Victoria, Coll. SCHENKLING.

**maculiceps** KRAATZ, 1899 (*Tenerus*)  
(l.c., 102)

Holotypus, N. Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT; im DEI [1896, Coll. KRAATZ].

**maculiceps** KRAATZ, 1899 (*Tenerus*)  
(l.c., 103—104; nom. praeocc. = *conradti* LOHDE, 1899, Ent. Nachr. 25, 305)

Holotypus, Togo, leg. CONRADT; im DEI [Coll. KRAATZ].

**maculicollis** SCHAEFFER, 1904 (*Pelonium*)  
(Journ. New York Ent. Soc. 12, 219—220)

4 Syntypen, Texas, Brownsville, im Museum Brooklyn Institute of Arts and Sciences.  
DEI: 2 Syntypen, Texas, Brownsville, Esperanza Rch.

**maculicollis** KRAATZ, 1899 (*Tenerus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 102—103; nom. praeocc. = *kratzi* LOHDE, 1899, Ent. Nachr. 25, 305)

Holotypus, N. Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT; im DEI [1896, Coll. KRAATZ].

**maculiventris** SCHENKLING, 1916 (*Tenerus*)  
(Ent. Mitt. 5, 149–150)

Mehrere Syntypen, Queensland, Cooktown, Coen District, im DEI.  
DEI: 1 Ex. Australien, 1 Ex. Cooktown, Nord-N. H.; Coll. KRAATZ; 1 Ex. Queensland, Coen District, Cape York, leg. HACKER, Coll. HACKER: Syntypen.

**magnificus** SCHENKLING, 1908 (*Cladiscus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 363)

Holotypus, Malang, auf Borneo ? (Sarawak-Museum), im DEI; [VI. 1900].

**marginalis** SCHENKLING, 1908 (*Phaeocyclotomus*)  
(l.c., 482)

Mehrere Syntypen, Nilgiri Hills, leg. ANDREWES, im DEI.  
DEI: 2 Syntypen, Nilgiri Hills, leg. ANDREWES.

**meieri** SCHENKLING, 1900 (*Pelonium*)  
(l.c., 408)

Holotypus, Elbinsel Steinwärder, nahe bei Hamburg, leg. MEIER, Coll. SCHENKLING, aus America mer. ?, eingeschleppt;  
im DEI [1895].

**mediopunctatus** SCHENKLING, 1908 (*Ommadius*)  
(l.c., 483–484)

Mehrere Syntypen, Nilgiri Hills, leg. ANDREWES, im DEI.  
DEI: 3 Syntypen, Nilgiri Hills, leg. ANDREWES.

**metaстernalis** SCHENKLING, 1907 (*Clerus*)  
(l.c., 312)

Mehrere Syntypen, Amazon, Ega, leg. BATES, im Britischen Museum und DEI.  
DEI: 2 Syntypen, Amazon, leg. BATES, 1905, Nr. 100, Coll. FRY.

**militaris** SCHENKLING, 1906 (*Clerus*)  
(l.c., 272–273)

Holotypus, mehrere Paratypen, Brasilien, San Leopoldo, im DEI.  
DEI: Holotypus, 1 Paratype, Brasilien, San Leopoldo, durch SCHNEIDER.

**minutus** SCHENKLING, 1908 (*Callimerus*)  
(l.c., 366–367)

Mehrere Syntypen, Nilgiri Hills, Naduvatam, Ouchterlony Valley, 6000–6500 Fuss, XII., V., leg. ANDREWES, im DEI.  
DEI: 2 Syntypen, Nilgiri Hills, leg. ANDREWES.

**minutus** SCHENKLING, 1899 (*Ommadius*)  
(Ann. Mus. Genova (2) 20, 161–162)

Mehrere Syntypen, Neu Guinea, Andai, Ramoi, 1872, leg. D'ALBERTIS, im Museum Genua.  
DEI: 1 Syntypus, Neu Guinea, Ramoi, IV. 1872, leg. D'ALBERTIS, Coll. SCHENKLING.

**mirifica** SCHENKLING, 1909 (*Hydnocera*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 307)

2 Syntypen, Mexiko, Ventanas, leg. FLOHR, im Museum Berlin und in Coll. SCHENKLING.  
DEI: 1 Syntypus, Mexiko, Ventanas, leg. FLOHR.

**modestum** GORHAM, 1903 (*Stigmatium*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 47, 336–337)

Mehrere Syntypen, India, Nilgiri Hills, Anamalais Hills, 4000 ft., leg. ANDREWES, in Coll. ANDREWES.  
DEI: 1 Syntypus, Nilgiri Hills, Coll. SCHENKLING.

**modestus** KRAATZ, 1899 (*Tillus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 82)

Holotypus, Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT; im DEI.

**monticola** SCHENKLING, 1906 (*Orthrius*)  
(l.c., 267)

Holotypus, Nordborneo, Kini-Balu, 1500 m, leg. WATERSTRADT, im DEI.

**mundula** SCHENKLING, 1900 (*Axina*)  
(l.c., 391)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. SCHENKLING.  
DEI: 2 Syntypen, Brasilien, Goyaz, durch DONCKIER, Coll. SCHENKLING.

**mundum** SCHENKLING, 1912 (*Pelonium*)  
(Ent. Mitt. 1, 329)

Holotypus, Formosa, Kosempo, VIII. 1911, leg. SAUTER; im DEI.

**muscosus** SCHENKLING, 1906 (*Ommadius*)  
(l.c., 297)

Holotypus, mehrere Paratypen, Sumatra, Si-Rambé; im DEI.  
DEI: Holotypus, 3 Paratypen, Sumatra, Si-Rambé, XII. 1890–III. 1891, durch MODIGLIANI, Coll. KRAATZ.

**mutilloides** HINTZ, 1902 (*Thanasimus*)  
(l.c., 181)

6 Syntypen, Usambara, im Museum Berlin.  
DEI: 1 Syntypus, Kepai, durch WEISE.

*muzensis* SCHENKLING, 1915 (*Clerus*)  
(Ent. Mitt. 4, 313)

Holotypus, Columbien, Muzo, im DEI [Coll. KRAATZ].

*myrmecodes* SCHENKLING, 1916 (*Pseudopallenis*)  
(l.c. 5, 219)

Mehrere Syntypen, Madagascar, Kap Amber, im DEI.  
DEI: 2 Syntypen, Madagascar, Cap d'Ambre, ex Coll. SCHNEIDER.

*nanus* SCHENKLING, 1901 (*Thaneroclerus*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 45, 106)

Mehrere Syntypen, Sumatra, Painan, Ins. Bodjo, im Museum Brüssel.  
DEI: 1 Ex. Painan; 1 Ex. Ile. Bodja, leg. WEYERS; Syntypen.

*niger* KRAATZ, 1899 (*Cylidrus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 82)

Holotypus, Kamerun, Johann Albrechts-Höhe, leg. CONRADT; im DEI [1896, Coll. KRAATZ].

*niger* HINTZ, 1908 (*Phlogistus*)  
(l.c., 710, 712)

9 Syntypen, N. Queensland, Kuranda, in Coll. HINTZ und im DEI.  
DEI: 1 Ex. N. Holl., Coll. KRAATZ; 2 Ex. Kuranda, leg. DODD; Syntypen.

*nigra* KRAATZ, 1899 (*Chariessa*)  
(l.c., 104—105)

Holotypus, N. Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT; im DEI [1896, Coll. KRAATZ].  
Syn. zu *nigerrimus* KUWERTZ, 1893.

*nigrifrons* SCHENKLING, 1906 (*Axina*)  
(l.c., 253, Taf. 2, Fig. 4)

Holotypus, mehrere Paratypen, Puerto Cabello, im DEI.  
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Puerto Cabello, Coll. SCHENKLING.

*nigrifrons* KRAATZ, 1899 (*Tenerus*)  
(l.c., 104)

Holotypus, N. Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT; im DEI [1896, Coll. KRAATZ].

*nigripes* PR, 1953 (*Ceratocopus*)  
(Beitr. Ent. 3, 320—321)

Holotypus, Ost-Afrika, Pugu, XII. 1913, leg. METHNER, im DEI.

*nigritrix* GORHAM, 1886 (*Colyphus*)  
(Biol. Centr.-Amer. 3 (2), Suppl., 336)

Mehrere Syntypen; Guatemala, Zapote, San Gerónimo, Teleman in Vera Paz, leg. CHAMPION; Panama, Caldera in Chiriquí, Bugaba, leg. CHAMPION.  
DEI: 1 Syntypus, Panama, Bugaba, leg. CHAMPION.

*nigroaenea* GORHAM, 1883 (*Hydnocera*)  
(l.c., 174)

Mehrere Syntypen, Mexico, Guanajuato, leg. DUGÉS, Coll. SALLÉ, Puebla, leg. SALLÉ.  
DEI: 1 Syntypus, Mexico, Puebla, Coll. SALLÉ.

*nilgirensis* SCHENKLING, 1908 (*Ommadius*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 484—485)

Mehrere Syntypen, Nilgiri Hills, Ouchterlony Valley, 3000—3500 ft., VI., IX.—XII., leg. ANDREWES, im DEI.  
DEI: 2 Syntypen, Nilgiri Hills.

*nitida* SCHENKLING, 1908 (*Strotocera*)  
(l.c., 361—362)

Holotypus, Kamerun, Mundame, leg. ROHDE, im DEI [Coll. KRAATZ].

*nitidum* SCHENKLING, 1916 (*Gastrocentrum*)  
(Arch. Naturg. 82, A 5, 117)

Holotypus, Formosa, Banshoryo Distr., Sokutsu, VII. 1912, leg. SAUTER; im DEI.

*nitidus* SCHENKLING, 1898 (*Ommadius*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 366)

Mehrere Syntypen, Ceram.  
DEI: 2 Syntypen, Ceram, Illo, 1884, leg. RIBBE, Coll. SCHENKLING.

*niveifascia* SCHAEFFER, 1905 (*Hydnocera*)  
(Sci. Bull. Brooklyn Inst. Mus. 1, 156)

Mehrere Syntypen, Arizona, Palmerlee, Cochise Co., leg. SCHAEFFER, im Brooklyn Museum.  
DEI: 3 Syntypen, Arizona, Palmerlee, Cochise Co.

*obscurus* SCHENKLING, 1904 (*Phloeocopus*)  
(Ann. Mus. Genova (3) 1, 16—17)

Holotypus, Madagascar, Diego Suarez, via DONCKIER an SCHENKLING, im DEI.

**occidentalis** SCHENKLING, 1906 (*Tenerus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 307–308)

Holotypus, San Thomé, im DEI [Coll. SCHENKLING].

**occipitalis** SCHENKLING, 1908 (*Ommadius*)  
(l.c., 486–487)

Mehrere Syntypen, N. Queensland, leg. SCHNEIDER, Kuranda, leg. DODD, im DEI.  
DEI: Syntypen: 1 Ex. N. Queensland, leg. SCHNEIDER, 3 Ex. Kuranda, leg. DODD.

**octopunctatus** SCHENKLING, 1906 (*Orthrius*)  
(l.c., 267)

Holotypus, Sumatra, im DEI [Coll. KRAATZ].

**omissus** SCHENKLING, 1906 (*Ommadius*)  
(l.c., 295, Taf. 2, Fig. 10)

Holotypus, mehrere Paratypen, Celebes, via STAUDINGER an SCHENKLING, im DEI.  
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Celebes, durch STAUDINGER, Coll. SCHENKLING und Coll. KRAATZ.

**orientalis** HINTZ, 1902 (*Cardiostichus*)  
(l.c., 191)

6 Syntypen, Usambara, im Museum Berlin.

DEI: 1 Syntypus, D. Ost-Afrika, Lindi, Coll. SCHENKLING.

**pallidiventre** GORHAM, 1876 (*Stigmatium*)  
(Cist. Ent. 2, 97–98)

Mehrere Syntypen, Mysol, durch CHEVROLAT.

DEI: 1 Syntypus, Mysol, Wallace, Coll. SCHENKLING.

**pallida** LEA, 1907 (*Lemidia*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 51, 334, 348)

Mehrere Syntypen, N. S. Wales, leg. FRENCH, Tarcutta, im Macleay Museum, Sydney, Blue Mountains, leg. FERGUSON, Galston, Clifton, National Park, Como, leg. LEA.

DEI: 1 Syntypus, N. S. Wales, Clifton, leg. LEA, Coll. HACKER.

**pallipes** KRAATZ, 1899 (*Neohydinus*)  
(l.c. 43, 215)

Holotypus, Südwest Sumatra, leg. WEYERS; im DEI [Coll. KRAATZ].

**parallela** PIC, 1948 (*Enopliomorpha*)  
(Tijdschr. Ent. (1948), 131–132)

Holotypus, Africa australis, Rhodesia, im DEI [Plumtin].

**parcuspunctata** SCHENKLING, 1900 (*Axina*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 388–389)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. BRANCSIK und Coll. SCHENKLING.

DEI: 4 Syntypen, Brasilien, Goyaz, durch DONCKIER, Coll. SCHENKLING.

**parva** SCHENKLING, 1908 (*Eucymatodera*)  
(l.c., 364–365)

2 Ex. Deutsch-Südwestafrika, Outyo, leg. LANGHELD, 1 Ex. Damara bis Ngamisee, leg. FLECK, im DEI und Museum Berlin:  
Syntypen.

DEI: 1 Syntypus, Deutsch SW Afrika, Outyo, leg. LANGHELD.

**parvicollis** SCHENKLING, 1908 (*Thanasimus*)  
(l.c., 478)

Holotypus, Deutsch-Ostafrika, Kigonsera, leg. ERTL, im DEI.

**parvulus** SCHENKLING, 1900 (*Epiphloeus*)  
(l.c., 398–399)

Holotypus, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. SCHENKLING; im DEI [durch DONCKIER].

**parvum** KRAATZ, 1899 (*Pyrrhostigmatium*)  
(l.c., 97)

Holotypus, SO.-Kamerun, Lolodorf, leg. CONRADT; im DEI [1895, Coll. KRAATZ].

**parvus** SCHENKLING, 1916 (*Thaneroclerus*)  
(Ent. Mitt. 5, 222)

2 Syntypen, Java, Preanger, in Coll. CORPORAAL und im DEI.  
DEI: 1 Syntypus, Java, Preanger, Tjimbong, durch CORPORAAL.

**paula** SCHENKLING, 1908 (*Tillicera*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 224)

Mehrere Syntypen, Nilgiri Hills, in Coll. ANDREWES und im DEI.  
DEI: 1 Syntypus, Nilgiri Hills.

**pectoralis** SCHENKLING, 1899 (*Chlorocnemis*)  
(Ann. Mus. Genova (2) 20, 141)

Mehrere Syntypen; Australia, Somerset, 1875, leg. D'ALBERTIS; Brit. Neu Guinea, Bujakori, 1890, leg. LORIA; im Museum Genua.  
DEI: 1 Syntypus, Australia, Somerset, I. 1875, leg. D'ALBERTIS, Coll. SCHENKLING.

*pectoralis* KRAATZ, 1899 (*Cylidrus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 81)

Mehrere Syntypen, Togo und Nigro-Benue, leg. CONRADT.

DEI: 1 Ex. Niger-Benue, 1 Ex. Togo, 1 Ex. dto., leg. CONRADT; Coll. KRAATZ, Syntypen.

*pectoralis* SCHENKLING, 1912 (*Ommadius*)  
(Ent. Mitt. 1, 326—327)

Mehrere Syntypen, Formosa, Fuhosho, VII. 1909/VIII. 1911, Taihorinsho, IX. 1909, Hoozan, 1909, Kosempo, VIII. 1911, Alikang, X. 1911, Kankau, IV.—V. 1912, leg. SAUTER.

DEI: Syntypen, Formosa, leg. SAUTER: 3 Ex. Fuhosho, VII. 1909/7.VIII.; 4 Ex. Taihorinsho, VIII., IX., 7. IX. 1909; 3 Ex. Hoozan, 1908—10; 6 Ex. Kosempo, 7. VIII., 7. IX. 1909/VIII., 7. VIII. 1911; 4 Ex. Alikang, 7. X.; 4 Ex. Kankau, IV., V. 1912.

*pectoralis* SCHENKLING, 1900 (*Platynoptera*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 401—402)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, in Coll. GRANDJEAN und Coll. SCHENKLING.  
DEI: 1 Syntypus, Brasilien, Goyaz, leg. DONCKIER, Coll. SCHENKLING.

*peloniooides* SCHENKLING, 1915 (*Clerus*)  
(Ent. Mitt. 4, 315—316)

Holotypus, Mexico, Jalapa, im DEI [1908].

*penicillatus* SCHENKLING, 1899 (*Metademius*)  
(Ann. Mus. Genova (2) 20, 137—138)

Mehrere Syntypen, Brit. Neu Guinea, Ins. Yule, VI. 1875, leg. D'ALBERTIS, im Museum Genua.  
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. SCHENKLING.

*pernix* SCHENKLING, 1915 (*Callimerus*)  
(Ent. Mitt. 4, 112—113)

7 Syntypen, östl. Himalaya, Kursong, 4700—5000 ft., im Indian Museum Kalkutta und DEI.  
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, Annandale, 24. VI. 1910.

*persicus* KRAATZ, 1894 (*Trichodes*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 126)

9 Syntypen, Persien, Hadschgabad.

DEI: 3 Syntypen, Hadschgabad, durch LEDERER, Coll. KRAATZ.

*piceocinctus* KRAATZ, 1899 (*Phaeocyclotomus*)  
(l.c., 92—93)

Mehrere Syntypen, Nord-Kamerun, Togo, leg. CONRADT.

DEI: Syntypen: 4 Ex. N. Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, 1896; 2 Ex. Togo; leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

*picta* SCHENKLING, 1907 (*Axina*)  
(l.c., 309)

Mehrere Syntypen, Amazon, Coll. BATES, Coll. FRY, im Britischen Museum und DEI.  
DEI: 1 Syntypus, Amazon, durch BATES, Coll. FRY, 1903, Nr. 100.

*pictipennis* KRAATZ, 1899 (*Phaeocyclotomus*)  
(l.c., 98)

2 Syntypen, Westafrica, Kamerun, Togo, leg. CONRADT.

DEI: 2 Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

*placidum* SCHENKLING, 1900 (*Pelonium*)  
(l.c., 405—406)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. KRAATZ und Coll. SCHENKLING.

DEI: Syntypen, Brasilien: 2 Ex. Goyaz, durch DONCKIER, Coll. SCHENKLING; 1 Ex. Prov. Goyaz, Jatahy, IX.—XI. 1897, Coll. KRAATZ.

*plagata* SCHENKLING, 1900 (*Axina*)  
(l.c., 390—391)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. GRANDJEAN und Coll. SCHENKLING.  
DEI: 3 Syntypen, Brasilien, Goyaz, durch DONCKIER, Coll. SCHENKLING.

*plicaticollis* SCHENKLING, 1916 (*Eleale*)  
(Ent. Mitt. 5, 147—148)

Mehrere Syntypen; N. S.-Wales, National Park; Victoria, Mallee Distr.; Tasmania, Mole Creek; im DEI.  
DEI: 2 Ex. Tasmania, Mole Creek, durch LEA, Coll. HACKER; 2 Ex. New S.-Wales, National Park, durch TAYLOR, Coll. HACKER: Syntypen.

*plumbeus* SCHENKLING, 1906 (*Phloeocopus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 259)

Holotypus, mehrere Paratypen, Madagascar, Ankazoaba, 1902, leg. BASTARD.  
DEI: 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

*podagraria* SCHENKLING, 1900 (*Priocera*)  
(l.c., 385—386)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, in Coll. FAIRMAIRE, Coll. GRANDJEAN und Coll. SCHENKLING.  
DEI: 2 Syntypen, Brasilien, Goyaz, durch DONCKIER, Coll. SCHENKLING.

**pretiosus** GORHAM, 1892 (*Callimerus*)  
(Ann. Mus. Genova (2) 12, 727)

2 Syntypen, Upper Burma, Bhamo, 1885–86, in Coll. FEA.  
DEI: 1 Syntypus, Birmania, Bhamo, VI. 1886, leg. FEA.

**princeps** GORHAM, 1886 (*Epiphloeus*)  
(Biol. Centr.-Amer. 3 (2), Suppl., 340, Taf. 12, Fig. 19)

Mehrere Syntypen, Panama, Bugaba, 1000 ft., leg. CHAMPION.  
DEI: 2 Syntypen, Bugaba, 800–1500 ft., leg. CHAMPION, Coll. SCHENKLING.

**procera** SCHENKLING, 1900 (*Ichneia*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 399–400)

Mehrere Syntypen, Peru, Callanga, in Coll. KRAATZ und Coll. SCHENKLING.  
DEI: 6 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, durch STAUDINGER.

**prolongatus** SCHENKLING, 1912 (*Orthrius*)  
(Ent. Mitt. 1, 325)

6 Syntypen, Formosa, leg. SAUTER: Taihorinsho, III., X. 1909, Kosempo, VIII. 1911, Taihorin, IX. 1911, Kankau, IV.–V. 1912.  
DEI: Syntypen, Formosa, leg. SAUTER: 2 Ex. Kosempo, VIII. 1911/22. V. 1912 (Datum nicht erwähnt); 2 Ex. Taihorinsho, VII./1909/7. IX. 1911 (Datum nicht erwähnt); 1 Ex. Kankau, Koshun, IV. 1912; 1 Ex. Taihorin, 7. IX. 1911.

**proximus** SCHENKLING, 1908 (*Tenerus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 703)

Mehrere Syntypen, Borneo, Klingkang, im Sarawak-Museum und DEI.  
DEI: 1 Syntypus, Klingkang, I.

**pulcher** SCHENKLING, 1907 (*Clerus*)  
(l.c., 310–311)

Mehrere Syntypen, Amazon, leg. BATES, im Britischen Museum und DEI.  
DEI: 1 Syntypus, Amazon, 1905, leg. BATES, Nr. 100, Coll. FRY.

**pulcherinus** SCHENKLING, 1899 (*Ommadius*)  
(Ann. Mus. Genova (2) 20, 388–389)

Mehrere Syntypen, Sumatra, Si-Rambé, 1890–91, leg. MODIGLIANI, im Museum Genua.  
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, XII. 1890–III. 1891, Coll. SCHENKLING.

**punctatus** HINTZ, 1908 (*Phlogistus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 710, 713–714)

17 Syntypen, Australia, Kuranda, in Coll. HINTZ und im DEI.  
DEI: 5 Syntypen, Kuranda, leg. DODD.

**puncticollis** KRAATZ, 1899 (*Tenerus*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 43, 216–217)

2 Syntypen, Südwest Sumatra, leg. WEYERS, im DEI [Coll. KRAATZ].

**purpurea** LEA, 1907 (*Lemidia*)  
(l.c. 51, 332, 341)

Holotypus, Queensland, Coen River, Coll. HACKER, im DEI.

**pusilla** SCHENKLING, 1906 (*Lemidia*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 303)

Holotypus, mehrere Paratypen, Queensland, Kuranda, leg. DODD, im DEI.  
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, VII. 1904.

**pusio** SCHENKLING, 1906 (*Clerus*)  
(l.c., 276)

Holotypus, mehrere Paratypen, Peru, Callanga, Marcapata, im DEI.  
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Peru, Callanga, durch STAUDINGER, Coll. SCHENKLING und Coll. KRAATZ.

**quadrifoveolatum** SCHENKLING, 1906 (*Pelonium*)  
(l.c., 313–314)

Holotypus, mehrere Paratypen, Brasilien, Jatahy, im DEI.  
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Brasilien, Goyaz, durch DONCKIER, Coll. SCHENKLING.

**quadrinotata** SCHENKLING, 1900 (*Priocera*)  
(l.c., 386–387)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, in Coll. FAIRMAIRE, Coll. GRANDJEAN, Coll. KRAATZ und Coll. SCHENKLING.  
DEI: 2 Ex. Brasilien, Goyaz, leg. DONCKIER, Coll. SCHENKLING; 2 Ex. Prov. Goyaz, Jatahy, IX.–XI. 1897, Coll. KRAATZ:  
Syntypen.

**quadriplagiata** GAHAN, 1908 (*Dieropsis*)  
(Ann. Mag. Nat. Hist. (3) 1, 96)

Mehrere Syntypen, British Central Africa, Kondowe, leg. WHYTE, Niomkolo, leg. CARSON, Fwambo, leg. NUTT.  
DEI: 1 ♀, Syntypus, E. Africa, Niomkolo, 91–28.

**rectefasciatus** SCHENKLING, 1915 (*Clerus*)  
(Ent. Mitt. 4, 318)

2 Syntypen, Brasilien, San Leopoldo, via SCHNEIDER an SCHENKLING, im DEI.

**rhodesianum** SCHENKLING, 1907 (*Stigmatium*)  
(Ann. S. Afr. Mus. 5, 201–202)

Mehrere Syntypen, Rhodesia, Sebakwe, im South African Museum.  
DEI: 1 Syntypus, Rhodesia, Sebakwe.

**rostii** SCHENKLING, 1908 (*Cladiscus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 362)

Holotypus, Westl. Himalaya, Kulu, leg. ROST, im DEI [Beasfluss].

**rotundopunctatus** HINTZ, 1908 (*Phlogistus*)  
(l.c., 711, 714)

3 Syntypen, Australia, Kuranda, in Coll. HINTZ und im DEI.  
DEI: 1 Syntypus, Kuranda, leg. DODD.

**ruficeps** KRAATZ, 1899 (*Microstigmatium*)  
(l.c., 100–101)

25 Syntypen, Togo, leg. CONRADT; im DEI [Coll. KRAATZ].

**ruficeps** SCHENKLING, 1900 (*Pelonium*)  
(l.c., 404)

Mehrere Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, in Coll. SCHENKLING.  
DEI: 2 Ex. Goyaz, 1 Ex. Brasilien, Goyaz, leg. DONCKIER; Coll. SCHENKLING, Syntypen.

**rufimanus** SCHENKLING, 1900 (*Clerus*)  
(l.c., 395)

Mehrere Syntypen, Peru, Paranga, Coll. SCHENKLING.

DEI: 3 Syntypen, Peru, Callanga, durch STAUDINGER, Coll. SCHENKLING.

Im Gegensatz zu der in der Originalbeschreibung verwendeten Schreibweise „Paranga“ steht auf dem Etikett „Callanga“.

**rufipes** KRAATZ, 1899 (*Phaeocyclotomus*)  
(l.c., 95–96)

Mehrere Syntypen, Westafrica, Kamerun, Togo, leg. CONRADT.  
DEI: 4 Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

**rufipes** SCHENKLING, 1898 (*Poecilochroa*)  
(l.c., 364–365)

Mehrere Syntypen, Mexiko, leg. COMITÁN.

DEI: Lectotypus, Mexiko, durch SPEYER, Coll. SCHENKLING; 1 ♀, Paralectotypus, Mexiko, leg. COMITÁN, Coll. KRAATZ; von EXKIS designiert.

**rufofemoratus** KRAATZ, 1899 (*Cephaloclerus*)  
(l.c., 106)

Holotypus, Togo, leg. CONRADT; im DEI [Coll. KRAATZ].

**rufofemoratus** SCHENKLING, 1915 (*Clerus*)  
(Ent. Mitt. 4, 314)

Holotypus, Peru, Chanchamayo, im DEI [leg. HEYNE].

**rufopiceum** KRAATZ, 1899 (*Pyrrhostigmatium*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., '97)

2 Syntypen, Nord-Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 1896, Coll. KRAATZ.

**rufostestaceus** SCHENKLING, 1902 (*Orthrius*)  
(Bull. Mus. Paris 8, 323)

Mehrere Syntypen, Dardiling, 1890, leg. HARMAND, im Museum Paris.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. SCHENKLING.

**rufum** KRAATZ, 1899 (*Pyrrhostigmatium*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., '96)

Holotypus, Gabun, durch WEBER; im DEI [Coll. KRAATZ].

**rufus** KRAATZ, 1899 (*Corynetes*)  
(l.c., 107)

Holotypus, Nord-Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT; im DEI [1896].

**rugulicollis** SCHENKLING, 1906 (*Opilo*)  
(l.c., 260)

Holotypus, Darjeeling, im DEI [Hammer, Coll. SCHENKLING].

**salamandra** SCHENKLING, 1906 (*Priocera*)  
(l.c., 255)

Holotypus, Mexiko, im DEI [Coll. KRAATZ].

**sanguineus** SCHENKLING, 1899 (*Tenerus*)  
(Ann. Mus. Genova (2) 20, 344–345)

Mehrere Syntypen, Ins. Nias, 1897–98, leg. RAAP, im Museum Genua.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

**sauteri** SCHENKLING, 1912 (*Allochotes*)  
(Ent. Mitt. 1, 328)

15 Syntypen, Formosa, Kankau, IV. 1912, leg. SAUTER.  
DEI: 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

**sauteri** SCHENKLING, 1912 (*Cladiscus*)  
(l.c., 322)

2 Syntypen, Formosa, Kosempo, VI. 1911, Banshoryo, VI. 1912, leg. SAUTER; im DEI [Sokutsu].

**schenklingi** HINTZ, 1908 (*Phlogistus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 712, 715)

13 Syntypen, Australia, N. S. Wales, in Coll. HINTZ und im DEI.  
DEI: 3 Ex. Australia, Coll. HACKER-Coll. KRAATZ; 1 Ex. N. Holl., Coll. KRAATZ: Syntypen.

**schultzei** SCHENKLING, 1913 (*Callimerus*)  
(Philipp. Journ. Sci. 8, No. 4, 303)

Holotypus, No. 1598, Luzon, Benguet, Baguio, leg. BANKS, in Coll. des Bureau of Science, Manila; Paratypen, No. 1392, Negros Occ., Bago, leg. BANKS, im DEI.  
DEI: 1 Paratypus, No. 1392, Negros, Occ., Nakalang, lot Gort. Lab. Coll., leg. BANKS.

**schulzi** HINTZ, 1908 (*Phlogistus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 710, 712)

7 Syntypen, Australia, Kap York, Kuranda, Endeavour, in Coll. HINTZ und im DEI.  
DEI: 1 Ex. N. Holl., Coll. KRAATZ; 1 Ex. Austral.; 2 Ex. Kuranda, leg. DODD; Syntypen.

**scitum** SCHENKLING, 1906 (*Stigmatum*)  
(l.c., 289–290, Taf. 2, Fig. 8)

Holotypus, mehrere Paratypen, Sumatra, Tebing tinggi, im DEI.  
DEI: Holotypus, 2 Paratypen, N. O. Sumatra, Tebing tinggi, leg. SCHULTHEISS, Coll. KRAATZ.

**scaber** SCHENKLING, 1902 (*Phaeocyclotomus*)  
(Not. Leyd. Mus. 23, 128–129)

4 Syntypen, West-Java, leg. SJTHOFF, im Museum Leiden.  
DEI: 1 Syntypus, Java, ex Museum Leiden, Coll. SCHENKLING.

**scotti** SCHENKLING, 1922 (*Anthriboclerus*)  
(Trans. Linn. Soc. London 18, 1, 323–329, Fig. 4)

9 Syntypen; Seychelles Inseln, Silhouette, Wald nahe d. Plateau von Mare bis Cochons, über 1000 ft., VIII.–IX. 1908; Mahé, Hochwald von Morne Blanc und Pilot, ca. 1500–2000 ft., XI. 1908, nahe Morne Blanc, ca. 1000 ft., XI. 1908, Cascade Estate, ca. 1000 ft.; PERCY SLADEN TRUST Exped.  
DEI: 1 Syntypus, Mahé, 1908–09, Seychelles Exp.

**sexnotatus** BOHEMAN, 1851 (*Clerus*)  
(Ins. Caffraria 1, 496–497)

Mehrere Syntypen, Caffraria, leg. WAHLBERG.  
DEI: 1 Syntypus, Caffraria, leg. WAHLBERG.

**sexplagiatus** SCHENKLING, 1908 (*Orthrius*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 478–479)

Mehrere Syntypen, Nilgiri Hills, leg. HAMPSON, im Britischen Museum und DEI.  
DEI: 2 Syntypen, Nilgiri Hills, leg. HAMPSON, 94–89.

**signatus** SCHENKLING, 1915 (*Orthrius*)  
(Ent. Mitt. 4, 310)

Holotypus, Bengal, im DEI [Coll. SCHENKLING].

**similis** SCHENKLING, 1900 (*Epiclines*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 397)

Mehrere Syntypen, Chile, Coll. KRAATZ und Coll. SCHENKLING.  
DEI: Lectotypus, Chile, durch SCHRÖDER; designiert von SOLERVICENS.  
Syn. zu *aeneus* PHILIPPI, 1864.

**similis** SCHENKLING, 1898 (*Priocera*)  
(l.c., 362)

Holotypus, via HEYNE an SCHENKLING, ohne Fundortangabe; im DEI [Brasilien, durch HEYNE, Coll. SCHENKLING]  
Syn. zu *variegata* KIRBY, 1818.

**similis** KRAATZ, 1899 (*Tenerus*)  
(l.c., 102)

Holotypus, Ashante, leg. REITTER; im DEI [Coll. KRAATZ].

**simillimus** SCHENKLING, 1902 (*Tenerus*)  
(l.c., 112)

Mehrere Syntypen, Nordost-Sumatra, Tebing tinggi, Tandjong Morawa, 1884–85, leg. SCHULTHEISS, via KRAATZ an SCHENKLING, im Museum Leiden und in Coll. SCHENKLING.  
DEI: 2 Syntypen, N. O. Sumatra, Tebing tinggi, leg. SCHULTHEISS, Coll. KRAATZ.

**simplex** SCHENKLING, 1907 (*Apopempsis*)  
(Ann. S. Afr. Mus. 5, 202)

Mehrere Syntypen, S. Rhodesia, Manica, Christmas Pass, im South African Museum.  
DEI: 1 Syntypus, S. E. Trop. Afr., Manica, Christmas Pass, Coll. SCHENKLING.

**simplex** SCHENKLING, 1900 (*Epiphloeus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 397—398)

Mehrere Syntypen, Bolivia, Coll. SCHENKLING.  
DEI: 2 Syntypen, Bolivia, durch STAUDINGER, Coll. SCHENKLING.

**simplex** SCHENKLING, 1903 (*Xenorhrius*)  
(Stett. Ent. Ztg. 64, 16—17)

Mehrere Syntypen, Hongkong, leg. BOWRING, im Museum Stettin.  
DEI: 1 Syntypus, Hongkong, leg. BOWRING, Coll. SCHENKLING.

**simsonei** LEA, 1907 (*Lemidia*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 51, 333, 349, Taf. 3, Fig. 58)

Mehrere Syntypen, Tasmania, Launceston, leg. SIMSON und GRIFFITH, Goulds Country, Mole Creek, Beaconsfield, leg. SIMSON, HOBART und LEA; King Island, leg. KERSHAW.  
DEI: 1 Syntypus, Tasmania, Launceston, Coll. HACKER.

**smaragdinus** SCHENKLING, 1899 (*Ommadius*)  
(Ann. Mus. Genova (2) 20, 152—153)

Mehrere Syntypen; Neu Guinea, Fly River, 1876—77, leg. D'ALBERTIS; Paumomu River, 1892, leg. LORIA; im Museum Genua.  
DEI: 1 Syntypus, Neu Guinea, Fly River, 1876—77, leg. D'ALBERTIS, Coll. SCHENKLING.

**socius** SCHENKLING, 1899 (*Ommadius*)  
(l.c., 157)

Mehrere Syntypen, Neu Guinea, Fly River, 1876—77, leg. D'ALBERTIS, im Museum Genua.  
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. SCHENKLING.

**soror** SCHENKLING, 1915 (*Pallenis*)  
(Ent. Mitt. 4, 110)

Holotypus, Madagaskar, Diego Suarez, im DEI [Coll. SCHENKLING].

**soror** SCHENKLING, 1903 (*Tillicera*)  
(Not. Leyd. Mus. 23, 127—128)

Mehrere Syntypen, Brit. Bootang, Bhutan, leg. DUREL, im Museum Leiden.  
DEI: 1 Syntypus, Brit. Bootang, leg. DUREL.

**speciosus** HINTZ, 1908 (*Phlogistus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 710, 713)

11 Syntypen, N. Queensland, Kuranda, Townsville, in Coll. HINTZ und im DEI.  
DEI: 4 Syntypen, Kuranda, leg. DODD.

**spectabilis** KRAATZ, 1883 (*Trichodes*)  
(l.c. 27, 346)

Holotypus, Turkestan, Osch, Coll. KRAATZ; im DEI.

**spinipenne** KRAATZ, 1899 (*Oxystigmatium*)  
(l.c., 91—92)

Mehrere Syntypen, Nord-Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT.  
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, 1896, Coll. KRAATZ.

**stictica** GORHAM, 1882 (*Priocera*)  
(Biol. Centr.-Amer. 3 (2), 140, Taf. 7, Fig. 17)

Mehrere Syntypen; Mexico, Oaxaca, leg. HÖGE und SALLÉ; Guatemala, Teleman, San Juan, Calderas, Cerro Zunil, Panteón, Panajachel, leg. CHAMPION; Nicaragua, Chontales, leg. BELT; Panama, Volcan de Chiriquí, leg. CHAMPION.  
DEI: 2 Syntypen, V. de Chiriquí, 25—4000 ft., leg. CHAMPION, Coll. SCHENKLING.

**striatopunctatus** SCHENKLING, 1901 (*Orthrius*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 45, 106)

Mehrere Syntypen, Bengal, Barway, Mandar, im Museum Brüssel.  
DEI: 3 Syntypen, Bengal, Mandar, VII. 1891, leg. CARDON, Coll. SCHENKLING.

**suavis** GORHAM, 1892 (*Callimerus*)  
(Ann. Mus. Genova (2) 12, 722—723)

4 Ex. Burma, Carin Hills, Chebà, 900—1100 m, in Coll. FEA; 2 Ex. India, Manipur, leg. DOHERTY, in Coll. FRY; Syntypen.  
DEI: 1 Syntypus, Carin Chebà, 900—1100 m, 5. XII. 1888, leg. FEA.

**subfuscum** GORHAM, 1876 (*Stigmatium*)  
(Cist. Ent. 2, 94)

Mehrere Syntypen, Philippine Isles, East Mindanao, durch SEMPER.  
DEI: 3 Syntypen, Mindanao, durch GORHAM, Coll. SCHENKLING.

**sumatranaus** KRAATZ, 1899 (*Cylidrus*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 43, 212)

Mehrere Syntypen, Südwest Sumatra, leg. WEYERS.  
DEI: 3 Syntypen, Sumatra, Coll. KRAATZ.

**sumatranaus** KRAATZ, 1899 (*Tillus*)  
(l.c., 214)

Holotypus, Südwest Sumatra, leg. WEYERS; im DEI [Coll. KRAATZ].

*sumatrensis* PIC, 1953 (*Teneropsis*)  
(Beitr. Ent. 3, 322)

Holotypus, Sumatra, im DEI.

*suturale* KRAATZ, 1899 (*Microstigmatium*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 101)

Holotypus, Togo, leg. CONRADT; im DEI [Coll. KRAATZ].

*suturalis* SCHENKLING, 1906 (*Clerus*)  
(l.c., 277)

Holotypus, mehrere Paratypen, Brasilien, Jatahy, im DEI.

DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Brasilien, Goyaz, durch DONCKIER, Coll. SCHENKLING.

*suturalis* SCHENKLING, 1906 (*Dasycoelurus*)  
(l.c., 291)

Holotypus, mehrere Paratypen, Sumatra, Si-Rambé, Malakka, im DEI.

DEI: Holotypus, Sumatra, Si-Rambé, XII. 1890 – III. 1891, leg. MODIGLIANI, Coll. KRAATZ; 4 Ex. dto., 1 Ex. Malakka, Coll. KRAATZ; Paratypen.

*suturalis* SCHENKLING, 1898 (*Platynoptera*)  
(l.c., 367 – 368)

Holotypus, Bolivia; im DEI [durch STAUDINGER, Coll. SCHENKLING].

*suturalis* SEIDLITZ, 1891 (*Trichodes*)  
(Fauna Transylvanica, 527)

Mehrere Syntypen, Spanien, in Escorial, 1865.

DEI: 2 Syntypen, Hisp., ex Coll. SEIDLITZ.

*tarsale* SCHENKLING, 1900 (*Pelonium*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 407)

Mehrere Syntypen; Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy; Paraguay; in Coll. GRANDJEAN und Coll. SCHENKLING.

DEI: Syntypen, Brasilien: 1 Ex. Goyaz, leg. DONCKIER, Coll. SCHENKLING; 2 Ex. Prov. Goyaz, Jatahy; 2 Ex. Paraguay, 188 .., leg. DRAKE; Coll. KRAATZ.

*tarsalis* GORHAM, 1892 (*Orthrius*)  
(Ann. Mus. Genova (2) 12, 737 – 738)

4 Syntypen, Birmania, Bhamo, 1885 – 86, in Coll. FEA.

DEI: 1 Syntypus, Birmania, Bhamo, VIII. 1885, leg. FEA, Coll. KRAATZ.

*terminale* SCHENKLING, 1908 (*Enoplium*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 706)

2 Syntypen, Vorderindien, Anamalai Hills, 3500 ft., durch ANDREWES, in Coll. ANDREWES und im DEI.

DEI: 1 Syntypus, Anamalais.

*terminalis* SCHENKLING, 1912 (*Cladiscus*)  
(Ent. Mitt. 1, 322 – 323)

Holotypus, Formosa, Taihorinsho, X. 1909, leg. SAUTER; im DEI [♂, 7. X.].

*termnitincola* CORPORAL, 1939 (*Thanerocerus*)  
(Bijdr. Dierkd. 27, 351 – 352, Taf. 9, Fig. 6)

Mehrere Syntypen, Sumatra's West Küste, Haraukloof, leg. JACOBSON.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, 560 m, VII. 1925.

*testacea* GORHAM, 1883 (*Hydnocera*)  
(Biol. Centr.-Amer. 3 (2), 169)

Mehrere Syntypen; Mexico, Playa Vicente, leg. HÖGE; Guatemala, Cerro Zunil, Quiche Mountains, leg. CHAMPION; Panama, Volcan de Chiriquí, alt. 8000 ft., Bugaba, leg. CHAMPION.

DEI: 1 Syntypus, Cerro Zunil, 4 – 5000 ft., leg. CHAMPION.

*texana* WOLCOTT, 1908 (*Chariesa*)  
(Ent. News 19, 70, 72)

3 Syntypen, Texas, Nolan County, Sweetwater, via WOODING an WOLCOTT.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. WOODING.

*thoracicus* SCHENKLING, 1907 (*Aulicus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 305)

4 Syntypen, Zentral-Amerika, Guerrero, Venta de Zopilote, 2800 ft., leg. SMITH, im Britischen Museum und in Coll. SCHENKLING.

DEI: 1 Syntypus, Guerrero, Venta de Zopilote, 2800 ft., X., leg. SMITH.

*tibialis* SCHENKLING, 1915 (*Orthrius*)  
(Ent. Mitt. 4, 310 – 311; nom. praeocc. = *tonkineus* PIC, 1925, Echange (40) 41, 15)

Holotypus, Tonkin, Laokay, via SALVAZA an SCHENKLING, im DEI [V. 1913].

*tibialis* SCHENKLING, 1906 (*Orthrius*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 268 – 269)

Holotypus, mehrere Paratypen, Assam, im DEI.

DEI: Holotypus, Assam, Coll. KRAATZ.

Syn. zu *brachialis* GORHAM, 1893.

**tibialis** KRAATZ, 1899 (*Tenerus*)  
(l.c., 104)

Holotypus, N. Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT; im DEI [1896, Coll. KRAATZ].

**togonis** SCHENKLING, 1906 (*Phloeocopus*)  
(l.c., 258)

Holotypus, mehrere Paratypen, Togo, im DEI.  
DEI: Holotypus, Togo, Coll. KRAATZ.

**tomentosus** SCHENKLING, 1906 (*Clerus*)  
(l.c., 275—276)

Holotypus, mehrere Paratypen, Central-Cordillere, unt. Salento, Muzo, im DEI.  
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

**tricolor** SCHENKLING, 1902 (*Ommadius*)  
(l.c., 158—159)

Mehrere Syntypen, Sumatra, Palembang, Java, in Coll. GRANDJEAN, Coll. SCHENKLING und im Museum Leiden.  
DEI: 1 Syntypus, Sumatra, Palembang, Coll. SCHENKLING.  
Syn. zu *ustulatus* GORHAM, 1878.

**tricolor** SCHENKLING, 1908 (*Orthrius*)  
(l.c., 479)

Holotypus, Queensland, leg. SCHNEIDER, im DEI [1906].

**trinotatus** SCHENKLING, 1916 (*Tenerus*)  
(Ent. Mitt. 5, 150)

Holotypus, Togo, im DEI [durch LUDWIG].

**tuberculatus** GORHAM, 1882 (*Clerus*)  
(Biol. Centr.-Amer. 3 (2), 153, Taf. 8, Fig. 20)

Mehrere Syntypen; Mexico, Cordova, leg. SALLÉ; Guatemala, Cerro Zunil, Capetillo, Aceituno, leg. CHAMPION.  
DEI: 1 Syntypus, Cerro Zunil, 4—5000 ft., leg. CHAMPION, Coll. SCHENKLING.

**tuberculatus** SCHENKLING, 1906 (*Neoclerus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 278—279)

Holotypus, Ceylon, leg. LEWIS, im DEI [Coll. KRAATZ].

**tuberculatus** SCHENKLING, 1906 (*Neotenerus*)  
(l.c., 309)

Holotypus, mehrere Paratypen, Brasilien, Jatahy, Paraguay; im DEI.  
DEI: Holotypus, Bresil., Prov. Goyaz, Jatahy, IX.—XI., Coll. SCHENKLING; 2 Ex. dto., Coll. SCHENKLING und Coll. KRAATZ; 1 Ex. Paraguay, 188., leg. DRAKE, Coll. KRAATZ: Paratypen.

**tuberculicollis** CHEVROLAT, 1874 (*Opilo*)  
(Rev. Mag. Zool., 284—285)

Mehrere Syntypen, Africa Australi, Natal, in Coll. CHEVROLAT.  
DEI: 1 Syntypus, Afr. mer. (Fundort nicht lesbar!), durch CHEVROLAT, Coll. KRAATZ.  
Syn. zu *nodicollis* BOHEMAN, 1851.

**tuberculicollis** SCHENKLING, 1902 (*Orthrius*)  
(Bull. Mus. Paris 8, 323)

Mehrere Syntypen, Dardjiling, 1890, leg. HARMAND, im Museum Paris.  
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

**tuberculipenne** SCHENKLING, 1900 (*Pelonium*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 406)

Mehrere Syntypen, Chile, Coll. KRAATZ und Coll. SCHENKLING.  
DEI: 3 Ex. Chile, durch SCHRÖDER, 4 Ex. Chile; Coll. SCHENKLING, Syntypen.  
Syn. zu *insignicornis* FAIRMAIRE, 1861.

**tucumanensis** SCHENKLING, 1908 (*Platynopitera*)  
(l.c., 703—704)

1 Ex. Argentina, Prov. Tucuman, bei Tapia, 1903, leg. BAER, via PIC an DEI; 1 Ex. Tucuman, leg. BRUCH, im La Plata-Museum; Syntypen.  
DEI: 1 Syntypus, Argentine, Prov. Tucuman, Tapia, 600 m, 3. IV. 1903, leg. BAER, Coll. PIC, 1906 — Coll. SCHENKLING.

**tugelanus** GORHAM, 1900 (*Trichodes*)  
(Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 5, 72—74)

3 Syntypen, Natal, Tugela River, Weenen, 1896, leg. MARSHALL.  
DEI: 1 Syntypus, Natal, Weenen, durch GORHAM, Coll. SCHENKLING.

**umbratus** SCHENKLING, 1912 (*Xenororthrius*)  
(Ent. Mitt. 1, 325—326)

Mehrere Syntypen, Formosa, Kosempo, IX. 1911/V. 1912, Kankau, IV.—V. 1912, leg. SAUTER.  
DEI: Syntypen, Formosa, leg. SAUTER: 5 Ex. Kosempo, 7. IX. 1909 (Datum nicht erwähnt!), 7. IX. 1911; 6 Ex. Kankau, Kosum, IV., V. 1912.

**uncinatus** SCHENKLING, 1907 (*Clerus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 312)

Mehrere Syntypen, Amazon, leg. BATES, im Britischen Museum und DEI.  
DEI: 1 Syntypus, Amazon, leg. BATES, 1906, ex Britisches Museum.

**undatus** SCHENKLING, 1899 (*Ommadius*)  
(Ann. Mus. Genova (2) 20, 343–344)

Mehrere Syntypen, Sumatra, Si-Rambé, 1890–91, leg. MODIGLIANI, im Museum Genua.  
DEI: 2 Syntypen, Sumatra, Si-Rambé, XII. 1890–III. 1891, leg. MODIGLIANI, Coll. SCHENKLING.

**ungulatus** ELSTON, 1922 (*Phlogistus*)  
(Trans. Proc. R. Soc. S. Austr. 46, 314)

Holotypus, mehrere Paratypen, Western Australia, Swan River, leg. CLARK, in Coll. ELSTON.  
DEI: 2 Paratypen, W. Australia, Swan R., leg. CLARK.

**unifasciata** SCHENKLING, 1900 (*Priocera*)  
(Mitt. Mus. Hamburg 15, 4, Separat)

Mehrere Syntypen, Brasilia, Lages, im Museum Hamburg.  
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

**unifasciata** PIC, 1953 (*Thriocera*)  
(Beitr. Ent. 3, 321)

Holotypus, Ost-Afrika, Myombe, III. 1914, leg. METHNER, im DEI [10.–16. III.].

**unifasciatum** KRAATZ, 1899 (*Microstigmatium*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 100)

Holotypus, Togo, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ; im DEI.

**unimaculata** PIC, 1940 (*Lebasiella*)  
(Echange 56, Nr. 481, 10–11)

Mehrere Syntypen, Mexico, im DEI und in Coll. PIC.  
DEI: 1 Syntypus, Mexico, Tasco, durch HOEGE.

**unimaculata** PIC, 1953 (*Strotocera*)  
(Beitr. Ent. 3, 320)

Holotypus, West-Afrika, Togogebiet, durch STAUDINGER & BANG-HAAS, im DEI.

**unistriatus** SCHENKLING, 1906 (*Opilo*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 260–261)

Holotypus, mehrere Paratypen, Pondicherry, im DEI.  
DEI: Holotypus, 2 Paratypen, Pondicherry, durch STAUDINGER.

**validus** SCHENKLING, 1915 (*Tillus*)  
(Ent. Mitt. 4, 109)

Holotypus, Südafrika, Rhodesia, Plumtree, im DEI.

**varicollis** SCHENKLING, 1906 (*Ichnea*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 310–311)

Holotypus, mehrere Paratypen, Brasilien, Jatahy, im DEI.  
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, Brasilien, Goyaz, leg. DONCKIER, Coll. SCHENKLING.

**ventralis** SCHENKLING, 1908 (*Ommadius*)  
(I.c., 485–486)

Mehrere Syntypen, Nord-Kanara, Basti, Bombay, 2500 ft., leg. BELL und leg. ANDREWES, im DEI.  
DEI: 2 Syntypen, Nord-Kanara, Basti, Bombay, leg. ANDREWES.

**vicinus** SCHENKLING, 1899 (*Ommadius*)  
(Ann. Mus. Genova (2) 20, 341–342)

Mehrere Syntypen, Ins. Mentawai, Sipora, 1894, leg. MODIGLIANI, im Museum Genua.  
DEI: 1 Syntypus, Mentawai, Sipora, Sereinu, V.–VI. 1894, leg. MODIGLIANI, Coll. SCHENKLING.

**villosa** SCHENKLING, 1908 (*Hydnocera*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 702)

Mehrere Syntypen, Mexiko, San Isidro, leg. HÖGE, im Britischen Museum und DEI.  
DEI: 2 Syntypen, Mexiko, San Isidro, leg. HÖGE.

**violaceipennis** SCHENKLING, 1912 (*Allochotes*)  
(Ent. Mitt. 1, 328)

Holotypus, Formosa, Kankau, IV. 1912, leg. SAUTER; im DEI [Koshun].

**viridescens** PIC, 1947 (*Prosymnus*)  
(Divers. Ent. 1, 5)

Mehrere Syntypen, Tanganjika.  
DEI: 1 Syntypus, D.O.A., Tanganjika, STAUDINGER & BANG-HAAS dedic.

**viridicollis** SCHENKLING, 1899 (*Chlorocnemis*)  
(Ann. Mus. Genova (2) 20, 140–141)

Mehrere Syntypen, Brit. Neu Guinea; Ighibirei, Kapakapa, 1890–91, leg. LORIA; Fly River, 1876–77, leg. D'ALBERTIS;  
im Museum Genua.  
DEI: 1 Syntypus, N. Guinea, Ighibirei, VII.–VIII. 1890, leg. LORIA, Coll. SCHENKLING.

**viridis** SCHENKLING, 1915 (*Cyclotomocerus*)  
(Ent. Mitt. 4, 317)

Syntypen: 2 Ex. Nord-Queensland, Kuranda, ex Coll. HACKER; 1 Ex. dto., via DODD an SCHENKLING; im DEI.  
DEI: 2 Syntypen, Kuranda, VII. 1905, Coll. HACKER.

**vitticeps** KRAATZ, 1899 (*Tenerus*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 104)

Holotypus, N. Kamerun, Joh. Albrechts-Höhe, leg. CONRADT; im DEI [1896, Coll. KRAATZ].

**vitticollis** SCHENKLING, 1906 (*Epiphloeus*)  
(l.c., 299)

Holotypus, mehrere Paratypen, Amazon, im DEI.  
DEI: Holotypus, 3 Paratypen, Amazon, Coll. KRAATZ.

**vitticollis** KRAATZ, 1899 (*Tenerus*)  
(l.c., 103; nom. praeocc. = *conradti* LOHDE, 1899, Ent. Nachr. 25, 305)

Holotypus, Togo, leg. CONRADT; im DEI [Coll. KRAATZ].

**vittipenne** SCHENKLING, 1906 (*Pelonium*)  
(l.c., 316)

Holotypus, mehrere Paratypen; Argentinien, Tucuman; Paraguay; im DEI.

DEI: Holotypus, Argentinien, Tucuman, leg. DONCKIER, Coll. KRAATZ; 2 Ex. dto., 1 Ex. Paraguay, leg. KRAATZ, Coll. KRAATZ; 1 Ex. dto., leg. DRAKE, 188.: Paratypen.

**wagneri** SCHENKLING, 1926 (*Opetiopalpus*)  
(Col. Centralbl. 1, 102)

Mehrere Syntypen, Hispania centr., Aragonien, Hochplateau bei Albarracin, 1200 m, leg. WAGNER.  
DEI: 2 Syntypen, Hispania, Aragon., Umgeb. Albarracin, 1200 m, VI.—VII. 1925.

**weyersii** KRAATZ, 1899 (*Cladiscus*)  
(Ann. Soc. Ent. Belg. 43, 213—214)

Holotypus, Südwest Sumatra, leg. WEYERS; im DEI.

**wokanensis** SCHENKLING, 1899 (*Ommadius*)  
(Ann. Mus. Genova (2) 20, 148)

Mehrere Syntypen, Ins. Aru, Wokan, 1873, leg. BECCARI, im Museum Genua.  
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. SCHENKLING.

**yunnensis** SCHENKLING, 1908 (*Allochotes*)  
(Dtsch. Ent. Ztschr., 702—703)

Mehrere Syntypen, Yunnan, leg. DONCKIER, im DEI.  
DEI: 3 Syntypen, Yunnan, leg. DONCKIER.

### Wahrscheinlich nicht beschriebene Arten

**bakeri** SCHENKLING (*Dasycoelcerus*)

DEI: 3 Typen, Los Banos, P. I., leg. BAKER.

**bipartitus** SCHENKLING (*Galeruclerus*)

DEI: 1 Typus, Brasilien, Mar de Hespanha, 14. XI. 1905.

**curvifasciata** LEA (*Allelidea*)

DEI: 1 Typus, W. Australia, Coll. HACKER.

**italicus** OBENBERGER (*Tillus*)

DEI: 1 Typus, Calabria, Aspromonte, leg. PAGANETTI, Coll. LEONHARD.

**mundum** SCHENKLING (*Pelonium*)

DEI: 1 Typus, Argentina, Pr. Santiago d. Estero, leg. BRUCH, 190.

**plagiatus** SCHENKLING (*Epiphloeus*)

DEI: 2 Typen, Brazil, Minas, Passa Quatro, Faz. dos Campos, 4. XII. 1915/2. I. 1918, leg. ZIKÁN.

**zikani** SCHENKLING (*Galeruclerus*)

DEI: 3 Typen, Brasilien, Mines, Passa Quetro, 7. XII. 1920, leg. ZIKÁN.

**virescens** SCHENKLING (*Ommadius*)

DEI: 1 Type, Sumatra, Liangagas, leg. DOHRN, Coll. SCHENKLING.

### Lymexylonidae

**ater** KRAATZ, 1895 (*Atractocerus*)

(Dtsch. Ent. Ztschr., 163)

♂ Holotypus, Togo; im DEI [leg. CONRADT, Coll. KRAATZ].

Nach KRAATZ ist der Holotypus ein ♂, er wurde jedoch vom Spezialisten WHEELER bei seiner Revision als ♀ ausgezeichnet.  
Syn. zu *brevicornis* LINNÉ, 1766.

**procerus** SCHENKLING, 1914 (*Atractocerus*)  
(Ent. Mitt. 3, 319–320)

1 Ex. Brasilia, Corumba, Coll. RICHTER, im DEI; 1 Ex. Süd-Brasilien, Porto Alegre, im Museum Dresden; 1 Ex. Cayenne, Demerara, im Britischen Museum: Syntypen.  
DEI: 1 ♀, Syntypus, Brazil, Corumba, Ato Paraguay, Coll. RICHTER.

### Derodontidae

**erichsoni** ROSENHAUER, 1846 (*Laricobius*)  
(*Broscosoma* und *Laricobius*, zwei neue Käfergatt. 7, Tab. f (II) A – L)

Mehrere Syntypen, Tyrol, Gschnitzer Thal bei Steinach, 30. VII.–6. VIII., 3200 ft.; Katharinenberg bei Wunsiedel im Fichtelgebirge, A. IX.; leg. ROSENHAUER.  
DEI: 1 Syntypus, Tyrol, Coll. STIERLIN.

**sahlbergi** REITTER, 1883 (*Laricobius*)  
(Rev. mens. Ent. 1, 42)

Mehrere Syntypen, Sibiria arctica, Fatjanowsk, leg. SAHLBERG.  
DEI: 1 Syntypus, Sibir. arct., leg. SAHLBERG, Coll. STIERLIN.

### Zusammenfassung

Vorliegender Katalog beinhaltet die Coleopteren-Typen (XX), die in den Sammlungen der Abteilung Taxonomie der Insekten des Institutes für Pflanzenschutzforschung, Bereich Eberswalde (ehemals Deutsches Entomologisches Institut), aufbewahrt werden.

### Summary

The present catalogue contains the types of Coleoptera (XX) that are preserved in the collections of the Department of Taxonomy of Insects in the Eberswalde branch of the Institute of Plant Protection Research (former Deutsches Entomologisches Institut).

### Резюме

Данный каталог содержит типы Coleoptera (XX), хранящиеся в коллекциях отдела таксономии насекомых при Научно-исследовательском институте защиты растений, Эберсвальдский филиал (бывший Немецкий энтомологический институт).

## Besprechungen

**Immunology of Human Infection. Part II: Viruses and Parasites; Immunodiagnosis and Prevention of Infectious Diseases.** (Comprehensive Immunology, Vol. 9). Herausgeber: NAHMIAS, A. J. & O'REILLY, R. J. PLenum MEDICAL BOOK COMPANY, New York – London. 1982; 19,5 × 25,8 cm; xxvii + 603 S., illus. Preis 45,00 U.S.\$.

Ausgehend von der Tatsache, daß das Stadium der Infektion nicht ohne die Untersuchung der Immunität vorangebracht werden kann, ist dieser Band dem Komplex der Wechselbeziehungen zwischen Mikrobiologie und Immunologie gewidmet. Namhafte Experten erörtern die allgemeinen Aspekte der gegenseitigen Beeinflussung von Wirt und infektiös wirkenden Kräften, der Immundiagnose, Immunitätsverhinderung und der Infektion in speziellen Wirten. Es werden detaillierte Angaben zu den spezifischen, infektiös wirkenden Kräften mitgeteilt einschließlich Bakterien, Mycoplasmen, Chlamydiae, Pilze, Virusen und Parasiten. Mit diesem Inhalt, gegliedert in 23 Hauptkapitel, spricht der Band nicht nur die Forschungen auf dem Gebiet der Infektionskrankheiten an, sondern ebenso die der Mikrobiologie und Immunologie. MORGE

**Flies of the Nearctic Region.** (Herausgeber: G. C. D. GRIFFITHS). E. SCHWEIZERBART'sche Verlagsbuchhandlung (NÄGELE und OBERMILLER), Stuttgart. 17,3 × 24,5 cm. Volume V: Homeodactyla and Asilomorpha  
Part 13, Number 1 (1980): HALL, J. C. & EVENHUIS, N. L.: Bombyliidae. 96 S., Fig. 1–73.

Die Bearbeitung der nearktischen Bombyliidae reicht in der exzellenten Gründlichkeit dieser Publikationsserie von der Bestimmungstabelle der Unterfamilien, der der nearktischen Gattungen der Bombyliinae bis zur Revision des Genus *Bombylius*. Der Teil endet im Bestimmungsschlüssel der *Bombylius*-Arten. MORGE

Pott, E. Wald und Forst. Pflanzen und Tiere nach Farbfotos bestimmen. Reihe BLV Naturführer 121. BLV Verlags-gesellschaft, München – Wien – Zürich. 1981; 11,7 × 17,8 cm, 128 S., 149 Farbphotos, 3 Zeichnungen. Preis 80,00 ö. S.

In der Reihe „BLV Naturführer“ ist nach den Bänden „Strand + Küste“ und „Bach – Fluß – See“ hiermit nun der dritte Biotopführer erschienen. Mit diesem wird nicht ein weiterer Beitrag zur Diskussion über die Situation der Wälder geliefert, in diesem Taschenbuch geht es vielmehr um die rein informative Darstellung des Lebensraumes Wald und seiner Bewohner. Es vermittelt damit primär die Grundlagen der Artenkenntnis, die Voraussetzung ist für die weitere Beschäftigung mit diesem Thema. – In der praxisbezogenen Konzeption dieser Serie mit ihrer Fülle von Informationen, ausgezeichnet durch die Handlichkeit des Bändchens, werden auf 149 hervorragenden Farbphotos die Pflanzen- und Tierarten der Wälder vorgestellt. Ergänzende Texte beschreiben Merkmale, Vorkommen, Lebensweise und Ökologie. Die Einleitung beinhaltet die Waldtypen Europas, einen Abriss zur Waldgeschichte, Ökologie und Funktion des Waldes sowie der Waldbewirtschaftung. MORGE