

Institut für Pflanzenschutzforschung
der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR
Bereich Eberswalde
Abteilung Taxonomie der Insekten
Eberswalde-Finow (DDR)

LOTHAR DIECKMANN

Ergebnisse der Albanien-Expedition 1961 des Deutschen Entomologischen Institutes

98. Beitrag

Coleoptera: Curculionidae

In dieser Arbeit werden 599 Exemplare aus 153 Arten der Familie der Rüsselkäfer erfaßt. Einige wenige Käfer wurden von Dr. U. SCHEIDING 1958 und von Dr. E. KÖNIGSMANN 1959 auf Touristenreisen in Albanien erbeutet. Alle anderen Exemplare wurden 1961 von den drei Teilnehmern der Albanien-Expedition des ehemaligen Deutschen Entomologischen Institutes (Dr. G. FRIESE, Dr. E. KÖNIGSMANN, J. SCHULZE) gesammelt. Die Determination von fünf *Otiorhynchus*-Arten wurde freundlicherweise von J. FREMUTH (Hradec Králové, ČSSR) übernommen, dem ich an dieser Stelle noch einmal besonders danke.

Die Mehrzahl der Arten ist in Europa weit verbreitet oder besiedelt außerdem asiatische und nordafrikanische Gebiete der paläarktischen Region. Nur 17 Spezies sind in ihrer Verbreitung auf die Balkanhalbinsel beschränkt; davon kommen acht ausschließlich in Albanien vor. Diese endemischen Arten sind meist flugunfähig und gehören vorwiegend in die Unterfamilien Otiorhynchinae und Brachyderinae.

Das System des WINKLER-Katalogs wurde — mit Ausnahme weniger Spezies — als Grundlage für die Anordnung der Gattungen und Arten genommen.

Coenorhinus germanicus (HERBST, 1797)

Verbreitung: Europa, Vorder- und Mittelasien, Sibirien, Mongolei.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Tirana, 9.—12. V. 61, DEI.

Coenorhinus aequatus (LINNÉ, 1767)

Verbreitung: Europa, Vorderasien, Mittelasien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Bizë bei Shëngjergji, 10.—15. VII. 61, DEI.

Rhynchites hungaricus (HERBST, 1784)

Verbreitung: Südöstliches Mitteleuropa bis Vorderasien.

Untersuchtes Material: 4 Exemplare

1 Ex. Mali me Gropë, Livadhet e Selitës, Wiese, 1000—1100 m, 3.—8. VII. 61, DEI;

2 Ex. Pogradec, Ohrida-See, 700—1000 m, 20. VI. 1959, leg. KÖNIGSMANN, DEI.

Rhynchites aethiops BACH, 1854

Verbreitung: Frankreich, Mittel-, Süd-, Ost- und Südosteuropa, Vorderasien.

Untersuchtes Material: 3 Exemplare

1 Ex. Mali me Gropë, Livadhet e Selitës, Wiese, 1000—1100 m, 3.—8. VII. 61, DEI;

2 Ex. Bizë bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10.—15. VII. 61, DEI.

Rhynchites bacchus (LINNÉ, 1758)

Verbreitung: West-, Mittel-, Süd- und Osteuropa, Vorder- und Mittelasien, Westsibirien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Borshi südl. Vlora, Litorale Terrasse mit *Olea* u. *Ficus*, 50—150 m, 14.—27. V. 61, DEI.

***Apoderus coryli* (LINNÉ, 1758)**

Verbreitung: Europa, Vorderasien, Sibirien, China.

Untersuchtes Material: 3 Exemplare

3 Ex. Nordalban. Alpen, Shalabach-Tal bei Thethi, 900–1200 m, 1.–4. VIII. 61, DEI.

***Apion violaceum* KIRBY, 1808**

Verbreitung: Paläarktische Region.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

1 Ex. Tirana, 9.–12. V. 61, DEI;

1 Ex. Mali me Gropë, Livadhet e Selitës, Wiese, 1000–1100 m, 3.–8. VII. 61, DEI.

***Apion affine* KIRBY, 1808**

Verbreitung: Europa, Vorderasien.

Untersuchtes Material: 4 Exemplare

3 Ex. Bizë bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400–1500 m, 10.–15. VII. 61, DEI;

1 Ex. Lurja östl. Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen, 1300 m, 19.–24. VII. 61, DEI.

***Apion oblongum* GYLLENHAL, 1839**

Verbreitung: Mittel- und Osteuropa, Vorder- und Mittelasien, Mittelsibirien, Mongolei.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Bizë bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400–1500 m, 10.–15. VII. 61, DEI.

***Apion tubiferum* GYLLENHAL, 1833**

Verbreitung: Europäische Mittelmeerländer, Syrien, Algerien.

Untersuchtes Material: 6 Exemplare

1 Ex. Lukova nördl. Saranda, 250 m, 24. V. 61, DEI;

5 Ex. Poliçan westl. Tomor, *Arbutus-Phillyrea*-Macchie, 500 m, 2.–12. VI. 61, DEI.

***Apion malvae* (FABRICIUS, 1775)**

Verbreitung: Paläarktische Region (fehlt in den nördlichen Gebieten).

Untersuchtes Material: 6 Exemplare

3 Ex. Borshi südl. Vloa, Litorale Terrasse mit *Olea* u. *Ficus*, 50–150 m, 14.–27. V. 61, DEI;

3 Ex. Durrësi, Umgeb. von Plazh, Anfang VI. 58, leg. SCHEIDING, DEI.

***Apion rufirostre* (FABRICIUS, 1775)**

Verbreitung: Europa, Nordafrika, Vorder- und Mittelasien.

Untersuchtes Material: 4 Exemplare

1 Ex. Tirana, 9.–12. V. 61, DEI;

2 Ex. Borshi südl. Vloa, Litorale Terrasse mit *Olea* u. *Ficus*, 50–150 m, 14.–27. V. 61, DEI;

1 Ex. Durrësi, Umgeb. von Plazh, Anfang VI. 58, leg. SCHEIDING, DEI.

***Apion aeneum* (FABRICIUS, 1775)**

Verbreitung: Paläarktische Region.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

2 Ex. Durrësi, Umgeb. von Plazh, Anfang VI. 58, leg. SCHEIDING, DEI.

***Apion radiolus* KIRBY, 1808**

Verbreitung: Paläarktische Region.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

2 Ex. Durrësi, Umgeb. von Plazh, Anfang VI. 58, leg. SCHEIDING, DEI.

***Apion frumentarium* (PAYKULL, 1792)**

Verbreitung: Europa, Vorderasien, Nordafrika.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

1 Ex. Bizë bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400–1500 m, 10.–15. VII. 61, DEI;

1 Ex. Lurja östl. Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen, 1300 m, 19.–24. VII. 61, DEI.

***Apion semivittatum* GYLLENHAL, 1833**

Verbreitung: Europa (fehlt im Norden), Vorderasien, westliches Nordafrika.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Borshi südl. Vloa, Litorale Terrasse mit *Olea* u. *Ficus*, 50–150 m, 14.–27. V. 61, DEI.

***Apion urticarium* (HERBST, 1784)**

Verbreitung: Europa, Vorder- und Mittelasien, Ostsibirien.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

2 Ex. Borshi südl. Vloa, Litorale Terrasse mit *Olea* u. *Ficus*, 50–150 m, 14.–27. V. 61, DEI.

***Apion vicinum* KIRBY, 1808**

Verbreitung: Europa, Algerien, Vorder- und Mittelasien, Sibirien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Lurja östl. Kurbneshi, Maja e Madhe, 1400–1789 m, 19.–24. VII. 61, DEI.

***Apion atomarium* KIRBY, 1808**

Verbreitung: Europa, Algerien, Anatolien, Kaukasus, Mongolei.

Untersuchtes Material: 17 Exemplare

1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.–22. VI. 61, DEI;

1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI.–2. VII. 61, DEI;

1 Ex. Bizë bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400–1500 m, 10.–15. VII. 61, DEI;

14 Ex. Lurja östl. Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen, 1300 m, 19.–24. VII. 61, DEI.

***Apion oblivium* SCHILSKY, 1902**

Verbreitung: Süd-, Mittel-, Ost- und Südosteuropa, Anatolien.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

2 Ex. Lurja östl. Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen, 1300 m, 19.–24. VII. 61, DEI.

***Apion seniculus* KIRBY, 1808**

Verbreitung: Paläarktische Region.

Untersuchtes Material: 3 Exemplare

2 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250–300 m, 25.–29. VII. 61, DEI;

1 Ex. Nordalban. Alpen, Shalabach-Tal bei Thethi, 900–1200 m, 1.–4. VIII. 61, DEI.

***Apion pubescens* KIRBY, 1811**

Verbreitung: Europa, Vorderasien, Mittelasien, Sibirien, Nordafrika (Marokko, Algerien)

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Bizë bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400–1500 m, 10.–15. VII. 61, DEI.

***Apion confluens* KIRBY, 1808**

Verbreitung: Europa, Vorderasien.

Untersuchtes Material: 7 Exemplare

6 Ex. Borshi südl. Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.–27. V. 61, DEI;

1 Ex. Lukova nördl. Saranda, 250 m, 24. V. 61, DEI.

***Apion detritum* MULSANT et REY, 1859**

Verbreitung: Europa, Vorderasien, Nordafrika.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Dajti, Westhang, 1100 m, 29. VI. 61, DEI.

***Apion onopordi* KIRBY, 1808**

Verbreitung: Europa, Vorder- und Mittelasien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Nordalban. Alpen, Shalabach-Tal bei Thethi, 900–1200 m, 1.–4. VII. 61, DEI.

***Apion penetrans* GERMAR, 1817**

Verbreitung: Europa, Kaukasus, Kasachstan, Marokko, Tunesien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Bizë bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400–1500 m, 10.–15. VII. 61, DEI.

***Apion alliariae* HERBST, 1797**

Verbreitung: Europa, westliches Nordafrika, Anatolien, Transkaukasus.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Mali me Gropë, Rotbuchenbestand mit angrenzender Weide, 1200 m, 3.–8. VII. 61, DEI.

***Apion carduorum* KIRBY, 1808**

Verbreitung: Europa, Nordafrika, Vorder- und Mittelasien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Borshi südl. Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.–27. V. 61, DEI.

***Apion loti* KIRBY, 1808**

Verbreitung: Europa, Vorder- und Mittelasien, Mongolei, Nordafrika.

Untersuchtes Material: 5 Exemplare

1 Ex. Uji Ftohte südl. Tepelena, 200 m, 29.–31. V. 61, DEI;

1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI.–2. VII. 61, DEI;

2 Ex. Mali me Gropë, Livadhët e Selitës, Wiese, 1000–1100 m, 3.–8. VII. 61, DEI;

1 Ex. Nordalban. Alpen, Shalabach-Tal bei Thethi, 900–1200 m, 1.–4. VIII. 61, DEI.

***Apion aeneomicans* WENCKER, 1864**

Verbreitung: Europäische Mittelmeerländer, südöstliches Mittel- und Osteuropa, Algerien.
 Untersuchtes Material: 2 Exemplare
 2 Ex. Polican westl. Tomor, *Arbutus-Phillyrea*-Macchie, 500 m, 2.—12. VI. 61, DEI.

***Apion platalea* GERMAR, 1817**

Verbreitung: Europa (nicht im Norden), Kaukasus.
 Untersuchtes Material: 2 Exemplare
 2 Ex. Mali me Gropë, Livadhet e Selitës, Wiese, 1000—1100 m, 3.—8. VII. 61, DEI.

***Apion gyllenhali* KIRBY, 1808**

Verbreitung: Europa, Kaukasus, Mittelasien, Sibirien.
 Untersuchtes Material: 1 Exemplar
 1 Ex. Borshi südl. Vlorë, Litorale Terrasse mit *Olea* u. *Ficus*, 50—150 m, 14.—27. V. 61, DEI.

***Apion columbinum* GERMAR, 1817**

Verbreitung: Europa, Vorderasien, Mittelasien, Sibirien.
 Untersuchtes Material: 2 Exemplare
 2 Ex. Mali me Gropë, Livadhet e Selitës, Wiese, 1000—1100 m, 3.—8. VII. 61, DEI.

***Apion facetum* GYLLENHAL, 1839**

Verbreitung: Europa, Vorderasien, Mittelasien, Sibirien, Mongolei.
 Untersuchtes Material: 3 Exemplare
 2 Ex. Borshi südl. Vlorë, SW-Hang, mit *Pistacia lentiscus*, *Phlomis fruticosa*, 200—400 m, 14.—27. V. 61; DEI;
 1 Ex. Borshi südl. Vlorë, Litorale Terrasse mit *Olea* u. *Ficus*, 50—150 m, 14.—27. V. 61, DEI.

***Apion ononis* KIRBY, 1808**

Verbreitung: Europa, Vorderasien, Nordafrika.
 Untersuchtes Material: 2 Exemplare
 1 Ex. Dajti, Westhang, 1100 m, 29. VI. 61, DEI;
 1 Ex. Mali me Gropë, Livadhet e Selitës, Wiese, 1000—1100 m, 3.—8. VII. 61, DEI.

***Apion viciae* (PAYKULL, 1800)**

Verbreitung: Paläarktische Region.
 Untersuchtes Material: 4 Exemplare
 1 Ex. Borshi südl. Vlorë, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 61, DEI;
 1 Ex. Uji Ftohte südl. Tepelena, 200 m, 29.—31. V. 61, DEI;
 2 Ex. Dajti, Südhang — Wiese, 900 m, 30. VI. 61, DEI.

***Apion virens* HERBST, 1797**

Verbreitung: Gesamte Paläarktis.
 Untersuchtes Material: 2 Exemplare
 2 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25.—29. VII. 61, DEI.

***Apion cerdo* GERSTAECKER, 1854**

Verbreitung: Europa, Vorder- und Mittelasien, Mittel- und Ostsibirien, Mongolei, Nordostchina.
 Untersuchtes Material: 2 Exemplare
 1 Ex. Borshi südl. Vlorë, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 61, DEI;
 1 Ex. Borshi südl. Vlorë, Litorale Terrasse mit *Olea* u. *Ficus*, 50—150 m, 14.—27. V. 61, DEI.

***Apion flavipes* (PAYKULL, 1792)**

Verbreitung: Gesamte Paläarktis.
 Untersuchtes Material: 23 Exemplare
 4 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 61, DEI;
 6 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI.—2. VII. 61, DEI;
 11 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25.—29. VII. 61, DEI;
 1 Ex. Nordalban. Alpen, Shalabach-Tal bei Thethi, 900—1200 m, 1.—4. VIII. 61, DEI;
 1 Ex. Durrësi Umgeb. von Plazh, Anfang VI. 58, leg. SCHRÖDING, DEI.

***Apion nigratarse* KIRBY, 1808**

Verbreitung: Europa, Vorder- und Mittelasien, Sibirien, Nordafrika.
 Untersuchtes Material: 4 Exemplare
 1 Ex. Borshi südl. Vlorë, Litorale Terrasse mit *Olea* u. *Ficus*, 50—150 m, 14.—27. V. 61, DEI;
 1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 61, DEI;
 1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI.—2. VII. 61, DEI;
 1 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25.—29. VII. 61, DEI.

***Apion trifolii* (LINNÉ, 1768)**

Verbreitung: Europa, Vorder- und Mittelasien, Nordafrika.

Untersuchtes Material: 31 Exemplare

6 Ex. Borshi südl. Vlora, Litorale Terrasse mit *Olea* u. *Ficus*, 50–150 m, 14.–27. V. 61, DEI;

6 Ex. Uji Ftohte südl. Tepelena, 200 m, 29.–31. V. 61, DEI;

5 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.–22. VI. 61, DEI;

12 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Luzernefeld, 300 m, 25.–29. VII. 61, DEI;

2 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250–300 m, 25.–29. VII. 61, DEI.

***Apion interjectum* DESBROCHERS, 1895**

Verbreitung: Europa, westliches Nordafrika.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.–22. VI. 61, DEI;

1 Ex. Bizë bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400–1500 m, 10.–15. VII. 61, DEI.

***Apion schoenherri* BOHEMAN, 1839**

Verbreitung: West-, südöstliches Mittel-, Ost- und Südosteuropa, Vorderasien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Borshi südl. Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.–27. V. 61, DEI.

***Apion laevicollae* KIRBY, 1811**

Verbreitung: West-, südöstliches Mittel- und Südosteuropa, Vorderasien, westliches Nordafrika.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Tirana, 9.–12. V. 61, DEI.

***Apion angusticollae* GYLLENHAL, 1833**

Verbreitung: Mittelmeergebiet.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

2 Ex. Borshi südl. Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.–27. V. 61, DEI.

***Apion assimile* KIRBY, 1808**

Verbreitung: Gesamte Paläarktis.

Untersuchtes Material: 5 Exemplare

1 Ex. Borshi südl. Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.–27. V. 61, DEI;

3 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.–22. VI. 61, DEI;

1 Ex. Bizë bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400–1500 m, 10.–15. VII. 61, DEI.

***Apion ononicola* BACH, 1854**

Verbreitung: Europa, Vorderasien, Nordafrika.

Untersuchtes Material: 39 Exemplare

1 Ex. Borshi südl. Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.–27. V. 61, DEI;

1 Ex. Uji Ftohte südl. Tepelena, 200 m, 29.–31. V. 61, DEI;

15 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.–22. VI. 61, DEI;

7 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI.–2. VII. 61, DEI;

1 Ex. Dajti, Westhang, 1100 m, 29. VI. 61, DEI;

12 Ex. Dajti, Südhang — Wiese, 900 m, 30. VI. 61, DEI;

1 Ex. Mali me Gropë, Livadhet e Selitës, Wiese, 1000–1100 m, 3.–8. VII. 61, DEI;

1 Ex. Nordalban. Alpen, Shalabach-Tal bei Thethi, 900–1200 m, 1.–4. VIII. 61, DEI.

***Apion difforme* GERMAR, 1818**

Verbreitung: Westeuropa, Italien, Südosteuropa, Syrien, westliches Nordafrika.

Untersuchtes Material: 3 Exemplare

1 Ex. Borshi südl. Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.–27. V. 61, DEI;

1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI.–2. VII. 61, DEI;

1 Ex. Dajti, Südhang — Wiese, 900 m, 30. VI. 61, DEI.

***Brachycerus undatus* FABRICIUS, 1798**

Verbreitung: Europäische Mittelmeerländer, Balkanhalbinsel, Algerien.

Untersuchtes Material: 3 Exemplare

3 Ex. Borshi südl. Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.–27. V. 61, DEI.

***Otiorhynchus meriditanus* APFELBECK, 1907**

Verbreitung: Albanien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Lurja östl. Kurbneshti, Kunora e Lurës, 1400–2000 m, 19.–24. VII. 61, DEI (FREMUTH det.).

***Otiorhynchus rugosostriatus* (GOEZE, 1777)**

Verbreitung: Europa, Kaukasus, Nordafrika.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

2 Ex. Borshi südl. Vlora, Litorale Terrasse mit *Olea* u. *Ficus*, 50–150 m, 14.–27. V. 61, DEI.

Otiorhynchus corruptor (HOST, 1789)

Verbreitung: Italien, Balkanhalbinsel, Anatolien.

Untersuchtes Material: 3 Exemplare

2 Ex. Borshi südl. Vlorë, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 61, DEI;

1 Ex. Borshi südl. Vlorë, Litorale Terrasse mit *Olea* u. *Ficus*, 50—150 m, 14. —27. V. 61, DEI.

Otiorhynchus albanicus APFELBECK, 1907

Verbreitung: Albanien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Bizë bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10.—15. VII. 61, DEI (FREMUTH det.).

Otiorhynchus inunctus STIERLIN, 1861

Verbreitung: Jugoslawien, Bulgarien, Albanien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Mali me Gropë, Livadhet e Selitës, Wiese, 1000—1100 m, 3.—8. VII. 61, DEI.

Otiorhynchus tumidipes STIERLIN, 1861

Verbreitung: Jugoslawien, Albanien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Nordalban. Alpen, Shalabach-Tal bei Thethi, 900—1200 m, 1.—4. VIII. 61, DEI (FREMUTH det.).

Otiorhynchus anatolicus BOHEMAN, 1843

Verbreitung: Albanien, Griechenland, Türkei (europäischer Teil und Anatolien).

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Borshi südl. Vlorë, SW-Hang, mit *Pistacia lentiscus*, *Phlomis fruticosa*, 200—400 m, 14.—27. V. 61, DEI (FREMUTH det.).

Otiorhynchus ligustici (LINNÉ, 1758)

Verbreitung: Europa, Vorder- und Mittelasien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Tomor, Kloster Abbas Ali, 1800 m, 8.—10. VI. 61, DEI.

Otiorhynchus krueperi ssp. *tomoricensis* LONA, 1922

Verbreitung: Albanien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Tomor, Abbas Ali, Gipfel, 2401 m, 8.—10. VI. 61, DEI (FREMUTH det.).

Trachyploeus spec. aff. *bosnicus* APFELBECK, 1898

Verbreitung: Albanien.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

2 Ex. Bizë bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10.—15. VII. 61, DEI.

Argoptochus bisignatus (GERMAR, 1824)

Verbreitung: Italien, Jugoslawien, Albanien.

Untersuchtes Material: 6 Exemplare

6 Ex. Mali me Gropë, Dolinengebiet, 1350 m, 6. VII. 61, DEI.

Phyllobius oblongus (LINNÉ, 1758)

Verbreitung: Europa, Sibirien.

Untersuchtes Material: 3 Exemplare

3 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25.—29. VII. 61, DEI.

Phyllobius maculicornis GERMAR, 1824

Verbreitung: Europa, Sibirien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Tomor, Kloster Abbas Ali, 2000 m, 8.—10. VI. 61, DEI.

Phyllobius argentatus (LINNÉ, 1758)

Verbreitung: Paläarktische Region.

Untersuchtes Material: 9 Exemplare

5 Ex. Mali me Gropë, Rotbuchenbestand mit angrenzender Weide, 1200 m, 3.—8. VII. 61, DEI;

2 Ex. Bizë b. Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10.—15. VII. 61, DEI;

1 Ex. Lurja östl. Kurbneshi, Lan Lura, Geröllhang in *Fagus-Abies*-Wald, 1350 m, 19.—24. VII. 61, DEI;

1 Ex. Lurja östl. Kurbneshi, Kunora e Lurës, 1400—2000 m, 19.—24. VII. 61, DEI.

***Phyllobius seladonius* BRULLÉ, 1832**

Verbreitung: Südöstliches Mittel-, Ost- und Südosteuropa.
 Untersuchtes Material: 1 Exemplar
 1 Ex. Uji Ftohte südl. Tepelena, 200 m, 29. — 31. V. 61, DEI.

***Phyllobius betulae* (FABRICIUS, 1801)**

Verbreitung: Mittel-, Süd- und Südosteuropa, Kaukasus.
 Untersuchtes Material: 4 Exemplare
 3 Ex. Dajti, Südhang — Wiese, 900 m, 30. VI. 61, DEI;
 1 Ex. Bizë bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10. — 15. VII. 61, DEI.

***Polydrusus pinicola* KIESENWETTER, 1864**

Verbreitung: Jugoslawien, Bulgarien, Albanien, Griechenland.
 Untersuchtes Material: 3 Exemplare
 2 Ex. Lurja östl. Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen, 1300 m, 19. — 24. VII. 61, DEI;
 1 Ex. Lurja östl. Kurbneshi, Lan Lura, Geröllhang in *Fagus-Abies*-Wald, 1350 m, 19. — 24. VII. 61, DEI.

***Polydrusus cervinus* (LINNÉ, 1758)**

Verbreitung: Europa, Sibirien.
 Untersuchtes Material: 2 Exemplare
 2 Ex. Poliqan westl. Tomor, *Arbutus-Phillyrea*-Macchie, 500 m, 2. — 12. VI. 61, DEI.

***Polydrusus picus* (FABRICIUS, 1792)**

Verbreitung: Mittel- und Südosteuropa, Kleinasien.
 Untersuchtes Material: 1 Exemplar
 1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17. — 22. VI. 61, DEI.

***Polydrusus tibialis* GYLLENHAL, 1834**

Verbreitung: Südöstliches Mittel-, Süd- und Südosteuropa, Vorderasien.
 Untersuchtes Material: 20 Exemplare
 1 Ex. Borshi südl. Vlorë, Litorale Terrasse mit *Olea* u. *Ficus*, 50—150 m, 14. — 27. V. 61, DEI;
 5 Ex. Borshi südl. Vlorë, Flußtal des Lumi i Borshit, 14. — 27. V. 61, DEI;
 2 Ex. Uji Ftohte südl. Tepelena, 200 m, 29. — 31. V. 61, DEI;
 2 Ex. Poliqan westl. Tomor, Kulturland, 500 m, 2. — 12. VI. 61, DEI;
 7 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI. — 2. VII. 61, DEI;
 3 Ex. Dajti, Südhang — Wiese, 900 m, 30. VI. 61, DEI.

***Polydrusus dorsualis* GYLLENHAL, 1840**

Verbreitung: Griechenland, Albanien.
 Untersuchtes Material: 4 Exemplare
 4 Ex. Borshi südl. Vlorë, Litorale Terrasse mit *Olea* u. *Ficus*, 50—150 m, 14. — 27. V. 61, DEI.

***Polydrusus thalassinus* GYLLENHAL, 1834**

Verbreitung: Südöstliches Mittel-, Ost- und Südosteuropa.
 Untersuchtes Material: 3 Exemplare
 1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17. — 22. VI. 61, DEI;
 1 Ex. Mali me Gropë, Livadhët e Selitës, Wiese, 1000—1100 m, 3. — 8. VII. 61, DEI;
 1 Ex. Nordalban. Alpen, Shalabach-Tal bei Thethi, 900—1200 m, 1. — 4. VIII. 61, DEI.

***Polydrusus apfelbecki* SOLARI, 1926**

Verbreitung: Albanien.
 Untersuchtes Material: 2 Exemplare
 2 Ex. Uji Ftohte südl. Tepelena, 200 m, 29. — 31. V. 61, DEI.

***Polydrusus mollis* (STRÖM, 1768)**

Verbreitung: Europa, Anatolien, Kaukasus, nordöstliches Kasachstan, Sibirien.
 Untersuchtes Material: 1 Exemplar
 1 Ex. Bizë bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10. — 15. VII. 61, DEI.

***Polydrusus hoppei* APFELBECK, 1921**

Verbreitung: Albanien.
 Untersuchtes Material: 2 Exemplare
 2 Ex. Borshi südl. Vlorë, Flußtal des Lumi i Borshit, 14. — 27. V. 61, DEI.

***Sciaphobus rubi* (GYLLENHAL, 1813)**

Verbreitung: Mittel-, Ost- und Südosteuropa.
 Untersuchtes Material: 3 Exemplare
 1 Ex. Mali me Gropë, Livadhët e Selitës, Wiese, 1000—1100 m, 3. — 8. VII. 61, DEI;
 2 Ex. Bizë b. Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10. — 15. VII. 61, DEI.

***Sciaphobus barbatulus* (GERMAR, 1824)**

Verbreitung: Italien, südliches Mittel- und Südosteuropa.
 Untersuchtes Material: 17 Exemplare
 16 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI. — 2. VII. 61, DEI;
 1 Ex. Dajti, Südhang — Wiese, 900 m, 30. VI. 61, DEI.

***Sciaphobus megalopsis* APFELBECK, 1921**

Verbreitung: Albanien.
 Untersuchtes Material: 2 Exemplare
 2 Ex. Durrësi Umgeb. von Plazh, Anfang VI. 58, leg. SCHEIDING, DEI.

***Eusomus oculum* GERMAR, 1824**

Verbreitung: Europa, Vorder- und Mittelasien, Westsibirien.
 Untersuchtes Material: 17 Exemplare
 1 Ex. Tomor, Kloster Abbas Ali, 1800 m, 8. — 10. VI. 61, DEI;
 3 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI. — 2. VII. 61, DEI;
 8 Ex. Dajti, Südhang — Wiese, 900 m, 30. VI. 61, DEI;
 3 Ex. Bizë bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400–1500 m, 10. — 15. VII. 61, DEI;
 1 Ex. Lurja östl. Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen, 1300 m, 19. — 24. VII. 61, DEI;
 1 Ex. Nordalban. Alpen, Shalabach-Tal bei Thethi, 900–1200 m, 1. — 4. VIII. 61, DEI.

***Foucattia depilis* KRAATZ, 1859**

Verbreitung: Jugoslawien (Dalmatien, Herzegowina, Montenegro), Albanien.
 Untersuchtes Material: 2 Exemplare
 1 Ex. Dajti, Südhang — Wiese, 900 m, 30. VI. 61, DEI;
 1 Ex. Mali me Gropë, Livadhet e Selitës, Wiese, 1000–1100 m, 3. — 8. VII. 61 DEI.

***Strophomorphus porcellus* (SCHOENHERR, 1832)**

Verbreitung: Europäische und asiatische Mittelmeerländer, Ost- und Südosteuropa, Kaukasus, nordwestliches Afrika.
 Untersuchtes Material: 1 Exemplar
 1 Ex. Poliçan westl. Tomor, Kulturland, 500 m, 2. — 12. VI. 61, DEI.

***Sitona ophthalmicus* DESBROCHERS, 1869**

Verbreitung: Südeuropa, Transkaukasien, Algerien.
 Untersuchtes Material: 1 Exemplar
 1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17. — 22. VI. 61, DEI.

***Sitona sulcifrons* (THUNBERG, 1798) ssp. *deubeli* KRAUSS, 1902**

Verbreitung: Jugoslawien (Bosnien, Montenegro), Albanien, Griechenland, Bulgarien, Rumänien.
 Untersuchtes Material: 2 Exemplare
 1 Ex. Borshi südl. Vlorë, Litorale Terrasse mit *Olea* u. *Ficus*, 50–150 m, 14. — 27. V. 61, DEI;
 1 Ex. Dajti, Südhang — Wiese, 900 m, 30. VI. 61, DEI.

***Sitona puncticollis* STEPHENS, 1831**

Verbreitung: Europa, Vorder- und Mittelasien, Nordafrika.
 Untersuchtes Material: 1 Exemplar
 1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI. — 2. VII. 61, DEI.

***Sitona flavescens* (MARSHAM, 1802)**

Verbreitung: Paläarktische Region.
 Untersuchtes Material: 9 Exemplare
 1 Ex. Borshi südl. Vlorë, Flußtal des Lumi i Borshit, 14. — 27. V. 61, DEI;
 7 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250–300 m, 25. — 29. VII. 61, DEI;
 1 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Unterwuchs in Apfelplantage, 350 m, 25. — 29. VII. 61, DEI.

***Sitona waterhousei* WALTON, 1846**

Verbreitung: Europa.
 Untersuchtes Material: 1 Exemplar
 1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI. — 2. VII. 61, DEI.

***Sitona crinitus* (HERBST, 1795)**

Verbreitung: Paläarktis.
 Untersuchtes Material: 2 Exemplare
 2 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Luzernefeld, 300 m, 25. — 29. VII. 61, DEI.

***Sitona cylindricollis* FAHRÆUS, 1840**

Verbreitung: Gesamte Paläarktis.
 Untersuchtes Material: 2 Exemplare
 2 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250–300 m, 25. — 29. VII. 61, DEI.

***Sitona humeralis* STEPHENS, 1831**

Verbreitung: Westliches Nordafrika, Europa, Vorder- und Mittelasien.

Untersuchtes Material: 5 Exemplare

2 Ex. Borshi südl. Vlorë, Flußtal des Lumi i Borshit, 14. – 27. V. 61, DEI;

2 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17. – 22. VI. 61, DEI;

1 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250–300 m, 25. – 29. VII. 61, DEI.

***Psalidium maxillosum* (FABRICIUS, 1792)**

Verbreitung: Norditalien, südöstliches Mittel-, Ost- und Südosteuropa, Vorder- und Mittelasien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Polican westl. Tomor, Kulturland, 500 m, 2. – 12. VI. 61, DEI.

***Chlorophanus* spec. aff. *viridis* (LINNÉ, 1758)**

Verbreitung: Bulgarien, Albanien, Griechenland.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250–300 m, 25. – 29. VII. 61, DEI.

Es handelt sich hier wahrscheinlich um eine neue Art, die wegen der kurzen Mukronen der Flügeldecken *C. viridis* ähnlich ist, aber wegen der runden dunklen Schuppen auf der Scheibe der Flügeldecken auch an *C. graminicola* GYLLENHAL erinnert.***Larinus latus* (HERBST, 1784)**

Verbreitung: Östliche Mittelmeerländer, Ost- und Südosteuropa, Vorderasien.

Untersuchtes Material: 7 Exemplare

7 Ex. Borshi südl. Vlorë, SW-Hang, mit *Pistacia lentiscus*, *Phlomis fruticosa*, 200–400 m, 14. – 27. V. 61, DEI.***Larinus carinirostris* GYLLENHAL, 1836**

Verbreitung: Italien, östliche Mittelmeerländer, Balkanhalbinsel, Vorderasien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Durrës, Umgeb. von Plazh, Anfang VI. 58, leg. SCHEIDING, DEI.

***Larinus planus* (FABRICIUS, 1792)**

Verbreitung: Europa, Vorderasien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Uji Ftohte südl. Tepelena, 200 m, 29. – 31. V. 61, DEI.

***Larinus sturnus* (SCHALLER, 1783)**

Verbreitung: Europa, Vorder- und Mittelasien.

Untersuchtes Material: 9 Exemplare

3 Ex. Bizë bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400–1500 m, 10. – 15. VII. 61, DEI;

6 Ex. Lurja östl. Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen, 1300 m, 19. – 24. VII. 61, DEI.

***Larinus jaceae* (FABRICIUS, 1775)**

Verbreitung: Europa (fehlt im Norden), Vorder- und Mittelasien.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

1 Ex. Bizë bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400–1500 m, 10. – 15. VII. 61, DEI;

1 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250–300 m, 25. – 29. VII. 61, DEI.

***Larinus bremskei* FAUST, 1900**

Verbreitung: Sizilien, Albanien, Bulgarien, Griechenland.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250–300 m, 25. – 29. VII. 61, DEI.

***Lixus iridis* OLIVIER, 1807**

Verbreitung: Paläarktische Region.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

2 Ex. Mali me Gropë, Livadhët e Selitës, Wiese, 1000–1100 m, 3. – 8. VII. 61, DEI.

***Lixus algirus* (LINNÉ, 1758)**

Verbreitung: Madeira, Kanaren, Europa (fehlt im Norden), Vorder- und Mittelasien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Mali me Gropë, Livadhët e Selitës, Wiese, 1000–1100 m, 3. – 8. VII. 61, DEI.

***Lixus elongatus* (GOETZE, 1777)**

Verbreitung: Paläarktische Region (fehlt in Nordeuropa).

Untersuchtes Material: 3 Exemplare

3 Ex. Tirana, 9. – 12. V. 61, DEI.

***Cleonis piger* (SCOPOLI, 1773)**

Verbreitung: Paläarktische Region.

Untersuchtes Material: 4 Exemplare

3 Ex. Tirana, 9.–12. V. 61, DEI;

1 Ex. Borshi südl. Vlorë, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.–27. V. 61, DEI.

***Pachytychius haematocephalus* (GYLLENHAL, 1836)**

Verbreitung: Europäische Mittelmeerländer, West- und Mitteleuropa, Algerien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Borshi südl. Vlorë, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.–27. V. 61, DEI.

***Smicronyx reichii* (GYLLENHAL, 1836)**

Verbreitung: Europa, Kleinasien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Borshi südl. Vlorë, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.–27. V. 61, DEI.

***Smicronyx nebulosus* TOURNIER, 1874**

Verbreitung: Spanien, Frankreich, Schweiz, BRD, Italien, ÖSSR, Österreich, Ungarn, Bulgarien, Albanien, Griechenland, Anatolien, UdSSR (Grusinen).

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI.–2. VII. 61, DEI;

1 Ex. Mali me Gropë, Livadhet e Selitës, Wiese, 1000–1100 m, 3.–8. VII. 61, DEI.

***Tychius* [= *Aoromius*] *quinquepunctatus* (LINNÉ, 1758)**

Verbreitung: Europa, Asien (bis Ostsibirien).

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Polican westl. Tomor, *Arbutus-Phillyrea*-Macchie, 500 m, 2.–12. VI. 61, DEI.

***Tychius argentatus* CHEVROLAT, 1859**

Verbreitung: Südeuropa, Vorder- und Mittelasien, nordwestliches Afrika.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Polican westl. Tomor, *Arbutus-Phillyrea*-Macchie, 500 m, 2.–12. VI. 61, DEI.

***Tychius flavicollis* STEPHENS, 1831**

Verbreitung: Europa, Vorderasien, nordwestliches Afrika.

Untersuchtes Material: 3 Exemplare

1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.–22. VI. 61, DEI;

1 Ex. Dajti, Westhang, 1100 m, 29. VI. 61, DEI;

1 Ex. Dajti, Südhang — Wiese, 900 m, 30. VI. 61, DEI.

***Tychius curtirostris* DESBROCHERS, 1873**

Verbreitung: Marokko, Spanien, Frankreich, Italien, Jugoslawien, Albanien, Griechenland.

Untersuchtes Material: 12 Exemplare

2 Ex. Borshi südl. Vlorë, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.–27. V. 61, DEI;

1 Ex. Borshi südl. Vlorë, Litorale Terrasse mit *Olea* u. *Ficus*, 50–150 m, 14.–27. V. 61, DEI;

1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.–22. VI. 61, DEI;

8 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250–300 m, 25.–29. VII. 61, DEI.

***Tychius* [= *Miccotrogus*] *picirostris* (FABRICIUS, 1787)**

Verbreitung: Europa, Asien (bis Ostsibirien).

Untersuchtes Material: 6 Exemplare

6 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250–300 m, 25.–29. VII. 61, DEI.

***Tychius* [= *Miccotrogus*] *cuprifer* (PANZER, 1799)**

Verbreitung: Mittel-, Süd- und Südosteuropa, Vorder- und Mittelasien, westliches Nordafrika.

Untersuchtes Material: 10 Exemplare

2 Ex. Borshi südl. Vlorë, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.–27. V. 61, DEI;

2 Ex. Borshi südl. Vlorë, Litorale Terrasse mit *Olea* u. *Ficus*, 50–150 m, 14.–27. V. 61, DEI;

1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.–22. VI. 61, DEI;

1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI.–2. VII. 61, DEI;

2 Ex. Bizë bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400–1500 m, 10.–15. VII. 61, DEI;

2 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250–300 m, 25.–29. VII. 61, DEI.

***Sibinia primita* (HERBST, 1795)**

Verbreitung: Europa, Vorder- und Mittelasien, Nordafrika.

Untersuchtes Material: 3 Exemplare

3 Ex. Dajti, Südhang — Wiese, 900 m, 30. VI. 61, DEI.

***Anthonomus rubi* (HERBST, 1795)**

Verbreitung: Europa, Asien (bis Ostsibirien), Algerien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 61, DEI.

***Anthonomus chevrolati* DESBROCHERS, 1868**

Verbreitung: Europa (fehlt im Norden), Algerien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Bizé bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10.—15. VII. 61, DEI.

***Anthonomus rufus* GYLLENHAL, 1836**

Verbreitung: Europa, Vorderasien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Bizé bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10.—15. VII. 61, DEI.

***Hylobius graecus* PIC, 1902**

Verbreitung: Albanien, Griechenland.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Borshi südl. Vlorë, Litorale Terrasse mit *Olea* u. *Ficus*, 50—150 m, 14.—27. V. 61, DEI.***Liparus tenebrioides* (PALLAS, 1781)**

Verbreitung: Balkanhalbinsel, Osteuropa, Kaukasus.

Untersuchtes Material: 4 Exemplare

3 Ex. Tomor, Kloster Abbas Ali, 1800 m, 8.—10. VI. 61, DEI;

1 Ex. Mali me Gropë, Rotbuchenbestand mit angrenzender Weide, 1200 m, 3.—8. VII. 61, DEI.

***Donus audax* FAUST, 1887**

Verbreitung: Albanien, Griechenland.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Borshi südl. Vlorë, Litorale Terrasse mit *Olea* u. *Ficus*, 50—150 m, 14.—27. V. 61, DEI.***Hypera pastinacae* (ROSSI, 1790)**

Verbreitung: Europäische Mittelmeerlande, West- und Mitteleuropa, Vorderasien, westliches Nordafrika.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Borshi südl. Vlorë, SW-Hang, mit *Pistacia lentiscus*, *Phlomis fruticosa*, 200—400 m, 14.—27. V. 61, DEI.***Hypera meles* (FABRICIUS, 1792)**

Verbreitung: Europa, Vorder- und Mittelasien, Sibirien, Mongolei, westliches Nordafrika.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

1 Ex. Uji Ftohte südl. Tepelena, 200 m, 29.—31. V. 61, DEI;

1 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25.—29. VII. 61, DEI.

***Hypera nigrirostris* (FABRICIUS, 1775)**

Verbreitung: Europa, Vorder- und Mittelasien, westliches Nordafrika.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI.—2. VII. 61, DEI;

1 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25.—29. VII. 61, DEI.

***Hypera postica* (GYLLENHAL, 1813) [= *variabilis* (HERBST, 1795)]**

Verbreitung: Paläarktische Region.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 61, DEI.

***Hypera trilineata* (MARSHAM, 1802)**

Verbreitung: Europa, Anatolien.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 61, DEI;

1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI.—2. VII. 61, DEI.

***Sphenophorus piceus* (PALLAS, 1776)**

Verbreitung: Mittel- und Südeuropa, Vorderasien, Nordafrika.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

1 Ex. Saranda, 28. V. 61, DEI;

1 Ex. Vlorë, Strand, 27. VII. 58, leg. GREBENSCHIKOV, DEI.

***Camptorhinus simplex* SEIDLITZ, 1867**

Verbreitung: Marokko, Spanien, Frankreich, Italien, Ungarn, Slowakei, Albanien, Griechenland, Syrien.
 Untersuchtes Material: 2 Exemplare
 1 Ex. Uji Ftohte südl. Tepelena, 200 m, 29. – 31. V. 61, DEI;
 1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17. – 22. VI. 61, DEI.

***Echinodera hypocrita* (BOHEMAN, 1837)**

Verbreitung: Europa (fehlt im Norden), Anatolien, Kaukasus.
 Untersuchtes Material: 1 Exemplar
 1 Ex. Bizë bei Shëngjergji, Rotbuchenwald, an und unter Buchenrinde, 1400–1500 m, 10. – 15. VII. 61, DEI

***Baris analis* (OLIVIER, 1790)**

Verbreitung: West-, Mittel- und Südeuropa, Kaukasus.
 Untersuchtes Material: 1 Exemplar
 1 Ex. Borshi südl. Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14. – 27. V. 61, DEI.

***Baris timida* (ROSSI, 1792)**

Verbreitung: Mittel-, Süd- und Osteuropa, Vorder- und Mittelasien, Nordafrika.
 Untersuchtes Material: 1 Exemplar
 1 Ex. Tirana, 9. – 12. V. 61, DEI.

***Baris coerulescens* (SCOPOLI, 1763)**

Verbreitung: Mittel-, Süd- und Osteuropa, Vorder- und Mittelasien, westliches Nordafrika.
 Untersuchtes Material: 1 Exemplar
 1 Ex. Tirana, 9. – 12. V. 61, DEI.

***Ceutorhynchus erysimi* (FABRICIUS, 1787)**

Verbreitung: Paläarktische Region.
 Untersuchtes Material: 1 Exemplar
 UEx. Durrresi, Umgeb. von Plazh, Anfang VI. 58, leg. SCHEIDING. DEI.

***Ceutorhynchus angustus* DIECKMANN & SMRECZYNSKI, 1972**

Verbreitung: Spanien, Frankreich, Schweiz, BRD, DDR, Polen, Österreich, ČSSR, Jugoslawien, Albanien, Bulgarien, Griechenland, Anatolien.
 Untersuchtes Material: 2 Exemplare
 2 Ex. Lurja östl. Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen, 1300 m, 19. – 24. VII. 61, DEI.

***Ceutorhynchus moelleri* THOMSON, 1868**

Verbreitung: Europa.
 Untersuchtes Material: 1 Exemplar
 1 Ex. Dajti, Südhang – Wiese, 900 m, 30. VI. 61, DEI.

***Ceutorhynchus javeti* BRISOUT, 1869**

Verbreitung: Europa (fehlt im Westen), Anatolien.
 Untersuchtes Material: 1 Exemplar
 1 Ex. Bizë bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400–1500 m, 10. – 15. VII. 61, DEI.

***Sirocalodes nigrinus* (MARSHAM, 1802)**

Verbreitung: Europa, Vorder- und Mittelasien, Algerien.
 Untersuchtes Material: 1 Exemplar
 1 Ex. Borshi südl. Vlora, Litorale Terrasse mit *Olea* u. *Ficus*, 50–150 m, 14. – 27. V. 61, DEI.

***Ceuthorhynchidius troglodytes* (FABRICIUS, 1787)**

Verbreitung: Europa, Vorderasien, Sibirien, westliches Nordafrika.
 Untersuchtes Material: 12 Exemplare
 9 Ex. Borshi südl. Vlora, Litorale Terrasse mit *Olea* u. *Ficus*, 50–150 m, 14. – 27. V. 61, DEI;
 1 Ex. Dajti, Shkall Prisk, 850 m, 27. VI. – 2. VII. 61, DEI;
 1 Ex. Bizë bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400–1500 m, 10. – 15. VII. 61, DEI;
 1 Ex. Lurja östl. Kurbneshi, Lan Lura, Wiesen, 1300 m, 19. – 24. VII. 61, DEI.

***Ceuthorhynchidius campanellae* SCHULTZE, 1895**

Verbreitung: Jugoslawien (Kroatien, Bosnien, Dalmatien), Albanien, Türkei, Kaukasus.
 Untersuchtes Material: 1 Exemplar
 1 Ex. Borshi südl. Vlora, Flußtal des Lumi i Borshit, 14. – 27. V. 61, DEI.

***Nanophyes marmoratus* (GOEZE, 1777)**

Verbreitung: Europa, Vorder- und Mittelasien, Sibirien (bis zum Pazifik).

Untersuchtes Material: 3 Exemplare

2 Ex. Borshi südl. Vlorë, Litorale Terrasse mit *Olea* u. *Ficus*, 50–150 m, 14.–27. V. 61, DEI;

1 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250–300 m, 25.–29. VII. 61, DEI.

***Nanophyes globiformis* KIESENWETTER, 1864**

Verbreitung: Europa (fehlt im Norden).

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Borshi südl. Vlorë, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.–27. V. 61, DEI.

***Nanophyes brevis* BOHEMAN, 1845**

Verbreitung: Europäische und asiatische Mittelmeerländer, Mittel- und Osteuropa, Kaukasus, Ägypten.

Untersuchtes Material: 11 Exemplare

1 Ex. Borshi südl. Vlorë, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.–27. V. 61, DEI;

4 Ex. Borshi südl. Vlorë, Sumpf am Lumi i Borshit, 14.–27. V. 61, DEI;

9 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250–300 m, 25.–29. VII. 61, DEI.

***Nanophyes nitidulus* GYLLENHAL, 1838**

Verbreitung: Europäische Mittelmeerländer, Mittel- und Osteuropa, Vorderasien, Nordafrika.

Untersuchtes Material: 5 Exemplare

3 Ex. Borshi südl. Vlorë, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.–27. V. 61, DEI;

2 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250–300 m, 25.–29. VII. 61, DEI.

***Gymnaetron pascuorum* (GYLLENHAL, 1813)**

Verbreitung: Europa, Anatolien, Kaukasus.

Untersuchtes Material: 10 Exemplare

4 Ex. Borshi südl. Vlorë, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.–27. V. 61, DEI;

4 Ex. Borshi südl. Vlorë, Litorale Terrasse mit *Olea* u. *Ficus*, 50–150 m, 14.–27. V. 61, DEI;

1 Ex. Iba unterhalb Krabë, 400 m, 17.–22. VI. 61, DEI;

1 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250–300 m, 25.–29. VII. 61, DEI.

***Gymnaetron tetrum* (FABRICIUS, 1792)**

Verbreitung: Europa (fehlt im Norden), Vorder- und Mittelasien, Sibirien.

Untersuchtes Material: 18 Exemplare

1 Ex. Borshi südl. Vlorë, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.–27. V. 61, DEI;

3 Ex. Borshi südl. Vlorë, SW-Hang, mit *Pistacia lentiscus*, *Phlomis fruticosa*, 200–400 m, 14.–27. V. 61, DEI;

1 Ex. Dajti, Südhang – Wiese, 900 m, 30. VI. 61, DEI;

2 Ex. Mali me Gropë, Livadhët e Selitës, Wiese, 1000–1100 m, 3.–8. VII. 61, DEI;

11 Ex. Durrës, Umgeb. von Plazh, Anfang VI. 58, leg. SCHEIDING, DEI.

***Gymnaetron antirrhini* (PAYKULL, 1800)**

Verbreitung: Europa, Vorder- und Mittelasien, Ostsibirien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Nordalban. Alpen, Shalabach-Tal bei Thethi, 900–1200 m, 1.–4. VIII. 61, DEI.

***Miarus monticola* PETRI, 1912**

Verbreitung: BRD, DDR, Polen, ČSSR, Österreich, Ungarn, Jugoslawien, (Slowenien, Dalmatien, Bosnien, Mazedonien), Albanien, Griechenland, Bulgarien, Rumänien, UdSSR (Moskau, Bukowina).

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Tomor, Kloster Abbas Ali, 1800 m, 8.–10. VI. 61, DEI.

***Miarus graminis* (GYLLENHAL, 1813)**

Verbreitung: Europa, Vorder- und Mittelasien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Mali me Gropë, Rotbuchenbestand mit angrenzender Weide, 1200 m, 3.–8. VII. 61, DEI.

***Cionus hortulanus* (GEOFFROY, 1785)**

Verbreitung: Europa, Vorder- und Mittelasien, Westsibirien, Marokko.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Durrës, Umgeb. von Plazh, Anfang VI. 58, leg. SCHEIDING, DEI

***Cionus olivieri* ROSENSCHÖLD, 1838**

Verbreitung: Europa (fehlt im Norden), Vorder- und Mittelasien, Marokko.

Untersuchtes Material: 25 Exemplare

25 Ex. Durrës, Umgeb. von Plazh, Anfang VI. 58, leg. SCHEIDING, DEI.

***Cionus thapsi* (FABRICIUS, 1792)**

Verbreitung: Europa, Vorder- und Mittelasien.

Untersuchtes Material: 8 Exemplare

1 Ex. Iba unterhalb Krraba, 400 m, 17.—22. VI. 61, DEI;

7 Ex. Durrresi, Umgeb. von Plazh, Anfang VI. 58, leg. SCHEIDING, DEI.

***Cionus pulverosus* GYLLENHAL, 1838**

Verbreitung: Österreich, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, Albanien, Griechenland, Anatolien.

Untersuchtes Material: 22 Exemplare

22 Ex. Durrresi, Umgeb. von Plazh, Anfang VI. 58, leg. SCHEIDING, DEI.

***Stereonychus fraxini* (DEGEER, 1781)**

Verbreitung: Europa, Ostsibirien, nordwestliches Afrika.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Lukova nördl. Saranda, 250 m, 24. V. 61, DEI.

***Rhynchaenus quercus* (LINNÉ, 1758)**

Verbreitung: Europa, Vorderasien, Algerien.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

1 Ex. Bizë bei Shëngjergji, Wiesen in Rotbuchenzone, 1400—1500 m, 10.—15. VII. 61, DEI;

1 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25.—29. VII. 61, DEI.

***Rhynchaenus hirtellus* MILLER, 1862**

Verbreitung: Albanien, Griechenland, Anatolien.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Borshi südl. Vlorë, Litorale Terrasse mit *Olea* u. *Ficus*, 50—150 m, 14.—27. V. 61, DEI.

***Rhynchaenus rufus* (SCHRANK, 1781)**

Verbreitung: Europa, Iran.

Untersuchtes Material: 1 Exemplar

1 Ex. Borshi südl. Vlorë, Flußtal des Lumi i Borshit, 14.—27. V. 61, DEI.

***Rhynchaenus fagi* (LINNÉ, 1758)**

Verbreitung: Europa, Anatolien, Kaukasus.

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

2 Ex. Mali me Gropë, Rotbuchenbestand mit angrenzender Weide, 1200 m, 3.—8. VII. 61, DEI.

***Rhynchaenus stigma* (GERMAR, 1821)**

Verbreitung: Europa, Vorder- und Mittelasien, Mongolei, Sibirien (bis zum Pazifik).

Untersuchtes Material: 2 Exemplare

2 Ex. Kula e Lumës bei Kukësi, Flußtal des Luma, 250—300 m, 25.—29. VII. 61, DEI.

Zusammenfassung

Aus der Käferfamilie Curculionidae werden 599 Exemplare aus 153 Arten behandelt, welche vorwiegend von den Teilnehmern der Albanien-Expedition des ehemaligen Deutschen Entomologischen Institutes 1961 gesammelt worden sind. 17 Arten sind nur auf der Balkanhalbinsel, acht Arten nur in Albanien verbreitet. Ein Exemplar der Gattung *Chlorophanus* gehört wahrscheinlich zu einer neuen Art, die auch in Bulgarien und Griechenland vorkommt.

Summary

This paper deals with 599 specimens of 153 species of the family Curculionidae that were mainly collected by members of the expedition to Albania made in 1961 by the former Deutsches Entomologisches Institut. Of these species, 17 are to be found on the Balkan peninsula only, and eight only in Albania. One specimen of the genus *Chlorophanus* probably belongs to a new species which occurs also in Bulgaria and Greece.

Резюме

Из семейства жуков Curculionidae рассматриваются 599 экземпляров 153 видов, которые большую часть были собраны участниками Албанской экспедиции бывшего Немецкого энтомологического института в 1961 г. 17 видов распространены только на Балканском полуострове, а 8 видов только в Албании. Один экземпляр, по всей вероятности, относится к новому виду, который тоже встречается в Болгарии и Греции.