

Institut für Pflanzenschutzforschung
der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR
Bereich Eberswalde
Abteilung Taxonomie der Insekten
Eberswalde-Finow (DDR)

HANNELORE GAEDIKE

Katalog der in den Sammlungen der Abteilung Taxonomie der Insekten des Institutes für Pflanzenschutzforschung, Bereich Eberswalde (ehemals Deutsches Entomologisches Institut), aufbewahrten Typen — XXI

(Coleoptera: Pselaphidae, Histeridae)

Pselaphidae

abyssinicus RAFFRAY, 1904 (*Centrophthalmus*)
Ann. Soc. Ent. France 73, 373

Mehrere Syntypen, Abyssinien: Hamacen, Endera, Mareb.
DEI: 1 Syntypus, Abyssinien.

acutangulus lunifer Z. KARAMAN, 1948 (*Bythinus*)
Prir. istraživanja Jug. akad. Zagreb 24, 8 + 15

2 ♂ Syntypen, Bulgarien, Samokov und Bačkov, im DEI.
DEI: 1 ♂ Syntypus, Bulgarien, Rhodope, Bačkov, 13. 5. 09, leg. RAMBOUSEK; 1 ♂ Syntypus, Bulg., Samokov, 1911, leg. HILF.

acutangulus scopljensis Z. KARAMAN, 1948 (*Bythinus*)
Prir. istraživanja Jug. akad. Zagreb 24, 8 + 15

Syntypen, Skoplje.
DEI: 3 Syntypen, Skoplje, 8. 1940.

admirandus L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Neodeuterus*)
Tijdschr. v. Ent. 30, 152—153

Syntypen, Sumatra.
DEI: 1 Syntypus, Sumatra, tabacs.

adparata L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Bryaxis*)
Tijdschr. v. Ent. 30, 129—130

Syntypen, Yucatan.
DEI: 1 Syntypus, Yucatan.

affinis L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)
Nunquam Otiosus 3, 501

Syntypen, Neu Süd Wales.
DEI: 2 Syntypen, N. S. Wales.

albatica APFELBECK, 1907 (*Bergrothiella*)
Sitz.-ber. Ak. Wiss. Wien 116, 512—514

Syntypen, Albanien, in den Hochgebirgen der Merdita, Munela, Zebia, Mal i Sheit, in Rotbuchenwäldern unter tiefen
Laublagen, leg. APFELBECK, 1905 und WINNEGUTH, 1906.
DEI: 3 Syntypen, Merdita, Zebia, 1906, leg. WINNEGUTH.

albanicus APFELBECK, 1907 (*Bythinus*)
Sitz.-ber. Ak. Wiss. Wien 116, 515—516

♂♀ Syntypen, Albanien, an der unteren Bojana bei Pulaj, in Eichenlaublagen.
DEI: 3 Syntypen, Velipoja, Albania, MUSTAJBEG.

amasiae REITTER, 1890 (*Bythinus*)
Dtsch. Ent. Ztschr. 34, 373

Syntypen, Nord-Kleinasien, bei Amasia, 11. 4. 1888, leg. KORB.
DEI: 1 ♂ Syntypus, Amasia, 1888, leg. KORB.

ampliventris L. W. SCHAUFUSS, 1877 (*Filiger*)
Pselaphiden Siam, 17

Syntypen, Siam, Bangkok.
DEI: 1 Syntypus, Bangkok.

ampliventris L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Pselaphus*)
Nunquam Otiosus 3, 482—483

Syntypen, Amazonas, in Sammlung L. W. SCHAUFUSS.
DEI: 6 Syntypen, Amazonas.

anopunctatus L. W. SCHAUFUSS, 1886 (*Curculionellus*)
Tijdschr. v. Ent. 29, 254—255

Syntypen, Melbourne.
DEI: 1 Syntypus, Melbourne.

armitagei KING, 1864 (*Bryaxis*)
Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1, 104; Taf. 7, Fig. 15

Mehrere Syntypen, Paramatta.
DEI: 1 Syntypus, Paramatta.

asturiensis REITTER, 1880 (*Bythinus*)
Verh. zool. bot. Ges. Wien 29 (1879), 534

Syntypen, Asturien, im Mus. SIMON und REITTER.
DEI: 1 ♂ Syntypus, Asturien, GETSCHMANN, 1879? (vielleicht Druckfehler?)

aubei L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Batrissus*)
Nunquam Otiosus 2, 284—285

Syntypen; Brasilien, Neu Freiburg; Brasilien, unter Nr. 113 von REICHE.
DEI: 1 Syntypus, Brasilien.

aurora L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)
Nunquam Otiosus 3, 496—497

Syntypen, Neu Süd Wales.
DEI: 2 Syntypen, N. S. Wales.

barbatus KING, 1863 (*Batrissus*)
Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1, 44—45, Fig. 6a

Syntypen, Parramatta.
DEI: 1 Syntypus, Parramatta.

barbatus REITTER, 1882 (*Centrophthalmus*)
Dtsch. Ent. Ztschr. 26, 183—184; Taf. 8, Fig. 4

Syntypen, Goldküste, Addah, leg. KOPP.
DEI: 1 Syntypus, Westafrika, Addah.

batavianus L. W. SCHAUFUSS, 1882 (*Zethus*)
Tijdschr. v. Ent. 25, 67—68

Syntypen, Batavia, leg. SJTHOFF.
DEI: 1 Syntypus, Batavia.

baumeisteri L. W. SCHAUFUSS, 1877 (*Bryaxis*)
Pselaphiden Siam, 7—9

Syntypen, Siam, Bangkok.
DEI: 5 Syntypen, Bangkok.

bicolor RAFFRAY, 1877 (*Oliarthrus*)
Rev. Mag. Zool. (Sér. 3) 5, 290—291; Taf. 3, Fig. 14

Syntypen, Zanzibar, unter Rinde.
DEI: 1 Syntypus, Zanzibar, leg. RAFFRAY.

biformis REITTER, 1882 (*Euplectus*)
Dtsch. Ent. Ztschr. 26, 192—193

Syntypen, Goldküste, Addah, leg. KOPP.
DEI: 1 Syntypus, W. Afrika, Addah, Goldküste.

bilobata BROUN, 1921 (*Sagola*)
Bull. N. Zealand Inst. 1, 486—487

Ca. 12 ♂♂ Syntypen, Umgebung Wakatipu, Mounts Dick, Alfred und Earnslaw, 26. 1. und 17. 3. 1914, leg. HALL.
DEI: 3 Syntypen, Ms. Dick, Otago, N. Z.

biocellata L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Bryaxis*)
Tijdschr. v. Ent. 30, 127—128

Syntypen, Mexico.
DEI: 1 Syntypus, Mexico.

bisinuata L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Bryaxis*)
Tijdschr. v. Ent. 30, 130—131

Syntypen, Cuba.
DEI: 1 Syntypus, Cuba.

bison L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)
Nunquam Otiosus 3, 499–500

♂♀ Syntypen, Neu Holland, King George Sound.
DEI: 12 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

bivofoelatus L. W. SCHAUFUSS, 1877 (*Pselaphus*)
Pselaphiden Siams, 6

Syntypen, Siam, Bangkok.
DEI: 3 Syntypen, Bangkok.

bodemeyeri REITTER, 1903 (*Bythinus*)
Wien. Ent. Ztg. 22, 221

Syntypen, Anatolien, Goek-Dagh, leg. v. BODEMEYER.
DEI: 1 Syntypus, Asia-minor, Goek-Dagh, leg. v. BODEMEYER.

brasilensis L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Euplectus*)
Tijdschr. v. Ent. 30, 154

♂♂ Syntypen, Minas Geraes, Brasilia, leg. SAHLBERG.
DEI: 1 Syntypus, Minas Geraes.

brasilensis L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Rhexius*)
Nunquam Otiosus 2, 259

Syntypen, Amazonenstrom, leg. BATES.
DEI: 17 Syntypen, Amazonenstrom.

brevis L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)
Nunquam Otiosus 3, 498

Syntypen, Tasmania.
DEI: 8 Syntypen, Tasmania.

breviscula L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)
Nunquam Otiosus 3, 503

Syntypen, Neu Holland am Clyde-Fluß.
DEI: 2 Syntypen, Clyde River.

bruchi RAFFRAY, 1908 (*Arthmius*)
Rev. Mus. La Plata 15, 69

Holotypus, Paratypen, Argentinien, Prov. Buénos Aires, leg. BRUCH; Holotypus, in Coll. RAFFRAY.
DEI: 1 Paratypus, Argentina, Prov. Buenos Aires, 20. 1. 1906, leg. BRUCH.

bussacensis estrellensis BESUCHET, 1961 (*Pselaphostomus*)
Eos 37, 252–253, Fig. 20

♂ Holotypus, Portugal, Distr. Guarda, Vale de Azares, leg. PAULINO D' OLIVEIRA, im DEI. 1 ♂ Paratypus, Portugal, Guarda, leg. PAULINO D'OLIVEIRA, im Mus. Frankfurt. 1 ♀ Paratypus, Portugal, Manteigas, 950 m, leg. BESUCHET, in Sammlung BESUCHET.
DEI: Holotypus, Val. Azares.

carinatus L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Batrissus*)
Nunquam Otiosus 2, 281

Syntypen, Brasilien, Neu Freiburg.
DEI: 1 Syntypus, Brasilien, N. Frib.

carinifrons L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Batrissus*)
Nunquam Otiosus 2, 283–284

Syntypen; Brasilien, Neu Freiburg; Rio de Janeiro, unter Nr. 95 von REICHE.
DEI: 3 Syntypen, Brasilien, Neu Freiburg.

cariniventris L. W. SCHAUFUSS, 1877 (*Füliger*)
Pselaphiden Siams, 17

Syntypen, Siam.
DEI: 1 Syntypus, Siam.

carinulata L. W. SCHAUFUSS, 1882 (*Batrissomorpha*)
Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova 18 (1882–83), 365–366

Syntypen; Java, Teibodas, 10. 1874, leg. BECCARI; Pulo Penang, 3. 1865, leg. DORIA; 1 Syntypus, Sumatra.
DEI: 1 Syntypus, Giava, Teibodas, 10. 1874, leg. BECCARI.

cavidorsum RAFFRAY, 1908 (*Batrissocenus*)
Dtsch. Ent. Ztschr. 1908, 409

Syntypen, S. O. Cameroun, Lolodorf, leg. CONRADT.
DEI: 1 Syntypus, S. O. Kamerun, Lolodorf, 1895, leg. CONRADT.

cetinjenis APFELBECK, 1906 (*Bythinus*)
Sitz.-ber. Ak. Wiss. Wien 115, 1669–1670

Syntypen, Montenegro, Umgebung von Cetinje, in Humuslagen, leg. APFELBECK.
DEI: 2 Syntypen, Cetinje, leg. APFELBECK.

chamaeleon L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)
Nunquam Otiosus 3, 499

Syntypen, Neu Holland, King George Sound.
DEI: 1 Syntypus, King George Sound.

clandestinus L. W. SCHAUFUSS, 1886 (*Enoptostomus*)
Tijdschr. v. Ent. 29, 277—278

Syntypen, Amazonas.
DEI: 1 Syntypus, Amazonas.

clara L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Bryaxis*)
Tijdschr. v. Ent. 30, 113

Syntypen, Sumatra.
DEI: 1 Syntypus, Sumatra.

clarae L. W. SCHAUFUSS, 1863 (*Machaerites*)
Verh. zool. bot. Ges. Wien 23, 1248—1250

2 ♀♀ Syntypen (1 ♀ davon ohne Kopf und Halsschild), Spanien, Provinz Burgos, in einer Höhle, 6. 1861, leg. L. W. SCHAUFUSS.
DEI: 1 ♀ Syntypus, 1 ♂ 3.

clavicornis L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Pselaphus*)
Nunquam Otiosus 3, 483—484

Syntypen, Gawley, Neu Holland.
DEI: 2 Syntypen, Gawley.

cochlearifer L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)
Nunquam Otiosus 3, 485

Syntypen, Mexico.
DEI: 1 Syntypus, Mexiko.

coelestis RAFFRAY, 1912 (*Reichenbachia*)
Ent. Mitt. 1, 108

Syntypen, Formosa, Takao.
DEI: 3 Syntypen, Formosa, Takao, 11. 1907, leg. SAUTER.

collaris RAFFRAY, 1877 (*Tmesiphorus*)
Rev. Mag. Zool. (Sér. 3) 5, 282—284; Taf. 3, Fig. 1

Syntypen, Zanzibar und Bagamoyo, unter Rinde, zusammen mit Ameisen, August—September.
DEI: 1 Syntypus, Zanzibar, leg. RAFFRAY.

communis C. SCHAUFUSS, 1890 (*Centrophthalmus*)
Ent. Nachr. 16, 139—141

Syntypen, Madagascar.
DEI: 5 Syntypen, Madagascar.

communis L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Gonatocerus*)
Nunquam Otiosus 3, 506

Syntypen, Neu Holland, am Clyde- und Rockhampton-Fluß.
DEI: 11 Syntypen, N. S. Wales, Clyde River.

compressicollis L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Tyrus*)
Tijdschr. v. Ent. 30, 104—105

Syntypen, Chile.
DEI: 1 Syntypus, Chile.

concolor RAFFRAY, 1908 (*Arthmius*)
Dtsch. Ent. Ztschr. 1908, 408—409

Syntypen, Paraguay.
DEI: 1 Syntypus, Paraguay, leg. DRAKE.

conicicollis L. W. SCHAUFUSS, 1877 (*Filiger*)
Pselaphiden Siams, 17—18

Syntypen, Siam, Bangkok.
DEI: 1 Syntypus, Siam, Bangkok.

conveza L. W. SCHAUFUSS, 1879 (*Bryaxis*)
Nunquam Otiosus 3, 487

Syntypen, Amazonas, in Coll. BONVOULOIR und SCHAUFUSS.
DEI: 1 Syntypus, Amazonas.

coregyreus REITTER, 1884 (*Bythinus*)
Dtsch. Ent. Ztschr. 28, 108; Taf. 2, Fig. 13, 13a

Syntypen; Corfu; bei Gasturi, unter tiefen Eichenlaublagen.
DEI: 2 Syntypen, Corfu, leg. REITTER.

cordata L. W. SCHAUFUSS, 1877 (*Bryaxis*)
Pselaphiden Siams, 9

Syntypen, Siam.
DEI: 1 Syntypus, Bangkok.

corpulenta L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Bryaxis*)
Tijdschr. v. Ent. 30, 123—124

Syntypen, Minas Geraes, Brasilien, leg. SAHLBERG.
DEI: 1 Syntypus, Minas Geraes.

creticus REITTER, 1885 (*Tychus*)

Dtsch. Ent. Ztschr. 29, 371

Syntypen, Creta, leg. v. OERTZEN.

DEI: 2 Syntypen, Creta, leg. v. OERTZEN.

cristata L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)

Nunquam Otiosus 3, 490—491

Syntypen, Mexico.

DEI: 1 Syntypus, Mexico.

cruralis RAFFRAY, 1914 (*Batriscenus*)

Suppl. Ent. 3, 1

♂♂ Syntypen, Formosa, Kosempo.

DEI: 3 Syntypen, Formosa, Kosempo, 7. 7. 1911, leg. SAUTER.

custos L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Batriscus*)

Tijdschr. v. Ent. 30, 138—139

Syntypen, Borneo.

DEI: 1 Syntypus, Borneo.

czernohorshyi REITTER, 1902 (*Machaerites*)

Wien. Ent. Ztg. 21, 1—2; Taf. 1, Fig. 4

Syntypen, Jablanica, Herzegowina, leg. HILF und REITTER; 1 Syntypus, am Ivan, an der Herzegowiner Abdachung, leg. REITTER.

DEI: 2 Syntypen, Herzegovina, Jablanica, 28. 5. 1901.

delicatus BROWN, 1886 (*Pselaphus*)

Man. N. Zealand Col. 4, 943—944

Syntypen, Neu Seeland, nahe Howick.

DEI: 4 Syntypen, Howick, Auckland.

denticulata DODERO, 1919 (*Amaurops*)

Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova (Ser. 3a) 8 (= 48) (1918—20), 183—184; Taf. 3, Fig. 7, 7a+b

Syntypen, Sardinien, Monte S. Antonio bei Macomer.

DEI: 1 Syntypus, Sardinien, Macomer, leg. DODERO.

dickensis BROWN, 1917 (*Sagola*)

Bull. N. Zealand Inst. 1, 377

8 Syntypen, Mount Dick bei Kingston, 1050 Fuß, 10. 3. 1914, leg. HALL.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Mr. Dick, Otago, N. Z.

diecki dentibasis DODERO, 1919 (*Amaurops*)

Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova (Ser. 3a) 8 (= 48) (1918—20), 182—183

3 Syntypen, Camaiore, südlicher Teil der Alpi apuane, 1910, leg. ANDREINI; zahlreiche Syntypen, Alpi apuane, Cardoso und Ponte Stazzemese und bei Forno Volasco, leg. DODERO.

DEI: 1 Syntypus, Alpi Apuane, Forno Volasco, 23. 8. 1917, leg. DODERO.

dimissionis L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Bryaxis*)

Tijdschr. v. Ent. 30, 123

Syntypen, Brasilien.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundortangaben.

disciger ROUBAL, 1910 (*Bythinus*)

Čas. České Spol. Ent. Prag 7, 143

7 Syntypen, Caucasus occ., Krásná Poljana, 1910, leg. ROUBAL.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Caucasus occ., Krasná Poljana, 7. 1910, leg. ROUBAL.

diversicolor L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)

Nunquam Otiosus 3, 498—499

Syntypen, Neu Holland, King George Sound.

DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, King George Sound.

doriae L. W. SCHAUFUSS, 1882 (*Batrismorpha*)

Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova 18 (1882—83), 366—367

Syntypen, Sumatra, Ms. Singalan, leg. BECCARI.

DEI: 2 Syntypen, Sumatra, Mte. Singalang, 7. 1878, leg. BECCARI.

doriae L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Machaerites*)

Nunquam Otiosus 2, 290

♂♀ Syntypen, Höhlen bei Spezzia, leg. DORIA.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Spezzia.

duvali SAULCY, 1863 (*Claviger*)

Ann. Soc. Ent. France (Sér. 4) 3, 83

Syntypen, Süd-Frankreich, bei *Formica brunnea* LATR.

DEI: 1 Syntypus, Fr. mér.

elongata L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Gamba*)

Nunquam Otiosus 2, 359

Holotypus, Pampas, unter Nr. 1931 in v. BONVOULOIR's Sammlung.

DEI: Holotypus, Pampas des westl. Süd. Am., Nr. 1931.

exaratus RAFFRAY, 1912 (*Batrisocenus*)
Arch. Nat. 78 A 6, 127—128

Syntypen, West Java, Rediri.
DEI: 1 Syntypus, Ostjava, Rediri.

excisa L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)
Nunquam Otiosus 3, 494

2 Syntypen, Cuba; 1 Syntypus, Chile?
DEI: 1 Syntypus, Cuba.

excisus L. W. SCHAUFUSS, 1877 (*Batrisus*)
Pselaphiden Siams, 16

♂♀ Syntypen, Siam, Bangkok.
DEI: 1 ♂ Syntypus, Siam, Bangkok; 1 ♀ Syntypus, Siam.

expandum REITTER, 1884 (*Trimium*)
Dtsch. Ent. Ztschr. 28, 111

21 Syntypen, Corfu und Cephalonia, leg. REITTER.
DEI: 1 Syntypus, Corfu, leg. REITTER.

fauconneti FAUVEL, 1886 (*Bythinus*)
Rev. d'Ent. 5, 125

Syntypen; Cantal, Le Lioran, leg. FAUVEL und FAUCONNET; Rhône, La Tour-de-Salvagny, leg. JACQUET; Allier, Montlucon und im Wald bei Bellenaves, leg. DES GOZIS.
DEI: 2 ♂♂, 1 ♀ Syntypen, Le Lioran, Cantal.

festivus L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Articerus*)
Nunquam Otiosus 3, 481

Syntypen, Amazonas.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundortangaben.

flavipes L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)
Nunquam Otiosus 3, 502—503

Syntypen, Sydney.
DEI: 1 Syntypus, Sydney.

fluvialis L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Bryaxis*)
Tijdschr. v. Ent. 30, 134—135

Syntypen, Amazonas.
DEI: 1 Syntypus, Amazonas.

fonensis L. W. SCHAUFUSS, 1877 (*Bryaxis*)
Pselaphiden Siams, 10

Syntypen, Siam, Bangkok seu Fon, ex Coll. CASTELNAU.
DEI: 1 Syntypus, Bangkok.

formicarius RAFFRAY, 1877 (*Enoptostomus*)
Rev. Mag. Zool. (Sér. 3) 5, 282; Taf. 3, Fig. 3—15

Syntypen, Abyssinie, Hochplateau des Hamacen, zusammen mit Ameisen, September.
DEI: 1 Syntypus, Abyssinie.

fraudatrix L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)
Nunquam Otiosus 3, 489

Syntypen, Neu Freiburg.
DEI: 1 Syntypus, Brasil., N. Freiburg.

frontalis RAFFRAY, 1908 (*Raxybis*)
Rev. Mus. La Plata 15, 71

Holotypus, Paratypen, Prov. Buenos Aires, Argentinien, Holotypus in Coll. RAFFRAY.
DEI: 1 Paratypus, Argentina, Prov. Buenos Aires, leg. BRUCH.

fulva L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Bryaxis*)
Berl. Ent. Ztschr. 31, 292—293

Syntypen, Indien (Birma?).
DEI: 1 Syntypus, Ind. or.

fundaebraccatus L. W. SCHAUFUSS, 1882 (*Batrisus*)
Tijdschr. v. Ent. 25, 71

Syntypen, Batavia, leg. STJTHOFF.
DEI: 1 Syntypus, Batavia.

furcifer L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Hamotus*)
Berl. Ent. Ztschr. 31, 309

Syntypen, Minas Geraes, Brasilien, leg. SAHLBERG, in Coll. SCHAUFUSS.
DEI: 2 Syntypen, Minas Geraes.

ganglbaueri APFELBECK, 1907 (*Pygozyon*)
Wiss. Mitt. Bosn. Herzegowina 10, 640

Syntypen, Südbosnien, Ivan planina und Trebević-Gebirge bei Sarajevo.
DEI: 1 ♂ Syntypus, Trebević, WGTB.

gestroi L. W. SCHAUFUSS, 1882 (*Pselaphus*)
Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova 18 (1882–83), 356–358

Syntypen, Celebes, Macassar, leg. BECCARI.

DEI: 1 Syntypus, Celebes, Macassar, 1. 74, leg. BECCARI.

gibbus L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Trichonyx*)
Nunquam Otiosus 2, 287–288

Syntypen; Amazonenstrom; unter Nr. 116 von REICHE; 1 Syntypus in Coll. L. W. SCHAUFUSS.

DEI: 2 Syntypen, Amazonenstrom.

giraffa L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Batrissus*)
Nunquam Otiosus 3, 507–508

Syntypen, "Pine mounting", Brigham, Nov. Holl.

DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Pine mounting, Brigham.

giraffa REITTER, 1880 (*Bythinus*)
Verh. zool. bot. Ges. Wien 29 (1879), 469

Syntypen, Central-Kaukasus, Kobi (Martkopi), unter Birkenlaub, 7500 Fuß.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Kaukasus, Kobi, leg. LEDER.

gladiator REITTER, 1885 (*Metopioxys*)
Dtsch. Ent. Ztschr. 29, 335–336

Zahlreiche Syntypen, Brasilien, Blumenau, leg. HETSCHKO.

DEI: 1 Syntypus, Blumenau.

globulifer L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)
Nunquam Otiosus 3, 504

♂♀ Syntypen, Melbourne.

DEI: 1 Syntypus, Melbourne.

gracilicornis RAFFRAY, 1877 (*Batrissus*)
Rev. Mag. Zool. (Sér. 3) 5, 294–295.

Syntypen, Abyssinie, westlich von Sémiène, Januar.

DEI: 1 Syntypus, Abyss., leg. RAFFRAY.

gracilis L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Panaphantus*)
Nunquam Otiosus 2, 261–262

Syntypen, Amazonenstrom, leg. BATES.

DEI: 11 Syntypen, Amazonenstrom.

grandicornis L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Euplectus*)
Nunquam Otiosus 3, 506–507

Syntypen, Chile.

DEI: 1 Syntypus, Chile.

halli BROUN, 1914 (*Sagola*)
Bull. N. Zeal. Inst. 1, 155–156

Ca. 12 Syntypen, Pudding Hill bei Methven, 5. 1912, leg. HALL.

DEI: 3 Syntypen, Methven, Canterbury, N. Z.

hamatus KING, 1863 (*Batrissus*)
Trans. Ent. Soc. N.S. Wales 1, 45–46, Fig. 6c

Syntypen, Parramatta, September.

DEI: 1 Syntypus, Parramatta.

hatamensis L. W. SCHAUFUSS, 1882 (*Batrissus*)
Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova 18 (1882–1883), 397

Holotypus, Nov. Guinea, 1875, leg. BECCARI, im Mus. Genua.

DEI: Holotypus, N. Guinea, Hatam, VI. 1875, leg. BECCARI, ex Mus. Genova.

hellenicum BESUCHET, 1955 (*Biblopectus*)
Mitt. Schw. Ent. Ges. 28, 194–195

Grèce, Val de Ropa, ♂ Holotypus, 1 ♂, 3 ♀♀ Paratypen, im Mus. Wien; 2 ♀♀, im DEI; 2 ♂♂, 11 ♀♀, im Mus. FREY; 1 ♂, 1 ♀, in Coll. BESUCHET; 1 ♂, Grèce, in Coll. BESUCHET.

DEI: 2 ♀♀ Paratypen, Corfu, Val di Ropa, 1905, leg. LEONHARD.

hipposideros L. W. SCHAUFUSS, 1877 (*Euplectus*)
Pselaphiden Siams, 12

Syntypen, Siam.

DEI: 1 Syntypus, Siam.

hirtella RAFFRAY, 1901 (*Hornia*)
Ann. Soc. Ent. France 70, 30

Syntypen, Ceylon, Bandarawella.

DEI: 1 ♀ Syntypus, Bandarawella, 1899.

hispanicus Z. KARAMAN, 1955 (*Tychus*)
Acta Mus. Sci. Nat. Skopje 3, Nr. 4/26, 118

♂ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, Südsanien, Algesiros; Holotypus, im DEI.

honestus L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Batrissus*)
Nunquam Otiosus 2, 272

Syntypen, Brasilien, Neu Freiburg.

DEI: 4 Syntypen, Brasilien, Neu Freiburg.

horni Z. KARAMAN, 1959 (*Centrophthalmosis*)
Bull. Soc. Ent. Mulhouse 1959, 49–51, Fig. 1

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Caucasus, leg. SCHRÖDER, im DEI.

hummleri REITTER, 1906 (*Euplectus*)
Wien. Ent. Ztg. 25, 129

2 Syntypen, Calabrien, Aspromonte, 1905, aus Laub gesiebt, leg. PAGANETTI-HUMMLER.

DEI: 2 Syntypen, Calabrien, Aspromonte, 1905, leg. PAGANETTI.

hyalina L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)
Nunquam Otiosus 3, 502

Syntypen; Neu Holland, Eastern Creek; Sydney; Clyde River.

DEI: 1 Syntypus, Sydney.

hyalinipennis L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)
Nunquam Otiosus 3, 501–502

Syntypen, Tasmanien.

DEI: 5 Syntypen, Tasmanien.

implicita RAFFRAY, 1912 (*Reichenbachia*)
Ent. Mitt. 1, 108–109

Syntypen, Formosa, Takao.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Takao, 12. 1907, leg. SAUTER.

inaequalis L. W. SCHAUFUSS, 1877 (*Centrophthalmus*)
Pselaphiden Siam, 22; als var. zu *punctipennis* L. W. SCHAUFUSS beschrieben

Syntypen, Siam, Bangkok.

DEI: 1 Syntypus, Siam.

incertulus MACHULKA, 1932 (*Bythinus*)
Wien. Ent. Ztg. 49, 129–130, Fig. 2

Syntypen; Südtirol, Bozen, leg. MATCHA; Alpes marit., Termi di Valdieri, St. Martin Lantosque, leg. GROUVELLE; Calabrien, Sta Eufemia, Sta Christina, Aspromonte, leg. PAGANETTI.

DEI: 12 Syntypen, St. M. Lantosq., leg. GROUVELLE.

incertulus meridionalis MACHULKA, 1932 (*Bythinus*)
Wien. Ent. Ztg. 49, 130

Syntypen, Calabrien, Sta Eufemia, Sta Christina, Aspromonte, leg. PAGANETTI.

DEI: 10 Syntypen, Calabria, St. Eufemia, 1905, leg. PAGANETTI.

indus L. W. SCHAUFUSS, 1882 (*Batrissus*)
Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova 18 (1882–83), 375–376

♂♂ Syntypen, Borneo, Sarawak, leg. DORIA.

DEI: 1 Syntypus, Borneo, Sarawak, 1865/66, leg. DORIA.

insignis REICHENSBERGER, 1931 (*Fustiger*)
Ent. Bl. 27, 6–7, Abb. 2

Syntypen, Vara Blanca, zwischen Barba und Poas, 2000 m, Wirtsameise *Pheidole* spec.

DEI: 1 Syntypus, Costa Rica, Vara Blanca, zwischen Barba und Poas, 2000 m, leg. SCHMIDT.

insignis L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Rhexius*)
Nunquam Otiosus 2, 260

2 Syntypen, Brasilien, Amazonenstrom, 1 Ex., Nr. 117, in Coll. REICHE, 1 Ex., Nr. 118, in Coll. L. W. SCHAUFUSS.

DEI: 1 Syntypus, Amazonenstrom.

isidorae L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)
Nunquam Otiosus 3, 500–501

Syntypen, Neu Holland, King George Sound.

DEI: 1 Syntypus, King George Sound.

javanicus RAFFRAY, 1912 (*Batriscenus*)
Arch. Nat. 78 A 6, 128

Syntypen, Java, Bandoeng, Sembang und Salatiga.

DEI: 1 Syntypus, Bandoeng, Sembang.

jeanneli BESUCHET, 1955 (*Biblopectus*)
Mitt. Schw. Ent. Ges. 28, 186–187

♂ Holotypus, Jugoslawie, Dalmatie, Metkovich, leg. REITTER, im Mus. Paris; Paratypen, Grèce, Corfou; 3 ♂♂, 2 ♀♀, im Mus. Wien; 1 ♂, 1 ♀, im DEI; 1 ♂, im Mus. FREY; 1 ♂, in Coll. BESUCHET; 1 ♂, Corfou, val de Ropa, im Mus. FREY; 1 ♂, Zante, leg. HILF, im DEI; 1 ♂, Russie, Caucase, Talsch, leg. KORB, im Mus. FREY.

DEI: 1 ♂, 1 ♀ Paratypen, Corfu, leg. PAGANETTI; 1 ♂ Paratypus, Zante, Kalamaki, 1909, leg. HILF.

kabyliana RAFFRAY, 1873 (*Bryaxis*)
Rev. Mag. Zool. (Sér. 3) 1 (= 36), 364, Taf. 15

Mehrere Syntypen, Kabylien, Azib-Zamoun, leg. LETOURNEUX.

DEI: 1 Syntypus, Kabylien.

kraatzi SAULCY, 1874 (*Trichonyx*)

Bull. Soc. Hist. Nat. Metz 13, 125–126

2 Syntypen, Cordoue, leg. KRAATZ.

DEI: 1 Syntypus, Andalusien, mit 2 Ameisen zusammen.

kubischteki REITTER, 1891 (*Pselaphoptrus*)

Wien. Ent. Ztg. 10, 140–141

1 ♀ Syntypus, bei Ordubad, am Ufer des Araxes, leg. KUBISCHTEK; etwa 20 Syntypen, Central-Asien, Margelan, leg. WILLBERG.

DEI: 1 Syntypus, Margelan.

laeviceps L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)

Nunquam Otiosus 3, 503–504

2 Syntypen, Neu Holland, Sydney und Eastern Creek.

DEI: 1 Syntypus, Sydney.

lathridiiforme REITTER, 1881 (*Pygoxyon*)

Dtsch. Ent. Ztschr. 25, 200–203; Taf. 4, Fig. 1–3

Syntypen; Dalmatien, Ragusa und Pridworje; Herzegow.; Drieno; Montenegro.

DEI: 2 Syntypen, Herzegowina, Drieno.

leonhardi REITTER, 1902 (*Bythinus*)

Wien. Ent. Ztg. 21, 3–4

♂♀ Syntypen, Herzegowina, Jablanica, Ivan.

DEI: 2 Syntypen, Herzegevin, Jablanica; 16. 6. 1901.

leonhardi REITTER, 1910 (*Pselaphostomus*)

Wien. Ent. Ztg. 29, 151–152

Zahlreiche Syntypen, Sizilien, bei Ficuzza und Madonia, aus verrottetem Eichenlaub gesiebt, 18. 4. 1906, leg. KRÜGER und LEONHARD.

DEI: 1 Syntypus, Sizilia, Madonia, leg. KRÜGER.

longipes DODERO, 1919 (*Amaurops*)

Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova (Ser. 3a) 8 (= 48) (1918–20), 186–187; Taf. 3, Fig. 10+10a

Mehrere Syntypen, Sardinien, Macomer und Monte S. Antonio.

DEI: 1 Syntypus, Sardinien, Macomer, leg. DODERO.

longispina REITTER, 1884 (*Bryaxis*)

Dtsch. Ent. Ztschr. 28, 106–107

Zahlreiche Syntypen; Corfu, Zante und Central-Dalmatien, an den Narentasümpfen, leg. REITTER. Toscana, Lucca, leg. CARARRA.

DEI: 1 Syntypus, Corfu, leg. REITTER.

machulkai BESUCHET, 1955 (*Bibloplectus*)

Mitt. Schw. Ent. Ges. 28, 187–188

France, Var, Fréjus, leg. REY. Holotypus, 2 ♂♂, 1 ♀, im DEI; 2 ♂♂, 2 ♀♀ Paratypen, im Mus. Wien; 1 ♂, in Coll. BESUCHET. Pyrénées orientales, Collioure, leg. NORMAND, 1 ♂, in Coll. BESUCHET; Yougoslavie, Slavonie, Fruskagora, leg. PAGANETTI, 1 ♂, im Mus. FREY.

DEI: ♂ Holotypus, 2 ♂♂, 1 ♀ Paratypen, Provence, Frejus, leg. REY.

macrocephalus L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Batrissus*)

Nunquam Otiosus 2, 273

Syntypen, Brasilien, Neu Freiburg, „auch in Herrn REICHES Sammlung“.

DEI: 5 Syntypen, Brasilien, Neu Freiburg.

majorinus L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Rhexius*)

Nunquam Otiosus 2, 260

Syntypen, Amazonenstrom, leg. BATES.

DEI: 2 Syntypen, Amazonenstrom.

mamilla L. W. SCHAUFUSS, 1877 (*Bryaxis*)

Pselaphiden Siam, 9

Syntypen, Siam, Bangkok.

DEI: 3 Syntypen, Bangkok.

margaritifer L. W. SCHAUFUSS, 1882 (*Batrissus*)

Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova 18, (1882–83) 377–378

Holotypus, Sumatra, im DEI.

marginalis L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Cylindrembolus*)

Tijdschr. Ent. 30, 103–104

Syntypen, Amazonas.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Amazonas.

martkopi REITTER, 1881 (*Bythinus*)

Verh. zool. bot. Ges. Wien 30 (1880), 510

Syntypen, Martkopi, aus Laub gesiebt.

DEI: 1 Syntypus, Caucasus, Martkopi, leg. LEDER.

melanocephala L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)
Nunquam Otiosus 3, 494—495

Syntypen, Tasmanien.

DEI: 1 Syntypus, Tasmanien.

melinensis REITTER, 1881 (*Bythinus*)
Dtsch. Ent. Ztschr. 25, 195—196; Taf. 6, Fig. 6, 7, 15

Syntypen, Süddalmatien, bei Meline in der Nähe von Castelnovo, leg. REITTER.

DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Dalmatien, Castelnovo, leg. REITTER.

mendax zantei Z. KARAMAN, 1955 (*Tychoides*)
Acta Mus. Mac. Sci. Nat. Skopje 3, Nr. 4/26, 133

2 ♂♂, 2 ♀♀ Syntypen, Insel Zante, im DEI.

DEI: 1 Syntypus, Zante, Kalamaki, 1909, leg. HILF; 3 Syntypen, Zante, Umgebung der Stadt, 1909, leg. HILF.

merditanus APFELBECK, 1906 (*Bythinus*)
Sitz.-ber. Ak. Wiss. Wien 115, 1668

Syntypen, Albanien, Gebirge der Merdita bei Oroshi, Mal i Shëit, leg. APFELBECK.

DEI: 2 Syntypen, Merdita, M. Schëit.

minasanae L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Bryaxis*)
Tijdschr. v. Ent. 30, 136—137

Syntypen, Minas Geraes, Brasilien, leg. SAHLBERG.

DEI: 1 Syntypus, Minas Geraes.

mirabilis KARAMAN, 1954 (*Bythobletus*)
Fragm. Balcanica 1, 50—51, Abb. 9

2 ♂♂ Syntypen, Norditalien, Como See und Luino, im DEI.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Como See, Mte. Bisbino; 1 ♂ Syntypus, Luino, leg. BRENSKE.

mohamedis REITTER, 1903 (*Bythinus*)
Wien. Ent. Ztg. 22, 222

Syntypen; Belgrader Wald bei Konstantinopel; Anatolien, Alem-Dagh, leg. v. BODEMEYER.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Asia-Minor, Alem-Dagh, leg. v. BODEMEYER.

monoceros L. W. SCHAUFUSS, 1882 (*Bryaxis*)
Bull. Soc. Ent. France (Sér. 6) 2, XCIV

Syntypen, Surinam, in Coll. DOHRN und im DEI.

DEI: 1 Syntypus, Surinam.

morus L. W. SCHAUFUSS, 1882 (*Batrissus*)
Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova 18 (1882—83), 388—389

Syntypen, Celebes, Macassar, leg. BECCARI.

DEI: 2 Syntypen, Celebes, Macassar, 1. 74, leg. BECCARI.

nanus L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Pselaphus*)
Nunquam Otiosus 3, 485

2 Syntypen, Amazonas, in Coll. L. W. SCHAUFUSS.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundortangaben.

nephriticus L. W. SCHAUFUSS, 1882 (*Batrissus*)
Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova 18 (1882—83), 384—385

♂♀ Syntypen, Celebes, Macassar, leg. BECCARI.

DEI: 1 Syntypus, Celebes, Macassar, 1. 74, leg. BECCARI.

nicotianus L. W. SCHAUFUSS, 1882 (*Batrissus*)
Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova 18 (1882—83), 393

Holotypus, Sumatra, ex *Nicotiana tabacum* LINNÉ, leg. GROUVELLE.

DEI: Holotypus, Tabak, GR.

nobilis HOLDHAUS, 1908 (*Amaurops*)
Dtsch. Ent. Ztschr. 1908, 23—24

Zahlreiche Syntypen, Corfu, Hagios Mathias, aus tiefen Laublagen gesiebt.

DEI: 7 Syntypen, Corfu, Hagi Mathias, 1905, leg. LEONHARD.

nubigena caucasicus ROUBAL, 1910 (*Euplectus*)
Casopis 7, 141—142

Mehrere Syntypen, Umg. Krasnaja Poljana.

DEI: 4 Syntypen, Caucasus occ., Krasnaja Poljana, 7. 1910, leg. ROUBAL.

opacus L. W. SCHAUFUSS, 1877 (*Zethus*)
Pselaphiden Siam, 12

Syntypen, Siam.

DEI: 1 ♀ Syntypus, Siam.

orientalis Z. KARAMAN, 1952 (*Bythinus*)
Prir. istraživanja Jug. akad. Zagreb 25, 114—115

Syntypen; Deutschland, Löhn. Tatra: Bolechow und Neudorf. Österreich: Milevert; Koralpe und Graz. Jugoslawien: Steiermark; Ljubljana; Novo Mesto; Rožni dal in Slovenien; Zagreb; Križevci in Kroatien; Sarajevo, Maklen und Celič in Bosnien; Veleš pl. bei Mostar in der Hercegovina. Bulgarien: Smederevo, leg. KARAMAN; Plevna; Samokov. 1 Ex., Sardinien, Assuni, leg. KRAUS, im DEI.

DEI: 1 Syntypus, Löhn; 6 Syntypen, Herzegovina, Velež Planina, 1900; 1 Syntypus, Croat.; 2 ♂♂ Syntypen, Bosnien, Maklen, 18+21. 6. 02; 2 Syntypen, Bulgarien, Trevna, 5.—6. 1912, leg. HILF; 2 ♂♂ Syntypen, Bulgarien, Samokov, 1911, leg. HILF; 2 Syntypen, Sardinia, Assuni, leg. KRAUSSE.

orion L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Batrissus*)
Nunquam Otiosus 2, 271—272

Syntypen; Neu Freiburg; Brasilien, unter Nr. 111 in Coll. REICHE.
DEI: 1 Syntypus, Brasilien, N. Freiburg.

ornatissima L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Bryaxis*)
Tijdschr. v. Ent. 30, 115—116

Syntypen, Sumatra.
DEI: 1 Syntypus, Sumatra.

oroshianus APFELBECK, 1906 (*Bythinus*)
Sitz.-ber. Ak. Wiss. Wien 115, 1668—1669

Syntypen, Albanien, Merdita, Gebirge bei Oroshi, Mal i Shëit, unter Buchen- und Hasellaublagen, leg. APFELBECK.
DEI: 2 Syntypen, Merdita, M. Schëit.

ovalipennis L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)
Nunquam Otiosus 3, 501

♂♀ Syntypen, Neu Seeland.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundortangaben.

paganettii Z. KARAMAN, 1959 (*Claviger*)
God. Zborn. Zeml. Fak. Univ. Skopje 12, 287, 296

♂ Holotypus, Caril, leg. PAGANETTI, im DEI.

paganettii REITTER, 1906 (*Trimium*)
Wien. Ent. Ztg. 25, 129

Zahlreiche Syntypen, Calabrien, Eufemia d'Aspromonte, 1905, leg. PAGANETTI-HUMMLER.
DEI: 5 Syntypen, Calabria, Sta. Eufemia, d'Aspromonte, 1905, leg. PAGANETTI.

parvidens RAFFRAY, 1912 (*Batriscenus*)
Arch. Nat. 78 A6, 127

Syntypen, West Java, Rediri.
DEI: 1 Syntypus, Ostjava, Rediri.

peniculus L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Batrissus*)
Nunquam Otiosus 2, 271

Syntypen, Neu Freiburg, Brasilien.
DEI: 1 Syntypus, N. Freiburg, Brasilien.

penita L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Bryaxis*)
Tijdschr. v. Ent. 30, 135—136

Syntypen, Amazonas.
DEI: 1 Syntypus, Amazonas.

pentachiroides L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Bryaxis*)
Tijdschr. v. Ent. 30, 125—126

♂♀ Syntypen, Minas Geraes, Brasilien, leg. SAHLBERG.
DEI: 1 Syntypus, Minas Geraes.

picta L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)
Nunquam Otiosus 3, 497

Syntypen, Tasmania.
DEI: 5 Syntypen, Tasmania.

picteti krügeri MACHULKA, 1932 (*Bythinus*)
Wien. Ent. Ztg. 49, 129

Syntypen, Val Camonica und Oltre di Colle.
DEI: 2 ♂♂ Syntypen, Val Camonica, Borno, leg. KRÜGER.

picticornis REITTER, 1882 (*Bryaxis*)
Dtsch. Ent. Ztschr. 26, 188—189; Taf. 9, Fig. 6

Syntypen, Goldküste, Addah, leg. KOPP.
DEI: 1 Syntypus, Westafrika, Addah.

plagiata RAFFRAY, 1912 (*Diaugis*)
Ent. Mitt. 1, 103—104

Syntypen, Formosa, Kosempo.
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kosempo, 8. 1909, leg. SAUTER.

planifrons L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Batrissus*)
Nunquam Otiosus 2, 270; als var. zu *trifoveolatus* L. W. SCHAUFUSS beschrieben

Syntypen; Santa Fé de Bogotá, Neu Granada; Magdalenenfluß; Columbien?
DEI: 1 Syntypus, N. Granada.

placatus L. W. SCHAUFUSS, 1882 (*Trichonyx*)
Rev. d'Ent. 1, 185—186

Syntypen, Cayenne, im Mus. Warschau.
DEI: 1 Syntypus, Cayenne, ex Mus. Warschau.

polita KING, 1863 (*Bryaxis*)

Trans. Ent. Soc. N.S. Wales 1, 49—50

Syntypen, Parramatta.

DEI: 1 Syntypus, Parramatta.

pumilio L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)

Nunquam Otiosus 3, 504

2 ♂♂, 1 ♀ Syntypen, Neu Holland, am Clyde-Fluß.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Clyde River.

punctatus KING, 1866 (*Rylus*)

Trans. Ent. Soc. N. S. Wales 1, 303; Taf. 7, Fig. 6

Syntypen; Parramatta; South Creek; Prospect Hill.

DEI: 2 Syntypen, Parramatta.

punctipennis L. W. SCHAUFUSS, 1877 (*Centrophthalmus*)

Pselaphiden Siams, 21—22

Syntypen, Siam, Bangkok.

DEI: 1 Syntypus, Bangkok.

punctipennis L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Gerallus*)

Nunquam Otiosus 3, 509—510

Syntypen, Neu Holland, Eastern Creek und Neu S. Wales.

DEI: 1 Syntypus, N. S. Wales; 2 Syntypen, N. Holland, Eastern Creek.

punctulatus RAFFRAY, 1914 (*Durbas*)

Suppl. Ent. 3, 4—5

Syntypen, Formosa, Akau.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Akau, 12. 07, leg. SAUTER.

pusilla L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)

Nunquam Otiosus 3, 491—492

2 Syntypen, Mexico.

DEI: 1 Syntypus, Mexico.

quadripunctatus L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Batrisus*)

Nunquam Otiosus 2, 273—274

Syntypen; Yucatan; „auch wohl in Herrn REICHES Sammlung unter Nr. 100.“

DEI: 1 Syntypus, Mexico, REICHE Nr. 100.

quadristriatus L. W. SCHAUFUSS, 1877 (*Centrophthalmus*)

Pselaphiden Siams, 22—23

Syntypen, Singapore.

DEI: 1 Syntypus, Singapore.

quinquefoveolatus L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Batrisus*)

Nunquam Otiosus 2, 274

Syntypen; Brasilien. Rio de Janeiro, in REICHES Sammlung unter Nr. 86 und 114.

DEI: 1 Syntypus, Brasilien.

recens L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)

Nunquam Otiosus 3, 487—488

Syntypen, Amazonas.

DEI: 1 Syntypus, Amazonas.

revelierei SAULCY, 1874 (*Claviger*)

Bull. Soc. Hist. Nat. Metz 13, 34—35

Syntypen, Corsica, leg. REVELIERE.

DEI: 1 Syntypus, Corse.

rhinoceros L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Batrisus*)

Nunquam Otiosus 2, 281—282

Syntypen, Brasilien, Neu Freiburg.

DEI: 1 Syntypus, Neu Freiburg.

rhinophorus BLATTNÝ, 1914 (*Bythinus*)

Verh. zool. bot. Ges. Wien 64, 122—123, Fig. 4

Syntypen, Italien, Berge südlich von Castel di Sangro, Mte. Pagano, leg. PAGANETTI.

DEI: 1 ♂ Syntypus, Berge südlich von Castel di Sangro, leg. PAGANETTI.

rosmarus REITTER, 1882 (*Bryaxis*)

Dtsch. Ent. Ztschr. 26, 187—188; Taf. 9, Fig. 5

Syntypen, Goldküste, Addah, leg. KOPP.

DEI: 1 Syntypus, Westafrika, Addah.

rubripennis RAFFRAY, 1908 (*Decarthron*)

Rev. Mus. La Plata 15, 76

Holotypus, Paratypen, Argentinien, Prov. Buénos Aires, Holotypus in Coll. RAFFRAY.

DEI: 1 Paratypus, Argentinien, Prov. Buenos Aires, 20. 1. 1906, leg. BRUCH.

rugiceps L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Batrissus*)
Nunquam Otiosus 2, 271

Syntypen, Neu-Granada, Santa Fé de Bogota.
DEI: 1 Syntypus, N.-Granada, S. Fé d-Bogota.

rugicollis L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Gamba*)
Nunquam Otiosus 2, 360

Holotypus, Pampas, unter Nr. 1429 in v. BONVOULOIR's Sammlung, im DEI.

sachtlebeni Z. KARAMAN, 1955 (*Tychoides*)
Acta Mus. Mac. Sci. Nat. Skopje 3, Nr. 4/26, 129–131

♂ Holotypus, Camerata nuova, Zentralitalien, leg. KRÜGER, im DEI.

sahlbergi REITTER, 1883 (*Xybaris*)
Verh. zool. bot. Ges. Wien 32 (1882), 381

Syntypen, Petropolis, leg. SAHLBERG.
DEI: 1 Syntypus, Brasília, SAHLBERG.

sanguineus BROWN, 1880 (*Bryaxis*)
Man. New Zealand Col. 1, 132

Mehrere Syntypen, Tairua, Neuseeland.
DEI: 1 ♂, 2 ♀♀ Syntypen, New Zealand, Tairua.

sarawakensis L. W. SCHAUFUSS, 1882 (*Batrissus*)
Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova 18 (1882–83), 381

♂♀ Syntypen, Borneo, Sarawak, leg. DORIA.
DEI: 1 Syntypus, Borneo, Sarawak, 1865/66, leg. DORIA.

sarawakensis L. W. SCHAUFUSS, 1882 (*Bryaxis*)
Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova 18 (1882–83), 364–365

Syntypen, Borneo, Sarawak, leg. DORIA.
DEI: 1 Syntypus, Borneo, Sarawak, 1865/66, leg. DORIA.

sarcinaria L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Bryaxis*)
Tijdschr. v. Ent. 30, 127

Syntypen; Mexico, Yucatan; auch in REICHES Sammlung unter Nr. 97.
DEI: 1 Syntypus, Yucatan.

sardoa aritzensis DODERO, 1919 (*Amaurops*)
Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova (Ser. 3a) 8 (= 48) (1918–20), 184–185

Mehrere Syntypen, Sardinien, Aritzo.
DEI: 3 Syntypen, Sardinia, Aritzo, Mte. Genargentu, leg. KRÜGER.

saucium RAFFRAY, 1908 (*Decarthron*)
Dtsch. Ent. Ztschr. 1908, 410–411

Syntypen, Paraguay.
DEI: 2 Syntypen, Paraguay, leg. DRAKE.

sauleyi REITTER, 1877 (*Amaurops*)
Dtsch. Ent. Ztschr. 21, 291

6 Syntypen, Caucasus, wenige Fuß unterhalb der Suram-Paßhöhe, in den Ritzen von verwitterten Sandsteinblöcken.
DEI: 2 Syntypen, Caucasus, Mesikisches Gebirge, leg. LEDER; 1 Syntypus, Caucasus.

sauteri RAFFRAY, 1912 (*Batrissocenus*)
Ent. Mitt. 1, 105

Syntypen, Formosa, Akau.
DEI: 20 Syntypen, Formosa, Akau, 12. 07, leg. SAUTER.

sauteri RAFFRAY, 1914 (*Prosthecarthron*)
Suppl. Ent. 3, 3–4

♂♂ Syntypen, Formosa, Anping.
DEI: 1 ♂ Syntypus, Formosa, Anping, 22. 5. 1912, leg. SAUTER.

schenklingi RAFFRAY, 1912 (*Batrissocenus*)
Ent. Mitt. 1, 105–106

Syntypen, Formosa, Akau, Kankau.
DEI: 12 Syntypen, Formosa, Akau, 12. 07, leg. SAUTER; 1 Syntypus, Formosa, Kankau, 12. 09, leg. SAUTER.

schlerethi REITTER, 1882 (*Bryaxis*)
Dtsch. Ent. Ztschr. 26, 189

Syntypen, Goldküste, Addah, leg. KOPP.
DEI: 1 Syntypus, Westafrika, Addah.

schmidtii REICHENSPERGER, 1931 (*Fustiger*)
Ent. Bl. 27, 4–6, Abb. 1

Syntypen, Vara Blanca, zwischen Barba und Poas, 2000 m, Wirtsameise *Pheidole* spec.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

scitiventris BROUN, 1921 (*Plectomorphus*)
Bull. N. Zealand Inst. 1, 507—508

Einige Syntypen, Glenhope, Nelson, 14. + 30. 3. 1915, leg. HALL.
DEI: 3 Syntypen, N. Z., Glenhope, Nelson.

scopula RAFFRAY, 1914 (*Arnyllium*)
Suppl. Ent. 3, 2

Syntypen, Formosa, Taihorin, Takao.
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Takao, 11. 07, leg. SAUTER; 1 Syntypus, Formosa, Taihorin, 7. 7. 1911, leg. SAUTER.

selysi L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Articeros*)
Nunquam Otiosus 3, 481—482

Syntypen, Neu Holland, Schwänenfluß.
DEI: 2 Syntypen, Swan River.

semisanguinea L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Bryaxis*)
Tijdschr. v. Ent. 30, 133

Syntypen, Minas Geraes, leg. SAHLBERG.
DEI: 1 Syntypus, Minas Geraes.

septemfoveolatus L. W. SCHAUFUSS, 1877 (*Batrisus*)
Pselaphiden Siams, 15—16

Syntypen, Siam, Bangkok.
DEI: 2 Syntypen, Siam, Bangkok.

setifer L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Metopioidea*)
Nunquam Otiosus 2, 451

Syntypen, Brasilien.
DEI: 3 Syntypen, Ega, WSTWD.

siamensis L. W. SCHAUFUSS, 1877 (*Bryaxis*)
Pselaphiden Siams, 9—10

Holotypus, Siam, Bangkok, ex Coll. CASTELNAU, im DEI.

similis L. W. SCHAUFUSS, 1882 (*Batrisus*)
Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova 18 (1882—83), 395

Holotypus, Sumatra, im DEI.
DEI: Holotypus, Sumatra, Tabak, Gr.

simplex L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Bythinogaster*)
Tijdschr. v. Ent. 30, 112

Syntypen, Insel San Domingo.
DEI: 2 Syntypen, San Domingo, Tabacs.

simplex RAFFRAY, 1908 (*Decarthron*)
Rev. Mus. La Plata 15, 75

Holotypus, Paratypen, Argentinien, Prov. Buenos Aires; Holotypus, in Coll. RAFFRAY.
DEI: 1 Paratypus, Argentina, Prov. Buenos Aires, 20. 1. 1906, leg. BRUCH.

simplex L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Trichonyx*)
Nunquam Otiosus 2, 287

Syntypen, Amazonenstrom
DEI: 2 Syntypen, Brasilien, Amazonas.

singularis L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)
Nunquam Otiosus 3, 488—489

Syntypen, Chile.
DEI: 1 Syntypus, Chile.

sobrina L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)
Nunquam Otiosus 3, 495

Syntypen, Tasmanien.
DEI: 1 Syntypus, Tasmanien.

solidus REITTER, 1881 (*Bythinus*)
Dtsch. Ent. Ztsch 125, 196—197; Taf. 6, Fig. 8, 9

Syntypen, Castelnuovo und Cattaro, leg. REITTER.
DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Dalmatien, Castelnuovo, leg. REITTER.

sotskyi L. W. SCHAUFUSS, 1877 (*Euplectus*)
Pselaphiden Siams, 13

Syntypen, Siam.
DEI: 2 Syntypen, Siam.

spiniollis L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Jubus*)
Nunquam Otiosus 2, 456—457

Syntypen, Nova Granata, in Coll. v. D. BRUCK und in Coll. SCHAUFUSS.
DEI: 1 Syntypus, N. Gran.

spuria L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Bryaxis*)
Tijdschr. v. Ent. **30**, 132

Syntypen, Friburg, Brasilien.
DEI: 1 Syntypus, Neu Freiburg.

steindachneri REITTER, 1881 (*Bryaxis*)
Verh. zool. bot. Ges. Wien **30** (1880), 511

Syntypen, Kaukasus, Abastuman, aus Laub gesiebt.
DEI: 1 Syntypus, Caucasus, Abastuman, leg. LEDER, in Coll. HEIDEN.

stultor L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Batrissus*)
Tijdschr. v. Ent. **30**, 144

Syntypen, Minas Geraes, Brasilia.
DEI: 3 Syntypen, Minas Geraes.

subasper L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Gerallus*)
Nunquam Otiosus **3**, 510

Syntypen; Tasmania; Neu S. Wales.
DEI: 1 Syntypus, Tasmania; 1 Syntypus, N. S. Wales.

subcalva REITTER, 1882 (*Desimia*)
Dtsch. Ent. Ztschr. **26**, 180–181; Taf. 8, Fig. 6

Syntypen, Goldküste, Addah, leg. KOPP.
DEI: 1 Syntypus, Westafrika, Addah.

subfoveolata L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Bryaxis*)
Nunquam Otiosus **2**, 262–263

Syntypen, Neu-Granada.
DEI: 1 Syntypus, N. Granada.

subtilis L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Homotus*)
Berl. Ent. Ztschr. **31**, 303–304

Syntypen, Minas Geraes, Brasilien, leg. SAHLBERG, in Coll. SCHAUFUSS.
DEI: 1 Syntypus, Min. Geraes.

subulatus KING, 1864 (*Tyrus*)
Trans. Ent. Soc. N. S. Wales **1**, 103; Taf. 7, Fig. 6

Syntypen, Parramatta, Dunheved.
DEI: 1 Syntypus, Parramatta.

sulcipennis BROWN, 1921 (*Eupinogilus*)
Bull. N. Zealand Inst. **1**, 518

Mehrere Syntypen, Staircase, 3500 Fuß, 15. 3. 1914, leg. HALL.
DEI: 3 Syntypen, Staircase, 3500 Fuß, Otago.

superbus L. W. SCHAUFUSS, 1882 (*Batrissus*)
Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova **18** (1882–83), 393–394

Holotypus, Sumatra.
DEI: Holotypus, Sumatra, Mte. Singalang, Luglio 1878, leg. BECCARI.

sursicauda GANGLBAUER, 1900 (*Reichenbachia*)
In: BODEMEYER, Quer durch Kleinasien, 146–147

♂ Holotypus, Biledjik, leg. BODEMEYER, im DEI.

sus L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Batrissus*)
Tijdschr. v. Ent. **30**, 143–144

Syntypen, Minas Geraes, Brasilia, leg. SAHLBERG.
DEI: 2 Syntypen, Minas Geraes.

talpa L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)
Nunquam Otiosus **3**, 496

Syntypen, Tasmania.
DEI: 1 Syntypus, Tasmanien.

talychensis REITTER, 1882 (*Trichonyx*)
Verh. zool. bot. Ges. Wien **31** (1881), 520

Syntypen; Caspisches Gebiet, Lenkoran; Tirol, Bozen, 4. 1881, leg. REITTER.
DEI: 1 Syntypus, Lenkoran, leg. LEDER.

triangulifer L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Bryaxis*)
Tijdschr. v. Ent. **30**, 128–129

Syntypen, Minas Geraes, Brasilien, leg. SAHLBERG.
DEI: 1 Syntypus, Minas Geraes.

trifoveolatus L. W. SCHAUFUSS, 1872 (*Batrissus*)
Nunquam Otiosus **2**, 269–270

Syntypen; Santa Fé de Bogotá, Neu Granada; Magdalenenfluß; Columbien?
DEI: 1 Syntypus, N. Granada.

trinodulus L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Batrissus*)
Tijdschr. v. Ent. 30, 144—145

Syntypen, Minas Geraes, Brasilia, leg. SAHLBERG.
DEI: 1 Syntypus, Minas Geraes.

trochanteralis BROWN, 1911 (*Vidamus*)
Ann. Mag. Nat. Hist. (Sér. 8) 8, 691—692

12 Syntypen, Erua und Waimarino, 2400—2700 Fuß, 1. 1911.
DEI: 2 Syntypen, Erua, King Country, New Zealand.

truncata L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Bryaxis*)
Tijdschr. v. Ent. 30, 128

Syntypen, Cuba.
DEI: 1 Syntypus, Cuba.

tuberculatus RAFFRAY, 1877 (*Odontalgus*)
Rev. Mag. Zool. (Sér. 3) 5, 287

Syntypen, Abyssinien, westlich von Sémiène, Januar.
DEI: 1 Syntypus, Abyssinien, leg. RAFFRAY.

tumidus BROWN, 1911 (*Euplectopsis*)
Ann. Mag. Nat. Hist. (Sér. 8) 8, 690—691

Ca. 12 Syntypen; Erua, 1. 1910; Weimarino; Makatote, leg. GUINNESS.
DEI: 3 Syntypen, Erua, King Country, New Zealand.

unifoveolata L. W. SCHAUFUSS, 1887 (*Bryaxis*)
Tijdschr. v. Ent. 30, 125

Syntypen, Cuba, leg. GRUNDLACH.
DEI: 1 Syntypus, Cuba.

ursinus L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Batrissus*)
Nunquam Otiosus 3, 507

Syntypen, Neu Holland, Wyde-Bay.
DEI: 1 Syntypus, Wide Bay.

vaccæ DODERO, 1900 (*Bythinus*)
Ann. Mus. Civ. St. Nat. Genova (Ser. 2a) 20 (1899—1901), 410—412

Mehrere Syntypen, westliches Ligurien, grotta di Verzi, bei Loano; 1 Syntypus, grotta Pollera, bei Montesordo bei Finalborgo, leg. DODERO.
DEI: 1 Syntypus, Gr. di Verzi, 16. 4. 1897, leg. DODERO.

varicornis Z. KARAMAN, 1954 (*Arcopagus*)
Fragm. Balc. 1, 49—50, Abb. 8

1 ♂, 3 ♀♀ Syntypen, Griechenland, Thessalien, Pelion, leg. LEONHARD, im DEI.

verrucipalpis APFELBECK, 1907 (*Bythinus*)
Sitz.-ber. Ak. Wiss. Wien 116, 514—515

Syntypen, Albanien, Mal i Sheit bei Oroshi, aus tiefen Buchenlaublagen, leg. APFELBECK.
DEI: 1 Syntypus, Merdita, M. Scheit.

vitrea L. W. SCHAUFUSS, 1880 (*Bryaxis*)
Nunquam Otiosus 3, 495

Syntypen, Tasmanien.
DEI: 1 Syntypus, Tasmanien.

vlastæ ROUBAL, 1913 (*Bryaxis*)
Ent. Bl. 9, 121—122

4 Syntypen, Caucasus occ., Krasnaja Poljana, in der alpinen Zone unter Moos, leg. ROUBAL.
DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

woerzi HOLDHAUS, 1908 (*Bythinus*)
Dtsch. Ent. Ztschr. 1908, 26

Einige Syntypen, auf Corfu und Kephallinia.
DEI: 1 ♂ Syntypus, Kephallinia, leg. WINKLER.

Wahrscheinlich nicht beschrieben

adelaidæ L. W. SCHAUFUSS

DEI: 6 Ex., Adelaide, als Typen ausgezeichnet.

aequicornis L. W. SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex., Columbien, leg. MORITZ, als Typus ausgezeichnet.

amptipennis L. W. SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex., Sydney, als Typus ausgezeichnet.

aridæ L. W. SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex., Sydney, als Typus ausgezeichnet.

binodis L. W. SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex., Columbien, leg. MORITZ, als Typus ausgezeichnet.

brevipennis L. W. SCHAUFUSS (*Gamba*)

DEI: 1 Ex., Arnajon, als Typus ausgezeichnet.

canilli L. W. SCHAUFUSS (*Sintectes*)

DEI: 6 Ex., Australia, Grigham, Pine mounting, 1 Ex. als Typus ausgezeichnet.

cephalotes L. W. SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex., Columbien, leg. MORITZ, als Typus ausgezeichnet.

communis L. W. SCHAUFUSS (*Euplectus*)

DEI: 4 Ex., Gawlen, als Typen ausgezeichnet.

crassicornis L. W. SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex., Columbien, leg. MORITZ, als Typus ausgezeichnet.

cyarchitectus L. W. SCHAUFUSS

DEI: 2 Ex., Sumatra, tabac., als Typen ausgezeichnet.

denticollis L. W. SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex., Columbien, leg. MORITZ, als Typus ausgezeichnet.

elegans L. W. SCHAUFUSS (*Tmesiphorus*)

DEI: 1 Ex., Chile, als Typus ausgezeichnet.

elongatus L. W. SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex., Champion B., als Typus ausgezeichnet.

erosipes L. W. SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex., Columbien, leg. MORITZ, als Typus ausgezeichnet.

excursoata L. W. SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex., Sumatra, Tabak, als Typus ausgezeichnet.

flachi PAGANETTI (*Faronus*)

DEI: 1 Ex., Calabria, Aspromonte, 1905, leg. PAGANETTI, als Typus ausgezeichnet.

foveicollis L. W. SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex., Columbien, leg. MORITZ, als Typus ausgezeichnet.

fracticornis L. W. SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex., Columbien, leg. MORITZ, als Typus ausgezeichnet.

globoicornis L. W. SCHAUFUSS (*Batrissus*)

DEI: 1 Ex., Chile, als Typus ausgezeichnet.

gracile L. W. SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex., Chile, als Typus ausgezeichnet.

grouvelli L. W. SCHAUFUSS (*Batrissus*)

DEI: 1 Ex., Sumatra, als Typus ausgezeichnet.

horni MACHULKA (*Bythinopsis*)

DEI: 2 ♂♂, Calabrien, Cimina, leg. PAGANETTI; 4 Ex., Calabria, Sta. Eufemia, leg. PAGANETTI; 1 Ex., San Basilio, Murgien, leg. PAGANETTI; 2 ♂♂, Messina, 1./12. 5. 1906, leg. DODERO; 1 Ex., Calabria, Antonimina, leg. PAGANETTI; als Typen ausgezeichnet.

impressicornis L. W. SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex., Columbien, leg. MORITZ, als Typus ausgezeichnet.

incognitus L. W. SCHAUFUSS

DEI: 6 Ex., Adelaide, als Typen ausgezeichnet.

incurnata L. W. SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex., Sumatra, als Typus ausgezeichnet.

laticlava L. W. SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex., Tasmanien, als Typus ausgezeichnet.

latipes L. W. SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex., Columbien, leg. MORITZ, als Typus ausgezeichnet.

leonhardi MACHULKA (*Euplectus*)

DEI: 1 ♂ Sicilia, Ficuzza, 18. 4. 1906, leg. LEONHARD (von REITTER als ♀ ausgezeichnet), als Typus ausgezeichnet.

marsyas L. W. SCHAUFUSS (*Bryaxis*)

DEI: 1 Ex., Chile, als Typus ausgezeichnet.

meridenensis L. W. SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex., Merida, als Typus ausgezeichnet.

minutus L. W. SCHAUFUSS (*Batrisus*)

DEI: 1 Ex., Chile, als Typus ausgezeichnet.

morosus L. W. SCHAUFUSS

DEI: 8 Ex., Swan Riv., als Typen ausgezeichnet.

nanus caucasicus MACHULKA (*Euplectus*)

DEI: 1 Ex., Lenkoran, leg. LEDER, als Typus ausgezeichnet.

nigrocephila L. W. SCHAUFUSS (*Bryaxis*)

DEI: 1 Ex., Siam, als Typus ausgezeichnet.

pallidus L. W. SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex., Sydney, als Typus ausgezeichnet.

picea L. W. SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex., Columbien, leg. MORITZ, als Typus ausgezeichnet.

posticus L. W. SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex., Pampas, als Typus ausgezeichnet.

pubescens L. W. SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex., Sydney, als Typus ausgezeichnet.

pulsator L. W. SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex., Sydney, als Typus ausgezeichnet.

puvetulatus L. W. SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex., New South Wales, als Typus ausgezeichnet.

rubella L. W. SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex., Batav., als Typus ausgezeichnet.

sagoloides L. W. SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex., Tasmanien, als Typus ausgezeichnet.

sculptilis L. W. SCHAUFUSS (*Eupsenius*)

DEI: 1 Ex., Chile, als Typus ausgezeichnet.

sculptipennis L. W. SCHAUFUSS (*Batrisus*)

DEI: 1 Ex., Chile, als Typus ausgezeichnet.

tabularis ANDREAE (*Henoplectus*)

DEI: 1 ♀ Ex., Tafelberg, Fir tree Moor, 15. 7. 1922, als Typus ausgezeichnet.

tarsalis L. W. SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex., Aragua, leg. MORITZ, als Typus ausgezeichnet.

tasmaniae L. W. SCHAUFUSS (*Tychus*)

DEI: 12 Ex., Tasmanien, als Typen ausgezeichnet.

thessalicus BLATTN. (*Trimium*)

DEI: 1 Ex., Pelion, Thessalien, als Typus ausgezeichnet.

transversalis L. W. SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex., Columbien, leg. MORITZ, als Typus ausgezeichnet.

trossulus L. W. SCHAUFUSS

DEI: 1 Ex., Tabac., GROUVELLE, als Typus ausgezeichnet.

venustus L. W. SCHAUFUSS (*Chenistes*)

DEI: 1 Ex., Mexico, Teapa, als Typus ausgezeichnet.

Histeridae

amplipes COOMAN, 1937 (*Eulomalus*)

Notes d'Ent. Chinoise Mus. Heude 4, 109—114

Holotypus, Sumatra, leg. HORN, im Mus. Paris. Paratypen: 1 ♀, dto.; 4 ♂♂, 2 ♀♀, Sumatra, Si Rambé, 1891, leg. MODIGLIANI; 1 ♂, Engano; 1 ♂, 2 ♀♀, Sumatra, Tebing-tinggi, leg. SCHULTHEISS; 3 ♂♂, 3 ♀♀, Java, 1890, leg. FRUHSTORFER; 2 ♂♂, 2 ♀♀, Java, 1908, leg. CORDIER; 6 ♂♂, 1 ♀, Java oriental, monts Tengger, 1890, leg. FRUHSTORFER.

DEI: Paratypen: 1 ♂, Engano; 2 ♂♂, 2 ♀♀, Sumatra; 1 ♀, N. O. Sumatra, Tebing-tinggi, leg. SCHULTHEISS; 1 ♂, Java; 2 ♂♂, Sumatra, Si-Rambé, 12. 1890–3. 1891, leg. MODIGLIANI.

asiaticus MAZUR, 1975 (*Hypocaccus*)

Bull. Acad. Polon. Sci. 23, 457–459, Fig. 1–2

Holotypus, 1 Paratypus, Ceylon, Trincomali, 1899, leg. HORN, im DEI.

bennigseni BICKHARDT, 1912 (*Eblisia*)

Ent. Mitt. 1, 307–308

Holotypus, Deutsch-Neuguinea, Kani-Gebirge, leg. VON BENNIGSEN, im DEI.

beyeri SCHARFFER, 1907 (*Hololepta*)

Ent. News 18, 302–304

♂♂ Syntypen, Santa Rosa, Lower California.

DEI: 1 Syntypus, Santa Rosa, Low. Cal.

bickhardti costaericae REICHENSPERGER, 1935 (*Ecclisister*)

Arb. morph. tax. Ent. 2, 204

Holotypus, Paratypen, Costa Rica, Hamburg-Farm, Ebene Limon, in Nestern von *Eciton burchelli*, 11. 1932, 2. 7. 1934, 25. 11. 1934, leg. NEVERMANN. Paratypus, im DEI.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

brasilienis MAZUR, 1974 (*Myrmeosaprinus*)

Beitr. Ent. 24, 55–56, Fig. 1–4

♂ Holotypus, Porte Allegre, Rio Grande do Sul, Brazil, in Nestern von *Trigona rufictus* LATR., leg. WITTE, im DEI.

calceatus COOMAN, 1931 (*Chronus*)

Bull. Soc. ent. France 1931, 204

Holotypus, ca. 50 Paratypen, Lac-Thô, Hoa-Binh, in Coll. DESBORDES.

DEI: 2 Paratypen, Hoa-Binh, Tonkin, leg. DE COOMAN.

canalifrons BICKHARDT, 1913 (*Trypeticus*)

Ent. Mitt. 2, 167–168

6 Syntypen, Formosa, Taihorin, Fuhosho und Kosempo, leg. SAUTER, im DEI und Coll. BICKHARDT.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Fuhosho, 7. 9.; 1 Syntypus, Formosa, Taihorin, 7. 8. 1911; 1 Syntypus, Formosa, Kosempo, 7. 6. 1912; alle leg. SAUTER.

cephallenicus K. DANIEL, 1906 (*Hister*)

Münch. Kol. Ztschr. 3, 174–176

9 Syntypen, Kephallenia, am Eleutherios-Pass, unter Steinen und Laub, 3.–4. 1905, leg. LEONHARD; 4 Ex., in Coll. K. DANIEL, 5 Ex., in Coll. LEONHARD.

DEI: 3 Syntypen, Kephallenia, Eleutherios-Pass, 1905, leg. LEONHARD.

cerberus AUZAT, 1923 (*Gnathoncus*)

Boll. Soc. ent. Ital. 55, 145–147

Syntypen, Sardinien, „a l'entrée de la Grotte de l'Enfer“, bei Scala di Giocca, leg. DODERO.

DEI: 2 Syntypen, Sardinien, Grotta dell Inferno, leg. DODERO.

cerylonoides BICKHARDT, 1912 (*Platysoma*)

Ent. Bl. 8, 123

3 Syntypen, Formosa, Fuhosho, 8.+9. 1909, leg. SAUTER, 2 Ex., im DEI, 1 Ex., in Coll. BICKHARDT.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

controversus COOMAN, 1935 (*Abraeus*)

Rev. franc. Ent. 2, 220–221, Fig. 3–4

Zahlreiche Syntypen, Hoabinh (Tonkin), im Mus. Paris.

DEI: 4 Syntypen, Hoa Binh, Tonkin, leg. DE COOMAN.

curvicollis BICKHARDT, 1913 (*Hister*)

Ent. Mitt. 2, 172

Holotypus, Formosa, Kankau (Koshun), 5. 1912, leg. SAUTER, im DEI.

dauricus REICHARDT, 1930 (*Hypocaccus*)

Rev. Russe d'Ent. 24, 52

Syntypen, Transbaicalia meridionalis und Mongolia borealis, Verchneudinsk, leg. MANDL; Berezovka, leg. SCHAUBERGER; Troitzkosavsk, 18.–20. 5. 1928, leg. LUKJANOVITSCH; Chalcha, Bajdarik, 30. 8. 1926; Bajdarik et Naryn-gol, 28. 8. 1926, leg. KRITSCHENKO, im Mus. Zool. Akad. Scient.

DEI: 1 Syntypus, Troitzkosavsk, Transbaikal, leg. MANDL; 2 Syntypen, Werchne-Udinsk, Transbaikal, leg. MANDL.

decemstriatus tingitanus REICHARDT, 1932 (*Chalcionellus*)

Mitt. zool. Mus. Berlin 18, 24 + 90–91

Holotypus, 1 Paratypus, Marokko, Oudjda, leg. THERY; 2 Paratypen, Algier; 2 Paratypen, Constantine und Massiv Mouzaia; 2 Paratypen, Tunis, Souk-el-Arba, leg. NORMAND.

DEI: 2 Paratypen, Tunisie, Souk-el-Arba, leg. NORMAND.

desbordesii COOMAN, 1930 (*Platysoma*)

Bull. Soc. ent. France 1930, 47–48

Ca. 30 Syntypen, Lac-Thô, Hoabinh, in Coll. DESBORDES.

DEI: 1 Syntypus, Hoa Binh, Tonkin, leg. DE COOMAN.

distinctus REICHENSBERGER, 1935 (*Psolidister*)

Arb. morph. tax. Ent. 2, 197—198, Fig. 3b

Holotypus, zahlreiche Paratypen; Costa Rica, La Caja bei San José, bei *Eciton burchelli*, 9. 10. 1932, 9., 10., 11. 1933; 5. 8. 1934, leg. SCHMIDT; Hamburg Farm, Ebene Limon, 1933, 1934, leg. NEVERMANN. Paratype, im DEI.
DEI: 1 Paratypus, Costa Rica, San José, 11. 1933, leg. SCHMIDT, bei *Eciton burchelli*; 1 Paratypus, Costa Rica, 29. 9. 1933, bei *Eciton burchelli*, leg. NEVERMANN.

dives LEWIS, 1911 (*Saprinus*)

Ann. Mag. nat. Hist. (Sér. 8) 8, 88

2 Syntypen, S. China, Pingshiang, leg. KREYENBERG, im DEI und Coll. LEWIS.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

formosanus BICKHARDT, 1912 (*Notodoma*)

Ent. Bl. 8, 126—127

Mehrere Syntypen, Formosa, Fuhosho, 8. 1909, leg. SAUTER; 1 Syntypus, Formosa, Taihorinsho, 8. 1909, leg. SAUTER, im DEI und Coll. BICKHARDT.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Taihorinsho, 8. 09, leg. SAUTER; 2 Syntypen, Formosa, Fuhosho, 8. 1909, leg. SAUTER.

gemellum COOMAN, 1929 (*Cylistosoma*)

Bull. Soc. ent. France 1929, 220

4 Syntypen, Indo-China, Lac-Thô, Hoabinh, in Coll. DESBORDES.

DEI: 1 Syntypus, Hoa Binh, Tonkin, leg. DE COOMAN.

graeus horni BICKHARDT, 1912 (*Hister*)

Ent. Mitt. 1, 291

Syntypen, Algier.

DEI: 1 Syntypus, Algier.

guyanensis MAZUR, 1974 (*Epierus*)

Beitr. Ent. 24, 56—57, Fig. 5

♂ Holotypus, French Guiana, Maroni river, leg. LE MOULT, im DEI.

henrici REICHENSBERGER, 1935 (*Clientister*)

Arb. morph. tax. Ent. 2, 192—193

Holotypus, Paratypen; Costa Rica, La Caja, bei *Eciton burchelli*, leg. SCHMIDT; Hamburgfarm, 7.—9. 1933, 8., 11. 1934, leg. NEVERMANN. Paratype, im DEI.

DEI: 1 Paratypus, Costa Rica, San José, 11. 1933, an *Eciton burchelli*, leg. H. SCHMIDT.

horni COOMAN, 1935 (*Paromalus*)

Arb. morph. tax. Ent. 2, 183—184, Fig. 1

♀ Holotypus, Carin Asciiu Ghecù, 1888, leg. FEA, im DEI.

horni BICKHARDT, 1913 (*Platysoma*)

Ent. Mitt. 2, 169

4 Syntypen, Formosa, Sokutsu, Banshoryo-Distrikt, Taihorin, Kankau (Koshun), im DEI und Coll. BICKHARDT.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Sokutsu, Banshoryo-Distr., 7. 7. 1912, leg. SAUTER; 1 Syntypus, Formosa, Taihorin, 7. 8. 1911, leg. SAUTER.

horni LEWIS, 1901 (*Tribalus*)

Ann. Mag. nat. Hist. (Sér. 7) 7, 244—245

Syntypen, Ceylon, Matala und Negambo, 1899, leg. HORN.

DEI: 1 Syntypus, Matala, 1899, leg. HORN; 1 Syntypus, Negambo, 1899, leg. HORN.

iheringi REICHENSBERGER, 1923 (*Chrysaetarius*)

Mitt. Schweiz. ent. Ges. 13, 332—333, Fig. 6

2 Syntypen, Brasilien, Blumenau, aus Nestern von *Eciton quadriglume*, 3. 1922, leg. Lehrer und Schüler des St. Antonius Kollegs.

DEI: 1 Syntypus, Paraná, bei *Eciton quadriglume*.

inops COOMAN, 1933 (*Pachylomalus*)

Bull. Mus. Paris (Sér. 2) 5, 195—196

Zahlreiche Syntypen, Hoabinh (Tonkin).

DEI: 2 ♂♂ Syntypen, Hoa-Binh, Tonkin, 1932, leg. DE COOMAN.

lewisi BICKHARDT, 1913 (*Parepierus*)

Ent. Mitt. 2, 173—174

Holotypus, Formosa, Taihorin, 7. 8. 1911, leg. SAUTER, im DEI verloren gegangen.

liebmanni BICKHARDT, 1921 (*Hololepta*)

Arch. Nat. 87 A 6, 47 und 50—51

6 Syntypen, Kuango (Quango); 2 Syntypen, Kongo-Gebiet, leg. SCHMIDT, in Coll. BICKHARDT; 7 Syntypen, Congo, im Zool. Mus. Berlin.

DEI: 1 Syntypus, Quango Gebiet.

tiopygoformis DESBORDES, 1924 (*Atholus*)

Bull. Soc. ent. France 1924, 115—116

2 Syntypen, Kl. Kombuis, Java-zee, 11. 9. 1920, im DEI und Coll. DESBORDES.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

***littoralis* FERRARI, 1866 (*Acritus*)**

Verh. zool. bot. Ges. Wien 16, 367–368

15 Syntypen, Strand des Lido bei Venedig, 6. 1864, leg. FERRARI.
DEI: 1 Syntypus, Venedig.***monitor* LEWIS, 1907 (*Hister*)**

Ann. Mag. nat. Hist. (Sér. 7) 20, 483

3 Syntypen, Brit. Uganda, leg. GRAUER, im DEI und Coll. LEWIS; weitere Syntypen, E. Ruwenzori, Old Camp, 6000 bis 7000 Fuß, 1906, leg. LEGGE und WOLLASTON.
DEI: 1 Syntypus, Brit. Uganda, leg. GRAUER.***neotropicus* MAZUR, 1974 (*Margarinotus*)**

Beitr. Ent. 24, 57, Fig. 6

♀ Holotypus, Argentinien, Cordoba, im DEI.

***nitens* COOMAN, 1932 (*Epitozasia*)**

Bull. Soc. ent. France 37, 135–136

Holotypus, 3 Paratypen, Umgeb. Hoabinh, Tonkin, in Coll. Desbordes; 3 Paratypen, dto., in Coll. COOMAN.
DEI: 1 Paratypus, Hoa-Binh, Tonkin, 1932, leg. DE COOMAN.***opulentus* COOMAN, 1932 (*Pachylomalus*)**

Bull. Soc. ent. France 37, 65–66

Mehr als 150 Syntypen, Berge von Lacson, Hoabinh.
DEI: 2 Syntypen, Hoa-Binh, Tonkin, 1932, leg. DE COOMAN.***placitus* LEWIS, 1906 (*Platylister*)**

Ann. Mag. nat. Hist. (Sér. 7) 18, 184

2 Syntypen, Deutsch-Neu Guinea, Herbertshöhe.
DEI: 1 Syntypus, Herbertshöhe.***praeteritus* SCHLEICHER, 1930 (*Hister*)**

Verh. Ver. nat. Heimatforschung Hamburg 21 (1929), 133–134

Holotypus, 3 Paratypen, Turansk, Baikalsee-Gebiet. Holotypus, im DEI.

***prolixus* REICHARDT, 1932 (*Chalcionellus*)**

Mitt. Zool. Mus. Berlin 18, 23 + 85–86

Holotypus, Marocco, Rabat, leg. THERY; 1 Paratypus, Tripolis, leg. MOSER; 2 ♂♂ Paratypen, dto., leg. QUED.; 1 Paratypus, dto., leg. KR.; 1 Paratypus, Sicilien, Ragusa, leg. SCHM.; 1 Paratypus, Spanien, „Pozuelo“, leg. SCHM.
DEI: 1 Paratypus, Tripolis, ex. Coll. KRAATZ.***punctillatus* BICKHARDT, 1913 (*Tribalus*)**

Ent. Mitt. 2, 174

12 Syntypen, Formosa, Kosempo, 8. 1909, leg. SAUTER, im DEI und Coll. BICKHARDT.
DEI: 5 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.***pygmaea* BICKHARDT, 1913 (*Nicotikis*)**

Ent. Mitt. 2, 170–171

Holotypus, Formosa, Hoozan, 7. 9. 1912, leg. SAUTER, im DEI.

***quadriglumis* REICHENSPERGER, 1923 (*Xylostega*)**

Ztschr. wiss. Insektenbiol. 18, 251–252, Fig. 2

Syntypen, Rio Negro, Parana, bei *Eciton quadriglume*.
DEI: 1 Syntypus, Paraná, bei *Eciton quadriglume*.***riparius* BICKHARDT, 1914 (*Acritus*)**

Ent. Bl. 10, 310–311

11 Syntypen, Chile bei Guayacan, 23. 3. 1902, leg. HORN; 3 Syntypen, Concón (?) 1197; 1 Syntypus, Iquique; 2 Syntypen, Valparaiso; im DEI und Coll. BICKHARDT.
DEI: 3 Syntypen, Chile, Guayacan; 1 Syntypus, Chile, Iquique, 23. 3. 1902, leg. HORN.***sauteri* BICKHARDT, 1913 (*Epierus*)**

Ent. Mitt. 2, 173

Holotypus, Formosa, Taihorin, 7. 1911, leg. SAUTER, im DEI.

***sauteri* BICKHARDT, 1912 (*Paromalus*)**

Ent. Bl. 8, 125–126, Fig.

♂ Holotypus, Formosa, Fuhosho, 8. 1908, leg. SAUTER, im DEI.

***sauteri* BICKHARDT, 1912 (*Platysoma*)**

Ent. Bl. 8, 124–125

Holotypus, Formosa, Taihorinsho, 9. 1909, leg. SAUTER, im DEI.

***sauteri* BICKHARDT, 1913 (*Trypeticus*)**

Ent. Mitt. 2, 167

Mehrere Syntypen, Formosa, Sokutsu, Bانشoryo Distr. und Kosempo, leg. SAUTER, im DEI und Coll. BICKHARDT.
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Sokutsu, Bانشoryo Distr., 2. 6. 1912, leg. SAUTER; 3 Syntypen, Formosa, Kosempo, 7. 6. 1912; alle leg. SAUTER.

schenklingi BICKHARDT, 1913 (*Platysoma*)
Ent. Mitt. 2, 170

Holotypus, Formosa, Sokutsu, Banshoryo-Distrikt, 7. 6. 1912, leg. SAUTER, im DEI.

scrobipygum COOMAN, 1932 (*Xestipyge*)
Bull. Soc. ent. France 37, 202

Syntypen, Hoabinh, Tonkin; 3 Ex., in Coll. COOMAN; 3 Ex., im Mus. Paris.
EI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

severus BICKHARDT, 1917 (*Phelister*)
Genera Insectorum 116b, 217

2 Syntypen, Paraguay, leg. FIEBRIG; 1 Ex., im DEI; 1 Ex., in Coll. BICKHARDT.
DEI: 1 Syntypus, Paraguay, leg. FIEBRIG.

solenopsidis REICHENSBERGER, 1935 (*Hippeutister*)
Arb. morph. tax. Ent. 2, 208—209

Holotypus, Paratypen, Costa Rica, La Caja bei S. José, in Nestern von *Solenopsis geminata*, 3., 4., 11. 1934, leg. SCHMIDT.
Südbrasilien, Nova Teutonia, bei *Solenopsis saevissima*, leg. PLAUMANN, Paratypus, im DEI.
DEI: 1 Paratypus, Costa Rica, La Caja, *Solenopsis geminata* FABRICIUS, leg. SCHMIDT.

sternalis BORGMEIER, 1930 (*Scapolister*)
Zool. Anz. 88, 36—39

Holotypus, Paratypen, Campinas, Staate Goyaz, im Zug von *Syntermis brasiliensis*, 15. 1. 1929, leg. SCHATZMAIR; Holotypus, im Inst. S. Paulo; Paratypen, in Coll. BORGMEIER und BRUCH.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

striolifer DESBORDES, 1924 (*Hypocaccus*)
Bull. Soc. ent. France 1924, 116—117

3 Syntypen, Santa Monica, California, 10. 5.—20. 7. 1902, leg. HORN; im DEI und Coll. DESBORDES.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, als Type Nr. 1 und Nr. 3 ausgezeichnet.

sulcatipygus COOMAN, 1932 (*Pachylomalus*)
Bull. Soc. ent. France 37, 67—68

Etwas 100 Syntypen, Tal von Lachô, Hoabinh.
DEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Hoa-Binh, Tonkin, 1932, leg. DE COOMAN.

unicum BICKHARDT, 1912 (*Platysoma*)
Ent. Bl. 8, 124

Holotypus, Formosa, Chip-Chip, 1. 1909, leg. SAUTER, im DEI.

vicaria COOMAN, 1935 (*Carcinops*)
Rev. franc. Ent. 2, 221—223, Fig. 5)

Zahlreiche Syntypen Hoabinh (Tonkin), im Mus. Paris.
DEI: 2 Syntypen, Hoa Binh, Tonkin, leg. DE COOMAN.

Zusammenfassung

Vorliegender Katalog beinhaltet die Coleopteren-Typen der Familien Pselaphidae (245 Typen) und Histeridae (56 Typen), die in den Sammlungen der Abteilung Taxonomie der Insekten des Institutes für Pflanzenschutzforschung, Bereich Eberswalde (ehemals Deutsches Entomologisches Institut), aufbewahrt werden.

Summary

This catalogue contains the types of Coleoptera of the families Pselaphidae (245 types) and Histeridae (56 types) preserved in the collections of the Department of Taxonomy of Insects in the Eberswalde branch of the Institute of Plant Protection Research (former Deutsches Entomologisches Institut).

Резюме

Данный каталог включает типы Coleoptera из семейств Pselaphidae (245 типов) и Histeridae (56 типов), хранящиеся в коллекциях отдела таксономии насекомых при институте защиты растений, Эберсвальдский филиал (бывший Немецкий энтомологический институт).