

Institut für Pflanzenschutzforschung
der Akademie der Landwirtschaftswissenschaften der DDR
Bereich Eberswalde
Abteilung Taxonomie der Insekten
Eberswalde-Finow (DDR)

HANNELORE GAEDIKE

Katalog der in den Sammlungen der Abteilung Taxonomie der Insekten des Institutes für Pflanzenschutzforschung, Bereich Eberswalde (ehemals Deutsches Entomologisches Institut), aufbewahrten Typen — XXIII

(Coleoptera: Rhipiceridae, Cebrionidae, Elateridae, Eucnemidae, Throscidae,
Chelonariidae, Buprestidae, Phylloceridae, Diceromyidae, Dascillidae, Helodi-
dae, Dryopidae, Georyssidae, Heteroceridae, Dermestidae, Byrrhidae)

Rhipiceridae

constricticollis VAN EMDEN, 1926 (*Callirhipis*)
Nova Guinea Zool. 15, 208–209

2 ♂♂, 1 ♀, Syntypen, Neu Guinea, Dormanpadbivak, 1410 m, 10. 1920, leg. VAN HEURN.
DEI: 1 ♂, Lectotypus, mit den Angaben der Beschreibung, hiermit festgelegt.

grandicornis VAN EMDEN, 1926 (*Callirhipis*)
Nova Guinea Zool. 15, 208

1 ♂, 2 ♀♀, Syntypen, Deutsch Neu-Guinea, Sattelberg, Coll. BENNIGSEN, im DEI.
DEI: 1 ♂, 1 ♀, Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

horni VAN EMDEN, 1924 (*Ennometes*)
Ent. Mitt. 13, 30–33, Fig. 7, 8

Syntypen, Formosa, Sokutsu, Banshoryo-Distr., 1912, 1 ♂, ca. 7. 8., 1 ♀, ca. 7. 7., leg. SAUTER.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 7. 8. 1912.

melanocephalus VAN EMDEN, 1924 (*Simianellus*)
Ent. Mitt. 13, 33–34

1 ♂, und Bruchstücke eines zweiten, Syntypen, Formosa, Kosempo, 6. 1912, leg. SAUTER.
DEI: 1 ♂, Syntypus, Formosa, Kosempo, 6. 1912, leg. SAUTER.

nevermanni VAN EMDEN, 1931 (*Callirhipis*)
Ent. Bl. 27, 147–149

Syntypen: 2 ♂♂, 2 ♀♀, La Palma?, 1500 m, leg. GONGORA; 1 ♂, 1 ♀, La Palma, 1500 m, 8. 2. 1925, aus Puppenzelle, leg. GONGORA; 3 ♂♂, 1 ♀, La Palma, 1500 m, 21. 2. 1925.
DEI: 1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Costa Rica, La Palma, 1500 m, 8. 2. 1925, leg. GONGORA.

olivetorum KRAATZ, 1859 (*Arrhaphus*)
Berl. ent. Ztschr. 3, 55; Taf. 3, Fig. 6

2 ♂♂, 1 ♀, Syntypen, bei Athen, zwischen der losen Borke eines Olivenbaumes, leg. KRÜPER.
DEI: 2 Syntypen, Graecia.

sauteri VAN EMDEN, 1924 (*Sandalus*)
Ent. Mitt. 13, 28–30, Fig. 1–3

♂♀ Syntypen, Formosa, Hoozan, 9. 1910, leg. SAUTER.
DEI: 1 ♂, Syntypus, Formosa, Hoozan, 9. 1910, leg. SAUTER.

variegata VAN EMDEN, 1926 (*Callirhipis*)
Nova Guinea Zool. 15, 207–208

Syntypen: 1 ♂, Neu-Guinea Exped., Idenburg Riv., Prauwenbivak, 11. 1920, leg. VAN HEURN; 1 ♀, Neu-Guinea Exped., Mamberamo Riv., Pionierbivak, 6.–7. 1920, leg. VAN HEURN; 1 ♂, Hattam, Neu Guinea, Utrechts zend. Gen., Mus. Leyden; 1 ♂, Gazellen-Halbinsel, Coll. BENNIGSEN; 1 ♂, Coll. KRAATZ, ohne Patria; 1 ♂, Neu-Guinea, Coll. SCHWARZ, im DEI; 2 ♂♂, Deutsch Neu-Guinea, Dallmannhafen, 12. 1908, leg. WALIS und NEUHAUSS, im Mus. Berlin; 1 ♂, Neu-Guinea, 1909, leg. MÜLLER, im Mus. Dresden; 1 ♂, Kaiser-Wilhelms-Land, Bongu, 9942, Mus. Dresden.
DEI: ♂ Lectotypus, N. Guinea Expedition, Idenburg Riv., Prauwenbivak, 11. 1920, leg. v. HEURN; 1 Paralectotypus, N. Guinea; hiermit festgelegt.

Wahrscheinlich nicht beschrieben:

crinitus VAN EMDEN (*Sandalus*)

DEI: 1 ♀, Usambara, Nguelo, als Typus ausgezeichnet.

gracilis VAN EMDEN (*Sandalus*)

DEI: 1 ♂, Benguella, leg. WELLMANN, als Typus ausgezeichnet.

nitens VAN EMDEN (*Sandalus*)

DEI: 1 ♂, Ungoni, 10. 12, als Typus ausgezeichnet.

Cebriionidae

anthracinus CHEVROLAT, 1874 (*Cebrio*)

Ann. Soc. ent. Fr. (5) 4, 403

Syntypen, Andalusien, in Coll. HEYDEN.

DEI: 1 Syntypus, And., WALT, in Coll. HEYDEN.

aterrimus CHEVROLAT, 1874 (*Cebrio*)

Ann. Soc. ent. Fr. (5) 4, 396–397

Syntypen, Algerien, Philippeville, in Coll. HEYDEN.

DEI: 1 Syntypus, Philippeville, TARNIER, in Coll. HEYDEN.

bruleriei HEYDEN, 1870 (*Cebrio*)

Berl. ent. Ztschr. 14 (Beiheft), 122–124

3 Syntypen, Portugal, Weg zwischen Celorico und Mangualde, in der Ebene am Fuß der Serra Estrella, auf *Spartium*-Hecken, 1 Ex., 25. 6. 1868, leg. HEYDEN, 2 Ex., leg. DE LA BRÛLERIE; in Coll. HEYDEN.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, leg. HEYDEN, in Coll. HEYDEN.

deformis CHEVROLAT, 1874 (*Cebrio*)

Ann. Soc. ent. Fr. (5) 4, 38

Syntypen, Algerien, Oran, HEYDEN.

DEI: 1 Syntypus, Oran, in Coll. HEYDEN.

fiorii LEONI, 1906 (*Cebrio*)

Riv. Col. Ital. 4, 212; Taf. 2, Fig.

Zahlreiche ♂♂, 1 ♀, Syntypen, Puglia, Bisceglia, leg. FIORI; zahlreiche ♂♂ Syntypen, Basilicata, Lavello und Molise, Termoli, leg. LEONI; Vulture, leg. BALDINI.

DEI: 2 Syntypen, Italien, Basilicata, leg. LEONI.

laticornis CHEVROLAT, 1874 (*Cebrio*)

Ann. Soc. ent. Fr. (5) 4, 409

Syntypen, Tanger, in Coll. HEYDEN.

DEI: 1 Syntypus, Tanger, in Coll. HEYDEN.

segmentatus CHEVROLAT, 1874 (*Cebrio*)

Ann. Soc. ent. Fr. (5) 4, 390–391

Syntypen, Mogador, HEYDEN.

DEI: 1 Syntypus, Amsmid bis Mogador, 14.–20. 6. 1872, leg. FRITSCH & REIN, in Coll. HEYDEN.

ventralis CHEVROLAT, 1874 (*Cebrio*)

Ann. Soc. ent. Fr. (5) 4, 397

Syntypen, Algerien, Oran, HEYDEN.

DEI: 1 Syntypus, Oran, TARNIER, in Coll. HEYDEN.

Elateridae

abbreviatus SCHWARZ, 1906 (*Acolus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 123–129

♂♀ Syntypen, Brasilien, Jatahy-Goyaz.

DEI: 5 Syntypen, Jatahy (Goyaz).

abdominalis SCHWARZ, 1901 (*Melanozanthus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 322–323

Syntypen, N-Borneo.

DEI: 1 Syntypus, Borneo; 3 Syntypen, Kina Balu.

acuminatus SCHWARZ, 1902 (*Heteroderes*)

Stett. ent. Ztg. 63, 241–242

Syntypen, Transvaal.

DEI: 1 Syntypus, Transvaal, leg. HARTMANN.

acutus SCHWARZ, 1902 (*Heteroderes*)

Stett. ent. Ztg. 63, 242–243

Syntypen, West-Afrika, Landana.

DEI: 1 Syntypus, Landana, 22. 7. 1892.

adeloceroides SCHWARZ, 1908 (*Psephus*)
Soc. ent. 23, 114

Syntypen, Sudan.

DEI: ♂ Lectotypus, Sudan, Kati, von GIRARD festgelegt.

adrastoides SCHWARZ, 1900 (*Cardiophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 157–158

♂♀ Syntypen, Usambara.

DEI: ♀ Lectotypus, 3 Paralectotypen, Usambara, leg. WEISE, durch VON HAYEK festgelegt.

adrastoides SCHWARZ, 1901 (*Cosmesus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 351–352

Syntypen, Guadalupe (Peru?).

DEI: 7 Syntypen, Guadeloupe.

adustus ELSTON, 1924 (*Iacon*)
Trans. Proc. R. Soc. S. Austral. 48, 205

Holotypus, Paratypen, Queensland: Cairns, leg. LEA; Coen River und Stewart River, leg. DODD; Townsville, leg. TINDALE; Malanda, leg. MÖBERG. Holotypus, im South Austr. Mus.

DEI: 2 Paratypen, Queensland, Coen River.

aeneipennis SCHWARZ, 1904 (*Anoplischius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 52–53

♂♀ Syntypen, Brasilien, B. Retiro.

DEI: 2 Syntypen, B. Retiro.

aenescens SCHWARZ, 1907 (*Crepidomenus*)
Stett. ent. Ztg. 68, 83

Syntypen, Australien, Victoria.

DEI: ♀ Lectotypus, Victoria, durch NEBOISS festgelegt.

aeneus SCHWARZ, 1901 (*Hymnoides*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 30–31

Syntypen, Ceylon, Nalanda, leg. HORN.

DEI: 8 Syntypen, Ceylon, Nalanda, leg. HORN.

aeneus SCHWARZ, 1904 (*Ischiodontus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 57–58

♂♀ Syntypen, Venezuela.

DEI: 5 Syntypen, Venezuela.

aequalis SCHWARZ, 1902 (*Agonischius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 332

Mehrere Syntypen, Sumatra, Indrapoera, leg. WEYERS, im Mus. Brüssel.

DEI: 1 Syntypus, Sumatra, Indrapoera, leg. WEYERS.

aequalis SCHWARZ, 1891 (*Agriotes*)
Dtsch. ent. Ztschr. 35, 107; Taf. 2, Fig. 40

♂♂ ♀♀ Syntypen, Sicilien.

DEI: 1 ♂, Syntypus, ohne Fundortangaben.

africanus SCHWARZ, 1905 (*Corymbites*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 291

Syntypen, Transvaal.

DEI: ♀ Lectotypus, Transvaal, von GIRARD festgelegt.

africanus SCHWARZ, 1898 (*Glyphonyx*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 154–155

♂♀ Syntypen, Kamerun.

DEI: 2 Syntypen, Kamerun; 3 Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT.

africanus SCHWARZ, 1905 (*Spilus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 283–284

Syntypen, Kamerun; Congo Franç., Benito.

DEI: ♂ Lectotypus, Kamerun; 1 Paralectotypus, Congo Franç., Benito; 1 Paralectotypus, Kamerun, Victoria; 1 Paralectotypus, ohne Fundortangaben; von GIRARD festgelegt.

agrioides SCHWARZ, 1901 (*Pomachilius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 338–339

Syntypen, Brasilien, Itahy, Prov. Goyas.

DEI: 2 Syntypen, Brasilien, Prov. Goyas, Jatahy, 9.–11. 1897.

agriotiformis SCHWARZ, 1898 (*Psephus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 188

Syntypen, Ost-Afrika, Usambara.

DEI: ♂ Lectotypus, Usambara, leg. WEISE, von GIRARD festgelegt.

alboguttatus SCHWARZ, 1902 (*Cardiophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 334—335

Syntypen, D. N.-Guinea.

DEI: 1 Syntypus, D. N.-Guinea, Simbang.

altaicus SCHWARZ, 1900 (*Althous*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 108—109

♂♂, 1 ♀, Syntypen, Altai.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundortangaben.

altaicus SCHWARZ, 1900 (*Corymbites*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 110

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Sibiria occ., Altaisk, leg. ROST, im DEI.

alternatus SCHWARZ, 1902 (*Lacon*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 311—312

Syntypen, Br. Neu-Guinea, Astrolabe-Gebirge.

DEI: 1 Syntypus, Br. N.-Guinea, Astrolabe Geb., leg. WEISKE.

alternatus SCHWARZ, 1903 (*Monocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 398

Syntypen, Süd-Australien.

DEI: 1 historisches Exemplar, vielleicht Type, N. S. Wales.

ambiguus SCHWARZ, 1905 (*Lobotarsus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 279—280

Syntypen, Madagaskar, Cap. d'Ambre.

DEI: ♂ Lectotypus, 3 Paralectotypen, Madagaskar, von GIRARD festgelegt.

ambiguus SCHWARZ, 1901 (*Melanoxanthus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 320—321

Syntypen, Birma.

DEI: 1 Syntypus, Birma.

ambiguus SCHWARZ, 1901 (*Parapomachilius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 340—341

Syntypen, Paraguay, leg. DRAKE.

DEI: 1 Syntypus, Paraguay, leg. DRAKE.

amitinus SCHWARZ, 1906 (*Ischiodontus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 110—111

Syntypen, Brasilien, Jatahy, Goyaz.

DEI: 1 Syntypus, Jatahy, Goyaz.

analis SCHWARZ, 1892 (*Cardiophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 36, 383

♂ Holotypus, Asia minor, Tokat., im DEI.

anatolicus REITTER, 1901 (*Ludius*)
Wien. ent. Ztg. 20, 100

Syntypen, Anatolien, Ak-Chehir, leg. KORB.

DEI: 2 Syntypen, Asia minor, Ac-Chehir, leg. KORB.

ancoralis SCHWARZ, 1901 (*Heteroderes*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 24—25

Syntypen, Ceylon, Anuradhapura, leg. HORN.

DEI: 7 Syntypen, Anuradhapura, 1899, leg. HORN.

angularis SCHWARZ, 1906 (*Anoplischius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 104

Syntypen, Columbia, Cauca-Tal.

DEI: 1 Syntypus, S. Amerika, Caucathal.

angularis SCHWARZ, 1905 (*Hemiops*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 266

Syntypen, Sumatra, Soekaranda.

DEI: 1 Syntypus, Soekaranda, 1. 1894, leg. DOHRN.

angularis SCHWARZ, 1902 (*Heteroderes*)
Stett. ent. Ztg. 63, 243—244

Syntypen, Madagascar.

DEI: 3 Syntypen, Madagascar, leg. SIKORA.

angularis SCHWARZ, 1898 (*Phedomenus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 142—143

Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT.

DEI: ♂ Lectotypus, Kamerun, von GIRARD festgelegt.

angularis SCHWARZ, 1903 (*Tilotarsus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 359—360

Syntypen, Madagaskar.

DEI: 2 Syntypen, Madagaskar, Ambergebirge; 2 Syntypen, ohne Fundortangaben.

angustatus SCHWARZ, 1906 (*Monocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 115

Syntypen, Brasilia.

DEI: 1 Syntypus, Brasilien.

angusticollis SCHWARZ, 1906 (*Aptopus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 143—144

♂♂ Syntypen, Mendoza.

DEI: 2 Syntypen, Mendoza.

angusticollis SCHWARZ, 1898 (*Glyphonyx*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 155—156

Syntypen, Assam.

DEI: 2 Syntypen, Assam.

angustifrons SCHWARZ, 1902 (*Aeolus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 234—235

Syntypen, Brasilien, Santos.

DEI: 1 Syntypus, Santos.

angustus SCHWARZ, 1899 (*Alaus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1899, 77—78

Syntypen, Deutsch Ost-Afrika, Usaramo, Mhonda.

DEI: 1 Syntypus, Usambara, Nguelo; 1 Syntypus, D. Ost Afrika, Usaramo; 1 Syntypus, Mhonda.

angustus SCHWARZ, 1904 (*Atractosomus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 59—60

Syntypen, Brasilien.

DEI: 1 Syntypus, Brasil.

angustus SCHWARZ, 1901 (*Sphenomerus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 21—22

Syntypen, Ceylon, Kandy, leg. HORN.

DEI: 2 Syntypen, Kandy.

angustus SCHWARZ, 1901 (*Stenopus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 308

Syntypen, Süd-Amerika, Caucahal.

DEI: 1 Syntypus, S. Amerika, Caucahal.

annamensis SCHWARZ, 1902 (*Heteroderes*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 322

Syntypen, Süd-Annam, Pha-Rang.

DEI: 1 Syntypus, Süd-Annam, Pha-Rang, leg. FRUHSTORFER.

annulatus SCHWARZ, 1901 (*Cosmesus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 352—353

Syntypen, Santa Rita.

DEI: 2 Syntypen, Santa Rita.

anpingensis MIWA, 1930 (*Cardiophorus*)
Wien. ent. Ztg. 47, 91

Syntypen, Formosa, Anping, 5. 1912, leg. SAUTER.

DEI: 4 Syntypen, Formosa, Anping, 5. 1912, leg. SAUTER.

antennalis SCHWARZ, 1902 (*Achrestus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 139—140

Holotypus, Peru, Chanchamayo, leg. LANGE, im DEI.

antennalis SCHWARZ, 1901 (*Agelasinus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 354—355

Syntypen, Peru, Callanga.

DEI: 3 Syntypen, Peru, Callanga.

antennalis SCHWARZ, 1907 (*Paracardiophorus*)
Stett. ent. Ztg. 68, 81—82

Syntypen, Australien, N. S. Wales.

DEI: 1 Syntypus, N. S. W.

antennalis SCHWARZ, 1903 (*Pomachilius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 71—72

Syntypen, Venezuela, Merida.

DEI: 1 Syntypus, Venezuela, Merida.

antennarius SCHWARZ, 1906 (*Monocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 359

Holotypus, Australia merid., im DEI.

antennarius SCHWARZ, 1909 (*Psephus*)
Soc. ent. 24, 46

Syntypen, Kamerun.

DEI: ♂ Lectotypus, ohne Fundortangaben, von GIRARD festgelegt.

antennatus SCHWARZ, 1906 (*Monocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 358

3 Syntypen, Victoria occ.

DEI: 2 Syntypen, Victoria occ.

anticus SCHWARZ, 1902 (*Eschatroxus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 255—256

2 Syntypen, Neu Guinea, Stephansort.

DEI: 3 Ex., N. Guinea, Stephansort, als Typen ausgezeichnet, es ist nicht festzustellen welche zwei Tiere SCHWARZ bei der Beschreibung vorgelegen haben.

anulatus SCHWARZ, 1901 (*Cardiophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 32

♂♂ Syntypen, Ceylon, Weligama, leg. HORN; ♀♀ Syntypen, Ceylon, Nalanda, leg. HORN.

DEI: 1 ♂, Syntypus, Weligama; 1 ♀, Syntypus, Nalanda.

apicalis SCHWARZ, 1900 (*Arrhaphes*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 94—95

4 Syntypen, Mentawai-Sipora, leg. MODIGLIANI; 1 Syntypus, N. O. Sumatra, leg. SCHULTHEISS.

DEI: 1 Syntypus, N. O. Sumatra; 3 Syntypen, Mentawai, Sipora, Sereinu, 5.—6. 1894, leg. MODIGLIANI.

apicalis SCHWARZ, 1902 (*Diploconus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 327

Syntypen, Sumatra.

DEI: 1 Syntypus, Sumatra.

apicalis SCHWARZ, 1905 (*Elasmosomus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 273—274

Syntypen, Usambara, Nguelo.

DEI: ♀ Lectotypus, Nguelo, von GIRARD festgelegt.

apicalis SCHWARZ, 1902 (*Esthesopus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 149

Syntypen, Paraguay, leg. DRAKE.

DEI: 2 Syntypen, Paraguay, 1885, leg. DRAKE.

apicalis SCHWARZ, 1898 (*Hemicleus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 183—184

Holotypus, Usambara, Ost-Afrika.

DEI: ♀ Holotypus, Usambara, leg. WEISE.

apicalis SCHWARZ, 1898 (*Melanthoides*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 141—142

Syntypen, Kamerun, Lolodorf, leg. CONRADT.

DEI: 1 Syntypus, Kamerun, Lolodorf.

apicalis SCHWARZ, 1903 (*Psephus*)
Arkiv Zoologi 1, 48—49

2 ♀♀, Syntypen, Kamerun; 1 Ex., leg. SJÖSTEDT, 1 Ex., in Coll. SCHWARZ.

DEI: ♀ Lectotypus, Kamerun, von GIRARD festgelegt.

apicatus SCHWARZ, 1906 (*Aeolus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 123—124

Syntypen, Brasilia, Jatahy-Goyaz.

DEI: 5 Syntypen, Jatahy (Goyaz).

apicatus SCHWARZ, 1902 (*Agonischius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 363

Holotypus (teste NEBOISS), N. Queensland, leg. WEISKE, im DEI.

apicatus SCHWARZ, 1904 (*Pomachilius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 73—74

2 Syntypen, Brasilien, leg. BRUCH.

DEI: 1 Syntypus, Brasilien, 10. 11. 1901, leg. BRUCH.

araxicola REITTER, 1895 (*Hypnoidus*)
Ent. Nachr. 21, 91

Syntypen, Araxesthal bei Orudubad.

DEI: 1 Syntypus, Caucasus, Araxesthal, leg. LEDER, REITTER, in Coll. HEYDEN.

arenarius SCHWARZ, 1901 (*Paracardiophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 37

Syntypen, Ceylon, Weligama, leg. HORN.
DEI: 1 Syntypus, Weligama.

arenicola SCHWARZ, 1901 (*Monocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 23–24

Syntypen, Ceylon: Trinkomalee, Weligama, Anuradhapura, leg. HORN.
DEI: 5 Syntypen, Trinkomalee; 1 Syntypus, Anuradhapura, 1899, leg. HORN.

arenicola SCHWARZ, 1901 (*Paracardiophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 36

Syntypen, Ceylon, Trinkomalee, leg. HORN.
DEI: Lectotypus, 2 Paralectotypen, Trinkomalee, durch VON HAYEK festgelegt.

arenosus SCHWARZ, 1901 (*Paracardiophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 35

Syntypen, Ceylon, Colombo, leg. HORN.
DEI: 1 Syntypus, Colombo.

arisanus MIWA, 1931 (*Glyphonyx*)
Wien. ent. Ztg. 47 (1930), 206

Holotypus, Formosa, Taihorin, 7. 8. 1911, leg. SAUTER. Paratypen; Arisan, 12. 1915, leg. MAKI; Arisan, 10. 10. 1912, leg. NITOE; Kanshirei, 11. 5. 1909, leg. NITOE.
DEI: Holotypus, Formosa, Taihorin, 7. 8. 1911, leg. SAUTER.

armeniacus SCHWARZ, 1892 (*Melanotus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 35 (1891), 365

3 ♂♂, Syntypen, Hoch-Armenien, in Coll. SCHWARZ.
DEI: 2 ♂♂, Syntypen, ohne Fundortangaben.

aspersus SCHWARZ, 1902 (*Alaotypus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 309–310

? Holotypus, Tonkin, Montes Mauson.
DEI: Holotypus, Tonkin, Montes Mauson, 4.–5., 2–3000 Fuß, leg. FRUHSTORFER.

assamensis SCHWARZ, 1902 (*Alaus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 204–206

Syntypen, Assam.
DEI: 1 Syntypus, Assam.

assamensis SCHWARZ, 1905 (*Hemiops*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 264–265

1 ♂, 5 ♀♀, Syntypen, Assam, Kohima.
DEI: 5 Syntypen, Assam.

assamensis SCHWARZ, 1902 (*Melanotus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 283–284

♂♂ Syntypen, Assam.
DEI: 5 Syntypen, Assam.

assamensis SCHWARZ, 1905 (*Psephus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 260–261

Holotypus, Assam, Kohima, leg. DUCHON, in DEI.

ater SCHWARZ, 1902 (*Anoplischius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 135–136

♀♀ Syntypen, Brasilien, Espirito-Santo.
DEI: 1 Syntypus, Espirito Santo, Brasil, leg. MICHAELIS.

ater SCHWARZ, 1906 (*Asaphoides*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 367–368

Holotypus (teste NEBOISS), Australia (merid. ?), in DEI.

ater SCHWARZ, 1909 (*Psephus*)
Soc. ent. 24, 101–102

Syntypen, Guinea.
DEI: ♂ Lectotypus, Guinea, von GIRARD festgelegt.

aterrimus piloselloides SCHWARZ, 1891 (*Agriotes*)
Dtsch. ent. Ztschr. 35, 88; als var. beschrieben

Syntypen, Sibirien; Amur, Wladiwostock.
DEI: 1 Syntypus, Sibirien or., in Hauptsammlung; 2 Syntypen, Wladiwostock; 1 Syntypus, Amur, in Coll. KOLTZE.

athoides SCHWARZ, 1900 (*Cardiophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 152

Syntypen, Dar-es-Salaam.
DEI: 1 Syntypus, Dar-es-Salaam.

***athoides* SCHWARZ, 1903 (*Euplastius*)**

Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 62

Syntypen, California.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 Paralectotypus, Californien, von BECKER (Can. Ent. 43, 171–174; 1961) festgelegt.

***athoiformis* SCHWARZ, 1903 (*Euplastius*)**

Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 61–62

Syntypen, Alabama.

DEI: ♂ Lectotypus, 2 Paralectotypen, Alabama, von BECKER (Can. Ent. 43, 175; 1961) festgelegt.

***athoiformis* SCHWARZ, 1898 (*Psephus*)**

Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 188–189

Syntypen, Ost-Afrika, Usambara.

DEI: ♂ Lectotypus, Usambara, leg. WEISE, von GIRARD festgelegt.

***atomus* SCHWARZ, 1904 (*Cosmesus*)**

Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 80

2 Syntypen, Argentinien, Buenos Aires (?), leg. BRUCH.

DEI: 1 Syntypus, Buenos Aires, leg. BRUCH.

***atricornis* HEYDEN, 1884 (*Corymbites*)**

Dtsch. ent. Ztschr. 28, 278

Einige Syntypen, Amurgebiet, Insel Askold, 1883, in Coll. HEYDEN und KOLTZE.

DEI: Lectotypus, Amur, I. Askold, 1884, in Coll. HEYDEN; 3 Paralectotypen, Askold, in Coll. KOLTZE; von GURJEVA festgelegt.

***atripes* REITTER, 1896 (*Elater*)**

Wien. ent. Ztg. 15, 288

Syntypen, Thian-Schan, durch HAUSER.

DEI: 2 Syntypen, Thian-Schan, Musart, 6. 1894, Coll. HAUSER.

***auratilis* SCHWARZ, 1903 (*Tetralobus*)**

Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 364–365

♂♂ Syntypen, Franç. Congo, Benito.

DEI: ♂ Lectotypus, 2 ♂♂, Paralectotypen, Congo Franç., Benito, von GIRARD festgelegt.

***auricollis* SCHWARZ, 1905 (*Adelocera*)**

Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 273

Syntypen, Madagaskar, Cap d'Ambre, Diego-Suarez.

DEI: ♂ Lectotypus, Cap d'Ambre, Madagascar, ex Coll. SCHNEIDER; 1 ♂, Paralectotypus, Diego Suarez; von GIRARD festgelegt.

***aurilegulus* L. W. SCHAUFUSS, 1862 (*Elater*)**

Sitz. Ber. Isis Dresden 1862, 200–201

30 Syntypen, Spanien, leg. STAUDINGER.

DEI: 1 Syntypus, Spanien.

***auronebulosus* REITTER, 1896 (*Selatosomus*)**

Wien. ent. Ztg. 15, 290

Syntypen, Turkestan, Thian-Schan, durch HAUSER.

DEI: 1 Syntypus, Thian-Schan, Musart, 6. 1894, Coll. HAUSER; 1 Syntypus, Juldus, Kuldscha.

***azoricus* TARNIER, 1860 (*Oophorus*)**

Coleopteres des Iles Azores. In: A. MORELET, Voyage aux Azores gr. 8, 93–94

Syntypen, Azoren, Umgebung von Ponta Delgada und Villa do Porto, auf den Inseln San Miguel und Santa Maria.

DEI: 1 Syntypus, Azoren, Santa Miguel.

***basalis* SCHWARZ, 1898 (*Cardiophorus*)**

Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 192

Syntypen, Ost-Afrika, Usambara.

DEI: 1 Syntypus, Usambara, leg. WEISE.

***basalis* SCHWARZ, 1902 (*Dioxypterus*)**

Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 315–316

Syntypen; Neu Pommern; Gazellen-Halbinsel; Herbertshöhe.

DEI: 1 Syntypus, Herbertshöhe.

***basalis* SCHWARZ, 1901 (*Pomachilioides*)**

Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 346

Syntypen, Callanga, Peru.

DEI: 1 Syntypus, Peru, Callanga.

***basalis* SCHWARZ, 1902 (*Pyrophorus*)**

Stett. ent. Ztg. 63, 284–285

Syntypen, Ecuador, Napo und Archidona.

DEI: ♂ Lectotypus, Ecuador, Archidona, leg. HAENSCH; 1 ♂, Paralectotypus, Ecuador, Napo, leg. HAENSCH, von COSTA (Arquivos de Zool. 29, 195; 1978) festgelegt.

basilaris SCHWARZ, 1906 (*Aeolus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 112—113

Syntypen, Brasilia, Jatahy, Goyaz.
DEI: 1 Syntypus, Jatahy (Goyaz).

basimaculata SCHWARZ, 1908 (*Cardiophorus*)
In: SJÖSTEDT, Kilimandjaro-Meru-Expedition 7 Col. 63

4 ♂♂ ♀♀, Syntypen, Kilimandjaro, Kibonoto, untere Kulturzone, 4. 1906; Meru-Niederung, Ngare na nyuki, 1. 1906; alle leg. SJÖSTEDT.
DEI: Meru Niederung, leg. SJÖSTEDT, 1 Syntypus, 25. 11. 1905, 1 Syntypus, Jan.

benitensis HAYEK, 1973 (*Agrypnus*)
Bull. Brit. Mus. N. H. Ent. Suppl. 20, 130; nom. nov. pro *depressus* SCHWARZ, 1902;
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 312—313

Syntypen, Congo Franç., Benito.
DEI: 1 ♀, Syntypus, Congo Franç., Benito.

bennigseni SCHWARZ, 1902 (*Dioxypterus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 314—315

♀♀ Syntypen; Neu Pommern; Gazellen Halbinsel; Baining-Berge.
DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♀, Paralectotypus, Baining Berge, durch VAN ZWALUWENBURG (Pacific Insects 1, 364; 1959) festgelegt.

bennigseni SCHWARZ, 1898 (*Ludius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 410

♂♀ Syntypen, Deutsch-Ost-Afrika.
DEI: ♂ Lectotypus, D. Ost-Afr., leg. v. BENNIGS.; 1 ♂, Paralectotypus, D. es. Sal.; von GIRARD festgelegt.

bennigseni SCHWARZ, 1896 (*Pantolamprus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 89—90

Syntypen, Pangani-Steppe, leg. BENNIGSEN.
DEI: ♀ Lectotypus, D. Ost Afrika, leg. v. BENNIGSEN, von GIRARD festgelegt.

bernhardinus STIERLIN, 1879 (*Melanotus*)
Mitt. Schweiz. ent. Ges. 5, 439—440

♂♀ Syntypen, Schweiz (ohne genauere Fundortangaben).
DEI: 1 Syntypus, Simplon; 1 Syntypus, St. Bernhard; 1 Syntypus, Wallis.

bicolor SCHWARZ, 1906 (*Ischiodontus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 107—108

Syntypen, Surinam.
DEI: 1 Syntypus, Surinam.

bicolor SCHWARZ, 1902 (*Monocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 122—123

Syntypen, Australia mer., Victoria.
DEI: 1 Syntypus, Australia, Victoria.

bicostata SCHWARZ, 1902 (*Anacantha*)
Stett. ent. Ztg. 63, 196—197

♂♀ Syntypen, Brasilien, Prov. Goyas, Jatahy.
DEI: 2 Syntypen, Brasilien, Prov. Goyas, Jatahy, 9.—11. 1897.

bifasciatus SCHWARZ, 1903 (*Paracosmesus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 79

Syntypen, Bolivien, Cochabamba.
DEI: 2 Syntypen, Boliv., Cochabamba, leg. GERM.

bifasciatus SCHWARZ, 1902 (*Semiotus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 129—130

♀♀ Syntypen, Brasilien, St. Catharina.
DEI: 1 Syntypus, S. Catharina, leg. LÜDERWALDT.

biformis SCHWARZ, 1902 (*Esthesopus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 268—269

♂♀ Syntypen, Peru, Callanga.
DEI: 6 Syntypen, Peru, Callanga.

bifoveolatus SCHWARZ, 1902 (*Pristilophus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 291—292

Syntypen, Tonga-Tabu, vom Mus. GODEFFROY.
DEI: 1 Syntypus, Tong Tabu., Mus. GODEFFROY Nr. 15619.

bilineatus SCHWARZ, 1906 (*Tomocephalus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 150—151

Syntypen, Chiriqui.
DEI: 1 Syntypus, Chiriqui.

bimaculata SCHWARZ, 1905 (*Penia*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 262—263

Syntypen, Assam.

DEI: 1 Syntypus, Assam.

bimaculatus SCHWARZ, 1902 (*Cardiorhinus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 295—296

Syntypen, Ecuador, Archidona.

DEI: 2 Syntypen, Ecuador, Archidona, leg. HAENSCH.

bimaculatus SCHWARZ, 1902 (*Horistonotus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 262—263

♂♂ Syntypen, Columbien.

DEI: 2 Syntypen, Columbien.

bimaculatus SCHWARZ, 1902 (*Lacon*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 113—114

2 Syntypen, Australia mer., Victoria.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 Paralectotypus, Australia, Victoria, durch VON HAYEK (Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) 38, 211; 1979) festgelegt.

bimarginatus SCHWARZ, 1903 (*Lacon*)
Soc. ent. 23, 93

Zahlreiche Syntypen, Madagascar, Montagnes d'Ambre.

DEI: 3 Syntypen, Amber-Gebirge.

bioculatus SCHWARZ, 1902 (*Thaumastellus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 336

Holotypus, Tonkin, Montes Mauson.

DEI: Holotypus, Tonkin, Montes Mauson, 4.—5., 2—3000 Fuß, leg. FRUHSTORFER.

bipartitus SCHWARZ, 1901 (*Monocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 313—314

Syntypen, Peru, Callanga.

DEI: 5 Syntypen, Peru, Callanga.

bipunctatus SCHWARZ, 1903 (*Lacon*)
Soc. ent. 23, 82—83

Syntypen, Madagascar, Plateau de l'Androy, Reg. d'Ambovombe.

DEI: 1 Syntypus, Plateau de l'Androy, Reg. d'Ambovombe; 1 Syntypus, Madagascar.

bipunctatus SCHWARZ, 1906 (*Panspaeus*)
In: WYTSMAN, Gen. Ins. 46, 148

Syntypen, Neu Seeland.

DEI: 1 Syntypus, Neu Seeland, verloren gegangen.

bipunctatus SCHWARZ, 1905 (*Phedomenus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 288

Syntypen, Togo.

DEI: ♂ Lectotypus, Togo, Bismarckburg, von GIRARD festgelegt.

bivittatus SCHWARZ, 1904 (*Ischiodontus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 58

♀♀ Holotypus, Paraguay, im DEI.

blepharipes SCHWARZ, 1901 (*Crepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 311—312

♂♀ Syntypen, Mexico, Durango.

DEI: 3 Syntypen, Mexico, Durango.

bodemeyeri REITTER, 1906 (*Elater*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 449

2 ♀♀, Syntypen, Anatolien, Alem-Dagh und Goek-Dagh, leg. v. BODEMEYER.

DEI: 1 Syntypus, Asia minor, Goek Dagh, leg. v. BODEMEYER.

boliviensis SCHWARZ, 1906 (*Triplonychus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 144

Syntypen, Bolivien, Yungas de La Paz.

DEI: 1 Syntypus, Bolivia, Yungas de La Paz, 1000 m.

brevicollis SCHWARZ, 1891 (*Agriotes*)
Dtsch. ent. Ztschr. 35, 104; Taf. 2, Fig. 34

♂♀ Syntypen, Syrien.

DEI: 1 Syntypus, Syrien, Kaifa, leg. REITTER; 1 Syntypus, Syrien, leg. COYE?

brevicornis SCHWARZ, 1900 (*Cardiophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 155—156

Syntypen, Usambara, Nguela.

DEI: 2 Paralectotypen, Usambara, Nguela, durch VON HAYEK festgelegt.

brevicornis SCHWARZ, 1904 (*Pomachilius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 61–62

♂♀ Syntypen, Brasilia merid., Nova Friburgo.
DEI: 1 Syntypus, Süd-Brasilien, Neu Freiburg, leg. WIENGREEN.

brevipennis SCHWARZ, 1901 (*Aeolus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 319

Syntypen, Rio Grande do Sul.
DEI: 1 Syntypus, Rio Gr. d. Sul.

brevipennis SCHWARZ, 1905 (*Alaus*)

siehe *curtipennis* SCHWARZ, 1906

brevipennis SCHWARZ, 1897 (*Athous*)
Wien. ent. Ztg. 16, 135

Syntypen, Abchasia, leg. ROST.
DEI: 2 Syntypen, Abchasia, leg. ROST.

brevipennis SCHWARZ, 1903 (*Drasterius*)

siehe *curtipennis* SCHWARZ, 1906

brevipennis SCHWARZ, 1903 (*Lobotarsus*)
Arkiv Zoologi 1, 44–46

Syntypen, Kamerun.
DEI: ♀ Lectotypus, Kamerun, Barombi, leg. CONRADT, von GIRARD festgelegt.

brevipes SCHWARZ, 1906 (*Anoplischius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 101–102

Syntypen, Argentina.
DEI: 1 Syntypus, Argent.

breviusculus SCHWARZ, 1900 (*Cardiophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 156

Syntypen, Afrika, Banana.
DEI: 2 Syntypen, Banana, leg. BUSSCHODTS.

bruchi SCHWARZ, 1906 (*Anoplischius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 103

♀ ? Holotypus, Brasilia, leg. BRUCH.
DEI: Holotypus, Brasilien, 11. 1901, leg. BRUCH.

bruchi SCHWARZ, 1904 (*Grammophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 71–72

1 ♂, 1 ♀?, Syntypen, Argentinien, Gob. Neuquen, leg. BRUCH.
DEI: 1 Syntypus, Argentinien, Gob. Neuquen, 12. 1. 1898, leg. BRUCH.

bruchi SCHWARZ, 1906 (*Monadicus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 142–143

Syntypen, Buenos Aires, leg. BRUCH.
DEI: 1 Syntypus, Argentina, Prov. Buenos Aires, 1896, leg. BRUCH.

bruchi SCHWARZ, 1906 (*Triplomychus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 144–145

Holotypus, Argentinien, Prov. Tucuman, leg. BRUCH.
DEI: Holotypus, Argentina, Prov. Tucuman, 30. 1. 1904, leg. BRUCH.

brunneipennis MIWA, 1931 (*Glyphonyx*)
Wien. ent. Ztg. 47 (1930), 206

Syntypen, Formosa, Kankau, 6., 8., 9. 1912, leg. SAUTER.
DEI: 2 Syntypen, Formosa, Kankau (Koshun), 8. 1912, 9. 1912, leg. SAUTER.

brunneiventris SCHWARZ, 1901 (*Aeolus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 316–317

Syntypen, Brasilien, Jatahy, Prov. Goyas.
DEI: 4 Syntypen, Brasilien, Prov. Goyas, Jatahy.

brunneiventris SCHWARZ, 1902 (*Elasmosomus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 217

Syntypen, Kamerun.
DEI: ♂ Lectotypus, Kamerun, durch GIRARD festgelegt.

brunneiventris SCHWARZ, 1908 (*Psephus*)
In: SJÖSTEDT, Kilimandjaro-Meru Expedition 7 Col., 60

♂♀ Syntypen, Kilimandjaro, Kibonoto, Kulturzone, 4. 1906, leg. SJÖSTEDT.
DEI: 1 ♂, Paralectotypus, Kilimandjaro, Kibonoto, Kulturzone, 9. 4. 1905–6, leg. SJÖSTEDT; 1 ♀, Paralectotypus, Kili-
mandjaro, Kibonoto, 1300–1900 m, 3. 3. 1905–06, leg. SJÖSTEDT; von GIRARD festgelegt.

***brunneofasciatus* SCHWARZ, 1906 (*Anchastus*)**

Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 137

Syntypen, Brasilien, Jatahy-Goyaz.

DEI: 1 Syntypus, Jatahy (Goyaz).

***brunneus* SCHWARZ, 1902 (*Anchastus*)**

Stett. ent. Ztg. 63, 253—254

Syntypen, Brasilien Yrimaguas.

DEI: 1 Syntypus, Yrimaguas.

***brunneus* SCHWARZ, 1907 (*Crepidomenus*)**

Stett. ent. Ztg. 68, 85—86

Holotypus (teste NEBOISS), Neu Seeland, im DEI.

***brunneus* SCHWARZ, 1902 (*Cylindroderus*)**

Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 334—335

Syntypen, Brasilien.

DEI: 1 Syntypus, Brasilien.

***brunnicornis* SCHWARZ, 1892 (*Melanotus*)**

Dtsch. ent. Ztschr. 36, 164 nota 1

Syntypen, China, Peking.

DEI: 1 Syntypus, Peking.

***brunnipennis* SCHWARZ, 1908 (*Olophoeus*)**

Soc. ent. 23, 113—114

Syntypen, Kamerun.

DEI: ♀ Lectotypus, Kamerun, von GIRARD festgelegt.

***brunnipes* SCHWARZ, 1902 (*Glyphochilus*)**

Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 321

Syntypen, West-Australien, Swan-River, im Mus. GODEFFROY.

DEI: 1 Syntypus, Swanriver, Alte Sammlung.

***brunnipes* SCHWARZ, 1902 (*Monocrepidius*)**

Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 119—120

♂♀ Syntypen, Queensland.

DEI: 2 Syntypen, Queensland.

***bucharensis* SCHWARZ, 1900 (*Cardiophorus*)**

Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 102

Syntypen, Buchara, Samarkand.

DEI: Lectotypus, 5 Paralectotypen, Buchara; 1 Paralectotypus, Samarkand, STDGR. 81; durch VON HAYEK festgelegt.

***caledonica* SCHWARZ, 1903 (*Chrosia*)**

Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 390—391

♂♂ Syntypen, Neu Caledonien.

DEI: 1 Syntypus, N. Caledon.

***candzei* FLEUTIAUX, 1935 (*Agraeus*)**

Ann. Soc. ent. Fr. 104, 24—25

Syntypen; Süd-Borneo, Martapoera, 6.—7., leg. DOHERTY, in Coll. FLEUTIAUX. Nord-Borneo, Kuching, leg. LEWIS, im Br. Mus. Java; leg. RAFFRAY und MAINDRON, im Mus. Paris. Sumatra, im DEI. Singapur, leg. RAFFRAY, im Mus. Bruxelles.

DEI: 1 ♂, Paralectotypus, Sumatra, durch VON HAYEK (Bull. Brit. Mus. N. H. Ent., Suppl. 20, 46; 1973) festgelegt.

***candzei* SCHWARZ, 1902 (*Horistonotus*)**

Stett. ent. Ztg. 63, 267—268

♂♀ Syntypen, Brasilien, Santos.

DEI: 1 Syntypus, Santos, leg. METZ; 2 Syntypen, Brasilien, Santos.

***candzei* SCHWARZ, 1902 (*Melanotus*)**

Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 327—328

Syntypen, Java, durch CANDÈZE.

DEI: 1 Syntypus, Java, Trezny?, Coll. CANDÈZE; 1 Syntypus, Coll. CANDÈZE.

***candzei* STIERLIN, 1864 (*Melanotus*)**

Berl. ent. Ztschr. 8, 149

Syntypen, Sicilien.

DEI: 2 Syntypen, Sicilia.

***candzei* SCHWARZ, 1896 (*Singhalenus*)**

Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 97

Syntypen, Cochinchina.

DEI: 1 Syntypus, Cochín.

capensis SCHWARZ, 1903 (*Idiotropia*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 375–376

Syntypen, Cap.

DEI: Lectotypus, Cap, Alte Sammlung, von GIRARD festgelegt.

carinicolis SCHWARZ, 1908 (*Lacon*)
Soc. ent. 23, 83

Syntypen, Madagascar.

DEI: 1 Syntypus, Madagascar.

carinicolis SCHWARZ, 1894 (*Melanotus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 38, 148–149

♂♂ Syntypen, Turkestan, Kulab.

DEI: 1 Syntypus, Turkestan, Kulab.

carinicornis SCHWARZ, 1903 (*Megapenthes*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 368–369

Syntypen, Nguela.

DEI: ♂ Lectotypus, Nguela, von GIRARD festgelegt.

carinulatus SCHWARZ, 1902 (*Melanozanthus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 326–327

Syntypen, Borneo, Kina-Balu.

DEI: 1 Syntypus, N. Borneo.

caspicus HEYDEN, 1883 (*Agriotes*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1883, 358

1 Syntypus, Tekke, in Coll. KRAATZ; 1 Syntypus, Baku, leg. SCHNEIDER, in Coll. HEYDEN.

DEI: 1 Syntypus, Caucasus, Baku, leg. SCHNEIDER.

castaneus MIWA, 1931 (*Glyphonyx*)
Wien. ent. Ztg. 47 (1930), 207

Syntypen, Formosa: Taihorin, 7. 1912 und Taihorinsho, 8. 1909, leg. SAUTER; Horisha, 7. 1926, leg. MIWA; Gyochi, 20. 5. 1909, leg. NITOE.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Taihorinsho, 7. 8., leg. SAUTER.

castaneus MIWA, 1930 (*Neodiploconus*)
Wien. ent. Ztg. 47, 92

Syntypen, Formosa: Kosempo, 22. 5. 1912 und Alikang, 6. 1909, leg. SAUTER; Kagi, 4. 1907, leg. MATSUMURA; Kanshirei, 18. 4. 1923, leg. TAKAHASHI; Horisha, 7. 1926, leg. MIWA; Rokkiri, 3. 5. 1908, leg. NITOE.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Alikang, 6. 1909, leg. SAUTER; 2 Syntypen, Formosa, Kosempo, 22. 5. 1912, leg. SAUTER.

cervicolor HEYDEN, 1880 (*Athous*)
Dtsch. ent. Ztschr. 24, 289

2♂♂, Syntypen, Asturien, Arvas, 1868, leg. HEYDEN.

DEI: 1 ♂, Syntypus, Asturien, Albas, 29. 7. 1868, leg. HEYDEN, in Coll. HEYDEN.

championi SCHWARZ, 1898 (*Anchastus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 147–148

Syntypen, Mexico.

DEI: 6 Syntypen, Mexico.

championi SCHWARZ, 1902 (*Athous*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 328–329

♂♀ Syntypen, Mexiko, Durango.

DEI: 2 Syntypen, Mexiko, Durango.

chilensis SCHWARZ, 1904 (*Monocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 70–71

Syntypen, Chile.

DEI: 1 Syntypus, Chile.

christophe GIRARD, 1974 (*Olophoeus*)
Ann. Soc. ent. France (N. S.) 10, 721–722, Fig. 1, 3, 9

♂ Holotypus, Angola, Benguella, leg. WELLMAN; 10 ♂♂, Paratypen, vom selben Fundort sowie von Huambo/Angola 1934, leg. PIMENTEL.

DEI: 4 Paratypen, Benguella, leg. Wellman.

cincticollis SCHWARZ, 1906 (*Monocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 118–119

2 Syntypen, Argentina, Prov. Tucuman, leg. BRUCH.

DEI: 2 Syntypen, Argentinien, Prov. Tucuman, 11. 1899, 20. 3. 1900, leg. BRUCH.

cinctipennis SCHWARZ, 1903 (*Cardiophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 371–372

Syntypen, Afrika or., Ikutha.

DEI: 1 Syntypus, Afr. or., Ikutha.

cinctipennis SCHWARZ, 1903 (*Horistonotus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 74—75

♂♀ Syntypen, Brasilien, St. Catharina.
DEI: 1 Syntypus, S. Catharina, leg. LÜDERWALDT.

cinctipennis SCHWARZ, 1904 (*Pomachilius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 77—78

Syntypen, Sao Paulo.
DEI: 1 Syntypus, S. Paulo.

cinnamomeus SCHWARZ, 1909 (*Elastrus*)
Soc. ent. 24, 122

Syntypen, Madagascar, Montagne d'Ambre.
DEI: 3 Syntypen, Madagaskar, Amberg.

cinnamomeus SCHWARZ, 1902 (*Olophoeus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 315—316

Syntypen, Transvaal.
DEI: 2 Syntypen, Transvaal, HARTMANN.

circumcinctus SCHWARZ, 1898 (*Psephus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 138

Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT.
DEI: ♀ Lectotypus, 1 ♀, Paralectotypus, Kamerun, leg. CONRADT, von GIRARD festgelegt.

collaris SCHWARZ, 1902 (*Agonischius*)
Stett. ent. Ztg. 63, 302

Syntypen, Sumatra.
DEI: 1 Syntypus, Sumatra.

collaris SCHWARZ, 1904 (*Cardiorhinus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 67—68

♂♂ Syntypen, Brasilien, Sao Paulo.
DEI: 3 Syntypen, S. Paulo.

collaris SCHWARZ, 1906 (*Monocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 360—361

Holotypus, Australia merid., im DEI.

collaris SCHWARZ, 1903 (*Symphostethus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 382—383

♀♀ Syntypen, Deutsch Neu Guinea.
DEI: 1 Syntypus, Herbertshöhe.

commutabilis ELSTON, 1924 (*Lacon*)
Trans. Proc. R. Soc. S. Austr. 48, 207

Holotypus, Paratypen; Northern Territory, Port Darwin, leg. HUNT, in Coll. FERGUSON; Northwest Australien: Derby, leg. DODD; Noonkanbah, leg. MjöBERG. Holotypus, in Coll. ELSTON.
DEI: 1 Syntypus, Port Darwin, N. Territory.

concameratus SCHWARZ, 1903 (*Steatoderus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 373—374

♀♀ Syntypen, Kamerun, Lolodorf.
DEI: ♂ Lectotypus, Kamerun; 1 ♀, Paralectotypus, Lolodorf, von GIRARD festgelegt.

concolor STIERLIN, 1862 (*Elater*)
Mitt. Schweiz. ent. Ges. 1 Heft 1, 36

Syntypen, Schweiz, Burgdorf, leg. MEYER-DÜR.
DEI: 2 Syntypen, Burgdorf.

condensus SCHWARZ, 1906 (*Monocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 360

Syntypen, Australia merid.
DEI: 1 historisches Exemplar, vielleicht Type, ohne Fundortangaben, aus Coll. SCHWARZ.

confinis SCHWARZ, 1909 (*Campylorsephus*)
Soc. ent. 24, 118

♂♂ Syntypen, Franz. Kongo, Benito.
DEI: ♂ Lectotypus, Congo Franç., Benito, von GIRARD festgelegt.

confusus FLEUTIAUX, 1918 (*Cardiophorus*)
Ann. Soc. ent. France 87, 228—229

Syntypen; Annam: Qui-Nhon und Tourane, leg. LA PERRAUDIÈRE; Hue, leg. DELAUNÉY; Chochinchine, Saigon.
DEI: 1 Syntypus, Annam, Qui Nhon.

confusus GIRARD, 1976 (*Propsephus*)
Ann. Soc. ent. France (N. S.) 12, 421–422, Fig. 6–9

♂ Holotypus, Tansanie, Nguelo, Usambara, leg. ROLLÉ, im Mus. Paris; 2 ♀♀, Paratypen, vom selben Fundort, im DEI und Coll. GIRARD.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

conicipennis SCHWARZ, 1902 (*Anoplischius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 136–137

Holotypus, Peru, Marcapata, im DEI.

conicipennis SCHWARZ, 1902 (*Steatoderus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 296–297

♂♀ Syntypen, Philippinen.

DEI: 1 Syntypus, Philippinen, leg. DOHRN.

consors HEYDEN, 1884 (*Athous*)
Dtsch. ent. Ztschr. 28, 293–294

♂ Holotypus, Insel Askold.

DEI: Holotypus, Amur, I. Askold, 1884, in Coll. HEYDEN.

consersus SCHWARZ, 1903 (*Monocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 63

Syntypen, Peru.

DEI: 2 Syntypen, Peru.

conspicuus SCHWARZ, 1891 (*Agristes*)
Dtsch. ent. Ztschr. 35, 86; Taf. 1, Fig. 4

♂♂ Syntypen, Klein-Asien, Karaman.

DEI: 1 historisches Exemplar, vielleicht Typus, Asia minor, Taurus Cilic.

constrictus SCHWARZ, 1902 (*Alaus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 312

♀♀ Syntypen, Tokelau-Inseln, Atafu.

DEI: 1 Syntypus, Duke of York (= Atafu), Mus. GODEFFROY Nr. 2394.

cordubensis HEYDEN, 1882 (*Silesis*)
Dtsch. ent. Ztschr. 26, 45–46

9 Syntypen, Sierra de Cordoba, leg. EHLERS.

DEI: 3 Syntypen, Sr. Cordoba, leg. EHLERS, in Coll. HEYDEN.

corymbitoides SCHWARZ, 1902 (*Monocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 358

Syntypen, Australia mer., Victoria.

DEI: 1 Syntypus, Victoria.

corymbitoides SCHWARZ, 1903 (*Psephus*)
Arkiv Zoologi 1, 47–48

6 ♂♂ ♀♀, Syntypen, Kamerun.

DEI: 1 ♂, Paralectotypus, Camerun, leg. SJÖSTEDT, von GIRARD festgelegt.

cosmesoides SCHWARZ, 1906 (*Parapomachilius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 140–141

Syntypen, Mendoza.

DEI: 6 Syntypen, Argentinien, Mendoza.

crassipes SCHWARZ, 1900 (*Limoniis*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 105–106

Syntypen, Turcia, Constantinopel.

DEI: 1 Syntypus, Turcia; 1 Syntypus, Constantinopel, leg. STRÜBING.

crassiusculus SCHWARZ, 1906 (*Ischiodontus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 106–107

Syntypen, Argentina.

DEI: 2 Syntypen, Argentinien.

crassiventris SCHWARZ, 1899 (*Agrypnus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1899, 75–76

Syntypen, Deutsch Ost-Afrika.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♂, Paralectotypus, D. Ost-Afrika, leg. v. BENNIGSEN, von GIRARD festgelegt.

crassus SCHWARZ, 1907 (*Monocrepidius*)
Stett. ent. Ztg. 68, 72

Syntypen, Australien, Victoria.

DEI: 2 Syntypen, Victoria.

cribratus SCHWARZ, 1908 (*Psephus*)
Soc. ent. 23, 122–123

Syntypen, West-Afrika (Kamerun?).

DEI: ♂ Lectotypus, Afr. occ., von GIRARD festgelegt.

cribricollis SCHWARZ, 1908 (*Psephus*)
Soc. ent. 23, 123

Syntypen, Senegal, Casamanca.

DEI: ♂ Lectotypus, Casamanca, von GIRARD festgelegt.

cruciatus SCHWARZ, 1901 (*Pomachilioides*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 344—345

Syntypen, Peru, Callanga.

DEI: 5 Syntypen, Peru, Callanga.

crucifer SCHWARZ, 1906 (*Aeolus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 129—130

Syntypen, Bolivia, La Paz.

DEI: 1 Syntypus, Bolivia, La Paz.

cuneipennis SCHWARZ, 1906 (*Crepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 111—112

♂♂, 1 ♀, Syntypen, ohne Fundortangaben aus Amerika.

DEI: 4 Syntypen, Brasilien, Prov. Goyas, Jatahy, 9.—11. 1897.

cuneolus SCHWARZ, 1900 (*Heteroderes*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 148—149

Syntypen, Dar-es-Salaam.

DEI: ♂ Lectotypus, Dar-es-Sal., von GIRARD festgelegt.

cuneolus SCHWARZ, 1902 (*Melanotus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 278—279

Syntypen; Sumatra, Liangagas, Soekaranda, durch DOHRN.

DEI: 1 Syntypus, Sumatra, Liangagas, leg. DOHRN.

cuneolus SCHWARZ, 1902 (*Melanoxanthus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 330—331

Syntypen; Sumatra; Borneo, Kina-Balu.

DEI: 1 Syntypus, Sumatra, Indrapoera; 2 Syntypen, Kina Balu.

curticollis SCHWARZ, 1906 (*Ischiodontus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 109

Holotypus, Brasilia, Apiahy, leg. KRUG.

DEI: Holotypus, D. KRUG.

curtipennis SCHWARZ, 1906 (*Alaus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 326; nom. nov. pro *brevipennis* SCHWARZ, 1905,
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 285

Syntypen, Gabun.

DEI: 2 Syntypen, Gabun.

curtipennis SCHWARZ, 1906 (*Drasterius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 326; nom. nov. pro *brevipennis* SCHWARZ, 1903,
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 57—58

11 Syntypen, Nord-Amerika, Alabama.

DEI: ♀ Lectotypus, 9 Paralectotypen, Alabama, leg. SPEYER, von BECKER (Can. Ent. 43, 165—166; 1961) festgelegt.

curvatus SCHWARZ, 1902 (*Heteroderes*)
Stett. ent. Ztg. 63, 245—246

Syntypen, Madagascar.

DEI: 1 Syntypus, Madagascar, leg. SIKORA.

cylindricollis SCHWARZ, 1903 (*Aeolus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 65—66

Syntypen, Brasilien, St. Catharina, Lages.

DEI: 1 Syntypus, Brasilien, Lages, 1.—3. 1887, leg. FRUHSTORFER; 2 Syntypen, S. Catarina, leg. LÜDERWALDT.

cylindricollis SCHWARZ, 1902 (*Agriotes*)
Stett. ent. Ztg. 63, 299

♂♀ Syntypen, China, Prov. Fokien.

DEI: 6 Syntypen, Fokien.

cylindricollis SCHWARZ, 1901 (*Melanoxanthus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 326—327

Syntypen, Sumatra.

DEI: 1 Syntypus, Sumatra.

cylindricus SCHWARZ, 1898 (*Athoomorphus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 156

Syntypen, Afrika, Orange.

DEI: 2 Syntypen, Orange.

cylindricus SCHWARZ, 1904 (*Cardiorhinus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 68—69

♂♂ Syntypen, Brasilien.
DEI: 11 historische Exemplare, ohne Fundortangaben, vielleicht Typen.

decoratus SCHWARZ, 1897 (*Diacanthus*)

siehe *decorus* SCHWARZ, 1906

decoratus SCHWARZ, 1898 (*Lobotarsus*)

siehe *lolodorfensis* HAYEK, 1973

decorus SCHWARZ, 1906 (*Diacanthus*)

In: WYTSMAN, Gen. insect. 46, 223; nom. nov. pro *decoratus* SCHWARZ, 1897,
Wien. ent. Ztg. 16, 136

♀ Holotypus, Turkestan, im DEI.

delicatulus SCHWARZ, 1897 (*Hypnoidus*)
Wien. ent. Ztg. 16, 129

Syntypen, Bagdad.
DEI: 2 Syntypen, Bagdad.

dentatus SCHWARZ, 1902 (*Esthesopus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 149—150

Syntypen, Brasilien.
DEI: 1 Syntypus, Brasilien.

denticulatus SCHWARZ, 1908 (*Psephus*)
Soc. ent. 23, 121—122

Syntypen, Kamerun.
DEI: ♀ Lectotypus, Kamerun, von GIRARD festgelegt.

depressicollis SCHWARZ, 1901 (*Alaus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 305

Syntypen, Insel Palau.
DEI: 1 Syntypus, Palau.

depressifrons DESBROCHERS, 1870 (*Athous*)
Abeille 7, 113—114

♂♀ Syntypen, Corsica.
DEI: 1 Syntypus, Corsica.

depressus SCHWARZ, 1902 (*Diploconus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 326—327

Syntypen, Sumatra, Indrapoera, leg. WEYERS, im Mus. Brüssel.
DEI: 1 Syntypus, Sumatra, Indrapoera, leg. WEYERS.

depressus SCHWARZ, 1902 (*Lobotarsus*)

siehe *benilensis* HAYEK, 1973

depressus SCHWARZ, 1902 (*Monocrepidius*)

siehe *planatus* SCHWARZ, 1906

deromecoides SCHWARZ, 1906 (*Medonia*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 136

Syntypen, Chile.
DEI: 6 Syntypen, Chile.

desbrochersi CANDEZE, 1881 (*Melanotus*)
Elaterides nouveaux 3, 87

Syntypen, Azoren, in Coll. DESBROCHERS.
DEI: 1 Syntypus, Açores, DESBR.

differens SCHWARZ, 1902 (*Cardiophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 254

♂♀ Syntypen, Madagaskar, Plateau de l'Androy, Reg. d'Ambovombe.
DEI: 1 Syntypus, Madagaskar, leg. SIKORA; 5 Syntypen, Plateau de l'Androy-Reg. d'Ambovombe.

dimidiatofasciatus SCHWARZ, 1904 (*Aeolus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 71

Syntypen, Sao Paulo.
DEI: 1 Syntypus, S. Paulo.

dimidiatus SCHWARZ, 1904 (*Cardiorhinus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 66—67

♂♀ Syntypen, Brasilien, Espirito Santo.
DEI: 8 Syntypen, Espirito Santo; 4 Syntypen, Brasilien.

dimidiatus SCHWARZ, 1902 (*Glyphonyx*)
Stett. ent. Ztg. 63, 306—307

Syntypen; Soekaranda, Liangagas, durch DOHRN.

DEI: 1 Syntypus, Sumatra, Soekaranda, 1. 1894, leg. DOHRN; 2 Syntypen, Sumatra, Liangagas, leg. DOHRN.

dimidiatus SCHWARZ, 1902 (*Paracardiophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 124

♀♀ Syntypen, Australia mer., Victoria.

DEI: 1 Syntypus, Australia, Victoria.

dimidiatus SCHWARZ, 1899 (*Psephus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1899, 67+72

♀♀ Syntypen, Kamerun.

DEI: ♀ Lectotypus, Kamerun; 1 ♀, Paralectotypus, Kamerun, Barombi, leg. CONRADT; von GIRARD festgelegt.

diplotrichus SCHWARZ, 1902 (*Anoplisthius*)
Stett. ent. Ztg. 63, 224

Syntypen, Ecuador, Balzapamba.

DEI: 1 Syntypus, Ecuador, Balzapamba, leg. HAENSCH.

diplotrichus SCHWARZ, 1909 (*Psephus*)
Soc. ent. 24, 93

Syntypen, Franz. Kongo, Benito.

DEI: ♂ Lectotypus, Congo Franç., Benito, von GIRARD festgelegt.

discicollis SCHWARZ, 1906 (*Cardiorhinus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 149—150

2 Syntypen, St. Catharina, durch ROLLE, im DEI.

discicollis SCHWARZ, 1901 (*Cosmesus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 353—354

Syntypen, Brasilien.

DEI: 2 Syntypen, Brasil.

discicollis SCHWARZ, 1902 (*Elater*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 322—323

Syntypen, Tonkin, Montes Mauson.

DEI: 1 Syntypus, Tonkin, Montes Mauson, 4.—5., 2—3000 Fuß, leg. FRUHSTORFER.

discicollis SCHWARZ, 1898 (*Melanoxanthus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 145—146

♂♀ Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT.

DEI: 5 Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT.

discicollis SCHWARZ, 1902 (*Monocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 141—142

Syntypen, Brasilien, St. Catharina.

DEI: 2 Syntypen, S. Catharina, leg. LÜDERWALDT; 1 Syntypus, St. Catharina; 1 Syntypus, Brasilien, St. Catharina.

discicollis SCHWARZ, 1901 (*Pomachilius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 334

Syntypen, Rio Grande do Sul.

DEI: 1 Syntypus, Rio Gr. d. Sul.

discoidalis SCHWARZ, 1906 (*Aeolus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 128

Syntypen, Brasilien, Jatahy-Goyaz.

DEI: 1 Syntypus, Brasilien, Prov. Goyas, Jatahy.

discoidalis SCHWARZ, 1902 (*Melanoxanthus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 328—329

Syntypen, Sumatra, Indrapoera; Borneo, Kina-Balu.

DEI: 1 Syntypus, Sumatra, Indrapoera, leg. WEYERS; 1 Syntypus, N. Borneo; 2 Syntypen, Kina Balu.

discoidalis SCHWARZ, 1903 (*Monocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 386

Syntypen, Australien.

DEI: 1 Syntypus, Austr.

discolor SCHWARZ, 1902 (*Cardiophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 254—255

♂♀ Syntypen, Madagaskar, Plateau de l'Androy, Reg. d'Ambovombe.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

discolor SCHWARZ, 1899 (*Psephus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1899, 79—80

♂♂♀ Syntypen, Deutsch Ost-Afrika.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 Paralectotypus, Deutsch Ost-Afrika; 4 Paralectotypen, Ostafrika; alle aus Coll. v. BENNIGSEN, von GIRARD festgelegt.

divaricatus SCHWARZ, 1904 (*Cardiorhinus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 62—63

Syntypen, Brasilien, Santos.

DEI: 1 Syntypus, Santos, leg. METZ; 1 Syntypus, Santos, Alto da Serra.

divisus SCHWARZ, 1898 (*Anoplischopsis*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 141

Syntypen, Mexico, S. Cristóbal.

DEI: 1 Syntypus, S. Cristóbal, 16.

dohrni SCHWARZ, 1902 (*Melanotus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 280—281

♂♀ Syntypen, Sumatra, Soekaranda, leg. DOHRN.

DEI: 1 Syntypus, Sumatra, Soekaranda, leg. DOHRN.

dohrni SCHWARZ, 1902 (*Melanoxanthus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 250—251

Syntypen, Sumatra, Soekaranda, leg. DOHRN.

DEI: 1 Syntypus, Sumatra, Soekaranda, leg. DOHRN.

dolosus SCHWARZ, 1898 (*Agonischius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 153

Syntypen, Assam.

DEI: 9 Syntypen, Assam.

dolosus SCHWARZ, 1903 (*Monocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 387

Syntypen, Süd-Australien, Melbourne.

DEI: 1 ♂, Syntypus, Melb.; 4 Syntypen, S. Australien; 1 Syntypus, Austral.

dorsalis SCHWARZ, 1901 (*Anoplischius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 310—311

Syntypen, Mexico, Durango.

DEI: 1 Syntypus, Mexico, Durango, Colonia 16.

dorsalis SCHWARZ, 1898 (*Hemicleus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 129

Syntypen, Kamerun, Lolodorf, leg. CONRADT, im DEI.

DEI: ♂ Lectotypus, Kamerun, von GIRARD festgelegt.

dorsalis SCHWARZ, 1901 (*Heteroderes*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 360

Syntypen, Kinchassa.

DEI: ♂ Lectotypus, 2 ♀♀, Paralectotypen, Kinchassa, Waelbroeck, 30. 10. 1896, von GIRARD festgelegt.

dorsalis SCHWARZ, 1899 (*Psephus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1899, 80; als var. zu *discolor* SCHWARZ beschrieben

Syntypen, Deutsch Ost-Afrika.

DEI: ♂ Lectotypus, D. Ost-Afrika, leg. v. BENNIGSEN, von GIRARD festgelegt.

drakei SCHWARZ, 1896 (*Cosmesus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 103

Syntypen, Paraguay, leg. DRAKE.

DEI: 5 Syntypen, Paraguay, leg. DRAKE.

drakei SCHWARZ, 1896 (*Monocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 99—100

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Paraguay, leg. DRAKE, im DEI.

drakei SCHWARZ, 1896 (*Pomachilius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 101

Syntypen, Paraguay, leg. DRAKE.

DEI: 4 Syntypen, Paraguay, leg. DRAKE.

dubiosus SCHWARZ, 1907 (*Megaphenthes*)
Stett. ent. Ztg. 68, 78—79

Syntypen, Australien, Victoria.

DEI: 2 Syntypen, Victoria.

dubius SCHWARZ, 1908 (*Cardiophorus*)
In: SJÖSTEDT, Kilimandjaro Meru Expedition 7 Col., 65—66

Holotypus, Meru, Ngare na nyuki, 12. 1905, leg. SJÖSTEDT.

DEI: Holotypus, Meru, Niederung, leg. SJÖSTEDT.

dubius SCHWARZ, 1902 (*Hapatesus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 126

Holotypus, Australia mer., Victoria, im DEI.

dubius SCHWARZ, 1901 (*Melanozanthus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 319—320

Syntypen, Sumatra.

DEI: 1 Syntypus, Sumatra.

duchoni SCHWARZ, 1905 (*Alaotypus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 257—258

3 Syntypen, Assam, Kohima, leg. DUCHON, im DEI.

duchoni SCHWARZ, 1905 (*Hemiops*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 265—266

3 Syntypen, Assam, Kohima, leg. DUCHON.

DEI: 2 Syntypen, Assam, Kohima, leg. DUCHON.

dugesi CANDEZE, 1893 (*Glyphonyx*)
Elaterides nouveaux 5, 66

Syntypen, Mexico, Guanajuato.

DEI: 1 Syntypus, Mexico.

edmundi QUELLE, 1955 (*Elasmosomus*)
Dtsch. ent. Ztschr. (N. F.) 2, 288

Holotypus, Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, 1897, leg. CONRADT, im Zool. Mus. Berlin; Paratypen: Congo, Riv. San Benito, 1885, leg. GUIRAL, im Mus. Paris; Ogoué, Franz. Aequatorial-Afrika, Lambaréné, 1913, leg. ELLENBERGER, im Mus. Paris.

DEI: 1 Paratypus, Kamerun, leg. CONRADT.

egregius SCHWARZ, 1901 (*Melanozanthus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 325—326

Syntypen, Java, leg. DUCHON.

DEI: 1 Syntypus, Java, leg. DUCHON.

elegantulus SCHWARZ, 1907 (*Monocrepidius*)

In: WYTSMAN, Gen. Ins. 46, 316; nom. nov. pro *elongatulus* SCHWARZ, 1902,
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 320—321

♂♂ Syntypen, Central-Tonkin, Chiem-Hoa.

DEI: 1 Syntypus, Central-Tonkin, Chiem Hoa, 8.—9., leg. FRUHSTORFER.

elegantulus SCHWARZ, 1906 (*Pomachilius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 139—140

Syntypen, Brasilien, St. Catharina.

DEI: 1 Syntypus, S. Catharina, leg. LÜDERWALDT.

ellipticus SCHWARZ, 1904 (*Ischiodontus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 59

Syntypen, Peru, Chanchamajo.

DEI: 1 Syntypus, Peru, leg. LANGE.

elongatulus SCHWARZ, 1902 (*Monocrepidius*)

siehe *elegantulus* SCHWARZ, 1907

elongatulus SCHWARZ, 1908 (*Psephus*)
Soc. ent. 23, 123

Syntypen, Togo.

DEI: ♂ Lectotypus, Togo, von GIRARD festgelegt.

elongatus SCHWARZ, 1902 (*Nomopleus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 292—293

Syntypen, Transvaal.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♂, Paralectotypus, Transvaal, leg. HARTMANN, von GIRARD festgelegt.

elongatus SCHWARZ, 1902 (*Spheniscosomus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 275—276

♀ Holotypus, N.-Borneo, im DEI.

elongatus SCHWARZ, 1901 (*Stenopus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 308—309

Syntypen, Süd-Amerika, Caucathal.

DEI: 1 Syntypus, S. Amerika, Caucathal.

emarginatus SCHWARZ, 1902 (*Monocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 121—122

Holotypus, Aru Inseln, im DEI.

emgei SCHWARZ, 1893 (*Elathous*)
Dtsch. ent. Ztschr. 37, 191

Holotypus, Griechenland, Salonichi, leg. EMGE, im DEI.

epirus STIERLIN, 1875 (*Athous*)
Mitt. Schweiz. ent. Ges. 4, 475–476

Syntypen, südliche Türkei, Janina.
DEI: 1 Syntypus, Janina.

erythrurus SCHWARZ, 1902 (*Arrhaphes*)
Stett. ent. Ztg. 63, 258–259

Syntypen, Sumatra, Soekaranda und Llangagas, leg. DOHRN.
DEI: 2 Syntypen, Sumatra, Soekaranda, leg. DOHRN; 1 Syntypus, Soekaranda, 1. 1894, leg. DOHRN.

euaensis SCHWARZ, 1902 (*Psephus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 352

Syntypen, Tonga-tabu, Eua, im Mus. GODEFFROY.
DEI: „Neotypus“ (Pac. Insects 1, 366; 1959) Eua, Mus. GODEFFROY. Die Begründung für die Festlegung eines Neotypus erscheint nicht stichhaltig, da das Exemplar in der Coll. SCHWARZ ebenfalls ein Etikett „Mus. GODEFFROY“ trägt. Bei diesem ♂ handelt es sich somit zweifelsfrei um ein Exemplar der Typenserie. Das ♂ wird hiermit als Lectotypus festgelegt.

excisus SCHWARZ, 1900 (*Cardiophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 152–153

Syntypen; Ost-Afrika, Dar-es-Salaam; Pangani; Usambara; Somali.
DEI: 2 Syntypen, Dar-es-Salaam; 1 Syntypus, Pangani-Steppe; 1 Syntypus, Usambara, leg. WEISE; 1 Syntypus, Somali.

exclamationis SCHWARZ, 1903 (*Athous*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 58–59

Syntypen, Nord-Amerika, Alabama.
DEI: 1 Syntypus, Alabama, leg. SPEYER.

exiguus SCHWARZ, 1903 (*Paracosmesus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 79–80

Syntypen, Bolivien, Cochabamba.
DEI: 2 Syntypen, Boliv., Cochabamba, leg. GERM.

eximius SCHWARZ, 1902 (*Melanoxanthus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 331–332

Syntypen, Borneo, Kina-Balu.
DEI: 3 Syntypen, N. Borneo; 3 Syntypen, Kina-Balu.

fasciculatus SCHWARZ, 1902 (*Elasmosomus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 214–215

Syntypen, Kamerun.
DEI: ♂ Lectotypus, Kamerun, Barombi, leg. CONRADT, von GIRARD festgelegt.

fasciculatus SCHWARZ, 1905 (*Hemicleus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 276–277

Syntypen, Kamerun, Barombi.
DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♀, Paralectotypus, Kamerun, von GIRARD festgelegt.

fasciculatus SCHWARZ, 1906 (*Paracrepidomenus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 365–366

Syntypen, N. S. Wales, Victoria occ.
DEI: ♂ Lectotypus, 4 Paralectotypen, Victoria occ., von NEBOISS festgelegt.

fastigiatus SCHWARZ, 1898 (*Lacon*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 185

Syntypen, Ost-Afrika, Usambara.
DEI: ♀ Lectotypus, 1 ♂, 2 ♀♀, Paralectotypen, Usambara, leg. WEISE, durch VON HAYEK (Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) Suppl. 20, 153; 1973) festgelegt.

feai FLEUTIAUX, 1935 (*Agraeus*)
Ann. Soc. ent. Fr. 104, 23

Syntypen; Birmanien; Tenasserim; Sikkim; Assam; Almora, Berenag, 6000 Fuß; Himalaya, Kulu, 3600 Fuß.
DEI: 1 ♂, Paralectotypus, Tenasserim, Thagata, 2.–4. 1887, durch VON HAYEK (Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) Suppl. 20, 31–32; 1973) festgelegt.

ferrugatus SCHWARZ, 1906 (*Ischiodontus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 110

Syntypen; Peru, Callanga; Bolivia, La Paz; Brasilia, St. Catharina.
DEI: 1 Syntypus, Bolivien, Yungas de La Paz; 1 Syntypus, Peru, Callanga.

ferrugineus SCHWARZ, 1900 (*Glyphonyx*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 97

Syntypen, N. O. Sumatra, leg. SCHULTHEISS.
DEI: 1 Syntypus, N. O. Sumatra, Tebing-tinggi, leg. SCHULTHEISS.

ferrugineus SCHWARZ, 1900 (*Heteroderes*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 147

Syntypen, Dar-es-Salaam.
DEI: 1 Syntypus, Dar-es-Salaam.

ferrugineus SCHWARZ, 1892 (*Melanotus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 35 (1891), 366

1 ♂, Syntypus, Graecia, in Coll. SCHWARZ; Syntypen, Dalmatien, in Coll. KRAATZ.
DEI: 1 ♂, Syntypus, Graecia.

ferrugineus SCHWARZ, 1898 (*Psephus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 187—188

Syntypen, Ost-Afrika, Usambara.
DEI: ♂ Lectotypus, D. O. Afrika; 1 Paralectotypus, Usambara; 1 Paralectotypus, Dar-es-Salaam, leg. v. BENNIGSEN; von GIRARD festgelegt.

ficuzzensis BUYSSON, 1912 (*Athous*)
Col. Rundsch. 1, 132—133

♂♂ Syntypen, Sizilien, Ficcuza, in Coll. LEONHARD.
DEI: 1 Syntypus, Sizilien, Ficcuza, 1906, leg. LEONHARD.

figuratus SCHWARZ, 1896 (*Monocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 100—101

Syntypen, Paraguay, leg. DRAKE.
DEI: 1 Syntypus, Paraguay, leg. DRAKE.

filicornis SCHWARZ, 1902 (*Monocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 359

Syntypen, Australia mer., Melbourne.
DEI: 1 Syntypus, Melb.

filicornis SCHWARZ, 1898 (*Psephus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 136—137

Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT.
DEI: ♂? Lectotypus, Kamerun; 1 ♀, Paralectotypus, Kamerun, leg. CONRADT; von GIRARD festgelegt.

fimbriatus SCHWARZ, 1906 (*Monocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 119—120

4 Syntypen, Mendoza, im DEI.

fimbriatus SCHWARZ, 1908 (*Psephus*)
Soc. ent. 23, 122

Syntypen, Kamerun.
DEI: ♂? Lectotypus, 1 ♂, Paralectotypus, Kamerun, von GIRARD festgelegt.

flaveolus SCHWARZ, 1907 (*Monocrepidius*)
Stett. ent. Ztg. 68, 74—75

Syntypen, Australien, Victoria occ.
DEI: 1 Syntypus, Austr. occ.

flavescens SCHWARZ, 1906 (*Anoplistichius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 102

Syntypen, Mendoza.
DEI: 3 Syntypen, Mendoza.

flavifrons SCHWARZ, 1903 (*Megapenthes*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 369

♀? Syntypen, Kamerun.
DEI: ♀ Lectotypus, Kamerun, Barombi, leg. CONRADT, von GIRARD festgelegt.

flavipes SCHWARZ, 1902 (*Anchastus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 332

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Tenasserim, Tanāong, leg. FRUHSTORFER.
DEI: 2 Syntypen, Tenasserim, Tanāong, 4000 Fuß, 5., leg. FRUHSTORFER.

flavipes SCHWARZ, 1906 (*Megapenthes*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 135—136

Syntypen, Mendoza.
DEI: 4 Syntypen, Mendoza.

flavobasalis HEYDEN, 1889 (*Agriotes*)
Dtsch. ent. Ztschr. 33, 328

Holotypus, Lusitaniae (Portugal), Serra do Estrella, leg. KOLTZE, im DEI.

flavobasalis SCHWARZ, 1902 (*Elater*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 324—325

Syntypen, Tonkin, Montes Mauson.
DEI: 2 Syntypen, Tonkin, Montes Mauson, 4.—5., 2—3000 Fuß, leg. FRUHSTORFER.

flavobasalis SCHWARZ, 1900 (*Melanoxanthus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 93–94

Syntypen, N. O. Sumatra, leg. SCHULTHEISS.
DEI: 1 Syntypus, N. O. Sumatra.

flavobasalis SCHWARZ, 1907 (*Monocrepidius*)
Stett. ent. Ztg. 68, 73

♂♂ Syntypen, Australien, Victoria occid.
DEI: 1 Syntypus, Victoria occ.

flavobasalis SCHWARZ, 1902 (*Paracardiophorus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 260–261

Syntypen, China, Prov. Fokien.
DEI: 2 Syntypen, Fokien.

flavofasciatus SCHWARZ, 1902 (*Agonischius*)
Stett. ent. Ztg. 63, 305–306

Syntypen, Borneo, Kina Balu.
DEI: 2 Syntypen, N. Borneo; 3 Syntypen, Kina Balu.

flavofasciatus SCHWARZ, 1902 (*Horistonotus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 263–264

Syntypen, Brasilien, Prov. Goyas, Jatahy.
DEI: 3 Syntypen, Brasilien, Prov. Goyas, Jatahy.

flavofasciatus SCHWARZ, 1901 (*Melanoxanthus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 324

Syntypen, N.-Borneo.
DEI: 4 Syntypen, Borneo, Kina-Balu, 1500 m.

flavovittatus SCHWARZ, 1901 (*Cosmesus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 351

♂♀ Syntypen, Brasilien.
DEI: 5 Syntypen, Brasilien, Lages, leg. FRUHSTORFER.

flavovittatus SCHWARZ, 1901 (*Melanoxanthus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 323–324

Syntypen, N. Borneo.
DEI: 2 Syntypen, Kina Balu.

flavus SCHWARZ, 1903 (*Cosmesus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 77–78

Syntypen, Peru, Vilcanota.
DEI: 1 Syntypus, Peru, Vilcanota.

flavus SCHWARZ, 1903 (*Nomopleus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 374–375

Syntypen, Oranje.
DEI: Lectotypus, Oranje, von GIRARD festgelegt.

fleutiauxi SCHWARZ, 1905 (*Nomopleus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 292

Syntypen, Afrika merid.
DEI: 1 Paralectotypus, Süd Afrika, von GIRARD festgelegt.

florentini FLEUTIAUX, 1894 (*Agonischius*)
Ann. Soc. ent. France 63, 688

Syntypen; Tonkin, Lang-Son, leg. FLORENTIN. Laos, Luang-Prabang, leg. Massie. Tonkin, Dang-Trua, leg. DORR.
DEI: 1 Syntypus, Tonkin, leg. FLORENTIN.

foersteri SCHWARZ, 1902 (*Alaus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 310

♀♀ Syntypen, Sumatra.
DEI: 1 Syntypus, Sumatra.

formosanus SCHWARZ, 1902 (*Sephilus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 319–320

Syntypen, Formosa.
DEI: 1 Syntypus, Formosa.

formicatus NEBOISS, 1967 (*Paracalais*)
Proc. R. Soc. Vict. 80, 273–274, Fig. 21–23; Taf. 44, Fig. 10

♀ Holotypus, Queensland, Endeavour R., im Mus. Melbourne; 11 Paratypen, siehe Originalbeschreibung.
DEI: 1 ♀, Paratypus, Queensland, Coen District, Cape York, leg. HACKER; 1 ♀, Paratypus, N. S. Wales, Endeavour. R.

forticornis SCHWARZ, 1900 (*Elater*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 99–100

♂♂ Syntypen, Süd-Ungarn, Rhilo-Dagh, Balkan, leg. MERKL.
DEI: 4 Syntypen, Süd-Ungarn, leg. MERKL.

***foveiventris* SCHWARZ, 1900 (*Cardiophorus*)**

Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 103

Syntypen, Graecia.

DEI: Lectotypus, Graecia, Parnassos, leg. v. OERTZEN, durch von HAYEK festgelegt.

***fragilis* SCHWARZ, 1892 (*Melanotus*)**

Dtsch. ent. Ztschr. 36, 160; Taf. 2, Fig. 24

♂♀ Syntypen, Turkestan, 1889, leg. HABERHAUER.

DEI: 1 Syntypus, Turkestan.

***fruhstorferi* SCHWARZ, 1902 (*Agonischius*)**

Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 340

♂♀ Syntypen, Tonkin, Montes Mauson.

DEI: 8 Syntypen, Tonkin, Montes Mauson, 2–3000 Fuß, 4.–5.

***fruhstorferi* SCHWARZ, 1902 (*Campsosternus*)**

Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 318

Syntypen, Tonkin, Montes Mauson, leg. FRUHSTORFER.

DEI: 4 Syntypen, Tonkin, Montes Mauson, 2–3000 Fuß, 4.–5., leg. FRUHSTORFER.

***fucosus* SCHWARZ, 1901 (*Melanoxanthus*)**

Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 321–322

Syntypen, Süd-Ost-Borneo.

DEI: 1 Syntypus, Sd. Ost Borneo.

***fulgidus* SCHWARZ, 1909 (*Psephus*)**

Soc. ent. 24, 109

Syntypen, Kamerun, Barombi.

DEI: ♀ Lectotypus, Kamerun, Barombi, leg. CONRADT, von GIRARD festgelegt.

***fulvescens* SCHWARZ, 1904 (*Pomachilius*)**

Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 73

2 Syntypen, Argentinien, Buenos Aires, leg. BRUCH.

DEI: 1 Syntypus, Argentinien, Prov. Buenos Aires, 7. 4. 1896, leg. BRUCH.

***fulvus* SCHWARZ, 1903 (*Steatoderus*)**

Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 373

♀♀ Syntypen, Nguela.

DEI: ♀ Lectotypus, 1 ♀, Paralectotypus, Nguelo, Usambara, von GIRARD festgelegt.

***fumosus* SCHWARZ, 1900 (*Melanoxanthus*)**

Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 92–93

Syntypen, N. O. Sumatra, leg. SCHULTHEISS.

DEI: 1 Syntypus, N. O. Sumatra.

***fuscipennis* SCHWARZ, 1906 (*Monocrepidius*)**

Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 362–363

Syntypen, Victoria.

DEI: 2 Syntypen, Victoria.

***fusconiger* SCHWARZ, 1909 (*Psephus*)**

Soc. ent. 24, 87

Syntypen, Kamerun, Victoria.

DEI: ♂ Lectotypus, Kamerun, Victoria, von GIRARD festgelegt.

***fuscus* MIWA, 1930 (*Agriotes*)**

Wien. ent. Ztg. 47, 93–94

Syntypen, Formosa: Sokutsu, Banshoryo district, 7. 7. 1912; Kosempo, 7. 9. 1909; alle leg. SAUTER.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Banshoryo Distr., Sokutsu, 7. 7. 1912, leg. SAUTER.

***fusiformis* SCHWARZ, 1902 (*Psephus*)**

Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 317–318

♂♀ Syntypen, Kamerun, Vallée de la N'Goko.

DEI: 2 Paralectotypen, Cameroun, Vallée de la N'Goko, 1. 1900 (Jobit), von GIRARD festgelegt.

***fusiformis* SCHWARZ, 1902 (*Stichotomus*)**

Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 336

Syntypen, Australia bor., Port Mackay.

DEI: 3 Syntypen, Australia bor., Port Mackay.

***gabunensis* SCHWARZ, 1903 (*Tetralobus*)**

Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 363–364

♂♂ Syntypen, Gabun.

DEI: ♂ Lectotypus, Gabun, von GIRARD festgelegt.

***gaedikei* GIRARD, 1974 (*Olophoeus*)**

Ann. Soc. ent. France (N. S.) 10, 722–724, Fig. 5

♂ Holotypus, Angola, Benguela, leg. WELLMAN, im Mus. Paris; 9 ♂♂, Paratypen, vom selben Fundort, 1 Ex., im Mus.

Paris, 4 Ex., im DEI, 4 Ex., in Coll. GIRARD.

DEI: 4 Paratypen, Benguela, leg. WELLMAN.

gaertneri SCHWARZ, 1901 (*Cardiophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 16

♂ Holotypus, Thüringen, Manebach, 1899, leg. GÄRTNER, im DEI.

ganglbaueri SCHWARZ, 1894 (*Adelocera*)
Dtsch. ent. Ztschr. 38, 145–146

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Syrien, Beirut, 1878, leg. APPL.

DEI: 1 Syntypus, Beirut, 1878, leg. APPL.

ganglbaueri SCHWARZ, 1891 (*Agriotes*)
Dtsch. ent. Ztschr. 35, 86; Taf. 1, Fig. 5

♂♂ Syntypen, Syrien, Beirut.

DEI: 1 ♂, Syntypus, Beirut, 1. 1878.

ganglbaueri SCHWARZ, 1897 (*Athous*)
Wien. ent. Ztg. 16, 133–134

♂♂ Syntypen, Krain, Nanos, leg. GANGLBAUER.

DEI: 5 Syntypen, Nanos, 1894, leg. GANGLBAUER.

geminatus SCHWARZ, 1902 (*Melanozanthus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 329–330

Syntypen, Borneo, Kina-Balu.

DEI: 1 Syntypus, Kina Balu.

getschmanni CANDÈZE, 1880 (*Cardiophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 24, 297–298

Syntypen, Asturia.

DEI: 1 Syntypus, Asturia, 1879, leg. GETSCHMANN, in Coll. HEYDEN.

gibberosus SCHWARZ, 1898 (*Alaus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 412–413

Syntypen; Gabon; Kamerun.

DEI: 2 Syntypen, Gabon.

gibbosus SCHWARZ, 1903 (*Lacon*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 379–380

Syntypen, Nord-Queensland.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♀, Paralectotypus, N. Queensland, leg. WEISKE, durch VON HAYEK (Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) 38, 219; 1979) festgelegt.

girardi GIRARD, 1971 (*Propsephus*)
Bull. I. F. A. N. 33 (Sér. A), 599–600, Fig. 42, 44

♂ Holotypus, Afrika, Côte d'Ivoire, Lamto, 20.–30. 3. 1969; 12 Paratypen, vom selben Fundort, 2. 1968–3. 1969; alle leg. GIRARD.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, 9. 3. 1969.

goyasiensis SCHWARZ, 1901 (*Aeolus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 317–318

Syntypen, Brasilien, Prov. Goyas, Jatahy.

DEI: 2 Syntypen, Brasilien, Jatahy, Prov. Goyas.

goyaziensis SCHWARZ, 1906 (*Monocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 116–117

2 ♂♂, 1 ♀, Syntypen, Brasilia, Jatahy Goyaz, im DEI.

gracilentus SCHWARZ, 1902 (*Lacon*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 306

♂♀ Syntypen, Salomo-Inseln, Tulagi, leg. BENNIGSEN.

DEI: Lectotypus, 3 Paralectotypen, Salomons-Insel, Tulagi, durch VON HAYEK (Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) 38, 220; 1979) festgelegt.

gracilipes SCHWARZ, 1902 (*Melanotus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 282–283

♂♂ Syntypen, Assam.

DEI: 1 Syntypus, Assam.

gracilis SCHWARZ, 1901 (*Adiaphorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 22–23

Syntypen, Ceylon, Nalanda, leg. HORN.

DEI: 1 Syntypus, Nalanda.

grandiusculus SCHWARZ, 1906 (*Esthesopus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 147

Syntypen, Brasilien.

DEI: 1 Syntypus, Brasilien.

gratiosus FLEUTIAUX, 1925 (*Agriotes*)
Bull. Soc. ent. France 1925, 278, Fig. 1, 2

♂♀ Syntypen, Tonkin, Lac Thô und Hoa-Binh, leg. DE COOMAN.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

gregarius SCHWARZ, 1900 (*Cardiophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 159

Syntypen, Dar-es-Salaam.

DEI: 1 Syntypus, Dar-es-Salaam.

gregarius SCHWARZ, 1902 (*Glyphonyx*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 334

Syntypen, Sumatra: Liangagas, Soekaranda, Indrapoera; leg. DOHRN & WEYERS.

DEI: 9 Syntypen, Sumatra, Indrapoera, leg. WEYERS.

grisea SCHWARZ, 1900 (*Adelocera*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 98

Holotypus, Buchara, im DEI.

griseofasciatus SCHWARZ, 1902 (*Alaus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 207—208

Syntypen, Borneo, Pontianak.

DEI: 1 Syntypus, Borneo, Pontianak, leg. HOLL.

haemorrhoidalis SCHWARZ, 1899 (*Campylocephus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1899, 66+69—70

♂♀ Syntypen, Usambara, leg. WEISE.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 Paralectotypus, Usambara, leg. WEISE, von GIRARD festgelegt.

hamatus SCHWARZ, 1903 (*Lobotarsus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 360—361

Syntypen, Madagaskar.

DEI: 1 Syntypus, Madagaskar.

hamatus SCHWARZ, 1901 (*Pomachilius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 339

Syntypen, Rio Grande do Sul.

DEI: 1 Syntypus, Rio Gr. d. Sul.

hauseri SCHWARZ, 1900 (*Cardiophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 100

Syntypen; Sefir-kuh; Issyk-kul; Thian-schan; Kuldscha; oberer Ili; leg. HAUSER.

DEI: 1 Syntypus, Sefir-Kuh, Kuschke; 1 Syntypus, Issyk-Kul, Ion Fluss; 1 Syntypus, Thian-S., Mussart.

heydeni SCHWARZ, 1891 (*Agriotes*)
Dtsch. ent. Ztschr. 35, 85; Taf. 1, Fig. 1

♂♂ Syntypen, Kleinasien: Smyrna, Magnesia.

DEI: 1 ♂, Syntypus, Smyrna; 1 Syntypus, Magnesia, in Coll. HEYDEN.

heydeni BUYSSON, 1915 (*Cardiophorus*)
Misc. Ent. 23, 9

♀ Holotypus, Ussuri, Amur, leg. KOLTZE, in Coll. HEYDEN Nr. 35.

heydeni SCHWARZ, 1892 (*Melanotus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 35 (1891), 365

Syntypen, Margellan, in Coll. HEYDEN.

DEI: 1 Syntypus, Margelan, leg. STAUDINGER, in Coll. HEYDEN.

hieroglyphicus SCHWARZ, 1902 (*Esthesopus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 269—270

Syntypen, Peru, Callanga.

DEI: 2 Syntypen, Peru, Callanga.

hilfi REITTER, 1912 (*Athous*)
Wien. ent. Ztg. 31, 317

♂♀ Syntypen, Bulgarien, Tschamkorija, leg. HILF.

DEI: 1 Syntypus, Bulg. Tschamkorija, 25. 6. 1911, leg. HILF.

hipponensis SCHWARZ, 1891 (*Agriotes*)
Dtsch. ent. Ztschr. 35, 111; Taf. 2, Fig. 44

♂♂ Syntypen, Algier.

DEI: 2 Syntypen, Algerien.

hipponensis DESBROCHERS, 1870 (*Cardiophorus*)
Abeille 7, 102—103

Syntypen, Algerien, Bône, in Coll. DESBROCHERS.

DEI: 1 Syntypus, Bône.

hirsutulus SCHWARZ, 1903 (*Crepidomenus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 392

Syntypen, Australien.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 Paralectotypus, Australien, von NEBOISS festgelegt.

holtzi SCHWARZ, 1902 (*Ludius*)

Stett. ent. Ztg. 63, 289

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Bulghar Dag, 3100 m, durch HOLTZ, im DEI.

holtzi SCHWARZ, 1896 (*Pseudagriotes*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 104

Syntypen, Amasia, Gözna, 1000 m, leg. HOLTZ.

DEI: 2 Syntypen, Asia minor, Taurus Cilic., Gözna, Amasia, 1000 m, 1895, leg. HOLTZ.

horni SCHWARZ, 1901 (*Alaus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 19–20

Syntypen, Ceylon, Nalanda, leg. HORN.

DEI: 1 Syntypus, Nalanda.

horni SCHWARZ, 1902 (*Lacus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 155; nom. nov. pro *lineatus* SCHWARZ, 1901,

Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 18–19

Syntypen, Ceylon: Matala, Kandy, Paradna, leg. HORN.

DEI: 3 Syntypen, Matala, 1899, leg. HORN; 2 Syntypen, Kandy, 1899, leg. HORN.

horni SCHWARZ, 1901 (*Melanoxanthus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 26–27

Syntypen, Ceylon, Horrowapotham, leg. HORN.

DEI: 1 Syntypus, Horrowapotham.

humeralis SCHWARZ, 1902 (*Elasmosomus*)

Stett. ent. Ztg. 63, 219–220

Syntypen, Kamerun.

DEI: ♂ Lectotypus, D. West Afrika (KRAATZ), von GIRARD festgelegt.

humeralis SCHWARZ, 1900 (*Melanoxanthus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 150

Syntypen, Usambara.

DEI: 2 Syntypen, Usambara, Nguelo.

ikuthaensis SCHWARZ, 1903 (*Cardiophorus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 372

Syntypen, Afrika or., Ikutha, Luitpoldkette.

DEI: 1 Syntypus, Afr. or., Luitpoldkette; 1 Syntypus, Afr. or., Ikutha.

illinitus SCHWARZ, 1902 (*Crepidomenus*)

Stett. ent. Ztg. 63, 293–295

♂♀ Syntypen, Neu Süd Wales, Richmond.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 Paralectotypus, N. S. W., Richmond, von NEBOISS festgelegt.

immaculatus SCHWARZ, 1902 (*Alaus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 115–116

♂♂ Syntypen, N.-Queensland.

DEI: 1 Syntypus, N. Queensland, leg. WEISKE.

imperialis SCHWARZ, 1901 (*Lycoreus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 302–304

♂♀ Syntypen, Madagascar, Andrahomana.

DEI: 2 Syntypen, Madagascar, Andrahomana, leg. SIKORA.

impressicollis SCHWARZ, 1902 (*Dilobilaris*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 129

Syntypen, Peru, Chanchamayo.

DEI: ♀ Lectotypus, Peru, Chanchamayo, leg. LANGE, durch VON HAYEK (Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) 38, 203; 1979) festgelegt.

impressicollis SCHWARZ, 1899 (*Psephus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1899, 67–71–72

♀♀ Syntypen, Kamerun.

DEI: ♀ Lectotypus, 1 Paralectotypus, Kamerun, Victoria, von GIRARD festgelegt.

impressifrons SCHWARZ, 1909 (*Dorygonus*)

Soc. ent. 24, 118

Syntypen, Madagascar, Mont. d'Ambre.

DEI: 1 Syntypus, Amber-Geb.

impressiventris SCHWARZ, 1900 (*Cardiophorus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 102–103

♂♀ Syntypen, Asia minor.

DEI: ♀ Lectotypus, 1 Paralectotypus, Asia minor, durch VON HAYEK festgelegt.

incertus SCHWARZ, 1901 (*Parapomachilius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 339—340

Syntypen, Brasilia.
DEI: 1 Syntypus, Brasilia.

incognitus SCHWARZ, 1891 (*Agriotes*)
Dtsch. ent. Ztschr. 35, 110; Taf. 2, Fig. 42

♂♂ Syntypen, Spanien, Arragonien.
DEI: 1 ♂, Syntypus, Arragonien.

incompta KRAATZ, 1882 (*Adelocera*)
Dtsch. ent. Ztschr. 26, 319

Syntypen, Samarkand.
DEI: 1 Syntypus, Samarkand, STDGR. 81.

inconditus SCHWARZ, 1908 (*Cardiophorus*)

siehe *mutatus* FLEUTIAUX, 1919.

inconditus SCHWARZ, 1902 (*Cylindroderus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 335—336

Syntypen, Brasilien, Minas Geraes.
DEI: 1 Syntypus, Brasil; 1 Syntypus, Prv. Rio de Janeiro, Grz. m. Minas Geraes, leg. WIENGREEN.

inconditus SCHWARZ, 1902 (*Hemolimerus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 330

Syntypen; Sumatra, Tingi-Tebi; Borneo, Kina Balu.
DEI: 1 Syntypus, Borneo; 1 Syntypus, Borneo, Kina Balu; 1 Syntypus, N. O. Sumatra, leg. SCHULTHEISS.

indicus SCHWARZ, 1902 (*Elater*)
Stett. ent. Ztg. 63, 247—248

Holotypus, Madras, Kodaikanal.
DEI: Holotypus, Kodikanal.

indistinctus SCHWARZ, 1906 (*Aeolus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 122—123

Syntypen, Brasilia, Padamo.
DEI: 1 Syntypus, Padamo.

inermis SCHWARZ, 1900 (*Cardiophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 101—102

Syntypen, Samarkand, Buchara, Taschkent.
DEI: Lectotypus, 2 Paralectotypen, Samarkand, leg. REITTER, durch VON HAYEK festgelegt.

infernus SCHWARZ, 1904 (*Cardiorhinus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 65—66

Syntypen, Brasilien, Espirito Santo.
DEI: 1 Syntypus, Espirito Santo.

inflatus SCHWARZ, 1898 (*Psephus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 135

Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI.
DEI: ♀ Lectotypus, Kamerun, leg. CONRADT, von GIRARD festgelegt.

informis SCHWARZ, 1891 (*Agriotes*)
Dtsch. ent. Ztschr. 35, 93—94; Taf. 1, Fig. 17

♂♂ Syntypen, ohne Fundortangaben.
DEI: 1 ♂, Syntypus, Sartorius, 1876.

informis KRAATZ, 1879 (*Corymbites*)
Berl. ent. Ztschr. 23, 287

Syntypen, Ala-Tau, Songarei.
DEI: 1 Syntypus, Ala Tau, KRAATZ; 2 Syntypen, Songarei.

inornatus SCHWARZ, 1900 (*Heteroderes*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 147—148

Syntypen; Dar-es-Salaam; Tanga; Usambara.
DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♀, Paralectotypus, Dar-es-Salaam; 1 ♀, Paralectotypus, Usambara; 1 ♀, Paralectotypus, Tanga; von GIRARD festgelegt.

inguinalis SCHWARZ, 1908 (*Cardiophorus*)
In: SJÖSTEDT, Kilimandjaro-Meru Expedition 7 Col., 64

♀ Holotypus, Kilimandjaro, Kibonoto, untere Kulturzone, 4. 1906, leg. SJÖSTEDT.
DEI: 1 historisches Exemplar, vielleicht Type, Kilimandjaro, Kibonoto, 1300 m, 5., leg. SJÖSTEDT.

inscriptus SCHWARZ, 1901 (*Cosmesus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 353

Syntypen, Santos, Brasilien, leg. METZ.
DEI: 1 Syntypus, Santos, leg. METZ.

intermedius KRAATZ, 1898 (*Alaus*)

siehe *rotundimaculatus* SCHWARZ.

intermedius SCHWARZ, 1904 (*Cardiorhinus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 63–64

♂♂ Syntypen, Brasilien, St. Catharina.

DEI: 3 Syntypen, Brasilien.

intermedius SCHWARZ, 1902 (*Lacon*)
Stett. ent. Ztg. 63, 199–200

Syntypen; Borneo, Kina Balu; Sumatra.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♀, Paralectotypus, N. Borneo; 1 Paralectotypus, Borneo, Kina Balu, durch VON HAYEK (Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) Suppl. 20, 170; 1973) festgelegt. 2 Syntypen, Borneo, Kina Balu, gehören nach VON HAYEK (l. c.) nicht zu *intermedius*.

intermedius SCHWARZ, 1903 (*Pomachilius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 70–71

Syntypen, Brasilien, St. Catharina.

DEI: 1 Syntypus, St. Catharina.

interruptus SCHWARZ, 1906 (*Aeolus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 120

Syntypen, Brasilia, St. Thomas.

DEI: 1 Syntypus, Brasil, St. Thoma.

interruptus SCHWARZ, 1902 (*Cardiophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 255–256

10 Syntypen, Madagaskar, Plateau de l'Androy, Reg. Ambovombe.

DEI: 3 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

jocosus CANDÉZE, 1881 (*Athous*)
Elaterides nouveaux 3, 90

Syntypen, Amur.

DEI: 1 Syntypus, Amur, I. Askold, in Coll. HEYDEN.

juvenilis SCHWARZ, 1902 (*Heteroderes*)
Stett. ent. Ztg. 63, 244–245

Syntypen, Madagascar.

DEI: 1 Syntypus, Madagascar, leg. SIKORA.

kankau MIWA, 1931 (*Glyphonyx*)
Wien. ent. Ztg. 47 (1930), 206–207

Holotypus, Formosa, Kankau, 7. 1912, leg. SAUTER; Paratypen, Koshun, 7. 1926, leg. MIWA.

DEI: Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung.

koenigi SCHWARZ, 1897 (*Athous*)
Wien. ent. Ztg. 16, 132–133

♂♂ Syntypen, Russisch Armenien, Kasikoporan, leg. KOENIG.

DEI: 2 Syntypen, Russisch Kurdist., Kasikoporan, leg. KÖNIG.

kolbei SCHWARZ, 1899 (*Alaus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1899, 73

Syntypen, Usambara, Nguelo.

DEI: 2 Syntypen, Usambara, Nguelo.

kraatz SCHWARZ, 1891 (*Agriotes*)
Dtsch. ent. Ztschr. 35, 85; Taf. 1, Fig. 2

♂♂ Syntypen, Klein Asien.

DEI: 1 ♂, Syntypus, Külek, ex Coll. KRAATZ; 1 Syntypus, Asia minor, Gülek, Taur. Cilic., ex Coll. SCHWARZ.

kraatz SCHWARZ, 1892 (*Melanotus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 36, 155

♂♂ Syntypen, Griechenland, in Coll. KRAATZ.

DEI: 1 Syntypus, Graec.

krugi SCHWARZ, 1906 (*Aeolus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 125–126

2 Syntypen, Brasilien, Apiahy, leg. KRUG, im DEI.

krugi SCHWARZ, 1904 (*Pomachilius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 78

Holotypus, Brasilien, Apiahy, leg. KRUG.

DEI: Holotypus, D. KRUG.

lacer SCHWARZ, 1900 (*Megapenthes*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 91–92

Syntypen, N. O. Sumatra, leg. SCHULTHEISS.

DEI: 1 Syntypus, N. O. Sumatra, Tebing-tinggi, leg. SCHULTHEISS.

lacerosus SCHWARZ, 1906 (*Monocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 113—114

♂♀ Syntypen, Peru, Callanga.
DEI: 3 Syntypen, Peru, Callanga.

laesus SCHWARZ, 1902 (*Agonischius*)
Stett. ent. Ztg. 63, 304—305

Syntypen, Borneo, Kina Balu.
DEI: 1 Syntypus, Kina Balu.

lamellicornis SCHWARZ, 1902 (*Achrestus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 140—141

Syntypen, Peru, Marcapata.
DEI: 1 Syntypus, Peru, Marcapata.

lamottei GIRARD, 1971 (*Propsephus*)
Bull. I. F. A. N. 33 (Sér. A), 610—612, Fig. 53, 54

♂ Holotypus, Afrika, Côte d'Ivoire, Lamto, 10.—25. 4. 1969; 5 Paratypen, vom selben Fundort, 10.—29. 2. 1968; alle leg. GIRARD.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

langei SCHWARZ, 1902 (*Semiotus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 132—133

Holotypus, Peru, Chanchamayo, leg. LANGE, im DEI.

langsдорffi STIERLIN, 1880 (*Athous*)
Mitt. Schweiz. ent. Ges. 5, 590—591

♂♀ Syntypen, Riviera, leg. CLAIR.
DEI: 4 Syntypen, Riviera.

lateralis SCHWARZ, 1902 (*Diploconus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 273—274

Syntypen, Celebes.
DEI: 1 Syntypus, Celebes.

lateralis SCHWARZ, 1903 (*Lacon*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 381—382

Syntypen, Australien, leg. PLASON.
DEI: 4 Syntypen, Australien.

lateralis SCHWARZ, 1906 (*Monocrepidius*)

siehe *liturus* SCHENKLING, 1925

lateralis SCHWARZ, 1906 (*Parapomachilius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 141—142

Syntypen, Brasilien, St. Catharina.
DEI: 1 Syntypus, Brasilien, St. Catharina.

lateralis SCHWARZ, 1905 (*Penia*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 261—262

Syntypen, Himalaya.
DEI: 1 ♂, Syntypus, Himalaya.

laterarius SCHWARZ, 1902 (*Monocrepidius*)
Stett. ent. Ztg. 63, 231—232

♂♀ Syntypen, Ecuador, Baños.
DEI: 4 Syntypen, Ecuador, Baños, leg. HAENSCH.

laterovittatus SCHWARZ, 1901 (*Agonischius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 37—38

Syntypen, Ceylon, Kandy, leg. HORN.
DEI: 1 Syntypus, Kandy.

laterus SCHWARZ, 1904 (*Ischiodontus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 55—56

Syntypen, Peru, Vilcanota.
DEI: 1 Syntypus, Peru, Vilcanota.

laticollis SCHWARZ, 1902 (*Glyphochilus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 320—321

Holotypus, Australia merid., in Coll. SCHWARZ, im DEI.

laticollis SCHWARZ, 1899 (*Psephus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1899, 66+70

♀♀ Syntypen, Kamerun.
DEI: ♂ Lectotypus, Lolodorf; 1 ♀, Paralectotypus, Kamerun; von GIRARD festgelegt.

laticornis REITTER, 1900 (*Pleonomus*)
Ent. Nachr. 26, 88–89

♂♀ Syntypen, Buchara, leg. STAUDINGER und BANG-HAAS.
DEI: 1 ♂, Syntypus, Buchara, Karatak, leg. STAUDINGER, in Coll. HEYDEN.

laticornis SCHWARZ, 1898 (*Psephus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 137–138

Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT.
DEI: ♀ Lectotypus, Kamerun, von GIRARD festgelegt.

latifasciatus SCHWARZ, 1906 (*Aeolus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 124

Syntypen, Brasilien, Jatahy-Goyaz.
DEI: 5 Syntypen, Jatahy (Goyaz).

latiusculus SCHWARZ, 1902 (*Glyphonyx*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 344–345

Syntypen, Sumatra.
DEI: 1 Syntypus, Sumatra.

latiusculus SCHWARZ, 1908 (*Psephus*)
In: SJÖSTEDT, Kilimandjaro-Meru Expedition 7 Col., 60–61

Syntypus, Meru-Niederung, Ngare na nyuki, 11. 1905, leg. SJÖSTEDT; 5 Syntypen, Usambara, in Coll. SCHWARZ.
DEI: 1 ♂, Paralectotypus, D. Ost Afrika, Ukami Berge, von GIRARD festgelegt.

latus SCHWARZ, 1900 (*Anchastus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 150–151

Syntypen, Dar-es-Salaam.
DEI: ♀ Lectotypus, Dar-es-Salaam, von GIRARD festgelegt.

latus SCHWARZ, 1906 (*Monocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 357

Holotypus, Queensland, im DEI.

lenticulatus SCHWARZ, 1906 (*Monocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 356–357

Zahlreiche Syntypen, Queensland.
DEI: 4 Syntypen, Queensland.

leonhardi REITTER, 1905 (*Athous*)
Best. Tab. europ. Col. 56, 81

♂♀ Syntypen; Herzegowina, Vran-Planina; Matorac und Matorog (vielleicht identisch), im Mus. Sarajevo.
DEI: 1 Syntypus, Herzegovina, Vran Planina, 6. 8. 1902, Coll. LEONHARD.

lepidulus SCHWARZ, 1906 (*Aeolus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 121–122

Syntypen, Brasilia?
DEI: 1 Syntypus, Patria?

lepontinus SCHWARZ, 1900 (*Athous*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 106–107

Holotypus, Piemont, lepontische Alpen, Val di Cervo.
DEI: Holotypus, V. di Cervo Str. 94.

limbatus SCHWARZ, 1909 (*Campylopersephus*)
Soc. ent. 24, 117–118

♂♀ Syntypen, Kamerun, Barombi.
DEI: ♀ Lectotypus, 1 Paralectotypus, Kamerun, Barombi, leg. CONRADT, von GIRARD festgelegt.

limbatus SCHWARZ, 1902 (*Cylindroderus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 127–128

Holotypus, Peru, Chanchamayo, leg. LANGE, im DEI.

linearis SCHWARZ, 1902 (*Elasmoscenus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 219

♂ Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI.

linearis SCHWARZ, 1903 (*Metablax*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 395

Syntypen, Australien.
DEI: ♂ Lectotypus, Austr., durch NEBOISS festgelegt.

lineatocollis SCHWARZ, 1898 (*Ludius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 410–411

♀♀ Syntypen, West-Afrika, Congo portug.
DEI: ♀ Lectotypus, 1 ♀, Paralectotypus, Congo portug., leg. DONCKIER, von GIRARD festgelegt.

lineatocollis SCHWARZ, 1906 (*Pyrophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 153

♂♀ Syntypen, Brasilien?

DEI: 3 Syntypen, ohne Fundortangaben.

lineatus SCHWARZ, 1902 (*Dicteniophorus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 308—309

♂ Holotypus (teste NEBOISS), Australien, N. Galles süd., im DEI.

lineatus SCHWARZ, 1901 (*Lacon*)

siehe *horni* SCHWARZ, 1902

lineatus SCHWARZ, 1903 (*Megapenthes*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 367—368

Syntypen, D. O.-Afrika.

DEI: 1 Syntypus, D. O.-Afrika.

lineolus SCHWARZ, 1901 (*Heteroderes*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 359

Syntypen, Kinschassa.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 Paralectotypus, Kinchassa, Waelbroeck, 24. 11. 1896, von GIRARD festgelegt.

lituratus SCHWARZ, 1901 (*Monocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 315

Syntypen, Peru, Callanga.

DEI: 1 Syntypus, Peru, Callanga.

liturus SCHENKLING, 1925 (*Conoderus*)
Coleopterorum Catalogus Pars 80, 115; nom. nov. pro *Monocrepidius lateralis* SCHWARZ, 1906,
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 115—116

Syntypen, Brasilia, Jatahy-Goyaz.

DEI: 1 Syntypus, Jatahy (Goyaz).

livida FLEUTIAUX, 1907 (*Medonia*)
Rev. Chil. Hist. Nat. 11, 185

Syntypen, Chile, Wald der warmen Quellen bei Chillan, leg. GERMAIN, im Mus. Santiago.

DEI: 1 Syntypus, Chili, GERMAIN.

lolodorfensis HAYEK, 1973 (*Agrypnus*)
Bull. Brit. Mus. nat. Hist. (Ent.) Suppl. 20, 177; nom. nov. pro *decoratus* SCHWARZ, 1898,
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 131

Syntypen, Kamerun, Lolodorf, leg. CONRADT.

DEI: ♀ Lectotypus, Kamerun, durch VON HAYEK (Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) Suppl. 20, 177; 1973) festgelegt.

longicollis SCHWARZ, 1906 (*Aeolus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 134—135

♂♀ Syntypen, Brasilien, Jatahy-Goyaz.

DEI: 3 Syntypen, Jatahy (Goyaz).

longicollis SCHWARZ, 1902 (*Eschatrozus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 325

Syntypen, Patria?, wahrscheinlich von den Molukken oder Neu Guinea.

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundortangaben.

longicollis SCHWARZ, 1905 (*Hemicleus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 277

Syntypen, Somali.

DEI: 1 Syntypus, Galla, leg. v. ERLANGER.

longicollis SCHWARZ, 1902 (*Horistonotus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 147—148

Syntypen, Peru, Marcapata.

DEI: 4 Syntypen, Peru, Marcapata.

longicornis SCHWARZ, 1901 (*Aeolus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 318—319

Syntypen, Surinam.

DEI: 2 Syntypen, Surinam.

longicornis SCHWARZ, 1906 (*Pomachilius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 137—138

Syntypen, Brasilien, São Paulo.

DEI: 1 Syntypus, S. Paulo.

longipennis SCHWARZ, 1900 (*Alaus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 145—146

Syntypen, Usambara.

DEI: 1 Syntypus, Usambara.

longipennis SCHWARZ, 1902 (*Cardiotarsus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 261—262

Syntypen, Himalaya.

DEI: 1 Syntypus, Himalaya.

longipennis SCHWARZ, 1898 (*Lacon*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 130

2 ♂♂, Syntypen, Madagascar.

DEI: 2 Syntypen, Madagascar.

longipennis SCHWARZ, 1906 (*Pyrophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 154

♀♀ Syntypen, Cuba.

DEI: 1 Syntypus, Cuba, Busticua.

longipennis SCHWARZ, 1902 (*Silesis*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 347—348

Holotypus, Darjeeling.

DEI: Holotypus, Darjeeling, 5., leg. FRUHSTORFER.

luteipennis SCHWARZ, 1902 (*Silesis*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 348—349

Syntypen, Pondicherry.

DEI: 1 Syntypus, Pondichery.

luteipes SCHWARZ, 1901 (*Cosmesus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 349

Syntypen, Brasilien.

DEI: 1 Syntypus, Brazil.

luteus SCHWARZ, 1906 (*Horistonotus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 145—146

Syntypen, Mendoza.

DEI: 5 Syntypen, Mendoza.

macer SCHWARZ, 1905 (*Nomopleus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 292

Syntypen, D. O. Afrika.

DEI: ♂ Lectotypus, D. Ost Afrika, von GIRARD festgelegt.

maculatus SCHWARZ, 1905 (*Lobotarsus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 280—281

Syntypen, Madagaskar, Diego-Suarez.

DEI: 2 Syntypen, Diego-Suarez.

maculatus SCHWARZ, 1909 (*Phedomenus*)
Soc. ent. 24, 122

Syntypen, Madagascar, Diego-Suarez.

DEI: 1 Syntypus, Diego Suarez.

maculatus SCHWARZ, 1908 (*Psephus*)
In: SJÖSTEDT, Kilimandjaro-Meru Expedition 7 Col., 62

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Kilimandjaro, Kibonoto, Regenwald, 2000—2500 m, 10. 1905, leg. SJÖSTEDT.

DEI: 1 ♂, Paralectotypus, Kilimandjaro, Kibonoto, 2000—3000 m, 11. 12. 1905—6, leg. SJÖSTEDT, von GIRARD festgelegt.

maculicollis SCHWARZ, 1906 (*Monocrepidius*)
In: WYTSMAN, Gen. Ins. 46, 96; nom. nov. pro *vitticollis* SCHWARZ, 1903,
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 64

Holotypus, Brasilien, im DEI.

maculifrons SCHWARZ, 1901 (*Pomachilius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 331—332

Syntypen, Peru, Callanga.

DEI: 1 Syntypus, Peru, Callanga.

maculipennis SCHWARZ, 1901 (*Cosmesus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 350—351

Syntypen, Espirito Santo.

DEI: 3 Syntypen, Espirito Santo.

maculipennis SCHWARZ, 1903 (*Lobotarsus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 361—362

Syntypen, Madagaskar.

DEI: 2 Syntypen, Madagaskar.

maculipennis SCHWARZ, 1902 (*Ludius*)
Stett. ent. Ztg. 63, 289—291

♂♀ Syntypen; China, Kwangtung; Tonkin.

DEI: 3 Syntypen, Kwangtung.

maculipennis SCHWARZ, 1898 (*Lycoreus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 134–135

Syntypen, Madagascar.

DEI: 1 Syntypus, Madagascar.

malcheri HELLER, 1935 (*Dioxypterus*)
Arb. morph. tax. Ent. 2, 265, Fig. 1

♂♀ Syntypen, Insel Santa Cruz, Vanikoro, im Mus. Dresden und im DEI

DEI: 1 Syntypus, Vanikora, leg. MALCHER.

margelanicus HEYDEN, 1881 (*Cardiophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 25, 325

Holotypus, Margelan.

DEI: Holotypus, Turkestan, leg. STAUDINGER, in Coll. HEYDEN.

marginatis (recte *marginalis*) SCHWARZ, 1901 (*Pomachilius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 332–333

Syntypen, Peru, Callanga.

DEI: 4 Syntypen, Peru, Callanga; 1 Syntypus, Peru.

marginatus SCHWARZ, 1907 (*Crepidomenus*)
Stett. ent. Ztg. 68, 83–85

Syntypen, Australien, Victoria.

DEI: Lectotypus, Victoria, von NEBOISS festgelegt.

marginicollis SCHWARZ, 1906 (*Aeroniopus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 369

Syntypen, Australien.

DEI: Lectotypus, ohne Fundortangaben, von NEBOISS festgelegt.

marginicollis SCHWARZ, 1902 (*Anchastus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 252–253

Syntypen, Guayana.

DEI: 1 Syntypus, Guiana.

marginicollis SCHWARZ, 1903 (*Pomachilius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 72

Syntypen, Ecuador, Papallacta.

DEI: 1 Syntypus, Ecuador, Papallacta, leg. HAENSCH.

marginipennis SCHWARZ, 1903 (*Lacon*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 380–381

Syntypen, Süd-Australien.

DEI: 1 Syntypus, Victoria.

marginipennis SCHWARZ, 1902 (*Monocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 321

Syntypen, Key-Insel.

DEI: 1 Syntypus, Key-Ins.

marmorata SCHWARZ, 1905 (*Penia*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 262

Syntypen, Assam.

DEI: 1 Syntypus, Assam.

medianus SCHWARZ, 1906 (*Aeolus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 120–121

Syntypen, Brasilia, Sao Paulo.

DEI: 1 Syntypus, S. Paulo.

mediofasciatus SCHWARZ, 1903 (*Aeolus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 67–68

Syntypen, Mexico, Durango.

DEI: 1 Syntypus, Mexico, Durango.

mediofasciatus SCHWARZ, 1906 (*Cosmesus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 152

Syntypen, São Paulo.

DEI: 2 Syntypen, S. Paulo.

melanocephalus SCHWARZ, 1902 (*Semiotus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 131

♀? Holotypus, Peru, Chanchamayo.

DEI: Der Holotypus ist wahrscheinlich verloren gegangen. Es befinden sich aber 4 Ex. aus Peru und Ecuador aus der Coll. SCHWARZ in unserer Sammlung.

melanoxanthoides SCHWARZ, 1902 (*Agonischius*)
Stett. ent. Ztg. 63, 300–301

2 ♂♂, Syntypen, Sumatra, Indrapoera, leg. WEYERS.

DEI: 1 Syntypus, Sumatra, Indrapoera, leg. WEYERS.

melanurus FLEUTIAUX, 1925 (*Agriotes*)
Bull. Soc. ent. France 1925, 280, Fig. 3

Zahlreiche Syntypen, Lac Thô, Hoa-Binh, leg. DE COOMAN.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

melanurus SCHWARZ, 1902 (*Anoplisthius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 134

Holotypus, Peru, Chanchamayo, leg. LANGE, im DEI.

melanurus SCHWARZ, 1896 (*Aphanobius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 102

Syntypen, Himalaya.
DEI: 1 Syntypus, Himalaya.

melanurus FLEUTIAUX, 1907 (*Deromecus*)
Rev. Chil. Hist. Nat. 11, 193

Syntypen, Chile, Wald der warmen Quellen, leg. GERMAIN, im Mus. Santiago.
DEI: 1 Syntypus, Chili, leg. GERMAIN.

melanurus SCHWARZ, 1901 (*Pomachilioides*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 346—347

Syntypen, Peru.
DEI: 1 Syntypus, Peru.

mellitulus COSTA, 1972 (*Pyrophorus*)
Papeis Arulzos Zool. S. Paulo 25, 200, 211—213, Fig. 1, 1a, 17, 24

♂ Holotypus, Haiti, Diquini, leg. MANN, im Mus. Cambridge; zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.
DEI: 3 Paratypen, Haiti; 4 Paratypen, Cuba, Holguin; 1 Paratypus, Cuba, KLGHF; 3 Paratypen, S. Domingo; 1 Paratypus, Brasilien, Germania; 2 Paratypen, Brasilien.

mesosternatis SCHWARZ, 1902 (*Psephus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 222

♂♀ Syntypen, Njam-Njam.
DEI: ♂ Lectotypus, Njam-Njam, von GIRARD festgelegt.

miliaris SCHWARZ, 1903 (*Psephus*)
Arkiv Zoologi 1, 50—51

2 Syntypen, Fernando Po, Sa. Isabel, 1 Ex., leg. SJÖSTEDT, 1 Ex., durch MOSER.
DEI: ♂ Lectotypus, Fernando Po, Sa. Isabel, 17. 3. 1900, leg. CONRADT, von GIRARD festgelegt.

minor SCHWARZ, 1904 (*Grammophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 72

♂♀ Syntypen, Chile.
DEI: 1 Syntypus, Chile.

minor SCHWARZ, 1906 (*Heterocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 100

Syntypen, Brasilia, Rio Grande do Sul.
DEI: 1 Syntypus, Rio Gr. d. Sul.

minor SCHWARZ, 1902 (*Sephilus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 319

1 Syntypus, Sumatra, Indrapoera, im Mus. Brüssel-Weyers; 1 Syntypus, Banguay, in Coll. SCHWARZ.
DEI: 1 Syntypus, Banguay, Ins. nördl. Borneo, leg. KEDENBURG.

minusculus SCHWARZ, 1904 (*Cosmesus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 80

Syntypen, Chile.
DEI: 1 Syntypus, Chile.

minusculus SCHWARZ, 1900 (*Monocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 90—91

Syntypen, N. O. Sumatra, leg. SCHULTHEISS.
DEI: 1 Syntypus, N. O. Sumatra.

minusculus SCHWARZ, 1908 (*Psephus*)
In: SJÖSTEDT, Kilimandjaro-Meru Expedition 7 Col., 61

15 Syntypen, Kilimandjaro, Kibonoto, Obstgartensteppe-Kulturzone, 9.—11. 1905, leg. SJÖSTEDT.
DEI: 2 Paralectotypen, Kilimandjaro, Kibonoto, 1300—1900 m, 15. 11. 1905—6, leg. SJÖSTEDT, von GIRARD festgelegt.

minutissimus SCHWARZ, 1898 (*Cardiophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 150—151

Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT.
DEI: 1 ♀, Syntypus, Kamerun.

minutus SCHWARZ, 1902 (*Anchastomorphus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 254—255

Syntypen, Mexico, Motzerongo.
DEI: 2 Syntypen, Motzerongo.

minutus SCHWARZ, 1903 (*Hapatesus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 395—396

Syntypen, Australien.

DEI: 1 Syntypus, Australien; 1 Syntypus, S. Australien.

minutus SCHWARZ, 1903 (*Hemicleus*)

siehe *Adelocera tanganus* HAYEK, 1973

minutus SCHWARZ, 1898 (*Lobotarsus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 133—134

Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI.

DEI: ♂ Lectotypus, Kamerun, von GIRARD festgelegt.

minutus SCHWARZ, 1902 (*Melanotus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 336—337

♂♀ Syntypen, Sumatra, Soekaranda.

DEI: 2 Syntypen, Sumatra, Soekaranda, leg. DOHRN; 1 Syntypus, Soekaranda, 1. 1894, leg. DOHRN.

minutus SCHWARZ, 1903 (*Monocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 388—389

Syntypen, Australien.

DEI: 2 Syntypen, Austral.

minutus SCHWARZ, 1908 (*Olophoeus*)
Soc. ent. 23, 110

Syntypen, Kamerun.

DEI: ♂ Lectotypus, Kamerun, von GIRARD festgelegt. 1 ♀, Syntypus, Kamerun, nach GIRARD „*minutus* ??“.

miser SCHWARZ, 1905 (*Lobotarsus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 281

Syntypen, Gabun.

DEI: 1 Syntypus, Gabon.

modestus SCHWARZ, 1906 (*Heterocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 99—100

Syntypen, Brasilia.

DEI: 2 Syntypen, Rio Gr. d. Sul.

modestus SCHWARZ, 1899 (*Psephus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1899, 66+70—71

♂♂ Syntypen, Kamerun.

DEI: ♂ Lectotypus, Kamerun; 1 Paralectotypus, Kamerun, Barombi, leg. CONRADT; von GIRARD festgelegt.

monilicornis SCHWARZ, 1897 (*Athous*)
Wien. ent. Ztg. 16, 134—135

Syntypen, Balkan, Bulgarien.

DEI: 5 Syntypen, Balkan.

monticola SCHWARZ, 1901 (*Melanoxanthus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 28

Syntypen, Ceylon, Bandarawella, 4000 Fuß, leg. HORN.

DEI: 1 Syntypus, Bandarawella.

moseri SCHWARZ, 1903 (*Agrypnus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 357

2 Syntypen, Deutsch-Ost-Afrika.

DEI: ♂ Lectotypus, D. Ost-Afrika, Lukuled?, von GIRARD festgelegt.

moseri SCHWARZ, 1902 (*Paracardiophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 125

♀♀ Syntypen, Australia mer., Victoria.

DEI: 1 Syntypus, Australia, Victoria.

moseri SCHWARZ, 1902 (*Physorrhinus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 146

Holotypus, Peru, Rio Toro, im DEI.

multimaculatus SCHWARZ, 1898 (*Heteroderes*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 189—190

Syntypen, Ost-Afrika, Usambara.

DEI: 1 Syntypus, Usambara; 2 Syntypen, Usambara, Nguela.

multimaculatus SCHWARZ, 1904 (*Pomachilius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 75—76

♂♀ Syntypen, Sao Paulo.

DEI: 4 Syntypen, S. Paulo.

murinus REITTER, 1895 (*Hypnoidus*)
Ent. Nachr. 21, 91

Syntypen; Lenkoran am Caspischen Meer; Araxesthal bei Ordubad.
DEI: 1 Syntypus, Lenkoran, leg. LEDER, in Coll. HEYDEN.

mutabilis SCHWARZ, 1898 (*Agonischius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 153–154

Syntypen, Assam.
DEI: 6 Syntypen, Assam.

mutabilis SCHWARZ, 1904 (*Anoplischius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 51–52

2 ♂♂, 3 ♀♀, Syntypen, Süd-Amerika.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundortangaben.

mutatus FLEUTIAUX, 1919 (*Cardiophorus*)
Voy. ALLUAUD & JEANNEL Afrique Orientale Col. 13, 96; nom. nov. pro *inconditus* SCHWARZ, 1908, In: SJÖSTEDT, Kilimandjaro-Meru Expedition 7 Col., 63–64

8 ♂♂, Syntypen, Meru, Ngare na nyuki, 11. 1905, 1. 1906, leg. SJÖSTEDT.
DEI: Meru Niederung, Ngare na nyuki, leg. SJÖSTEDT, 1 Syntypus, 29. 11. 1905, 2 Syntypen, 1. 1906.

mutatus FLEUTIAUX, 1919 (*Psephus*)
Voy. ALLUAUD & JEANNEL Afrique Orientale Col. 13, 47; nom. nov. pro *rubripennis* SCHWARZ, 1908. In: SJÖSTEDT, Kilimandjaro-Meru Expedition 7 Col., 59–60

Syntypen, Kilimandjaro, Kibonoto, Obstgartensteppe, 22. 3. 1906, leg. SJÖSTEDT.
DEI: 1 Paralectotypus, Kilimandj., Kibonoto, Kulturz., 1. 3., leg. SJÖSTEDT, von GIRARD festgelegt.

natalensis SCHWARZ, 1907 (*Beliophorus*)
In: WYTSMAN, Gen. Ins. 46, 247 nota; Taf. 6, Fig. 3

Syntypen, Natal.
DEI: ♀ Lectotypus, 1 ♀, Paralectotypus, Natal, von GIRARD festgelegt.

nebulosus SCHWARZ, 1905 (*Lacon*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 278

Syntypen, Madagaskar, Cap d'Ambre.
DEI: 1 Syntypus, Madagascar, Cap d'Ambre, ex Coll. F. SCHNEIDER.

niger SCHWARZ, 1897 (*Elathous*)
Wien. ent. Ztg. 16, 130–131

Syntypen, Griechenland, Parnass.
DEI: 1 Syntypus, Parnass.

niger SCHWARZ, 1901 (*Deromecus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 329–330

Syntypen, Süd-Chile, Osorno.
DEI: 1 Syntypus, Süd-Chile, Osorno.

niger SCHWARZ, 1905 (*Lacon*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 258–259

Syntypen, Darjeeling.
DEI: ♂ Lectotypus, 3 Paralectotypen, Darjeeling, durch VON HAYEK (Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) Suppl. 20, 190; 1973) festgelegt.

niger SCHWARZ, 1902 (*Melanoxanthus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 324–325

Syntypen, Sumatra, Indrapoera, leg. WEYERS, im Mus. Brüssel.
DEI: 2 Syntypen, Sumatra, Indrapoera, leg. WEYERS.

niger SCHWARZ, 1900 (*Melanthoides*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 146

Syntypen, Deutsch-Ostafrika.
DEI: 4 Syntypen, D. O. Afrika.

niger SCHWARZ, 1905 (*Odontonychus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 281–282

Syntypen, Kamerun, Lolodorf.
DEI: 1 Syntypus, Lolodorf.

niger SCHWARZ, 1902 (*Pericus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 306–307

Syntypen, Rangun.
DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♂, Paralectotypus, Rangoon, durch VON HAYEK (Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) Suppl. 20, 41; 1973) festgelegt.

niger SCHWARZ, 1898 (*Phedomenus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 143–144

Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT.
DEI: 1 Syntypus, Kamerun.

niger SCHWARZ, 1902 (*Spheniscosomus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 276—277

♀♀ Syntypen, Java.

DEI: 2 Syntypen, Java.

nigerrimus SCHWARZ, 1901 (*Atractosomus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 312—313

Syntypen, Mexico, Colonia.

DEI: 1 Syntypus, Mexico, Colonia; 1 Syntypus, Colonia 16.

nigerrimus SCHWARZ, 1902 (*Cosmesus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 297—298

♂♀ Syntypen, Ecuador, Santa Inéz und Baños.

DEI: 1 Syntypus, Ecuador, Santa Inéz, leg. HAENSCH; 1 Syntypus, Ecuador, Baños, leg. HAENSCH.

nigra SCHWARZ, 1905 (*Penia*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 263

Syntypen, Darjeeling.

DEI: 1 Syntypus, Darjeeling.

nigriceps SCHWARZ, 1906 (*Aeolus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 130—131

Syntypen, Bolivien, La Paz.

DEI: 1 Syntypus, Bolivien, La Paz.

nigriceps SCHWARZ, 1900 (*Diploconus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 95—96

Syntypen, N. O. Sumatra, leg. SCHULTHEISS.

DEI: 1 Syntypus, Sumatra; 2 Syntypen, N. O. Sumatra.

nigriceps SCHWARZ, 1902 (*Monocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 142—143

Syntypen, Brasilien, St. Catharina.

DEI: 1 Syntypus, St. Catharina.

nigricollis SCHWARZ, 1901 (*Cremnostethus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 197—198

♀ Holotypus, Assam, im DEI.

nigricollis SCHWARZ, 1902 (*Horistonotus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 265—266

Syntypen, Peru, Callanga.

DEI: 3 Syntypen, Peru, Callanga.

nigricollis SCHWARZ, 1909 (*Psephus*)
Soc. ent. 24, 109—110

Syntypen, Kamerun, Vallée de la N'Goko.

DEI: 3 Lectotypus, Cameroun, Vallée de la N'Goko, 1. 1900 (Jobit), von GIRARD festgelegt.

nigricornis SCHWARZ, 1903 (*Monocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 384—385

Syntypen, Australien.

DEI: 1 Syntypus, Austr.

nigricornis SCHWARZ, 1902 (*Sphaenelater*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 365—366

Holotypus, Neu Seeland, im DEI.

nigrifrons SCHWARZ, 1902 (*Diploconus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 272—273

Holotypus, Insel Gardener bei Neu-Mecklenburg, im DEI.

nigrifrons SCHWARZ, 1902 (*Heteroderes*)
Stett. ent. Ztg. 63, 246—247

Syntypen, Madagascar.

DEI: 4 Syntypen, Madagascar, leg. SIKORA.

nigrifrons SCHWARZ, 1907 (*Monocrepidius*)
Stett. ent. Ztg. 68, 75—76

Syntypen, Australien, Victoria occ., 1 Ex., durch PLASON, mehrere durch ROLLE.

DEI: 1 Syntypus, Victoria occ.; 2 Syntypen, Austr. occ.

nigrifrons SCHWARZ, 1909 (*Rhinopsephus*)
Soc. ent. 24, 118

Syntypen, Central-Afrika.

DEI: Lectotypus, Central-Afrika, von GIRARD festgelegt.

nigripennis SCHWARZ, 1906 (*Asaphoides*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 366—367

♂♀ Syntypen, N. S. Wales.
DEI: ♀ Lectotypus, 4 Paralectotypen, N. S. W., von NEBOISS festgelegt.

nigripennis SCHWARZ, 1901 (*Ctenoplos*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 356

Syntypen, N. Borneo.
DEI: 2 Syntypen, Borneo.

nigritarsis SCHWARZ, 1902 (*Ludius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 331—332

Syntypen, Java, Preanger.
DEI: 1 Syntypus, Java, Preanger, 4—6000 Fuß, leg. WARBURG.

nigriventris SCHWARZ, 1906 (*Ischiodontus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 105—106

Syntypen, Bolivia, La Paz.
DEI: 1 Syntypus, Bolivia, La-Paz.

nigrofasciatus SCHWARZ, 1902 (*Acolus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 233—234

Syntypen, Surinam.
DEI: 2 Syntypen, Surinam.

nigrofasciatus SCHWARZ, 1900 (*Heteroderes*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 146—147

Syntypen, Dar-es-Salaam.
DEI: 1 Syntypus, Dar-es-Salaam.

nigrolateralis SCHWARZ, 1901 (*Melanozanthus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 324—325

♂♀ Syntypen, N. Borneo.
DEI: 1 Syntypus, Borneo; 9 Syntypen, Kina-Balu.

nigrolaterus SCHWARZ, 1904 (*Anoplischius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 55

Syntypen, Venezuela.
DEI: 2 Syntypen, Venezuela.

nigrolaterus SCHWARZ, 1901 (*Metriaulacus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 198—199

Syntypen, Borneo, Kina-Balu.
DEI: 1 Syntypus, Borneo.

nigrolaterus SCHWARZ, 1903 (*Monocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 385—386

Syntypen, Australien.
DEI: 1 Syntypus, Austr.

nigrolimbatus SCHWARZ, 1898 (*Psephus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 140—141

Syntypen, Dar-es-Salaam.
DEI: ♀ Lectotypus, Dar-es-Salaam, von GIRARD festgelegt.

nigrolineatus SCHWARZ, 1901 (*Semiotus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 306

2 Syntypen, Brasilien, Jatahy, Prov. Goyas.
DEI: 1 Syntypus, Brasilien, Prov. Goyas, Jatahy, 9.—11. 1897; 1 Syntypus, Jatahy (Goyaz).

nigromaculatus SCHWARZ, 1905 (*Alaus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 285—286

Syntypen, Togo, Congo Franç., Benito.
DEI: 1 Syntypus, Togo; 1 ♀, Syntypus, Congo Franç., Benito.

nigromarginatus SCHWARZ, 1899 (*Psephus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1899, 66+68—69

♂♂ Syntypen, Usambara, leg. WEISE.
DEI: ♂ Lectotypus, Usambara, leg. WEISE, von GIRARD festgelegt.

nigropilosus SCHWARZ, 1902 (*Ludius*)
Stett. ent. Ztg. 63, 288—289

♂♂ Syntypen, Caucasus.
DEI: 1 Syntypus, Caucasus.

nigrovittatus SCHWARZ, 1902 (*Ischiodontus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 137

Syntypen, Peru, Callanga.
DEI: 1 Syntypus, Peru, Callanga.

nitidicollis SCHWARZ, 1901 (*Diploconus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 341—342

Holotypus, Ost-Celebes, Tombugu.

DEI: Holotypus, Ost-Celebes, Tombugu, 1885, leg. KÜHN.

nitidicollis SCHWARZ, 1903 (*Monocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 387—388

Syntypen; Neu-Süd-Wales; Victoria, Melbourne.

DEI: 1 ♂, Syntypus, New-South-Wales, leg. SCHRADER; 2 Syntypen, N. S. Wales; 3 Syntypen, Australia, Victoria; 1 ♀, Syntypus, Melb.

nitidipennis SCHWARZ, 1901 (*Ctenoplus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 355

Syntypen, Borneo, Kina Balu.

DEI: 1 Syntypus, Kina Balu.

nitidissimus SCHWARZ, 1905 (*Cardiotarsus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 290—291

Syntypen, Madagaskar, Diego Suarez.

DEI: 2 Syntypen, Diego Suarez.

nitidus SCHWARZ, 1902 (*Diploconus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 274—275

Syntypen; Nusa; Nordspitze von Neu Mecklenburg; Neu Pommern.

DEI: 2 Syntypen, Insel Nusa; 1 Syntypus, Neu Pommern, Kinigunang, leg. RIBBE; 1 Syntypus, Herbertshöhe.

oberndorferi SCHWARZ, 1903 (*Aeolus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 66—67

Holotypus, Argentinien, im DEI.

oberndorferi SCHWARZ, 1903 (*Elathous*)
Wien. ent. Ztg. 22, 207

♀♀ Syntypen, N. Amerika, N.Y., Buffalo.

DEI: ♀ Lectotypus, N.Y., Buffalo, von BECKER (Can. Ent. 43, 166—167; 1961) festgelegt.

oberndorferi SCHWARZ, 1902 (*Pericus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 202—203

Syntypen, Madras.

DEI: ♂ Lectotypus, Madras, durch VON HAYEK (Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) Suppl. 20, 42; 1973) festgelegt.

obliquemaculatus SCHWARZ, 1905 (*Cardiophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 290

Syntypen, Weenen, Natal.

DEI: 1 Syntypus, Weenen, Natal.

oblongicollis FLEUTHAUX, 1931 (*Cardiophorus*)
Bull. Soc. zool. Fr. 56, 313, Fig. 2

Syntypen, Tonkin, Lac-Thó, Hoa-Binh, leg. DE COOMAN.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

obscuripes SCHWARZ, 1900 (*Cardiophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 160

Syntypen, Tanga.

DEI: 1 Syntypus, Tanga.

obscurus SCHWARZ, 1903 (*Monocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 64—65

Syntypen, Paraguay.

DEI: 1 Syntypus, Paraguay.

octomaculatus SCHWARZ, 1898 (*Megapenthes*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 144—145

Syntypen, Assam.

DEI: 1 Syntypus, Assam.

oertzeni SCHWARZ, 1902 (*Atractosomus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 226—227

♀♀ Syntypen, Ecuador, Santa Inéz.

DEI: 4 Syntypen, Ecuador, Santa Inéz., leg. HAENSCH.

oertzeni SCHWARZ, 1897 (*Silesis*)
Wien. ent. Ztg. 16, 136

Syntypen, Creta, leg. v. OERTZEN.

DEI: 2 Syntypen, Creta, leg. v. OERTZEN.

opaculus SCHWARZ, 1902 (*Glyphochilus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 321—322

Syntypen, West-Australien, Swan-River, im Mus. Hamburg.

DEI: 1 Syntypus, Swanriver, Alte Sammlung.

opaculus SCHWARZ, 1900 (*Heteroderes*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 148

Syntypen, Kamerun.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♂, Paralectotypus, Lolodorf, von GIRARD festgelegt.

opacus SCHWARZ, 1902 (*Monocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 143–144

♂♀ Syntypen, Ecuador, Balzapamba.

DEI: 2 Syntypen, Ecuador, Balzapamba, leg. HAENSCH.

orbiculatus SCHWARZ, 1902 (*Lycoreus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 314

♂♀ Syntypen, Madagaskar, Plateau d'Androy, Reg. d'Ambovombe.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

ovatus SCHWARZ, 1909 (*Psephus*)
Soc. ent. 24, 87

♂♂ Syntypen, Franz. Kongo, Benito.

DEI: ♂ Lectotypus, Congo Franç., Benito, von GIRARD festgelegt.

pachyderoides SCHWARZ, 1902 (*Melanoxanthus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 251–252

Syntypen, Deutsch-Ost-Afrika.

DEI: 1 Syntypus, D. Ost-Afrika.

parallelus SCHWARZ, 1901 (*Adiaphorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 22

Syntypen, Ceylon, Weligama, leg. HORN.

DEI: 1 Syntypus, Weligama.

parallelus SCHWARZ, 1902 (*Aeolus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 238

Syntypen, Brasilien, Prov. Goyas, Jatahy.

DEI: 1 Syntypus, Brasilien, Prov. Goyas, Jatahy.

parallelus SCHWARZ, 1906 (*Chalcolepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 98–99

Syntypen, Arizona.

DEI: 2 Syntypen, Arizona.

parallelus SCHWARZ, 1902 (*Elasmosomus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 218

Syntypen, Kamerun.

DEI: ♂ Lectotypus, Kamerun, von GIRARD festgelegt.

parallelus SCHWARZ, 1906 (*Ischiodontus*)

siehe *schwarzi* BECKER, 1961

parallelus SCHWARZ, 1902 (*Tetralobus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 315

Syntypen, Nossi-Bé.

DEI: 1 Syntypus, Nossi-Bé, leg. FREY.

parcus SCHWARZ, 1903 (*Tilotarsus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 358–359

Syntypen, Madagaskar.

DEI: 4 Syntypen, Madagaskar.

parvicollis SCHWARZ, 1902 (*Cosmesus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 150–151

Syntypen, Peru, Marcapata.

DEI: 2 Syntypen, Peru, Marcapata.

parvulus SCHWARZ, 1903 (*Aeolus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 68

Syntypen, Cayenne.

DEI: 1 Syntypus, Cayenne.

parvulus FLEUTIAUX, 1903 (*Cryptohypnus*)
Ann. Soc. ent. France 71 (1902), 575

Syntypen, Annam oder Tonkin.

DEI: 1 Syntypus, Tonkin, Lac Tho, Hoa-Binh, leg. DE COOMAN.

parvulus SCHWARZ, 1909 (*Psephus*)
Soc. ent. 24, 77–78

♂♂ Syntypen, Franz. Kongo, Benito.

DEI: ♂ Lectotypus, Congo Franç., Benito, von GIRARD festgelegt.

parvus SCHWARZ, 1903 (*Monocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 389—390

Syntypen, Australien.

DEI: 1 Syntypus, Austr.

patruus HEYDEN, 1884 (*Corymbites*)
Dtsch. ent. Ztschr. 28, 294

Holotypus, Vladivostok, Coll. KOLTZE, im DEI, in Coll. HEYDEN. Ein weiteres Exemplar in Coll. KOLTZE.

pauper SCHWARZ, 1907 (*Monocrepidius*)
Stett. ent. Ztg. 68, 76—77

Syntypen, Fidji-Inseln.

DEI: 1 Syntypus, Ins. Fidji.

paucillus SCHWARZ, 1901 (*Hypnoides*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 31

Syntypen, Ceylon, Bandarawella, leg. HORN.

DEI: 6 Syntypen, Bandarawella.

pectinicornis SCHWARZ, 1908 (*Alaus*)
Soc. ent. 23, 101—102

2 ♂♂, Syntypen, Kamerun, Old Calabar.

DEI: 2 Syntypen, Kamerun, Old Calabar.

pectinicornis SCHWARZ, 1909 (*Aphanobius*)
Soc. ent. 24, 131

Syntypen, Madagascar, Montagne d'Ambre.

DEI: 1 Syntypus, Amber Geb.

pectinicornis GIRARD, 1980 (*Propsephus*)
Ann. Soc. ent. France (N. S.) 16, 216—217, Fig. 23

♂ Holotypus, Tansanie, Usambara, Neu Bethel, 7. 10. 1903, im Mus. Berlin; 5 ♂♂, Paratypen, vom selben Fundort und 10. 1904; Dar-es-salam, Coll. SCHWARZ; im Mus. Berlin, im DEI, in Coll. GIRARD und im Mus. Paris.

DEI: 1 Paratypus, Daressal.

pectoralis SCHWARZ, 1896 (*Psephus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 90

Syntypen, Dar-es-Salaam, leg. BENNIGSEN.

DEI: ♀ Lectotypus, Usaramo, Coll. v. BENNIGSEN, von GIRARD festgelegt.

pedestris SCHWARZ, 1904 (*Atractosomus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 60—61

Syntypen, Brasilien, Espirito Santo.

DEI: 1 Syntypus, Espirito Santo; 2 Syntypen, Brasil.

pellitus SCHWARZ, 1892 (*Cardiophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 36, 383—384

Syntypen; Turkmenien, leg. REITTER; Turkestan, leg. STAUDINGER.

DEI: ♀ Lectotypus, Turkmenien, REITTER, LEDER, durch VON HAYEK festgelegt.

pellitus SCHWARZ, 1898 (*Melanotus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 151—152

Syntypen, Borneo mer.-orient.

DEI: 1 Syntypus, Sd. Ost-Borneo.

pellitus SCHWARZ, 1903 (*Monocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 383—384

♂♀ Syntypen, Nord-Queensland.

DEI: 2 Syntypen, N. Queensland, leg. WEISKE.

permucronatus SCHWARZ, 1902 (*Agrypnus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 194

Syntypen, Borneo, Kina-Balu.

DEI: Lectotypus, Borneo, Kina-Balu; 1 Paralectotypus, Borneo; durch VON HAYEK festgelegt.

perterminatus SCHWARZ, 1904 (*Pomachilius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 74

Syntypen, Brasilien, Lages.

DEI: 1 Syntypus, Brasilien, Lages, 1.—3. 1887, leg. FRUHSTORFER.

peruanus SCHWARZ, 1901 (*Monocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 314—315

Syntypen, Peru, Callanga.

DEI: 7 Syntypen, Peru, Callanga.

picescens SCHWARZ, 1907 (*Monocrepidius*)
Stett. ent. Ztg. 68, 71

Syntypen, Australia merid.

DEI: 2 Syntypen, Australien merid.

piceus SCHWARZ, 1906 (*Horistonotus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 146—147

2 Syntypen, Argentinien, Buenos-Aires, leg. BRUCH.

DEI: Argentina, Prov. Buenos Aires, leg. BRUCH, 1 Syntypus, 12. 1. 1898, 1 Syntypus, 19. 3. 1903.

piceus SCHWARZ, 1902 (*Pyrophorus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 285—287

Syntypen, Ecuador, Santa-Inéz.

DEI: 1 Syntypus, Ecuador, Santa Inéz, leg. HAENSCH.

pictilis SCHWARZ, 1899 (*Lacon*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1899, 76—77

Syntypen, Deutsch Ost-Afrika.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♂, Paralectotypus, D. Ost Afrika, leg. v. BENNIGSEN; 2 ♂♂, Paralectotypen, Ost Afrika; durch VON HAYEK (Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) 38, 231; 1979) festgelegt.

pictipennis SCHWARZ, 1902 (*Cardiophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 333—334

Syntypen, Pondicherry.

DEI: 4 Syntypen, Pondichery.

pictipennis SCHWARZ, 1906 (*Hypnoidus*)
In: WYTSMAN, Gen. Ins. 46, 156; Taf. 5, Fig. 10; nom. nov. pro *variegatus* SCHWARZ, 1902,
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 253

Syntypen, Madagaskar, Plateau de l'Androy, Reg. d'Ambovombe.

DEI: 3 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

plagiatus SCHWARZ, 1906 (*Cylindroderus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 157—158

Syntypen, Bolivia, La-Paz.

DEI: 2 Syntypen, Bolivia, La Paz.

plagiellus SCHWARZ, 1902 (*Melanozanthus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 326

Syntypen, Borneo, Kina-Balu.

DEI: 4 Syntypen, Kina Balu.

planatus SCHWARZ, 1906 (*Monocrepidius*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 326; nom. nov. pro *depressus* SCHWARZ, 1902, l. c. 1902, 359—360

Syntypen, Neu-Seeland.

DEI: 1 Syntypus, Neu-Seeland.

plasoni SCHWARZ, 1903 (*Metablax*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 393—394

Syntypen, Australien.

DEI: 1 Syntypus, Australien.

plasoni SCHWARZ, 1906 (*Monocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 361—362

Syntypen, Australia merid.

DEI: 4 Syntypen, Australia. merid.

plumbeus SCHWARZ, 1902 (*Arrhaphes*)
Stett. ent. Ztg. 63, 257—258

Syntypen; Sumatra, Soekaranda, Liangagas, leg. DOHRN; Indrapoera, leg. WEYERS.

DEI: 2 Syntypen, Sumatra, Soekaranda, leg. DOHRN; 1 Syntypus, Soekaranda, 1. 1894, leg. DOHRN; 3 Syntypen, Sumatra, Liangagas, leg. DOHRN; 3 Syntypen, Sumatra, Indrapoera, leg. WEYERS.

pogonodes NEBOISS, 1967 (*Austrocalais*)
Proc. R. Soc. Vict. 80, 283—284, Fig. 41—46; Taf. 46, Fig. 22

♀ Holotypus, Coen, Q'ld., ex. Coll. WILSON, im Mus. Melbourne; Paratypen, siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 ♀, Paratypus, Queensland, Coen District, Cape York, leg. HACKER.

polygrammus SCHWARZ, 1904 (*Pomachilius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 78—79

Holotypus, Brasilien, Apiahy, im DEI.

posticinus SCHWARZ, 1906 (*Cosmesus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 151

Holotypus, Brasilien, San Leopoldo, im DEI.

praeclarus SCHWARZ, 1906 (*Esthesopus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 148—149

Syntypen, Brasilien, Jatahy-Goyaz.

DEI: 6 Syntypen, Jatahy-Goyaz.

praetermissus SCHWARZ, 1891 (*Agriotes*)
Dtsch. ent. Ztschr. 35, 87; Taf. 1, Fig. 6

♂♂ Syntypen, Syrien, Beirut.

DEI: 1 ♂, Syntypus, Beirut, 1. 1878, APPL.

principatus SCHWARZ, 1905 (*Lacon*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 259

Syntypen, Ceylon, Kandy.

DEI: ♀ Lectotypus, Kandy, durch VON HAYEK (Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) 38, 233; 1979) festgelegt.

prominens SCHWARZ, 1896 (*Ischiodontus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 97

Syntypen, Brasilia?

DEI: 1 Syntypus, ohne Fundortangaben.

propinquus SCHWARZ, 1898 (*Alaus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 412

Syntypen; Deutsch-Ost-Afrika; Zanzibar; Kamerun; Gabon und Benguela.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♂, Paralectotypus, D. Ost-Afrika, leg. v. BENNIGSEN; 1 ♂, Paralectotypus, Mpuapua; von GIRARD festgelegt.

prosternalis SCHWARZ, 1908 (*Psephus*)
Soc. ent. 23, 114

Syntypen, Njam-Njam.

DEI: ♂ Lectotypus, Njam-Njam, von GIRARD festgelegt.

pseudoscalaris SCHWARZ, 1896 (*Monocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 98

Syntypen, Paraguay.

DEI: 1 Syntypus, Paraguay, leg. DRAKE.

pubescens SCHWARZ, 1902 (*Camposternus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 318–319

Syntypen; Malacca; Borneo.

DEI: 1 Syntypus, Malacca; 1 Syntypus, Borneo.

puerilis SCHWARZ, 1902 (*Psephus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 318–319

Syntypen, Kamerun, Vallée de la N'Goko.

DEI: 3 Paralectotypen, Cameroun, Vallée de la N'Goko, 1. 1900 (Jobit), von GIRARD festgelegt.

pulchellus SCHWARZ, 1905 (*Elasmosomus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 274–275

Syntypen, Togo.

DEI: ♀ Lectotypus, Togo, leg. RAFFRAY, von GIRARD festgelegt.

pulcher SCHWARZ, 1905 (*Elasmosomus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 275–276

Syntypen, Kamerun, Balanga.

DEI: ♀ Lectotypus, Kamerun, Balanga, von GIRARD festgelegt.

pulcher SCHWARZ, 1906 (*Pomachilius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 138–139

Syntypen, Brasilien, São Paulo.

DEI: 4 Syntypen, Sao Paulo.

pulchratis SCHWARZ, 1903 (*Pomachilius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 72–73

Syntypen, Brasilien, St. Catharina.

DEI: 1 Syntypus, S. Catharina, LÜDERWALDT.

pullus SCHWARZ, 1901 (*Pomachilius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 336–337

Syntypen, Ecuador, Cachabé, leg. ROSENBERG.

DEI: 4 Syntypen, Cachabé, 1. 1897, leg. ROSENBERG.

punctatissimus SCHWARZ, 1904 (*Anoplischius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 54

Syntypen, Brasilien, B. Retiro.

DEI: 1 Syntypus, B. Retiro.

punctatostratus SCHWARZ, 1892 (*Melanotus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 35 (1891), 365–366

4 ♂♂, Syntypen, Syrien, in Coll. SCHWARZ.

DEI: 3 ♂♂, Syntypen, ohne Fundortangabe (wohl Syrien).

punctatus SCHWARZ, 1902 (*Diploconus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 271–272

Syntypen, Borneo, Kina-Balu.

DEI: 3 Syntypen, Kina-Balu.

punctatus SCHWARZ, 1893 (*Elater*)
Dtsch. ent. Ztschr. 37, 192

Mehrere Syntypen, Hoch-Armenien.

DEI: 2 historische Exemplare, vielleicht Typen, ohne Fundortangaben.

***purpureus lederi* HEYDEN, 1877 (*Corymbites*)**

Verh. Naturf. Ver. Brünn 16, 204

1 ♀, Syntypus, Elisabethpol, Caucasus; 1 ♀, Syntypus, Taurus, leg. HABERHAUER, in Coll. HEYDEN; 1 ♂, Syntypus, Ungarn, durch STENTZ.

DEI: 1 Syntypus, Taurus, leg. HABERHAUER; 1 Syntypus, Hung., STZ.; in Coll. HEYDEN.

***purpureus* SCHWARZ, 1899 (*Pantolamprus*)**

Dtsch. ent. Ztschr. 1899, 78—79

2 Syntypen (davon 1 nur mit einer Flügeldecke), Deutsch-Ost-Afrika.

DEI: ♀ Lectotypus, D. O. Afrika, von GIRARD festgelegt.

***pusillus* SCHWARZ, 1898 (*Lacon*)**

Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 186—187

Syntypen, Ost-Afrika, Usambara.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♂, 3 ♀♀, Paralectotypen, Usambara, durch VON HAYEK (Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) Suppl. 20, 50; 1973) festgelegt.

***pusillus* SCHWARZ, 1901 (*Pomachilius*)**

Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 337—338

Syntypen, Ecuador, Cachabé, leg. ROSENBERG.

DEI: 4 Syntypen, Cachabé, 1. 1897, leg. ROSENBERG.

***pustulatus* SCHWARZ, 1906 (*Aeolus*)**

Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 120

Syntypen, Brasilien, St. Catharina.

DEI: 1 Syntypus, S. Catharina, leg. LÜDERWALDT.

***quadraticollis* SCHWARZ, 1903 (*Crepidomenus*)**

Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 392—393

Syntypen, Australien.

DEI: Lectotypus, Australien, von NEBOISS festgelegt.

***quadraticollis* SCHWARZ, 1906 (*Psephus*)**

Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 353

Syntypen, Australia merid.

DEI: 1 Syntypus, Austr. mer.

***quadriguttatus* SCHWARZ, 1898 (*Hemirrhaphus*)**

Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 148

Syntypen, Kamerun, Lolodorf, leg. CONRADT.

DEI: 2 Syntypen, Kamerun.

***quadrilineatus* SCHWARZ, 1902 (*Melanoxanthus*)**

Stett. ent. Ztg. 63, 249—250

Syntypen, Borneo, Kina-Balu.

DEI: 3 Syntypen, Kina Balu.

***quadrilineatus* SCHWARZ, 1901 (*Psiloniscus*)**

Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 328—329

Syntypen, Mexico, Durango (Colonia).

DEI: 1 Syntypus, Colonia 16.

***quadrimaculatus* FLEUTIAUX, 1933 (*Melanotus*)**

Ann. Soc. ent. France 102, 230

Syntypen, Tonkin, Hoa-Binh, Lac-Thô, leg. DE COOMAN.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

***quadrimaculatus* SCHWARZ, 1901 (*Pomachilius*)**

Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 334—335

Syntypen, Brasilien, Jatahy, Prov. Goyas.

DEI: 5 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

***quadrinotatus* SCHWARZ, 1908 (*Lacon*)**

Soc. ent. 23, 73

Syntypen, Madagascar.

DEI: 1 Syntypus, Madagascar, leg. SIKORA.

***quadripicturatus* SCHWARZ, 1891 (*Lacon*)**

Dtsch. ent. Ztschr. 35, 151

Holotypus, Madagascar, im DEI.

***quadristriatus* SCHWARZ, 1900 (*Cardiophorus*)**

Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 156—157

Syntypen, Afrika, ohne nähere Fundortangaben.

DEI: 1 Syntypus, Tanga.

***quadrivittatus* CANDEZE, 1896 (*Alaus*)**

Elaterides nouveaux 6, 14—15

Syntypen, Molukken, Bangkey, in Coll. SCHWARZ.

DEI: 1 Syntypus, Bangkei, 1885, leg. KÜHN.

raffrayi SCHWARZ, 1896 (*Cardiophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 92—93

Syntypen; Dar-es-Salaam; Tanga, leg. BENNIGSEN.
DEI: Lectotypus, 7 Paralectotypen, Dar-es-Salaam; 2 Paralectotypen, Tanga, Coll. BENNIGSEN; durch VON HAYEK festgelegt.

rectangularis SCHWARZ, 1902 (*Alaus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 311—312

♀♀ Syntypen, Insel Larat (Tenimber Inseln).
DEI: 1 Syntypus, Larat-Ins. (Tenimber Inseln).

rectangulus SCHWARZ, 1903 (*Lacon*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 378—379

Syntypen, Deutsch Neu-Guinea.
DEI: ♀ Lectotypus, D. N. Guinea, durch VON HAYEK (Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) 38, 234; 1979) festgelegt.

recticollis SCHWARZ, 1903 (*Tetralobus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 363

♂♀ Syntypen, Franz. Congo, Benito.
DEI: ♂ Lectotypus, Congo Francais; 1 ♀, Paralectotypus, Congo Français, Donetzia?, von GIRARD festgelegt.

reitteri SCHWARZ, 1891 (*Agriotes*)
Dtsch. ent. Ztschr. 35, 101; Taf. 1, Fig. 28

♂♂ Syntypen, West-Caucasus.
DEI: 1 Syntypus, Cauc., leg. ROST.

reitteri SCHWARZ, 1891 (*Cardiophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 35, 151—152

2 ♂♂, Syntypen, Syrien.
DEI: 1 ♂, Syntypus, Syrien, Haifa, leg. REITTER (ohne Aedeagus).

restinctus SCHWARZ, 1902 (*Monocrepidius*)
Stett. ent. Ztg. 63, 229—230

Syntypen, Guatemala.
DEI: 1 Syntypus, Guatemala, leg. PEHLKE.

robustus STIERLIN, 1863 (*Athous*)
Mitt. Schweiz. ent. Ges. 1 Heft 4, 91—92

2 ♂♂, 1 ♀, Syntypen, Sicilien, Coll. STIERLIN.
DEI: 2 Syntypen, Sicilia, Coll. STIERLIN.

robustus SCHWARZ, 1901 (*Cosmesus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 349—350

Syntypen, Peru, Callanga.
DEI: 1 Syntypus, Peru, Callanga.

robustus SCHWARZ, 1902 (*Dictenophorus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 307—308

♀ Holotypus, Australien, Neu-Süd-Wales, im DEI.

robustus SCHWARZ, 1903 (*Lacon*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 377

Syntypen, Deutsch Neu-Guinea, Simbang.
DEI: ♀ Lectotypus, D. N. Guinea, Simbang, durch VON HAYEK (Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) 38, 234; 1979) festgelegt.

rosti SCHWARZ, 1897 (*Anchastus*)
Wien. ent. Ztg. 16, 128—129

♂♀ Syntypen, Kaukasus occ., leg. ROST.
DEI: 1 Syntypus, Caucasus.

rosti SCHWARZ, 1897 (*Athous*)
Wien. ent. Ztg. 16, 131—132

♂♀ Syntypen, Cirkassien, leg. ROST.
DEI: 1 Syntypus, Circassia, leg. ROST.

rotundicollis SCHWARZ, 1901 (*Amychus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 196

Holotypus, Chatam Inseln, im DEI.

rotundifrons SCHWARZ, 1902 (*Glyphonyx*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 346—347

Syntypen, Pondicherry.
DEI: 1 Syntypus, Pondichery.

rotundimaculatus SCHWARZ, 1905 (*Alaus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 284; nom. nov. pro *intermedius* KRAATZ, l. c. 1898, 414; 1898

5 Syntypen, Togo, in Coll. KRAATZ (Typenserie von *intermedius* KRAATZ). Syntypen, Dahomey, Kamerun, Togo (Typenserie von *rotundimaculatus* SCHWARZ).
DEI: ♀ Lectotypus, 1 ♀, Paralectotypus, Togo, leg. CONRADT; 1 ♀, Paralectotypus, Dahomey; 1 ♀, Paralectotypus, Kamerun, leg. CONRADT; von GIRARD festgelegt.

rubida SCHWARZ, 1902 (*Adelocera*)
Stett. ent. Ztg. 63, 195

Syntypen, Insula Mona.

DEI: 1 Syntypus, Ins. Mona, leg. BOCK.

rubiginosus SCHWARZ, 1906 (*Ischiodontus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 107

♂♂ Syntypen, Argentina, Cordoba.

DEI: 1 Syntypus, Argentinien, Cordoba, leg. FRENZEL.

rubripennis SCHWARZ, 1901 (*Melanoxanthus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 322

Syntypen, N. Borneo.

DEI: 1 Syntypus, N. Borneo; 2 Syntypen, Kina-Balu.

rubripennis SCHWARZ, 1898 (*Psephus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 136

Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♀, Paralectotypus, Kamerun, leg. CONRADT, von GIRARD festgelegt.

rubripennis SCHWARZ, 1908 (*Psephus*)

siehe *mutatus* FLEUTIAUX, 1919

rubripennis SCHWARZ, 1901 (*Stenopus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 309—310

4 Syntypen, Süd-Amerika, Caucathal.

DEI: 3 Syntypen, S. Amerika, Caucathal.

rufangulus SCHWARZ, 1902 (*Agonischius*)
Stett. ent. Ztg. 63, 303—304

Syntypen, Nord-Borneo, Kina Balu.

DEI: 2 Syntypen, N. Borneo; 5 Syntypen, Kina Balu.

rufescens SCHWARZ, 1901 (*Sphenomerus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 20—21

Syntypen, Ceylon, Nalanda, leg. HORN.

DEI: 1 Syntypus, Nalanda.

ruficollis SCHWARZ, 1900 (*Agonischius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 96

Syntypen, N. O. Sumatra, leg. SCHULTHEISS.

DEI: 1 Syntypus, N. O. Sumatra; 1 Syntypus, Sumatra.

ruficollis SCHWARZ, 1904 (*Cardiorhinus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 64—65

♂♀ Syntypen, Brasilien, Espirito Santo.

DEI: 2 Syntypen, Espirito Santo.

ruficollis SCHWARZ, 1901 (*Diploconus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 343—344

Syntypen, Neu Guinea.

DEI: 1 ♀, Syntypus, Neu Guinea.

ruficollis SCHWARZ, 1902 (*Elater*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 323—324

Syntypen, Tonkin, Montes Mauson.

DEI: 1 Syntypus, Tonkin, Montes Mauson, 4.—5., 2—3000 Fuß, leg. FRUHSTORFER.

ruficollis SCHWARZ, 1902 (*Monocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 121

3 Syntypen, Australia mer., Victoria, 2 Ex., leg. DONCKIER, 1 Ex., leg. MOSER.

DEI: 1 Syntypus, Australia, Victoria; 1 Syntypus, Australia, leg. DONCKIER.

ruficornis SCHWARZ, 1906 (*Monocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 114—115

Syntypen, Mendoza.

DEI: 1 Syntypus, Mendoza.

rufipennis SCHWARZ, 1902 (*Monocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 144—145

Holotypus, Peru, Chanchamayo, leg. LANGE, im DEI.

rufipennis SCHWARZ, 1899 (*Psephus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1899, 80; als var. zu *discolor* SCHWARZ beschrieben

Syntypen, Deutsch Ost-Afrika.

DEI: ♂ Lectotypus, 3 Paralectotypen, Ostafrika, von GIRARD festgelegt. Ein weiteres Tier [Bradshaw, Zambesi, 1878], von GIRARD als Paralectotypus ausgezeichnet, kann nicht zu der Typenserie gehören, da der Fundort nicht in der Originalbeschreibung erwähnt wird.

rufipes SCHWARZ, 1903 (*Crepidomenus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 391

Syntypen, Australien.

DEI: ♀ Lectotypus, 1 Paralectotypus, Australien, von NEBOISS festgelegt.

rufipes SCHWARZ, 1902 (*Psephus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 351—352

Syntypen, Tonga-tabu, im Mus. GODEFFROY.

DEI: ♀ „Neotypus“ (Pac. Insects 1, 367; 1959) Tonga, Mus. GODEFFROY, hiermit als Lectotypus festgelegt. Begründung für diese Änderung siehe bei *Psephus euaensis* SCHWARZ.

rufithorax MIWA, 1930 (*Athous*)
Wien. ent. Ztg. 47, 92—93

Holotypus, Formosa, Taihorin, 7. 6. 1911, leg. SAUTER; Paratypen, Horisha, 7. 1926, leg. MIWA.

DEI: Holotypus, mit den Angaben der Beschreibung.

rufiventris SCHWARZ, 1900 (*Cardiophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 153—154

♂♀ Syntypen, Dar-es-Salaam.

DEI: 3 Syntypen, Dar-es-Salaam.

rufiventris SCHWARZ, 1902 (*Corymbites*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 337—338

♀♀ Syntypen, Assam.

DEI: 1 Syntypus, Assam.

rufiventris SCHWARZ, 1898 (*Craspedonotus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 148—149

Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT.

DEI: ♀ Lectotypus, Kamerun; 1 ♀, Paralectotypus, Kamerun, KRAATZ; durch VON HAYEK festgelegt.

rufiventris SCHWARZ, 1903 (*Esthesopus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 75

Syntypen, Venezuela.

DEI: 1 Syntypus, Venezuela.

rufolaterus SCHWARZ, 1902 (*Agonischius*)
Stett. ent. Ztg. 63, 299—300

Syntypen, Borneo, Kina Balu.

DEI: 2 Syntypen, Kina Balu.

rufopilosus SCHWARZ, 1902 (*Monocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 118—119

Holotypus, Australia mer., Victoria, im DEI.

rufus SCHWARZ, 1902 (*Elius*)
Stett. ent. Ztg. 63, 223

Syntypen, Pondichery.

DEI: 1 Syntypus, Pondichery.

rugifrons SCHWARZ, 1906 (*Cosmesus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 152—153

Syntypen, Brasilien, St. Catharina.

DEI: 2 Syntypen, S. Catharina, leg. LÜDERWALDT.

rugipennis SCHWARZ, 1891 (*Agriotes*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1891, 113; Taf. 2, Fig. 48

Syntypen, Pecking.

DEI: 1 Syntypus, Pecking, DEYROLLE, in Coll. HEYDEN.

rugosipennis SCHWARZ, 1909 (*Psephus*)
Soc. ent. 24, 14

Syntypen, Franz. Kongo, Benito.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♂, Paralectotypus, Congo Franç., Benito, von GIRARD festgelegt.

rugosus SCHWARZ, 1899 (*Olophoeus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1899, 67+72—73

♂♂ Syntypen, Deutsch Ost-Afrika.

DEI: 1 ♂, Syntypus, D. Afrika, Ngombo.

rugulosus SCHWARZ, 1900 (*Melanoxanthus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 149—150

Syntypen, Dar-es-Salaam.

DEI: ♂ Lectotypus, D. Ost-Afrika, von GIRARD festgelegt.

russovi HEYDEN, 1889 (*Cardiophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 33, 328

Holotypus, Turkestan, Farab, leg. RUSSOW, durch SEIDLITZ erhalten, in Coll. HEYDEN, im DEI.

sahlbergi SCHWARZ, 1900 (*Cardiophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 104—105

♂♂ Syntypen, Amu-Darja.
DEI: 2 Syntypen, Amu Daria, leg. SAHLBERG.

sambesianus SCHWARZ, 1903 (*Odontonychus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 366—367

Syntypen, Sumbo.
DEI: ♂ Lectotypus, Sumbu, leg. DUVIVIER, von GIRARD festgelegt.

sanguinea FLEUTIAUX, 1908 (*Adelocera*)
Bull. Soc. ent. France 1908, 164

Syntypen, Tonkin, Mts. Mauson, 2000—3000 m, 4.—5., leg. FRUHSTORFER.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

sanguinicollis SCHWARZ, 1902 (*Melanozanthus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 325

Syntypen, Pondicherry.
DEI: 4 Syntypen, Pondichery.

sauteri MIWA, 1931 (*Glyphonyx*)
Wien. ent. Ztg. 47 (1930), 207

Syntypen, Formosa: Taihorin, 7. 8. 1911; Taihorinsho, 8. 1909; alle leg. SAUTER.
DEI: 2 Syntypen, Formosa, Taihorin, 7. 8. 1911, leg. SAUTER; 2 Syntypen, Formosa, Taihorinsho, 8. 1909, leg. SAUTER.

sauteri MIWA, 1930 (*Silesis*)
Wien. ent. Ztg. 47, 95—96

Syntypen, Formosa: Fuhosho, 8. 1909; Kosempo, 22. 5. 1912; Taihorin, 7. 8. 1911; Taihorinsho, 8. 1909; alle leg. SAUTER;
Horisha, 7. 1926, leg. MIWA; Musha, 5. 1919, leg. OKUNI; Mt. Arisan, 10. 1918, leg. SONAN; Tabo, 8. 1923, leg. SHIRAKI;
Shinchiku, 7. 1918, leg. SONAN.
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Fuhosho, 8. 1909; 1 Syntypus, Formosa, Kosempo, 22. 5. 1912; 1 Syntypus, Formosa, Taihorin, 7. 8. 1911; 4 Syntypen, Formosa, Taihorinsho, 8. 1909 und 7. 9.; alle leg. SAUTER.

schauinslandi SCHWARZ, 1901 (*Amychus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 194—196

2 Syntypen, Chatam-Inseln, leg. SCHAUINSLAND.
DEI: 1 Syntypus, Chatam-Inseln.

schneideri SCHWARZ, 1908 (*Alaus*)
Soc. ent. 23, 110

Syntypen, Kamerun, Edea.
DEI: 1 Syntypus, Kamerun, Edea, ex Coll. SCHNEIDER.

schneideri KIESENWETTER, 1878 (*Athous*)
Verh. Naturforsch. Ver. Brünn 16 (1877), 203

Syntypen; Schambobell, 8. 1875, leg. SCHNEIDER; Kor-oglu, 5., leg. LEDER.
DEI: 2 Syntypen, Schambobell, leg. SCHNEIDER.

schneideri SCHWARZ, 1902 (*Gastrimargus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 310—311

2 Syntypen, Afrika orient., Micindani, durch SCHNEIDER.
DEI: ♀ Lectotypus, 1 ♀, Paralectotypus, Afrika or., Micindani, ex Coll. SCHNEIDER, durch GIRARD festgelegt.

schneideri SCHWARZ, 1906 (*Pyrophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 155—156

Holotypus, Brasilien, San Leopoldo, leg. SCHNEIDER, im DEI.

schusteri SCHWARZ, 1897 (*Paracardiophorus*)
Wien. ent. Ztg. 16, 129—130

Syntypen, Bagdad.
DEI: 1 Syntypus, Bagdad.

schwarzii REITTER, 1898 (*Elathous*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 346

Syntypen, Kleinasien, Mardin.
DEI: 1 Syntypus, Asia min., Mardin.

schwarzii BECKER, 1961 (*Ischiodontus*)
Canad. Ent. 43, 169—170, Fig. 5; nom. nov. pro *parallelus* SCHWARZ, 1906,
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 104—105

Syntypen, America borealis, Alabama.
DEI: ♂ Lectotypus, Alabama, leg. SPEYER, von BECKER (Canad. Ent. 43, 169—170; 1961) festgelegt.

scitulus SCHWARZ, 1909 (*Campylocephus*)
Soc. ent. 24, 117

♂♀ Syntypen, San-Thomé.
DEI: ♂ Lectotypus, 4 Paralectotypen, San Thome, von GIRARD festgelegt.

scopus SCHWARZ, 1902 (*Lacon*)
Stett. ent. Ztg. 63, 200—202

Syntypen, Deutsch-Neu-Guinea, Stephansort.

DEI: ♂ Lectotypus, N. Guinea, Stephansort, durch VON HAYEK (Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) Suppl. 20, 208; 1973) festgelegt.

scriptus SCHWARZ, 1904 (*Pomachilius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 74—75

Syntypen, Brasilien, Pernambuco.

DEI: 2 Syntypen, Brasilien, Pernambuco.

scutellaris SCHWARZ, 1903 (*Esthesopus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 76—77

Syntypen, Brasilien.

DEI: 1 Syntypus, Brasilien.

scutellaris SCHWARZ, 1902 (*Tetralobus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 209—210

2 ♂♂, Syntypen, Deutsch-Ost-Afrika, Tanga, leg. HINTZ.

DEI: ♂ Lectotypus, Tanga, von GIRARD festgelegt.

semiferrugineus SCHWARZ, 1896 (*Psephus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 95—96

Syntypen, Afrika, Delagoa-Bai.

DEI: ♂ Lectotypus, Delagoa-B., von GIRARD festgelegt.

semifuscus SCHWARZ, 1909 (*Psephus*)
Soc. ent. 24, 4

Syntypen, Kamerun, Victoria.

DEI: ♀ Lectotypus, Kamerun, Victoria, von GIRARD festgelegt.

seminiger SCHWARZ, 1909 (*Psephus*)
Soc. ent. 24, 77

Syntypen, Kamerun.

DEI: ♂ Lectotypus, Kamerun, leg. SJÖSTEDT, von GIRARD festgelegt.

semitoides SCHWARZ, 1906 (*Pyrophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 154—155

♀ Holotypus, Argentinien, Gob. Neuquen, leg. BRUCH, im DEI.

semipunctatus SCHWARZ, 1902 (*Psephus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 316—317

♂♀ Syntypen, Kamerun, Vallée de la N'Goko.

DEI: 1 Paralectotypus, Cameroun, Vallée de la N'Goko, 1. 1900 (Jobit), von GIRARD festgelegt.

semirufus SCHWARZ, 1899 (*Psephus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1899, 80; als var. zu *discolor* SCHWARZ beschrieben

Syntypen, Deutsch Ost-Afrika.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♀, Paralectotypus, D. Ost Afrika, von GIRARD festgelegt.

semirugulosus SCHWARZ, 1898 (*Psephus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 138—139

Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT.

DEI: ♀ Lectotypus, 1 ♀, Paralectotypus, Kamerun, von GIRARD festgelegt. Ein dritter Syntypus ist verlorengegangen.

semistriatus SCHWARZ, 1899 (*Agrypnus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1899, 74—75

Syntypen, Deutsch Ost-Afrika.

DEI: ♂ Lectotypus, D. Ost-Afrika, leg. BENNIGSEN, von GIRARD festgelegt.

semistriatus SCHWARZ, 1900 (*Anchastus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 151—152

Syntypen, Kamerun.

DEI: 2 Syntypen, Kamerun.

senilis SCHWARZ, 1903 (*Psephus*)
Arkiv Zoologi 1, 51

♂♀ Syntypen: zahlreiche Syntypen, Kamerun, Umgebung von Barombi, leg. CONRADT, im Mus. Stettin und Coll. SCHWARZ; 3 Syntypen, Kamerun, leg. SJÖSTEDT, im Mus. Stockholm; 2 Syntypen, Franz. Kongo, Benito, in Coll. SCHWARZ.

DEI: ♂ Lectotypus, 2 ♀♀, Paralectotypen, Kamerun, Victoria; 1 ♂, Paralectotypus, Kamerun, Barombi, leg. CONRADT; 1 ♀, Paralectotypus, N. Kamerun, Johann-Albrechtshöhe, 96, leg. CONRADT; von GIRARD festgelegt. 2 Syntypen (*senilis*?), Congo Franç., Benito.

seriatus SCHWARZ, 1909 (*Psephus*)
Soc. ent. 24, 4

♀♀ Syntypen, Franz. Kongo, Benito.

DEI: ♀ Lectotypus, 1 ♀, Paralectotypus, Congo Franç., Benito, von GIRARD festgelegt.

sericatus SCHWARZ, 1891 (*Agriotes*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1891, 113; Taf. 2, Fig. 47

Syntypen, Pecking.

DEI: 1 Syntypus, Pecking, DEYROLLE, in Coll. HEYDEN.

serratipennis SCHWARZ, 1898 (*Psephus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 139—140

♂♀ Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT.

DEI: ♂ Lectotypus, 2 ♀♀, Paralectotypen, Kamerun, leg. CONRADT, von GIRARD festgelegt.

setosulus SCHWARZ, 1903 (*Lacon*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 378

Syntypen, Deutsch Neu-Guinea.

DEI: 1 Syntypus, D. N. Guinea, Stephansort; 1 Syntypus, N. Guinea, Fumack.

setosus SCHWARZ, 1902 (*Lacon*)
Stett. ent. Ztg. 63, 311—312

Syntypen, Madagascar, Antongil-Bai.

DEI: 1 Syntypus, S. de la baie d'Antongil.

sexmaculatus SCHWARZ, 1902 (*Aeolus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 236—237

Syntypen, Columbia.

DEI: 1 Syntypus, Columbia.

sexmaculatus SCHWARZ, 1901 (*Anchastomorphus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 328

Syntypen, Brasilien, Jatahy, Prov. Goyaz.

DEI: 2 Syntypen, Brasilien, Prov. Goyas, Jatahy, 9.—11. 1897; 2 Syntypen, Jatahy, Prov. Goyaz.

sexmaculatus SCHWARZ, 1901 (*Pomachilius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 335—336

Syntypen, Brasilien, Jatahy, Prov. Goyas.

DEI: 3 Syntypen, Brésil, Prov. Goyas, Jatahy, 9.—11. 1897; 1 Syntypus, Jatahy (Goyaz).

sexplagiatus SCHWARZ, 1902 (*Aeolus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 235—236

Syntypen, Brasilien, Itaituba.

DEI: 4 Syntypen, Brasilien, Grav. Para, Itaituba.

sexpustulatus SCHWARZ, 1906 (*Aeolus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 124—125

Syntypen, Brasilien, Jatahy-Goyaz.

DEI: 3 Syntypen, Jatahy (Goyaz).

sexpustulatus SCHWARZ, 1902 (*Melanoxanthus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 327—328

Syntypen, Borneo, Kina-Balu.

DEI: 1 Syntypus, N. Borneo; 3 Syntypen, Kina Balu.

sexvittatus SCHWARZ, 1901 (*Monocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 316

Syntypen, Columbia.

DEI: 2 Syntypen, Columbien.

signatus SCHWARZ, 1902 (*Aeolus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 239—240

Syntypen, Caucathal.

DEI: 1 Syntypus, Caucathal.

sikorae SCHWARZ, 1896 (*Agriotes*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 96

Syntypen, Madagascar.

DEI: 1 Syntypus, Madag.

similatus SCHWARZ, 1902 (*Melanoxanthus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 331

Syntypen, Sumatra; Borneo, Kina Balu.

DEI: 1 Syntypus, Sumatra, Indrapoera; 2 Syntypen, N. Borneo; 1 Syntypus, Kina Balu.

simoni STIERLIN, 1879 (*Ectinus*)
Mitt. Schweiz. ent. Ges. 5, 511—512

Syntypen, Syrien.

DEI: 2 ♂♂, 2 ♀♀, Syntypen, Syrien.

sjoestedti SCHWARZ, 1908 (*Lacon*)
In: SjöSTEDT, Kilimandjaro-Meru Expedition 7 Col., 57—58

2 Syntypen, Usambara, Mombo, 6., leg. SjöSTEDT.

DEI: ♀ Lectotypus, Usambara, Mombo, Juni, leg. SjöSTEDT, durch VON HAYEK (Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) Suppl. 20, 213; 1973) festgelegt.

smyrnensis SCHWARZ, 1903 (*Elathous*)
Wien. ent. Ztg. 22, 207—208

♀♀ Syntypen, Asia minor, Smyrna.
DEI: 1 Syntypus, Smyrna, 14. 8. 1871.

solitus SCHWARZ, 1902 (*Heteroderes*)
Stett. ent. Ztg. 63, 240

Syntypen, Madras.
DEI: 2 Syntypen, Madras.

somcheticus SCHWARZ, 1896 (*Cardiophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 148

Syntypen, Somchetien, leg. CONRADT.
DEI: 2 Syntypen, Somchetien, 1892, leg. CONRADT.

songoricus KRAATZ, 1879 (*Corymbites*)
Dtsch. ent. Ztschr. 23, 283

5 Syntypen, Targabatai.
DEI: Lectotypus, 2 Paralectotypen, Tarbagat, von GURJEVA festgelegt.

sordidulus SCHWARZ, 1909 (*Cardiophorus*)
Soc. ent. 24, 130

Syntypen, Madagascar, Montagne d'Ambre.
DEI: 1 Syntypus, Amber-Geb.

sordidulus SCHWARZ, 1907 (*Monocrepidius*)
In: WYTSMAN, Gen. Ins. 46, 316; nom. nov. pro *sordidus* SCHWARZ, 1902,
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 120

2 Syntypen, Australia mer., Victoria, im DEI.

sordidulus SCHWARZ, 1896 (*Psephus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 94—95

Syntypen, Afrika, Niam-Niam.
DEI: 3 Lectotypus, 1 ♂, Paralectotypus, Njam-Njam, von GIRARD festgelegt.

sordidus SCHWARZ, 1906 (*Aeolus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 133—134

Holotypus, Argentinien, Gob. Caco, 12. 1894, leg. BRUCH, im DEI.

sordidus SCHWARZ, 1909 (*Dorygonus*)
Soc. ent. 24, 122

Syntypen, Madagascar.
DEI: 1 Syntypus, Madagascar.

sordidus SCHWARZ, 1902 (*Monocrepidius*)
siehe *sordidulus* SCHWARZ, 1907

sororius SCHWARZ, 1903 (*Cardiophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 371

♂♀ Syntypen, Afr. or., Ikutha, Micindani.
DEI: 3 Syntypen, Afr. or., Micindani.

spenicollis SCHWARZ, 1894 (*Odontoderus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 38, 149—150

♂♂ Syntypen, Syrien, Beirut.
DEI: 1 Syntypus, Beirut, APPL., 1878, B. M.

spinipennis SCHWARZ, 1902 (*Anaissus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 150

Syntypen, Peru, Chanchamayo.
DEI: 1 Syntypus, Peru, Chanchamayo, leg. LANGE.

spinipennis SCHWARZ, 1902 (*Cyathodera*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 133—134

Syntypen, Peru, Tarapota.
DEI: 1 Syntypus, Peru, Tarapota.

spinipennis SCHWARZ, 1900 (*Megapenthes*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 91

Syntypen, N. O. Sumatra, leg. SCHULTHEISS.
DEI: 1 Syntypus, N. O. Sumatra.

spinosulus SCHWARZ, 1901 (*Heteroderes*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 25—26

Syntypen, Ceylon, Trincomalee, leg. HORN.
DEI: 1 Syntypus, Trincomali.

spinus SCHWARZ, 1901 (*Pomachilius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 333

Syntypen, Peru, Callanga.
DEI: 1 Syntypus, Peru, Callanga.

splendens SCHWARZ, 1909 (*Psephus*)
Soc. ent. 23 (1908–1909), 181–182

Syntypen, Goldküste.
DEI: ♀ Lectotypus, Goldküste, von GIRARD festgelegt.

splendidus SCHWARZ, 1909 (*Psephus*)
Soc. ent. 24, 109

Syntypen, Congo.
DEI: ♀ Lectotypus, Congo, von GIRARD festgelegt.

squalidus SCHWARZ, 1891 (*Agriotes*)
Dtsch. ent. Ztschr. 35, 104; Taf. 2, Fig. 33

♂♂ Syntypen, Sibirien, Tarbagatai.
DEI: 1 ♂, Syntypus, Sibirien, Tarbagatai, 1877, leg. HABERHAUER.

starcki SCHWARZ, 1891 (*Agriotes*)
Dtsch. ent. Ztschr. 35, 94; Taf. 1, Fig. 18

♂♂♀ Syntypen, West-Caucasus.
DEI: 1 ♂, Syntypus, Caucas occid., Medovej, leg. STARCK; 1 Syntypus, Caucas occid., Utsch Dere, leg. STARCK; 1 Syntypus, West-Caucas., Utsch Dere, leg. KÖNIG.

stephanus SCHWARZ, 1902 (*Glyphonyx*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 345–346

Syntypen, Pondicherry.
DEI: 3 Syntypen, Pondicherry.

sternalis SCHWARZ, 1909 (*Psephus*)
Soc. ent. 24, 92–93

Syntypen, Kamerun.
DEI: ♂ Lectotypus, Kamerun, von GIRARD festgelegt.

striatus SCHWARZ, 1902 (*Glyphonyx*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 343–344

Syntypen, Tonkin, Montes Mauson.
DEI: 3 Syntypen, Tonkin, Montes Mauson, 4.–5., 2–3000 Fuß.

subaenescens SCHWARZ, 1905 (*Agonischius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 263–264

2 Syntypen, Assam, Kohima, leg. DUCHON.
DEI: 1 Syntypus, Assam, Kohima.

subangulatus SCHWARZ, 1902 (*Diploconus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 270–271

Syntypen, Sumatra, Soekaranda.
DEI: 1 Syntypus, Sumatra; 2 Syntypen, Soekaranda, 1. 1894, leg. DOHRN.

subaurata SCHWARZ, 1904 (*Adelocera*)
Spolia Zeylanica 2, Part 5, 46

Syntypen, Ceylon, im Mus. Colombo.
DEI: 1 Syntypus, Ceylon.

subcarinulatus SCHWARZ, 1908 (*Lacon*)
Soc. ent. 23, 82

Syntypen, Madagascar, Mont. d'Ambre.
DEI: 1 Syntypus, Madagascar, Ambergelbirge.

subcylindricus SCHWARZ, 1908 (*Lacon*)
Soc. ent. 23, 93

Syntypen, Madagascar, Mont. d'Ambre.
DEI: 1 Syntypus, Madagascar, Mont d'Ambre.

subdentatus SCHWARZ, 1900 (*Cardiophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 158–159

Syntypen, Usambara, leg. WEISE.
DEI: 4 Syntypen, Usambara, leg. WEISE.

subhumeralis SCHWARZ, 1901 (*Cardiophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 33–34

Syntypen, Ceylon, Kanthalay, leg. HORN.
DEI: 1 Syntypus, Kanthalay.

subhumeralis SCHWARZ, 1902 (*Melanozanthus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 329

Syntypen, Sumatra.
DEI: 1 Syntypus, Sumatra, Indrapoera.

submaculatus SCHWARZ, 1902 (*Monocrepidius*)
Stett. ent. Ztg. 63, 230—231

Syntypen, Ecuador, Balzapamba.

DEI: 1 Syntypus, Ecuador, Balzapamba, leg. HAENSCH.

submaculatus SCHWARZ, 1902 (*Pyrophorus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 287—288

Syntypen, Ecuador, Balzapamba.

DEI: 1 Syntypus, Ecuador, Balzapamba, leg. HAENSCH.

submarmoratus SCHWARZ, 1903 (*Psephus*)
Arkiv Zoologi 1, 49—50

3 Syntypen, Kamerun, 2 Ex. von SJÖSTEDT, 1 Ex. von KRAATZ.

DEI: 1 Paralectotypus, Kamerun, SJÖSTEDT; 1 Paralectotypus, Kamerun; von GIRARD festgelegt.

subopacus SCHWARZ, 1902 (*Campsolesternus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 319

Syntypen, Sumatra.

DEI: 1 Syntypus, Sumatra.

subjectinatus SCHWARZ, 1902 (*Alaotypus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 308—309

2 ♂♂, Syntypen, Tonkin, Montes Mauson, leg. FRUHSTORFER.

DEI: 1 Syntypus, Tonkin, Montes Mauson, 2—3000 Fuß, 4.—5., leg. FRUHSTORFER.

subjectinatus SCHWARZ, 1902 (*Corymbites*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 361—362

Syntypen, Nord-Queensland.

DEI: 1 Syntypus, N. Queensland, leg. WEISKE.

subjectinatus SCHWARZ, 1902 (*Hemicrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 339—340

Holotypus (an den Fühlern und Beinen sehr defekt), Tonkin, Montes Mauson.

DEI: Holotypus, Tonkin, Montes Mauson, 4.—5., 2—3000 Fuß, leg. FRUHSTORFER.

subsericeus SCHWARZ, 1902 (*Alaus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 115

♀ Holotypus, Neu-Süd-Wales, im DEI.

substriatus SCHWARZ, 1906 (*Anoplischius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 100—101

Syntypen, Brasilia, Jatahy-Goyaz.

DEI: 2 Syntypen, Brasilien, Jatahy, Goyaz.

substriatus SCHWARZ, 1906 (*Chalcolepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 97—98

Syntypen, Arizona.

DEI: Lectotypus, 4 Paralectotypen, Arizona, von BECKER (Can. Ent. 43, 162—163; 1961) festgelegt.

subtuberculatus SCHWARZ, 1898 (*Lobotarsus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 132—133

Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♂, Paralectotypus, Kamerun, leg. CONRADT, von GIRARD festgelegt.

subvirescens SCHWARZ, 1904 (*Semiotus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 49—50

Syntypen, Ecuador, Balzapamba.

DEI: 1 Syntypus, Ecuador, Balzapamba, leg. HAENSCH.

sulcicollis SCHWARZ, 1902 (*Alaus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 313—314

♂♂ Syntypen, Shortland-Insel.

DEI: 1 Syntypus, Shortland-Insel.

sulcicollis SCHWARZ, 1902 (*Ischiodontus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 137—138

Syntypen, Ecuador, Archidona.

DEI: 1 Syntypus, Ecuador, Archidona, leg. HAENSCH.

sulcicollis SCHWARZ, 1908 (*Lacon*)
Soc. ent. 23, 73—74

Syntypen, Madagascar, Antananarivo.

DEI: 1 Syntypus, Madagascar, leg. SIKORA.

sulcicollis SCHWARZ, 1896 (*Pantolamprus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 93—94

Holotypus, Afrika, Aschanti, in Coll. SCHWARZ, im DEI.

sulcifrons SCHWARZ, 1901 (*Pomachilius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 330–331

Syntypen, Callanga, Peru.

DEI: 2 Syntypen, Callanga, Peru; 2 Syntypen, Peru.

suturalis SCHWARZ, 1902 (*Achrestus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 138–139

♂♂ Syntypen, Peru, Marcapata.

DEI: 3 Syntypen, Peru, Marcapata.

suturalis SCHWARZ, 1902 (*Horistonotus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 264–265

Syntypen, Peru, Callanga.

DEI: 6 Syntypen, Peru, Callanga.

suturalis SCHWARZ, 1901 (*Melanoxanthus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 327

Syntypen, Madagascar.

DEI: 2 Syntypen, Madagaskar.

suturalis SCHWARZ, 1906 (*Simodactylus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 354–355

1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Queensland.

DEI: 1 Syntypus, Queensland.

suturalis SCHWARZ, 1902 (*Spheniscosomus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 277–278

Syntypen, Ceram.

DEI: 1 Syntypus, Ceram, Illo, 1884, leg. RIBBE.

suturrellus SCHWARZ, 1902 (*Megapenthes*)
Stett. ent. Ztg. 63, 248–249

Syntypen, Madagascar.

DEI: 1 Syntypus, Madagascar, leg. SIKORA.

syriacus SCHWARZ, 1903 (*Elathous*)
Wien. ent. Ztg. 22, 208

Syntypen, Syrien, Beirut.

DEI: 1 Syntypus, Syria, Beirut.

taeniatus CANDÈZE, 1878 (*Melanoxanthus*)
Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova 12, 129

Zahlreiche Syntypen, Celebes, Kandari, 3. 1874, leg. BECCARI.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

taicana MIWA, 1930 (*Csikia*)
Wien. ent. Ztg. 47, 93

Holotypus, Formosa, Taihorinsho, 8. 1909, leg. SAUTER. Paratypen, Formosa: Mt. Arisan, 10. 10. 1912, leg. NITOE; Kwarenko, 7. 1926, leg. MIWA; Baibara, 7. 1926, leg. MIWA.

DEI: Holotypus, Formosa, Taihorinsho, 8. 1909, leg. SAUTER.

tanganus HAYEK, 1973 (*Adelocera*)
Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) Suppl. 20, 48–49; nom. nov. pro *minutus* SCHWARZ, 1903,
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 358

Syntypen, Tanga.

DEI: ♀ Lectotypus, Tanga, durch VON HAYEK (Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) Suppl. 20, 48–49; 1973) festgelegt.

taprobanensis SCHWARZ, 1901 (*Cardiophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 34–35

Syntypen, Ceylon: Matala; Kandy, leg. HORN.

DEI: 1 Syntypus, Matala.

tauricus HEYDEN, 1882 (*Agriotes*)
Dtsch. ent. Ztschr. 26, 155

2 Syntypen, Krim, Theodosia, leg. RETOWSKI.

DEI: 1 Syntypus, Theodosia, leg. RETOWSKI (ohne Kopf und Halsschild).

tauricus SCHWARZ, 1897 (*Ludius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1897, 400

Syntypen, Asia minor, Taurus cilic., leg. HOLTZ.

DEI: 2 Syntypen, Asia minor, Taurus Cilic., 1895, leg. HOLTZ.

tenebrosus SCHWARZ, 1898 (*Ludius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 411

♂♀ Syntypen, Java, Mont Kawie, Pasoeroean.

DEI: 2 Syntypen, Java, Pasoeroean, Mts. Kawie.

tenellus SCHWARZ, 1901 (*Melanoxanthus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 28–29

Syntypen, Ceylon: Nalanda; Trinkomalee, leg. HORN.

DEI: 3 Syntypen, Ceylon, Nalanda, 1899, leg. HORN; 1 Syntypus, Ceylon, Trinkomali, 1899, leg. HORN.

tenuiculus SCHWARZ, 1901 (*Melanoxanthus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 29—30

Syntypen, Ceylon, Haputale, leg. HORN.
DEI: 1 Syntypus, Haputale.

terminatus SCHWARZ, 1906 (*Aeolus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 132

Syntypen, Peru, Chanchamago.
DEI: 1 Syntypus, Peru, Chanchamago, ex Coll. SCHNEIDER.

terminatus SCHWARZ, 1906 (*Esthesopus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 147—148

Syntypen, Brasilien, St. Catharina.
DEI: 1 Syntypus, Colonia, Hansa, St. Catharina.

terminatus SCHWARZ, 1902 (*Paracosmesus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 151—152

Holotypus, Peru, Chanchamayo, leg. LANGE.
DEI: Holotypus, Peru, leg. LANGE.

testaceipennis SCHWARZ, 1904 (*Atractosomus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 70

Syntypen, Brasilien, leg. BRUCH.
DEI: 1 Syntypus, Brasil, 21. 10. 1901, leg. BRUCH.

testaceipennis SCHWARZ, 1900 (*Cardiophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 159—160

Syntypen, Dar-es-Salaam.
DEI: 1 Syntypus, Dar-es-Salaam, leg. v. BENNIGSEN.

testaceus SCHWARZ, 1902 (*Cylindroderus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 128

Syntypen, Brasilien, Yrimaguas.
DEI: 1 Syntypus, Yrimaguas.

testaceus SCHWARZ, 1904 (*Ischiodontus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 56—57

Syntypen, Columbien.
DEI: 1 Syntypus, Columbien.

testaceus SCHWARZ, 1902 (*Stichotomus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 336

Syntypen, Australien (ohne genauere Angaben).
DEI: ♂ Lectotypus, 2 ♂♂, Paralectotypen, Australien, von NEBOISS festgelegt.

tibialis SCHWARZ, 1900 (*Corymbites*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 111

Syntypen, Altai.
DEI: 1 Syntypus, Altai.

tigrinus SCHWARZ, 1905 (*Alaus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 286—287

♂♀ Syntypen, Benguela.
DEI: 2 Syntypen, Benguela.

tonkinensis SCHWARZ, 1902 (*Agonischius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 341—342

Syntypen, Tonking, Montes Mauson, leg. FRUHSTORFER.
DEI: 3 Syntypen, Tonkin, Montes Mauson, 2—3000 Fuß, 4.—5., leg. FRUHSTORFER.

tonkinensis SCHWARZ, 1902 (*Hemicrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 338—339

Syntypen, Tonkin, Montes Mauson.
DEI: 2 Syntypen, Tonkin, Montes Mauson, 4.—5., 2—3000 Fuß, leg. FRUHSTORFER.

trapezicollis SCHWARZ, 1903 (*Corymbites*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 59—60

♂♂ Syntypen, America borealis.
DEI: 1 Syntypus, Am. bor.

trapezicollis SCHWARZ, 1909 (*Psephus*)
Soc. ent. 24, 78

Syntypen, Kamerun, Barombi.
DEI: ♂ Lectotypus, Kamerun, Barombi, leg. CONRADT, von GIRARD festgelegt.

triangulus SCHWARZ, 1903 (*Lobotarsus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 362

Syntypen, Kamerun.
DEI: ♂ Lectotypus, Kamerun, leg. SJÖSTEDT, von GIRARD festgelegt.

triligatus SCHWARZ, 1902 (*Horistonotus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 266–267

Syntypen, Brasilien, Santos.

DEI: 3 Syntypen, Brasilien, Santos; 2 Syntypen, Santos, leg. METZ.

trilineatus SCHWARZ, 1902 (*Achrestus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 227–228

♂♀ Syntypen, Peru, La Merced.

DEI: 2 Syntypen, Peru, La Merced.

tristis SCHWARZ, 1891 (*Agriotes*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1891, 105; Taf. 2, Fig. 36

Syntypen, Türkei.

DEI: 1 Syntypus, Türkei, leg. MERKL, in Coll. HEYDEN.

trisulcatus SCHWARZ, 1903 (*Metablax*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 394–395

Syntypen, Australien.

DEI: Holotypus (teste NEBOISS), Australien.

trivittatus SCHWARZ, 1902 (*Aeolus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 323

Syntypen, Madagaskar, Plateau d l'Androy, Reg. d'Ambovombe.

DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

trivittatus SCHWARZ, 1904 (*Anoplishius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 53–54

Syntypen, Brasilien, B. Retro.

DEI: 1 Syntypus, B. Retro.

trivittatus SCHWARZ, 1901 (*Melanozanthus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 27

Syntypen, Ceylon, Weligama, leg. HORN.

DEI: 1 Syntypus, Ceylon, Weligama, 1899, leg. HORN.

tshukini REITTER, 1910 (*Athous*)
Wien. ent. Ztg. 29, 177–178

Mehrere ♂♂ Syntypen, Zentraler Nordabhang des Kaukasus bei Teberda, unweit der Quellen des Kuban, leg. PLIGINSKIY und ZOLOTAREW.

DEI: 1 Syntypus, Cauc. cent. bor., Teberda, 4200'–5000', leg. ZOLOTAREW.

tuberculatus SCHWARZ, 1903 (*Cardiophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 370–371

Syntypen, Afrika or., Micindani.

DEI: 3 Syntypen, Africa or., Micindani.

tumidicollis SCHWARZ, 1906 (*Horistonotus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 145

3 Syntypen, Mendoza.

DEI: 3 Syntypen, Mendoza.

tumidicollis SCHWARZ, 1902 (*Ludius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 330–331

Holotypus, Madras, im DEI.

tumidithorax SCHWARZ, 1907 (*Cardiophorus*)
Stett. ent. Ztg. 68, 80–81

Syntypen, Australien, Queensland.

DEI: 1 Syntypus, Queensland.

turkestanicus SCHWARZ, 1902 (*Lacon*)
Stett. ent. Ztg. 63, 198–199

Syntypen, Turkestan, Buchara.

DEI: 2 Syntypen, Buchara; 1 Syntypus, Turkestan.

umbraticollis SCHWARZ, 1909 (*Elastrus*)
Soc. ent. 24, 122–123

Syntypen, Madagascar, Montagne d'Ambre.

DEI: 1 Syntypus, Madagascar, Amberggeb.

umbratus SCHWARZ, 1906 (*Aeolus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 133

Syntypen, Brasilia merid., Curitiba, Paraná.

DEI: 1 Syntypus, Süd-Brasilien, Curitiba, Parana, 15. 6. 1887, leg. DÖRING-WANDSBECK.

undulatus SCHWARZ, 1902 (*Dioxypterus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 316–317

Syntypen, N. Guinea?

DEI: 1 Syntypus, Patria?, Fidschi Insel?

undulatus SCHWARZ, 1902 (*Elasmosomus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 215—217

Syntypen, Kamerun.

DEI: ♀ Lectotypus, Kamerun, von GIRARD festgelegt.

unicolor SCHWARZ, 1902 (*Horistonotus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 148

Syntypen, Peru, Marcapata.

DEI: 2 Syntypen, Peru, Marcapata.

unifasciatus SCHWARZ, 1902 (*Pomachilius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 146—147

Syntypen, Peru, Marcapata.

DEI: 1 Syntypus, Peru, Marcapata.

urgensis SCHWARZ, 1900 (*Athous*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 109

1 Syntypus, Urga; Syntypen, Amur.

DEI: 1 Syntypus, Urga; 1 Syntypus, Amur.

ustulatus SCHWARZ, 1902 (*Glyphochilus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 322—323

Syntypen, Sydney, im Mus. GODEFFROY.

DEI: 1 Syntypus, Sydney, Mus. GODEFFROY No. 11242.

ustulatus SCHWARZ, 1898 (*Melanozanthus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 146—147

♂♀ Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT.

DEI: 1 ♀ Syntypus, Kamerun, leg. CONRADT.

vadosus SCHWARZ, 1900 (*Cardiophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 154

Syntypen, Dar-es-Salaam.

DEI: 3 Syntypen, Dar-es-Salaam.

validus SCHWARZ, 1892 (*Melanotus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 35 (1891), 366

3 ♀♀, Syntypen, Margelan, in Coll. SCHWARZ, im DEI.

variabilis SCHWARZ, 1896 (*Psephus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 90—91

Syntypen, Dar-es-Salaam, leg. BENNIGSEN.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 Paralectotypus, Dar-es-Salaam, leg. v. BENNIGSEN; 2 Paralectotypen, Ost-Afrika, leg. v. BENNIGSEN; von GIRARD festgelegt.

variegatus SCHWARZ, 1902 (*Aeolus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 145—146

Syntypen, Brasilien, Petropolis.

DEI: 2 Syntypen, Petropolis, leg. SAHLBERG.

variegatus SCHWARZ, 1902 (*Alaus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 114—115

Syntypen, Queensland.

DEI: 2 Syntypen, Queensland.

variegatus SCHWARZ, 1902 (*Hypnoidus*)

Siehe *pictipennis* SCHWARZ, 1906

variegatus SCHWARZ, 1902 (*Paracardiophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 123—124

Syntypen, Australia mer., Victoria.

DEI: 1 Syntypus, Australia, Victoria.

variegatus SCHWARZ, 1902 (*Pericus*)
Stett. ent. Ztg. 63, 203—204

Syntypen, Birma.

DEI: ♀ Lectotypus, Birma, durch VON HAYEK (Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) Suppl. 20, 50—51; 1973) festgelegt.

variegatus SCHWARZ, 1904 (*Pomachilius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1904, 76—77

Syntypen, Sao Paulo.

DEI: 4 Syntypen, S. Paulo.

varipennis SCHWARZ, 1900 (*Cardiophorus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1900, 100—101

Syntypen; Buchara; Repetek; Merw; Turkmenien; Issyk-kul.

DEI: 1 Syntypus, Merw, Anger; 1 Syntypus, Issyk-Kul, Ton-Fluß; 1 Syntypus, Turkmenien, leg. LEDER, REITTER.

venaticus CANDEZE, 1860 (*Cardiophorus*)
Monographie des Elaterides 3, 214; Taf. 3, Fig. 30

Syntypen, Java, in Coll. HEYDEN.

DEI: 1 Syntypus, Java, HAENLEIN, in Coll. HEYDEN.

venustulus SCHWARZ, 1902 (*Glyphochilus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 319–320

♂♀ Syntypen, Sydney, aus dem Mus. GODEFFROY.

DEI: 1 Syntypus, Sidney, Mus. GODEFFROY No. 11233.

venustus SCHWARZ, 1903 (*Aeolus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 69–70

♂ Holotypus, Brasilien, St. Catharina, im Mus. Stettin.

DEI: 1 historisches Exemplar, S. Catharina, leg. LÜDERWALDT, ex Coll. SCHWARZ.

veriloquus COSTA, 1972 (*Pyrophorus*)
Papeis Avulsos Zool. S. Paulo 25, 202, 219–221, Fig. 8+8a

♂ Holotypus, Guatemala, leg. CONRADT, im Mus. Paris. Paratypen: 1 Ex., Mexico, Chiapas, N. W. Ocosingo, 8. 3. 1953, leg. SCHLINGER; 19 Ex., Guatemala; 1 Ex., Vera Paz, S. Cristobal; 1 Ex., Panama, Veraguas, leg. WARSZOWICZ.

DEI: 2 Paratypen, Guatemala, leg. CONRADT.

versicolor MULSANT, 1856 (*Cardiophorus*)
Opusc. ent. 7, 95–97

Syntypen, Süd-Frankreich.

DEI: 1 historisches Exemplar, vielleicht Type, Provence.

vetustus SCHWARZ, 1894 (*Melanotus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 38, 147–148

Mehrere Syntypen, Turkestan, Kulab.

DEI: 5 Syntypen, Turkestan, Kulab.

victoriae SCHWARZ, 1902 (*Alaus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 116–117

♂ Holotypus, Australia mer., Victoria, im DEI.

victoriae SCHWARZ, 1902 (*Corymbites*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 362

Syntypen, Australia mer., Victoria.

DEI: 2 Syntypen, Austr.

villigeroides REITTER, 1905 (*Athous*)
Best. Tab. 56, 55

1 ♂, Syntypus, Monte-Rosa, in Coll. HEYDEN; 1 ♀, Syntypus, Monte-Rosa, in Coll. REITTER.

DEI: 1 ♂, Syntypus, M. Rosa, leg. STAUDINGER, in Coll. HEYDEN.

virgatus SCHWARZ, 1903 (*Aeolus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 68–69

♂♀ Syntypen, Brasilien, St. Catharina.

DEI: 1 Syntypus, Brasilien, St. Catharina.

virgulus SCHWARZ, 1896 (*Pomachilius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 101–102

Syntypen, Brasilia.

DEI: 1 Syntypus, Brasilia.

viriditarsus SCHWARZ, 1906 (*Chalcolepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 97

♀♀ Syntypen, San Salvador.

DEI: 1 Syntypus, S. Salvador.

vitticollis SCHWARZ, 1902 (*Agonischius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 342–343

Syntypen, Borneo, Kina-Balu.

DEI: 1 Syntypus, N. Borneo.

vitticollis SCHWARZ, 1902 (*Crepidomenus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 329

Syntypen, Sidney.

DEI: ♂ Lectotypus, 1 ♂, Paralectotypus, Sidney, Mus. GODEFFROY, durch NEBOISS festgelegt.

vitticollis HELLER, 1935 (*Dioxypterus*)
Arb. morph. tax. Ent. 2, 265–267, Fig. 2

Syntypen, Salomo Insel Nova Georgia, Pauru, im Mus. Dresden und im DEI.

DEI: 1 Syntypus, Salomo I. Neu Georgia, Paura, leg. MALCHER.

vitticollis SCHWARZ, 1902 (*Monocrepidius*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 117–118

Syntypen; Australia merid., Melbourne; Nord Queensland

DEI: 1 Syntypus, Melbourne.

vitticollis SCHWARZ, 1903 (*Monocrepidius*)

siehe *maculicollis* SCHWARZ, 1906

vittiger HEYDEN, 1887 (*Agonischius*)

Horae Soc. ent. Ross. 21, 267—268

1 Syntypus, Korea; 1 Syntypus, Pecking, leg. STAUDINGER, in Coll. HEYDEN.
DEI: 1 Syntypus, Pecking, 1885, leg. STAUDINGER, in Coll. HEYDEN.

vuattouxi GIRARD, 1971 (*Propsephus*)

Bull. I. F. A. N. 33 (Sér. A), 602—603, Fig. 45, 47

♂ Holotypus, Afrika, Côte d'Ivoire, Lamto, 1.—6. 3. 1969; 6 Paratypen, vom selben Fundort, 10.—29. 2. 1968, 19. 3. 1969 und 10.—25. 4. 1968; alle leg. GIRARD.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, 10.—29. 2. 1968.

vulneratus SCHWARZ, 1906 (*Cylindroderus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 156—157

Syntypen, La Paz.

DEI: 1 Syntypus, Bolivia, La Paz.

vulneratus SCHWARZ, 1907 (*Megapenthes*)

Stett. ent. Ztg. 68, 77—78

Holotypus, Australia mer., im DEI.

weisei SCHWARZ, 1898 (*Anchastus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 190—191

♂♀ Syntypen, Ost-Afrika, Usambara.

DEI: 5 Syntypen, Usambara, leg. WEISE.

weisei SCHWARZ, 1898 (*Hemicleus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 183

Syntypen, Usambara, Ost-Afrika.

DEI: 1 Syntypus, Usambara, leg. WEISE.

weisei SCHWARZ, 1898 (*Laeon*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1898, 185—186

Syntypen, Ost-Afrika, Usambara.

DEI: ♀ Lectotypus, 1 ♀, Paralectotypus, Usambara, leg. WEISE, durch VON HAYEK (Bull. Br. Mus. nat. Hist. (Ent.) Suppl. 20, 51; 1973) festgelegt.

Wahrscheinlich nicht beschrieben:

argentatus QUELLE (*Elasmosomus*)

DEI: 1 Ex., Kamerun, leg. CONRADT, als Typus ausgezeichnet.

beckeri PEČIRKA (*Agriotes*)

DEI: 1 Ex., China, Tatsienlu-Kiulung, leg. REITTER, als Typus ausgezeichnet.

kiesencvetteri STIERLIN (*Agriotes*)

DEI: 1 Ex., Sarepta, als Typus ausgezeichnet.

lepidulus SCHWARZ (*Pomachilius*)

DEI: 2 Ex., Brasilien, Theresopolis, leg. SCHNEIDER, als Typen ausgezeichnet.

lepidus SCHWARZ (*Pomachilius*)

DEI: 3 Exemplare, Theresop., leg. SCHNEIDER, als Typen ausgezeichnet.

nanus PEČIRKA (*Hypnoidus*)

DEI: 1 Ex., Werchne-Udinsk, Trsbaikal, leg. MANDL, als Typus ausgezeichnet.

sareptanus STIERLIN (*Agriotes*)

DEI: 1 Ex., Sarepta, als Typus ausgezeichnet.

Eucnemidae

africanus SCHWARZ, 1902 (*Microrhagus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 351—352

Syntypen, Kamerun.

DEI: 1 Syntypus, Kamerun.

ater SCHWARZ, 1902 (*Lycan*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 353

Syntypen, Australien.

DEI: 1 Syntypus, Australien.

brunneipennis SCHWARZ, 1902 (*Lycan*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 353—354

Syntypen, Borneo.

DEI: 1 Syntypus, Borneo.

cephalotes FLEUTIAUX, 1924 (*Fornax*)
Bull. Soc. ent. France 1924, 156

Syntypen; Tonkin; Cho-Ganh, leg. Duport; Hoa-Binh, leg. COOMAN.
DEI: 1 Syntypus, Tonkin, Lac Thó, Hoa Binh, leg. DE COOMAN.

chevrolati STIERLIN, 1864 (*Microrhagus*)
Berl. ent. Ztschr. 8, 148–149

♂♀ Syntypen, Sicilien.
DEI: 2 Syntypen, Sicilien.

hamatus SCHWARZ, 1902 (*Scopulifer*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 355–356

Holotypus, Sumatra.
DEI: Holotypus, Sumatra, Mesogenus.

nigrolimbatus SCHWARZ, 1902 (*Thylacosternus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 356–357

Syntypen, Brasilien.
DEI: 1 Syntypus, Rio de Janeiro.

planifrons SCHWARZ, 1902 (*Hylochaes*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 352–353

Syntypen, Deutsch Neu Guinea.
DEI: 2 Syntypen, D. N. Guinea.

scutellaris FLEUTIAUX, 1896 (*Fornax*)
Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (Ser. 2) 16, 574–575

Syntypen; Mentawai, Si Oban, 4.–8.; Sipora, Sereinu, 5., 6. 1894; leg. MODIGLIANI.
DEI: 4 Syntypen, Mentawai, Si Oban, 4.–8. 1894, leg. MODIGLIANI.

Throscidae

atticus REITTER, 1921 (*Trixagus*)
Wien. ent. Ztg. 38, 69

Syntypen, Griechenland.
DEI: 1 Syntypus, Attica.

micado REITTER, 1921 (*Trixagus*)
Wien. ent. Ztg. 38, 68 nota

Syntypen, Japan, in Coll. KRAATZ.
DEI: 1 Syntypus, Japan.

schenklingi REITTER, 1921 (*Trixagus*)
Wien. ent. Ztg. 38, 71

Syntypen, Japan.
DEI: 1 Syntypus, Japan.

Chelonariidae

adstrictum MÉQUIGNON, 1934 (*Chelonarium*)
Arb. morph. tax. Ent. 1, 300

Holotypus, Brasilien, Santos, leg. METZ, im DEI.

declive MÉQUIGNON, 1934 (*Chelonarium*)
Arb. morph. tax. Ent. 1, 298

Holotypus, Brasilien, in Coll. SCHWARZ, im DEI.

horni MÉQUIGNON, 1934 (*Chelonarium*)
Arb. morph. tax. Ent. 1, 298–299

Syntypen; 1 Ex., Brasilien, leg. FRUHSTORFER, in Coll. GROUVELLE; 1 Ex., Brasilien, in Coll. KRAATZ; 1 Ex., Brasilien, Minas Geraes, sierra de Estrella, 1847, leg. LAPORTE DE CASTELNAU, im Mus. Paris.
DEI: 1 Syntypus, Brasilia.

inumbatum MÉQUIGNON, 1934 (*Chelonarium*)
Arb. morph. tax. Ent. 1, 296–297

4 Syntypen, Mexico, Chiapas, in Coll. KRAATZ.
DEI: 1 ♂, 1 ♀, Syntypen, Chiapas.

modestum MÉQUIGNON, 1934 (*Chelonarium*)
Arb. morph. tax. Ent. 1, 297

Holotypus, Guatemala, in Coll. SCHWARZ, im DEI.

parallepipenne MÉQUIGNON, 1934 (*Chelonarium*)
Arb. morph. tax. Ent. 1, 296

2 Syntypen, Mexico, leg. HOEGE, in Coll. KRAATZ.
DEI: 1 Syntypus, Mexico, leg. HOEGE.

posticum MÉQUIGNON, 1934 (*Chelonarium*)

Arb. morph. tax. Ent. 1, 299—300

Holotypus, Brasilien, Santa-Catharina, in Coll. SCHWARZ, im DEI.

sublampros MÉQUIGNON, 1934 (*Chelonarium*)

Arb. morph. tax. Ent. 1, 295—296

2 Syntypen, Mexico, Sierra de Durango; 1 Ex., in Coll. MÉQUIGNON; 1 Ex., in Coll. KRAATZ.

DEI: 1 Syntypus, Mexico, leg. HOEGE.

vartianae MANDL, 1967 (*Chelonarium*)

Ann. Nat. Hist. Mus. Wien 70, 443—444

Holotypus, 4 Paratypen, Afghanistan, 25 km N von Barikot, 1300 m, 12.—17.7. 1963, leg. KASY & VARTIAN. Holotypus 2 Paratypen, im Mus. Wien, 2 Paratypen, in Coll. MANDL.

DEI: 1 Paratypus, Afghanistan, 25 km N. v. Barikot, 1800 m, Nuristan, leg. KASY & VARTIAN.

Wahrscheinlich nicht beschrieben:

maulazi MÉQUIGNON (*Chelonarium*)

DEI: 1 Ex., Bresil, Et. de Rio de Janeiro, Nova Friburgo, 2—3—4 1903, leg. GROUVELLE, als Cotypus ausgezeichnet.

Buprestidae

abeillei OBENBERGER, 1914 (*Acmaeodera*)

Ent. Bl. 10, 251

Syntypen, Algier, in Coll. OBENBERGER.

DEI: 1 Paralectotypus, Algérie, von VOLKOVITSH festgelegt.

acastus KERREMANS, 1912 (*Agrilus*)

Arch. Nat. 78 A 11, 114

Syntypen, Formosa, Kankau, leg. SAUTER.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kankau, 7. 4. 1912, leg. SAUTER.

achilleus OBENBERGER, 1935 (*Agrilus*)Časopis 32, 121; nom. nov. pro *myrmido* KERREMANS, 1912, Arch. Nat. 78 A 7, 208—209

Syntypen, Formosa, Taihorinsho, 7. 1909, leg. SAUTER.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Taihorinsho, 7. 9., leg. SAUTER.

adenostomae CAZIER, 1939 (*Acmaeodera*)

Bull. S. Calif. Acad. Sci. 37 (1938), 137—138

♀ Holotypus, Sunset Valley, Santa Barbara County, California, 14. 7. 1938, an *Adenostoma fasciculatum*, leg. CAZIER, in Coll. CAZIER. 106 Paratypen von verschiedenen kalifornischen Fundorten, siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben des Holotypus.

aeneiventris JAKOWLEFF, 1886 (*Sphenoptera*)

Horae Soc. ent. Ross. 20, 91—92

Syntypen, Mesopotamien, Malatia, in Coll. HEYDEN.

DEI: 1 Syntypus, Mesopotamien, Malata, STAUDIGR. 85.

aeneocuprea KERREMANS, 1914 (*Anthaxia*)

Arch. Nat. 79 A 8 (1913), 103—104

Syntypen, Formosa, Bانشoryo Distr., Sokutsu, leg. SAUTER.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Bانشoryo-Distr., Sokutsu, 7. 8. 1912, leg. SAUTER.

aeneomicans KRAATZ, 1882 (*Sphenoptera*)

Dtsch. ent. Ztschr. 26, 317—318

Holotypus, Samarkand, leg. HABERHAUER, durch STAUDINGER, in Coll. HEYDEN, im DEI.

aeneus KERREMANS, 1900 (*Sambus*)

Mem. Soc. ent. Belg. 7, 19—20

♂♀ Syntypen, Sumatra, Padang oder Hindrapoera, 1884 und 1896, leg. WEYERS.

DEI: 2 Syntypen, Sumatra W. C., Indrapoera, leg. WEYERS.

aerata JAKOWLEFF, 1887 (*Sphenoptera*)

Horae Soc. ent. Ross. 21, 62—64

♂♂ ♀♀ Syntypen, Persien, leg. CHRISTOPH, in Coll. KRAATZ.

DEI: 1 Syntypus, Persien.

aesopus KERREMANS, 1912 (*Coraeus*)

Arch. Nat. 78 A 11, 111

Syntypen, Formosa, Kosempo, leg. SAUTER.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kosempo, 22. 5. 1912, leg. SAUTER.

affinis KERREMANS, 1900 (*Aphanisticus*)

Mem. Soc. ent. Belg. 7, 41—42

Syntypen, Sumatra, Padang oder Hindrapoera, 1884 und 1896, leg. WEYERS.

DEI: 1 Syntypus, Sumatra W. C., Indrapoera, leg. WEYERS; 14 Syntypen, Sumatra.

agriloides KERREMANS, 1900 (*Aphanisticus*)
Mem. Soc. ent. Belg. 7, 38

Syntypen, Sumatra, Padang oder Hindrapoera, 1884 und 1896, leg. WEYERS.
DEI: 9 Syntypen, Sumatra.

ajaz KERREMANS, 1912 (*Agrilus*)
Arch. Nat. 78 A 7, 207

Syntypen, Formosa: Kosempo, 9. 1909, 8. 1911; Alikang, 10. 1909; leg. SAUTER.
DEI: 2 Syntypen, Formosa, Kosempo, 9. 1909/7. 1911, leg. SAUTER; 1 Syntypus, Alikang, 10. 1909, leg. SAUTER.

akbesiana OBENBERGER, 1919 (*Sphenoptera*)
Arch. Nat. 85 A 3, 120–121

Syntypen; Syria, Akbes, in Coll. WINKLER; Libanon, in Coll. OBENBERGER.
DEI: 1 Syntypus, Libanon.

amasina K. DANIEL, 1903 (*Anthaxia*)
Münch. Kol. Ztschr. 1, 252

Syntypen, Kleinasien.
DEI: 1 Syntypus, Asia minor, Aski-Chehir, leg. v. BODEMEYER.

analís OBENBERGER, 1925 (*Hylaeogena*)
Sborn. ent. odd. Nar. Mus. Praze 3, 82, 135, 145, Fig. 108

Syntypen, Brasilien, Sao Paulo.
DEI: 2 Syntypen, Brasilia, Sao Paulo, leg. MRÁZ.

angelica OBENBERGER, 1915 (*Sphenoptera*)
Ent. Bl. 11, 54–55

Syntypen, Araxesufer, leg. VESELÝ.
DEI: 1 Syntypus, Caucasus.

anthracina OBENBERGER, 1926 (*Acmaeodera*)
Arch. Nat. 92 A 9, 88–89+18

Syntypen; Transvaal (HOLUB); S. W. Protectorate: Narebiz (Mus. Capetown); Otjimbumbo, Kunene River, 3. 1923 (Mus. Capetown); Loc. ?, (British Mus.).
DEI: 1 Syntypus, Transvaal, Coll. OBENBERGER.

antiqua ausonica OBENBERGER, 1927 (*Sphenoptera*)
Sborn. ent. odd. Nar. Mus. Praze 3, 95

Syntypen; Sicilia; Rumelia or., Studenec.
DEI: 1 Syntypus, Sicilia.

araxana OBENBERGER, 1915 (*Sphenoptera*)
Ent. Bl. 11, 52–53

Wenige Syntypen, Gebüsch bei Ordubad am Araxes, leg. VESELÝ.
DEI: 1 Syntypus, Araxes, leg. VESELÝ.

araxicola OBENBERGER, 1916 (*Trachys*)
Arch. Nat. 82 A 11, 25+58

Syntypen, Kaukasus, Araxestäl.
DEI: 1 Syntypus, Caucasus, Araxesthal, leg. LEDER, REITTER.

arcuatus OBENBERGER, 1925 (*Pachyschelus*)
Sborn. ent. odd. Nar. Mus. Praze 3, 78, 121–122, Fig. 61

Syntypen; Brasilien, Sao Paulo; Paraguay.
DEI: 3 Syntypen, Brasilia, Sao Paulo, leg. MRÁZ.

argenteus KERREMANS, 1914 (*Sambus*)
Arch. Nat. 79 A 8 (1913), 104

Syntypen, Formosa, Kankau, Koshun, leg. SAUTER.
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kankau (Koshun), 4. 1912, leg. SAUTER.

argentinus OBENBERGER, 1924 (*Paragrillus*)
Arch. Nat. 90 A 3, 145

Syntypen; Argentinien, Corrientes; La Merced.
DEI: 1 Syntypus, Argentina, Prov. Corrientes, leg. BRUCH.

armeniaca cypria OBENBERGER, 1917 (*Julodis*)
Col. Rundsch. 6, 48

Zahlreiche Syntypen, Nicosia, Cyprus.
DEI: 1 Syntypus, Cyprus, Nicosia.

aspera KERREMANS, 1892 (*Parataenia*)
Ann. Soc. ent. Belg. 36, 54–55

18 Syntypen; Sierra-Leone; Gabun; Camerun und Congo; im Mus. Brüssel, Coll. OBERTHÜR, MEYER-DARCIS und KERREMANS.
DEI: 1 Syntypus, Gabon, MEYER-DARCIS.

aureonitens OBENBERGER, 1919 (*Paragrillus*)
Ent. Mitt. 8, 22–23

Syntypen, Costa Rica, Surrubres, 300', leg. HEYNE; einige Ex. in Coll. OBENBERGER.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

auropictus KERREMANS, 1912 (*Agrilus*)

Arch. Nat. 78 A 7, 208

Syntypen, Taihorin, 9. 1911, leg. SAUTER.

DEI: 2 Syntypen, Formosa, Taihorin, 7. 6. 1911, leg. SAUTER.

bacchus KERREMANS, 1912 (*Agrilus*)

Arch. Nat. 78 A 11, 114

Syntypen, Formosa, Sokutsu (Banshoryo Distr.), leg. SAUTER.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Sokutsu, Banshoryo Distr., 7. 6. 1912, leg. SAUTER.

bantuensis OBENBERGER, 1916 (*Sphenoptera*)

Ztschr. wiss. Ins. Biol. 1, 18

Syntypen, Südkamerun, Joko, 9., durch HEYNE.

DEI: 2 Syntypen, Südkamerun, Joko, 9.

baobdii OBENBERGER, 1913 (*Agrilus*)

Ent. Mitt. 2, 338—339; Taf. 3, Fig. 5

4 Syntypen, Marokko, 3 Ex., in Coll. OBENBERGER, 1 Ex., im DEI.

DEI: 1 Syntypus, Marocco.

bartoni OBENBERGER, 1940 (*Acmaeodera*)

Sborn. Nar. Mus. Praze 2B (Zool. 3), 127—128

Syntypen, Creta, Levka Ori, 1938, leg. ŠTĚPÁNEK & TÁBORSKÝ.

DEI: 1 Paralectotypus, mit den Angaben der Beschreibung, von VOLKOVITSH festgelegt.

baudii OBENBERGER, 1914 (*Anthaxia*)

Col. Rundsch. 3, 131

Syntypen, Sardinien, Korsika, in Coll. OBENBERGER, 1 Ex., in Coll. LEONHARDT.

DEI: 1 Syntypus, Sardinien.

bedoci BOURGOIN, 1924 (*Lampra*)

Bull. Soc. ent. France 1924, 138

♂♀ Syntypen; Tonkin, Cho Gauh, leg. DUPORT; Hoa Binh, durch BÉDOC.

DEI: 1 Syntypus, Tonkin, Hoa-Binh.

bennigseni KERREMANS, 1899 (*Agrilus*)

Ann. Soc. ent. Belg. 43, 281—282

Syntypen, Usagora, leg. v. BENNIGSEN.

DEI: 1 Syntypus, Westusambara, ex Coll. v. BENNIGSEN.

bennigseni OBST, 1906 (*Julodis*)

Ann. Soc. ent. Belg. 50, 168—169

Syntypen, Deutsch Südwest-Afrika, Windhoek.

DEI: 1 Syntypus, D.S.W. A., Windhoek, ex Coll. v. BENNIGSEN.

bennigseni KRAATZ, 1896 (*Pseudocastalia*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 86

1 Syntypus, Zanzibar, Usaramo, in Coll. KRAATZ; 1 Syntypus, Zanzibar, Pare Gebirge, in Coll. v. BENNIGSEN.

DEI: 1 Ex., Usaramo, von HOLM irrtümlich als Holotypus ausgezeichnet, hiermit als Lectotypus festgelegt.

bicolor OBST, 1906 (*Julodis*)

Ann. Soc. ent. Belg. 50, 169—170

Syntypen, D. S. W.-Afrika, Omaruru, leg. VOLKMANN, 1 Ex., in Coll. v. BENNIGSEN.

DEI: 1 Syntypus, D. S. W. A., ex Coll. v. BENNIGSEN.

bilobiceps certulus OBENBERGER, 1937 (*Aphanisticus*)

Sborn. ent. odd. Nar. Mus. Praze 15, 18; als var. beschrieben

Syntypen, Afrika, Ukerewe.

DEI: 1 Syntypus, Ukerewe.

bodemeyeri JAKOWLEFF, 1900 (*Sphenoptera*)

Horae Soc. ent. Ross. 34, 501—503

♀♀ Syntypen, Kleinasien, Eski-Chehir, leg. v. BODEMEYER.

DEI: 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, davon 3 Ex. in Coll. HEYDEN.

bodoani KERREMANS, 1911 (*Anthaxia*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1911, 634

Syntypen, Kleinasien, Tschakit-Thal.

DEI: 1 Syntypus, Asia-turquie, Tschakit-Thal, leg. v. BODEMEYER.

breiti OBENBERGER, 1919 (*Sphenoptera*)

Arch. Nat. 85 A 3, 117—118

Syntypen, Mesopotamien, Mossul, 5. 1909, leg. HAUSER, in Coll. BREIT, KNIRSCH und OBENBERGER.

DEI: 1 Syntypus, Mesopotamien, Assur, 3. 08.

canadensis OBENBERGER, 1917 (*Agrilus*)

Ent. Bl. 13, 181

Syntypen, Kanada, mehrere Ex. in Coll. OBENBERGER.

DEI: 1 Syntypus, Kanada.

capensis OBENBERGER, 1926 (*Acmaeodera*)
Arch. Nat. 92 A 9, 19+86-87

Syntypen, Kap der guten Hoffnung.
DEI: 1 Syntypus, Südafrika.

carminea KERREMANS, 1900 (*Chrysobothris*)
Ann. Soc. ent. Belg. 44, 305-306

♂♀ Syntypen, Brasilien, Goyaz, Jatahy, leg. DONCKIER.
DEI: 1 Syntypus, Brésil, Prov. Goyas, Jatahy.

chalcichroa OBENBERGER, 1914 (*Sphenoptera*)
Col. Rundsch. 3, 132-133

Syntypen, Ägypten, in Coll. OBENBERGER.
DEI: 1 Syntypus, Aegypten.

clarescens KERREMANS, 1909 (*Sphenoptera*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1909, 283

Holotypus, Persien, Luristan, leg. v. BODEMEYER, im DEI.

cleopatra OBENBERGER, 1913 (*Anthaxia*)
Col. Rundsch. 2, 64-65

6 Syntypen, Tripolis, in Coll. OBENBERGER.
DEI: 1 Syntypus, Tripolis.

clymene OBENBERGER, 1924 (*Psiloptera*)
Arch. Nat. 90 A 3, 58

Syntypen, Usambara.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundortangaben; 16 Syntypen, Kwai, Usambara; 1 Syntypus, Usambara; 1 Syntypus, Ost-Afrika.

coerulea JAKOWLEFF, 1899 (*Sphenoptera*)
Horae Soc. ent. Ross. 32 (1898), 559-561

♀♀ Syntypen, Persien, in Coll. HEYDEN.
DEI: 1 Syntypus, Persien, Luristan, leg. v. BODEMEYER; 2 Syntypen, Sultanabad, leg. v. BODEMEYER; in Coll. HEYDEN.

coeruleipennis THÉRY, 1934 (*Aphanisticus*)
Bull. et Ann. Soc. ent. Belg. 74, 148-149

Syntypen, Sumatra, Buitenzorg, leg. KANNEGIEIER, in Coll. THÉRY.
DEI: 1 Syntypus, Buitenzorg, ± 1000', 2^{de} Sem. 90, leg. KANNEGIEIER.

coeruleus KERREMANS, 1900 (*Endelus*)
Mem. Soc. ent. Belg. 7, 46

Zahlreiche Syntypen, Sumatra, Padang oder Hindrapoera, 1884 und 1896, leg. WEYERS.
DEI: 2 Syntypen, Sumatra W. C., Indrapoera, leg. WEYERS; 6 Syntypen, Sumatra.

collaris KERREMANS, 1900 (*Callimicra*)
Ann. Soc. ent. Belg. 44, 350-351

Syntypen, Goyaz, Jatahy, leg. DONCKIER.
DEI: 1 Syntypus, Brésil, Jatahy, Prov. Goyaz.

collaris KERREMANS, 1900 (*Endelus*)
Mem. Soc. ent. Belg. 7, 45-46

Syntypen, Sumatra, Padang oder Hindrapoera, 1884 und 1896, leg. WEYERS.
DEI: 4 Syntypen, Sumatra.

combinatrix OBENBERGER, 1919 (*Sphenoptera*)
Arch. Nat. 85 A 3, 124-125

Syntypen, Transkaspien, Penschdeh.
DEI: 1 Syntypus, Transcasp., Inam-baba.

comptus KERREMANS, 1900 (*Agrilus*)
Ann. Soc. ent. Belg. 44, 331

Syntypen, Brasilien, Goyaz, Jatahy, leg. DONCKIER.
DEI: 1 Syntypus, Brésil, Jatahy, Prov. Goyaz.

confusa KERREMANS, 1912-13 (*Sphenoptera*)
Monogr. Bupr. 6, 104

Syntypen, Persien, Luristan, leg. v. BODEMEYER, in den Coll. HEYDEN, THÉRY und KERREMANS.
DEI: 1 Syntypus, Persien, Luristan, leg. v. BODEMEYER, in Coll. HEYDEN.

coreana OBENBERGER, 1917 (*Buprestis*)
Col. Rundsch. 6, 50-51

Syntypen; Korea, Seoul; China; 1 ♂, 1 ♀, in Coll. OBENBERGER.
DEI: 1 Syntypus, China.

corporeaali OBENBERGER, 1924 (*Trachys*)
Treubia 6, 27

Zahlreiche Syntypen, Sumatra, Ostküste, Sibolangit, 550 m, 10. 1921, leg. LOERTZING & CORPORAAL, im Mus. Buitenzorg, Prag und im DEI.
DEI: 5 Syntypen, Sibolangit, 7. 1921, leg. D. v. L.

costata OBENBERGER, 1916 (*Meliboeopsis*)
Ztschr. wiss. Ins. Biol. 1, 12

4 Syntypen, Nord-Nyassa-See, Utenpule Usafua, 1500 m, 6. 1909, leg. GOETZE.
DEI: 1 Syntypus, Nord-Nyassa-See, Utenpule Usafua, 1500 m, 1899, leg. GOETZE.

crassiceps JAKOWLEFF, 1887 (*Sphenoptera*)
Horae Soc. ent. Ross. 21, 75—76

Syntypen, Kleinasien, Malatia, in Coll. KRAATZ.
DEI: 1 Syntypus, Malatia, Mesopotam., 1885, leg. STAUDGR., in Coll. HEYDEN.

cratomerina OBENBERGER, 1922 (*Anthaxia*)
Ent. Bl. 18, 127

Syntypen; West-Usambara; Transvaal.
DEI: 1 Syntypus, West-Usambara.

crinita maroccana OBENBERGER, 1916 (*Acmacodera*)
Wien. ent. Ztg. 35, 237; als var. beschrieben

2 Syntypen, Marokko, in Coll. OBENBERGER.
DEI: 1 Paralectotypus, Marocco, von VOLKOVITSH festgelegt.

ctesias KERREMANS, 1912 (*Agrilus*)
Arch. Nat. 78 A 11, 115

Syntypen, Formosa, Kankau, leg. SAUTER.
DEI: 3 Syntypen, Formosa, Kankau (Koshun), 4. 1912, leg. SAUTER.

cupreosplendens KERREMANS, 1912 (*Lampra*)
Arch. Nat. 78 A 7, 203—204

Syntypen, Formosa, Kosempo, 7. 1911, leg. SAUTER.
DEI: 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

cupricauda CARTER, 1927 (*Neospades*)
Proc. Linn. Soc. N. S. Wales 52, 228—229

♂ Holotypus, 18 ♂♂, 9 ♀♀, Paratypen, Northern Territory, King River, leg. SPENCER.
DEI: 1 ♂, 1 ♀, Paratypen, King R., 24. 12. 1915.

cupricollis KERREMANS, 1903 (*Psiloptera*)
In: WYTSMAN, Gen. Ins. Bupr. 12, 96

Syntypen, Engl. Ost-Afrika, Mengia.
DEI: 1 Syntypus, Engl. O. Afrika.

cuprinus KERREMANS, 1897 (*Brachys*)
Mem. Soc. ent. Belg. 6, 137

Syntypen, Brasilien, Jatahy, Goyaz, leg. PUJOL.
DEI: 2 Syntypen, Brésil, Prov. Goyas, Jatahy.

cuprosus OBENBERGER, 1923 (*Agrilus*)
Tijdschr. Ent. 66, 15—16

Syntypen; Cameroon, Tiko b. Victoria, 1. 1. 1915, leg. v. ROTHKIRCH; Buea; in Coll. VAN ROON, STAUDINGER, v. MÜHLHEIM, OBENBERGER.
DEI: 1 Syntypus, Kamerun, Buea.

curtii OBENBERGER, 1913 (*Agrilus*)
Col. Rundsch. 2, 32; als var. von *albogularis* GORY beschrieben

1 Syntypus, Uj-Pest, 12. 7. 1910, leg. PEČIRKA; 1 Syntypus, Bisamberg bei Wien; 1 Syntypus, Wien, Umgebung, leg. CURTI, in Coll. OBENBERGER.
DEI: 1 Syntypus, Hungaria, Uj. Pest, 12. 7. 1910.

decastigma leonhardi OBENBERGER, 1924 (*Melanophila*)
Jubilejni sborn. Cs. ent. spol., 25

Syntypen, Dsungaria, in Coll. LEONHARD und OBENBERGER.
DEI: 3 Syntypen, Dsungarei, Karlyk Tak., 5.—6. 1908.

depressifrons KERREMANS, 1900 (*Agrilus*)
Ann. Soc. ent. Belg. 44, 326—327

Syntypen, Brasilien, Goyaz, Jatahy, leg. DONCKIER.
DEI: 1 Syntypus, Brésil, Jatahy, Prov. Goyas.

dives JAKOWLEFF, 1902 (*Sphenoptera*)
Horae Soc. ent. Ross. 35, 573—575, 580

Syntypen; Buchara, durch STAUDINGER & BANG-HAAS; Hissar, Oberlauf des Toupalang, durch WILLBERG, in Coll. SEMENOW.
DEI: 1 Syntypus, Buchara, STAUDINGER.

dolatus KERREMANS, 1897 (*Agrilus*)
Mem. Soc. ent. Belg. 6, 119

Syntypen, Brasilien, Goyaz, Jatahy, leg. PUJOL.
DEI: 1 Syntypus, Brésil, Jatahy, Prov. Goyas.

ebenina JAKOWLEFF, 1900 (*Sphenoptera*)
Horae Soc. ent. Ross. 34, 498–499

♂♂ Syntypen, Alai, durch STAUDINGER.

DEI: 1 Syntypus, Turkestan, Alai, STAUDINGER, in Coll. HEYDEN.

elongatus KERREMANS, 1900 (*Endelus*)
Mem. Soc. ent. Belg. 7, 44–45

Mehrere Syntypen, Sumatra, Padang oder Hindrapoera, 1884 und 1896, leg. WEYERS.

DEI: 1 Syntypus, Sumatra, leg. WEYERS; 3 Syntypen, Sumatra W. C., Indrapoera, leg. WEYERS.

emmerichi OBENBERGER, 1934 (*Coroebus*)
Casopsis 31, 43–44

Syntypen, China, Tatsienlu-Kiulung, leg. REITTER.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

erratrix OBENBERGER, 1919 (*Sphenoptera*)
Arch. Nat. 85 A 3, 125

2 Syntypen, China, in Coll. OBENBERGER.

DEI: 1 Syntypus, China.

eugeni JAKOWLEFF, 1899 (*Sphenoptera*)
Horae Soc. ent. Ross. 32 (1898), 554–555

♂♂ Syntypen, Transcaucasie, Tiflis, leg. KÖNIG.

DEI: 1 Syntypus, Caucasus, Tiflis, leg. KOENIG.

excisa JAKOWLEFF, 1887 (*Sphenoptera*)
Horae Soc. ent. Ross. 21, 68–69

♂♀ Syntypen, Sardinien, in Coll. KRAATZ und HEYDEN.

DEI: 1 Syntypus, Sardinien, in Coll. HEYDEN.

flavofasciata latisquammis OBENBERGER, 1914 (*Acmaeodera*)
Ent. Bl. 10, 254

Syntypen; Ungarn; Griechenland, Saloniki; von KRÜPER erhalten.

DEI: 3 Paralectotypen, Ungarn, von VOLKOVITSH festgelegt.

formosana KERREMANS, 1912 (*Trachys*)
Arch. Nat. 78 A 7, 209

Syntypen, Formosa, Taihorinsho, 8. 1909, leg. SAUTER.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Taihorinsho, 8. 1909, leg. SAUTER.

formosanus KERREMANS, 1912 (*Agrilus*)
Arch. Nat. 78 A 7, 205–206

Syntypen, Formosa, Taihorin, 6. 1911, leg. SAUTER.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

fossa KERREMANS, 1909 (*Sphenoptera*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1909, 271–272

Syntypen, Persien, Luristan, leg. v. BODEMEYER.

DEI: 1 Syntypus, Persien, Luristan, leg. v. BODEMEYER, in Coll. HEYDEN.

fuelleborni KOLBE, 1901 (*Sternocera*)
Sitzber. Ges. nat. Freunde 1901, 83–84

Mehrere Syntypen, Konde-Unyika am Nordende des Nyassa-Sees, leg. FÜLLEBORN; Syntypen, Gegend zwischen Poroto und dem Rukwa-See, Anfang 8. 1899, leg. GOETZE.

DEI: 1 Syntypus, N.-Nyassa-See, Konde-Unyika, 1. 1900, leg. FÜLLEBORN.

gentilis KERREMANS, 1895 (*Trachys*)
Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (Sér. 2) 14, 540–541

Syntypen, Sumatra, Si-Rambé, leg. MODIGLIANI.

DEI: 2 Syntypen, Sumatra.

gestroi OBENBERGER, 1924 (*Paragrilus*)
Arch. Nat. 90 A 3, 144–145

Syntypen; Paraguay, Asuncion; S. Bernardino, 9. 1898, leg. BOGGIANI, im Mus. Genua.

DEI: 1 Syntypus, Paraguay.

glabricollis OBENBERGER, 1929 (*Sphenoptera*)
Coll. Centralbl. 4, 33

Syntypen, Kleinasien, Eski Chehir.

DEI: 1 Syntypus, Klein-Asien, Eski-Chehir, leg. v. BODEMEYER.

granulipennis THÉRY, 1928 (*Anthaxia*)
Ent. Mitt. 17, 77–79

♀ Holotypus, Tipolti, Baikal, im DEI.

grusinus OBENBERGER, 1917 (*Agrilus*)
Wien. ent. Ztg. 36, 209–210

2 Syntypen, Ost-Kaukasus, Kasum-Kjant, in Coll. OBENBERGER.

DEI: 1 Syntypus, Kasum-Kjant, Ca.or., CHRISTOPH.

helferi OBENBERGER, 1939 (*Yermoella*)
Arb. morph. tax. Ent. 6, 264—265

1 Syntypus, Californien, Yermo, 15. 5. 1937, leg. SCOTT, in Coll. OBENBERGER; 1 Syntypus, S. Cal., NICOLAY, im DEI.
DEI: Lectotypus, S. Cal., NICOLAY, von NELSON festgelegt.

hellenica OBENBERGER, 1914 (*Acmaeodera*)
Ent. Bl. 10, 252

Syntypen, ohne Fundortangaben.
DEI: 1 Paralectotypus, Saloniki, von VOLKOVITSH festgelegt.

helvetica STIERLIN, 1868 (*Anthaxia*)
Mitt. Schw. ent. Ges. 2, 345—346

Mehrere Syntypen, Engadin; 2 Syntypen, Monte Rosa, 5500'.
DEI: 1 Syntypus, Engadin; 1 Syntypus, Macugnaga.

heva KERREMANS, 1902 (*Julodis*)
Bull. Soc. ent. France 1902, 38

Syntypen, West-Afrika, Benguela, durch DONCKIER.
DEI: 3 Syntypen, Benguela.

heynei OBENBERGER, 1917 (*Agrilus*)
Col. Rundsch. 6, 35—36

Zahlreiche Syntypen, Costa-Rica, 300', Surubres, durch HEYNE, in Coll. OBENBERGER.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

heynei OBENBERGER, 1916 (*Sphenoptera*)
Ztschr. wiss. Ins. Biol. 1, 11

Ca. 20 Syntypen, Südkamerun, Joko, 7., von HEYNE.
DEI: 3 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

hoplisturoides OBENBERGER, 1916 (*Sphenoptera*)
Wien. ent. Ztg. 35, 255—256

Wenige Syntypen, Turcia, in Coll. OBENBERGER.
DEI: 1 Syntypus, Turcia.

horni THÉRY, 1941 (*Belgaumia*)
Bull. Soc. ent. France 46, 91—92, Fig. 1

Holotypus, Malacca, im DEI.

horni KERREMANS, 1914 (*Sambus*)
Arch. Nat. 79 A 8 (1913), 104—105

Syntypen, Formosa, Kankau, Koshun, leg. SAUTER.
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kankau, Koshun, 5. 1912, leg. SAUTER.

horni KERREMANS, 1908 (*Stigmodera*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1908, 64—65

55 Syntypen, Queensland, leg. ROLLE, im DEI.
DEI: 1 Syntypus, Queensland, Kuranda (Cairns), ROLLE.

horni KERREMANS, 1912 (*Trachys*)
Arch. Nat. 78 A 11, 116

Syntypen, Formosa, Kankau (Koshun), leg. SAUTER.
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kankau (Koshun), 5. 1912, leg. SAUTER.

hornianus KERREMANS, 1912 (*Agrilus*)
Arch. Nat. 78 A 7, 206

Syntypen, Formosa, Taihorin, 7. 1911, leg. SAUTER.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

igniceps JAKOWLEFF, 1886 (*Sphenoptera*)
Horae Soc. ent. Ross. 20, 89—90

Syntypen, Mesopotamien, Malatia, in Coll. HEYDEN.
DEI: 1 Syntypus, Mesopotamien, Malatia, in Coll. HEYDEN.

indistincta SAUNDERS, 1869 (*Stigmodera*)
Insecta Saundersiana 3, 11—12; Taf. 1, Fig. 16

Syntypen, Neu S. Wales.
DEI: 1 Syntypus, ohne Fundortangaben.

infranitens KERREMANS, 1912 (*Chrysobothris*)
Arch. Nat. 78 A 7, 204

Syntypen, Formosa, Kosempo, 10. 1909, leg. SAUTER.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

insulicola KERREMANS, 1912 (*Agrilus*)
Arch. Nat. 78 A 7, 205

Syntypen, Formosa, Taihorin, 6. 1911, leg. SAUTER.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

insulicola KERREMANS, 1912 (*Coraeus*)
Arch. Nat. 78 A 7, 205

Syntypen, Formosa, Kosempo, 6. 1911, leg. SAUTER.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

intrusus KERREMANS, 1914 (*Agrilus*)
Arch. Nat. 79 A 8 (1913), 105–106

Syntypen, Formosa, Kankau, Koshun, leg. SAUTER.
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kankau (Koshun), 4. 1912, leg. SAUTER.

iranica OBENBERGER, 1937 (*Trachys*)
Sborn. ent. odd. Nar. Mus. Praze 15, 43–44

Syntypen, Iran, Masenderan.
DEI: 1 Syntypus, Persien, Masendran, leg. REITTER.

ixion KERREMANS, 1912–1913 (*Sphenoptera*)
Monogr. Bupr. 6, 74; Taf. 33, Fig. 3

Syntypen, Persien, Luristan, leg. v. BODEMEYER, in Coll. THÉRY, HEYDEN, KRAATZ und KERREMANS.
DEI: 3 Syntypen, Persien, Luristan, leg. v. BODEMEYER, davon 1 Ex. in Coll. HEYDEN.

judaeorum OBENBERGER, 1914 (*Acmaeodera*)
Ent. Bl. 10, 253–254

Syntypen, Palästina und Syrien.
DEI: 1 Paralectotypus, Palaestina, von VOLKOVITSH festgelegt.

kerremansi THÉRY, 1927 (*Endelus*)
Ann. Bull. Soc. ent. Belg. 67, 87; nom. nov. pro *parallelus* KERREMANS, 1913,
Arch. Nat. 78 A 11 (1912), 116

Syntypen, Formosa, Kankau (Koshun), leg. SAUTER.
DEI: 3 Syntypen, Formosa, Kankau (Koshun), 7. 4. 1912, leg. SAUTER.

kheili OBENBERGER, 1924 (*Taphrocerus*)
Sborn. ent. odd. Nar. Mus. Praze 2, 55+73–74

Syntypen, Brasilien, Sao Paulo, leg. MRÁZ.
DEI: 1 Syntypus, Sao Paulo, leg. MRÁZ.

kleinei OBENBERGER, 1939 (*Brachys*)
Arb. morph. tax. Ent. 6, 305–306

2 Syntypen, Costa Rica, in Coll. OBENBERGER; 1 Syntypus, Costa Rica, im Mus. Stettin; 2 Syntypen, Costa Rica, aus
Minen von *Calea urticifolia*, 8. 1930, leg. SCHMIDT, im Mus. Stettin und im DEI.
DEI: 1 ♂, Syntypus, Costa Rica, San José, aus Minen von *Calea urticifolia*, 8. 1930, leg. SCHMIDT.

lachesis OBENBERGER, 1924 (*Psiloptera*)
Arch. Nat. 90 A 3, 64–65

Syntypen, Madagaskar.
DEI: 1 Syntypus, Madagaskar, Ambanja.

lata HEYDEN, 1885 (*Acmaeodera*)
Dtsch. ent. Ztschr. 29, 287

♂♀ Syntypen, Namagan, durch STAUDINGER.
DEI: 2 Syntypen, Turkestan, Namagan, STAUDIGR. 85.

latipennis OBENBERGER, 1914 (*Latipalpis*)
Col. Rundsch. 3, 130–131

Syntypen; Griechenland; Kleinasien, Mersina; Syrien, Aleppo.
DEI: 1 Syntypus, Syrien, Aleppo.

leonhardi OBENBERGER, 1914 (*Acmaeodera*)
Ent. Bl. 10, 252–253

Holotypus, ohne Fundortangaben, in Coll. LEONHARD.
DEI: Holotypus, Algier, Biskra, ex Coll. LEONHARD.

leonhardi OBENBERGER, 1916 (*Chrysobothrys*)
Wien. ent. Ztg. 35, 261; als var. von *affinis* FABRICIUS beschrieben

2 Syntypen, Bulgarien, Maglige, 7.–8. 1912, leg. HILF, in Coll. LEONHARD.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

leonhardi OBENBERGER, 1927 (*Sphenoptera*)
Sborn. ent. odd. Nar. Mus. Praze 5, 25–26

Syntypen, Persien, Luristan, Poucht-é Kouh, Bazuft usw.; im Mus. Madrid, Paris und Berlin.
DEI: 1 Syntypus, Persien, Sultanabad, leg. v. BODEMEYER.

litura KIESENWETTER, 1857 (*Agrilus*)
In: ERICHSON, Naturgesch. Ins. Dtschl. 4, 139–140

Zahlreiche Syntypen, Steyermark, leg. KAHR.
DEI: 3 Syntypen, Styria, leg. KAHR.

lugubris KERREMANS, 1914 (*Agrilus*)
Arch. Nat. 79 A 8 (1913), 107

♂♂ Syntypen, Formosa, Kosempo, leg. SAUTER.
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kosempo, 7. 1909, leg. SAUTER.

luristana KERREMANS, 1909 (*Sphenoptera*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1909, 272 - 273

Syntypen, Persien, Luristan, leg. v. BODEMEYER.
DEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

lusitanica OBENBERGER, 1914 (*Acmaeodera*)
Ent. Bl. 10, 251 - 252

Syntypen, Portugal, 3 Ex., in Coll. OBENBERGER, 6 Ex., in Coll. LEONHARD.
DEI: 4 Paralectotypen, S. Martinho, Portugal, leg. DE BARROS, von VOLKOVITSH festgelegt.

luteogramma OBENBERGER, 1923 (*Agrilus*)
Tijdschr. Ent. 66, 25 - 26

Syntypen; Cameroon: Ebolowa, 1912; Buea, leg. v. ROTHKIRCH; in den Coll. VAN ROON, STAUDINGER, v. MÜHLHEIM und OBENBERGER.
DEI: 1 Syntypus, Kamerun, Buea.

madagascariensis OBENBERGER, 1937 (*Aphanisticus*)
Sborn. ent. odd. Nar. Mus. Praha 15, 107

Syntypen, Madagaskar, Tananarive.
DEI: 1 Syntypus, Madagaskar, Tananarive, leg. OLSOUFIEFF.

maior alpina OBENBERGER, 1916 (*Trachys*)
Arch. Nat. 82 A 11, 26 + 60; als var. beschrieben

Syntypen; Frankreich, Béziers, Jaën und Kärnten, Gailtal.
DEI: 1 Syntypus, Gailtal Cr., leg. KLIMSCH.

marquardtii OBENBERGER, 1914 (*Agrilus*)
Cas. Cs. Spol. ent. 11, 41 - 42 + 47 - 48

Einige Syntypen, China, Kiang-si.
DEI: 1 Syntypus, China; 1 Syntypus, China, Kiangsi, in Coll. HEYDEN.

massaica OBENBERGER, 1917 (*Psiloptera*)
Col. Rundsch. 6, 86 - 87

Mehrere Syntypen; Abessinien, Harrar; Deutsch-Ostafrika, Kilimandjaro; einige Ex., in Coll. OBENBERGER.
DEI: 1 Syntypus, Abyss., Harrar, coll. PLASON.

mentor KERREMANS, 1912 (*Agrilus*)
Arch. Nat. 78 A 7, 207

Syntypen, Formosa, Taihorinsho, 9. 1909, leg. SAUTER.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

mesopotamica deserti OBENBERGER, 1919 (*Sphenoptera*)
Arch. Nat. 85 A 3, 129

Syntypen; Transkaspien, Merw; Afghanistan, Kuschke, in Coll. OBENBERGER.
DEI: 1 Syntypus, Transkaspien, Merw, 1900, ex Coll. HAUSER.

micans JAKOWLEFF, 1886 (*Sphenoptera*)
Horae. Soc. ent. Ross. 20, 93

Syntypen, Persien, Astrabad, Coll. GANGLBAUER.
DEI: 1 Syntypus, Perse, KRAATZ.

minutus reflexiformis OBENBERGER, 1916 (*Trachys*)
Arch. Nat. 82 A 11, 21 + 46

Syntypen, Italien, Vallombrosa.
DEI: 1 Syntypus, Vallombrosa.

modicus KERREMANS, 1899 (*Pachyschelus*)
Ann. Soc. ent. Belg. 43, 355

Syntypen, Brasilien, Goyaz, leg. PUJOL.
DEI: 2 Syntypen, Bresil, Jatahy, Prov. Goyas.

moesta JAKOWLEFF, 1887 (*Sphenoptera*)
Horae Soc. ent. Ross. 21, 64 - 65

Syntypen, Persien, leg. CHRISTOPH, in Coll. KRAATZ.
DEI: 1 Syntypus, Persien.

mongolica JAKOWLEFF, 1887 (*Sphenoptera*)
Rev. d'Ent. 6, 115

2 ♀♀, Syntypen, Nordchina, in Coll. KRAATZ.
DEI: 1 Syntypus, China, (Janowl.) KRTZ., in Coll. HEYDEN.

monstruosa KERREMANS, 1908 (*Psiloptera*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1908, 61, Fig.

♂ Holotypus, Benguela, leg. WELLMAN, im DEI.

mossulensis OBENBERGER, 1919 (*Sphenoptera*)

Arch. Nat. 85 A 3, 118–119

Zahlreiche Syntypen, Mesopotamien, Mossul, 5. 1909, leg. HAUSER, in Coll. BREIT, KNIRSCH, OBENBERGER, WINKLER usw.
DEI: 2 Syntypen, Mesopotamien, Assur., 5. 08.

mrazi OBENBERGER, 1922 (*Callimicra*)

Arch. Nat. 88 A 12, 162–163

Syntypen, Brasilien, São Paulo, leg. MRÁZ.

DEI: 2 Syntypen, Sao Paulo, leg. MRÁZ.

mrazi OBENBERGER, 1924 (*Taphrocerus*)

Sborn. ent. odd. Nar. Mus. Praze 2, 49, 63

Syntypen, Brasilien, São Paulo, leg. MRÁZ.

DEI: 1 Syntypus, Brasilien, Sao Paulo, leg. MRÁZ.

mulleri THÉRY, 1925 (*Agrilus*)

Ent. Mitt. 14, 163–165

Syntypen, Neu Guinea, in Coll. THÉRY und im DEI.

DEI: 2 Syntypen, D. Neu-Guinea, leg. WAHNES.

mulleri THÉRY, 1925 (*Coroebus*)

Ent. Mitt. 14, 162–163

Neu Guinea; 1 Syntypus, in Coll. THÉRY, 2 Syntypen, im DEI.

DEI: 2 Syntypen, D. Neu-Guinea, leg. WAHNES.

myrmido KERREMANS, 1912 (*Agrilus*)

siehe *achilleus* OBENBERGER, 1935

nigra KERREMANS, 1897 (*Callimicra*)

Mem. Soc. ent. Belg. 6, 144

Syntypen, Brasilien, Goyaz, Jatahy, leg. PUJOL.

DEI: 1 Syntypus, Brésil, Jatahy, Prov. Goyas.

nigricinctus KERREMANS, 1912 (*Agrilus*)

Arch. Nat. 78 A 7, 206

Syntypen, Formosa, Taihorin, 7. 1911, leg. SAUTER.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

nigriventris THÉRY, 1928 (*Chrysobothris*)

Ent. Mitt. 17, 76–77, Fig. 1

Holotypus, Brasilien, Staat Sao-Paulo.

DEI: Holotypus, Est. Sao Paulo, Guarujá, 3. 1923, leg. MELIN.

nigrojubata ROUBAL, 1913 (*Anthaxia*)

Col. Rundsch. 2, 33–34

Einige Syntypen, Nordkaukasus, Frühling 1912, leg. ROUBAL; 1 Syntypus, Syrien, leg. OBENBERGER.

DEI: 1 Syntypus, Ca. b. Teberda, 6. 1912, leg. ROUBAL.

obesa beirae OBENBERGER, 1926 (*Sphenoptera*)

Sborn. ent. odd. Nar. Mus. Praze 4, 37

Syntypen, Beira.

DEI: 1 Syntypus, Beira, leg. BODONG.

obesa benningseni THÉRY, 1936 (*Sphenoptera*)

Arb. morph. tax. Ent. 3, 294+295, Fig. 3

♀ Holotypus, Dar es Salaam, leg. V. BENNINGSEN, im DEI.

obnotatus KERREMANS, 1912 (*Agrilus*)

Arch. Nat. 78 A 7, 208

Syntypen; Formosa, Kosempo, 8. 1909; Taihorinsho, 7. 1909, leg. SAUTER.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kosempo, 7. 8. 1909, leg. SAUTER; 1 Syntypus, Formosa, Taihorinsho, 7. 8., leg. SAUTER.

ogloblini OBENBERGER, 1934 (*Taphrocerus*)

Sborn. ent. odd. Nar. Mus. Praze 12, 25+53

Syntypen, Argentinien, Missiones-Loreto, Sta Anna, leg. OGLOBLIN.

DEI: 2 Syntypen, Arg., Loreto, 3., leg. OGLOBLIN.

omissus KERREMANS, 1914 (*Agrilus*)

Arch. Nat. 79 A 8 (1913), 106

Syntypen, Formosa, Kankau, Koshun, leg. SAUTER.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kankau (Koshun), 4. 1912, leg. SAUTER.

onopordi costifera OBENBERGER, 1919 (*Julodis*)

Bull. Soc. ent. France 1919, 142

Mehrere Syntypen, Anti Taurus, Eibes, in Coll. OBENBERGER.

DEI: 1 Syntypus, Eibes, Antitaur.

***onopordi obsoletesulcata* OBENBERGER, 1917 (*Julodis*)**
Col. Rundsch. 6, 47

Mehrere Syntypen; Kleinasien, Amasia; Syrien, Nubien; in Coll. OBENBERGER.
DEI: 1 Syntypus, As.m., Amasia.

***oporina* JAKOWLEFF, 1903 (*Sphenoptera*)**
Rev. Russe d'Ent. 3, 386—387

2 ♂♂, 4 ♀♀, Syntypen, Transcaucasien, Elisabethpol, 25. 11. 1902, leg. MALUSHENKO.
DEI: 1 Syntypus, Caucasus, Elisabethpol, 15. 11. 1902, leg. MALJUSHENCO.

***orbicularis* KERREMANS, 1892 (*Parataenia*)**
Ann. Soc. ent. Belg. 36, 55

20 Syntypen, Alt-Calabor, Gabon und Sierra-Leone; im Mus. Brüssel, in Coll. OBERTHÜR, MEYER-DARCIS und KERREMANS.
DEI: 1 Syntypus, Old Calabor, MEYER-DARCIS.

***ordubadensis* OBENBERGER, 1916 (*Sphenoptera*)**
Wien. ent. Ztg. 35, 250

Einige Syntypen, Russisch-Armenien, Ordubad, am Araxes, leg. VESELY, in Coll. OBENBERGER.
DEI: 1 Syntypus, Araxes, leg. VESELY.

***orestes* KERREMANS, 1912 (*Agrilus*)**
Arch. Nat. 78 A 11, 113

Syntypen, Formosa, Kosempo, leg. SAUTER.
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kosempo, 22. 5. 1912, leg. SAUTER.

***paganettii* OBENBERGER, 1913 (*Agrilus*)**
Col. Rundsch. 2, 30—31

3 Syntypen, Calabria Antonimina, Mte. Conevo, Prov. di Ancona, leg. PAGANETTI, in Coll. PAGANETTI.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

***paganettii* OBENBERGER, 1914 (*Cyphosoma*)**
Col. Rundsch. 3, 115, Textfig.

3 Syntypen, Korfu, leg. PAGANETTI, in Coll. OBENBERGER.
DEI: 1 Syntypus, Corfu, leg. PAGANETTI.

***papua* OBENBERGER, 1940 (*Endelus*)**
Casopsis 37, 32

Syntypen, Nova Guinea.
DEI: 1 Syntypus, N. Guinea.

***paracuspидatus* OBENBERGER, 1939 (*Agrilus*)**
Sborn. ent. odd. Nar. Mus. Praze 17, 15—16

Syntypen, Transvaal, Olifants Nek, leg. BAUM.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

***parallelus* KERREMANS, 1913 (*Endelus*)**

siehe *kerremansi* THÉRY, 1927

***parnassia* JAKOWLEFF, 1887 (*Sphenoptera*)**
Horae Soc. ent. Ross. 21, 74—75

Syntypen, Parnass, in Coll. KRAATZ.
DEI: 1 Syntypus, Parnass, 1. 6. 1855.

***paulensis* OBENBERGER, 1924 (*Paragrilus*)**
Arch. Nat. 90 A 3, 142—143

Syntypen, Brasilien, São Paulo, leg. MRÁZ.
DEI: 2 Syntypen, Brasilien, Sao Paulo, leg. MRÁZ.

***persuperba* OBENBERGER, 1912 (*Anthaxia*)**
Wien. ent. Ztg. 31, 159—160

6 Syntypen, Algérie, in Coll. OBENBERGER.
DEI: 1 Syntypus, Afr. du Nord, Algérie.

***pertristis* OBENBERGER, 1933 (*Agrilus*)**
Sborn. ent. odd. Nar. Mus. Praze 11, 40

Syntypen, Brasília, Santa Catharina, Bahia, leg. FRUHSTORFER.
DEI: 1 Syntypus, Bresil.

***piceolus* OBENBERGER, 1925 (*Pachyschelus*)**
Sborn. ent. odd. Nar. Mus. Praze 3, 117

Syntypen, Brasilien, Sao Paulo, leg. MRÁZ.
DEI: 1 Syntypus, Brasilien, Sao Paulo, leg. MRÁZ.

***pilosula* JAKOWLEFF, 1887 (*Sphenoptera*)**
Horae Soc. ent. Ross. 21, 69—70

♀♀ Syntypen, Carthagera, in Coll. HEYDEN.
DEI: 1 Syntypus, Carthagera, HANDSCHUCH, in Coll. HEYDEN.

plantivorus OBENBERGER, 1937 (*Aphanisticus*)
Sborn. ent. odd. Nar. Mus. Praze 15, 112

Syntypen, Madagascar; Tananarive, Ambodirano, Tanovano, Perinet etc.
DEI: 2 Syntypen, Madagascar, Tananarive, leg. OLSOUFIEFF.

prava KERREMANS, 1909 (*Sphenoptera*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1909, 278–279

♂♂ Syntypen, Asie mineure, Eski-Chehir, leg. v. BODEMEYER.
DEI: 1 Syntypus, Klein-Asien, Eski-Chehir, leg. v. BODEMEYER, in Coll. HEYDEN.

preissi OBENBERGER, 1923 (*Lius*)
Ent. Bl. 19, 122

Zahlreiche Syntypen, Brasilien, São Paulo, durch PREISS, in Coll. OBENBERGER.
DEI: 1 Syntypus, São Paulo.

priamus KERREMANS, 1912 (*Agrilus*)
Arch. Nat. 78 A 7, 207–208

Syntypen, Formosa, Kosempo und Alikang, 9. + 10. 1909, 8. 1911, leg. SAUTER.
DEI: 4 Syntypen, Formosa, Alikang, 10. 1909, leg. SAUTER; 6 Syntypen, Formosa, Kosempo, 9. 1909, leg. SAUTER; 4 Syntypen, Formosa, Kosempo, 7. 1911, leg. SAUTER.

priamus OBENBERGER, 1926 (*Sphenoptera*)
Sborn. ent. odd. Nar. Mus. Praze 4, 33–34

Syntypen; Transvaal; Kap Kolonie; Rhodesien; Süd-Afrika.
DEI: 3 Syntypen, Transvaal; 80 Syntypen, ohne Fundortangaben, Coll. KRAATZ.

problematica OBENBERGER, 1916 (*Trachys*)
Arch. Nat. 82 A 11, 26 + 60–61, Fig. 28c

Syntypen; Preußen; Sachsen; Niederösterreich; Frankreich; Kleinasien.
DEI: 1 Syntypus, Dresden; 1 Syntypus, Prussia.

profusa KERREMANS, 1909 (*Sphenoptera*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1909, 277–278

Holotypus, Persien, Luristan, leg. v. BODEMEYER, im DEI, in Coll. HEYDEN.

psittacina HEYDEN, 1887 (*Anthaxia*)
Dtsch. ent. Ztschr. 31, 303

Syntypen, Amur, Nebenfluß Suyfun, in Coll. HEYDEN.
DEI: 2 Syntypen, Amur, Suyfun, KOLTZE, in Coll. KOLTZE und HEYDEN.

pueblana OBENBERGER, 1916 (*Acmaeodera*)
Ztschr. wiss. Ins. Biol. 1, 9–10

Mehrere Syntypen, Mexico, Necaxa, Puebla.
DEI: 1 Syntypus, Mexico, Necaxa (Puebla), leg. HEINE.

pyrethri STIERLIN, 1863 (*Cylindromorphus*)
Bull. Soc. Imp. Nat. Moscou 36, 491

Syntypen, Sarepta.
DEI: 1 Syntypus, Sarepta.

pyrrhus KERREMANS, 1912 (*Agrilus*)
Arch. Nat. 78 A 11, 112–113

Syntypen, Formosa, Kosempo, leg. SAUTER.
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kosempo, 7. 9. 1909, leg. SAUTER.

radiolus KERREMANS, 1912 (*Agrilus*)
Arch. Nat. 78 A 11, 113–114

Syntypen, Formosa, Kankau, leg. SAUTER.
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kankau, 7. 4. 1912, leg. SAUTER.

rangnowi KERREMANS, 1909 (*Sphenoptera*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1909, 273–274

24 Syntypen, Persien, Luristan, leg. v. BODEMEYER.
DEI: 7 Syntypen, Persien, Luristan, leg. v. BODEMEYER; 3 Ex., in Coll. HEYDEN.

robusta duboisi CAZIER, 1939 (*Acmaeodera*)
Bull. S. Calif. Acad. Sci. 37 (1938), 138–140

♀ Holotypus, California, Death Valley, Fumace Creek, 14. 4. 1938, an *Prosopis juliflora glandulosa*, leg. DU BOIS, in Coll. CAZIER. 427 Paratypen, vom selben Fundort, leg. DU BOIS, WHITE und WOOLEY.
DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

rollei KERREMANS, 1908 (*Stigmodera*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1908, 63–64

Syntypen, Queensland, leg. ROLLE, im DEI.
DEI: 1 Syntypus, Queensland, Cairns, Kuranda, ROLLE.

roscidinus OBENBERGER, 1923 (*Agrilus*)
Tijdschr. Ent. 66, 18–19

Syntypen; Cameroor, Duala b. Victoria, 1. 1. 1913, leg. v. ROTHKIRCH, in den Coll. VAN ROON, STAUDINGER, v. MÜHLHEIM und OBENBERGER.
DEI: 1 Syntypus, Kamerun, Duala.

rossicus OBENBERGER, 1916 (*Agrilus*)
Wien. ent. Ztg. 35, 276

Mehrere Syntypen, Südrussland, Sarepta, in Coll. OBENBERGER.
DEI: 3 Syntypen, Sarepta.

rothkirchi OBENBERGER, 1923 (*Agrilus*)
Tijdschr. Ent. 66, 24, Textfig.

Syntypen; Cameroon; Tiko b. Victoria, Ebolowa, Buea, Duala, 1912, 1913, leg. v. ROTHKIRCH, in den Coll. VAN ROON, v. MÜHLHEIM, STAUDINGER und OBENBERGER.
DEI: 1 Syntypus, Kamerun, Buea.

roubali OBENBERGER, 1913 (*Pachyschelus*)
Casopis 10, 91-94+100-102

Mehrere Syntypen, Algier-Grandin.
DEI: 1 Syntypus, Alger., ex. Coll. OBENBERGER.

rugosipennis OBENBERGER, 1916 (*Meliboeus*)
Wien. ent. Ztg. 35, 268

Holotypus, Nordafrika, wahrscheinlich Ägypten, in Coll. OBENBERGER.
DEI: Holotypus, Ägp. mer.

sachtlebeni OBENBERGER, 1958 (*Vanroonia*)
Acta ent. Mus. nat. Prague 32, 506, 508-509

Holotypus, 1 Paratypus, Prins Frederic Island, Niedl. Neu Guinea; Holotypus, im DEI; Paratypus, in Coll. OBENBERGER.
DEI: Holotypus, Idenburg-riv., Seitenfluß des Mamberamo, Neu Guinea, 1911, leg. TER POORTEN.

sauteri KERREMANS, 1912 (*Agrilus*)
Arch. Nat. 78 A 7, 206

Syntypen, Formosa, Kosempo, 6. 1911, leg. SAUTER.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

sauteri KERREMANS, 1912 (*Chrysobothris*)
Arch. Nat. 78 A 7, 204

Syntypen, Formosa, Kosempo, 10. 1910 und 7. 1911, leg. SAUTER.
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kosempo, 7. 1911, leg. SAUTER.

sauteri KERREMANS, 1912 (*Coraeus*)
Arch. Nat. 78 A 7, 205

Syntypen, Formosa; Anping, Taihorin, 6. 1911, leg. SAUTER.
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Taihorin, 6. 1911, leg. SAUTER; 2 Syntypen, Formosa, Anping, leg. SAUTER.

sauteri KERREMANS, 1912 (*Endelus*)
Arch. Nat. 78 A 7, 209

Syntypen, Formosa, Taihorinsho, 7. 1909, leg. SAUTER.
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Taihorinsho, 7. 9., leg. SAUTER.

sauteri KERREMANS, 1912 (*Philanthaxia*)
Arch. Nat. 78 A 11, 110-111

Syntypen, Formosa, Kosempo, leg. SAUTER.
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kosempo, 1912, leg. SAUTER.

sauteri KERREMANS, 1912 (*Sambus*)
Arch. Nat. 78 A 11, 112

Syntypen, Formosa, Kankau (Koshun), leg. SAUTER.
DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kankau (Koshun), 4. 1912, leg. SAUTER.

sauteri KERREMANS, 1912 (*Trachys*)
Arch. Nat. 78 A 7, 209

Syntypen, Formosa, Taihorin, 7. 1909, 8. 1911, leg. SAUTER.
DEI: 2 Syntypen, Formosa, Taihorin, 7. 8. 1911, leg. SAUTER.

scheibei THÉRY, 1936 (*Anthaxia*)
Arb. morph. tax. Ent. 3, 188-190, Fig. 9

Holotypus, Hindukusch, Parigil und Patscheigil, 12. 7. 1935, im DEI.

schenklingi KERREMANS, 1908 (*Psiloptera*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1908, 62-63

3 Syntypen, Benguella, leg. WELLMAN, im DEI.
DEI: 2 Syntypen, Benguella, leg. WELLMAN.

schmidt OBENBERGER, 1939 (*Agrilus*)
Arb. morph. tax. Ent. 6, 302-303

Syntypen, Costa Rica, La Caja, 8 km w. San José, leg. SCHMIDT, im DEI, 1 Ex., im Mus. Stettin, 3 Ex., Coll. OBENBERGER.
DEI: 5 Syntypen, C. R., La Caja, 8 km w. San José, 1930, leg. SCHMIDT.

schmidt OBENBERGER, 1939 (*Brachys*)
Arb. morph. tax. Ent. 6, 306-308

2 Syntypen, Costa Rica, La Caja bei San José, leg. SCHMIDT, im DEI.
DEI: 2 Syntypen, Costa Rica, La Caja, 8 km w. San José, 1 ♂, 1930, 1 ♀, 1934; leg. SCHMIDT.

schmidti OBENBERGER, 1939 (*Pachyschelus*)
 Arb. morph. tax. Ent. 6, 309—310

2 Syntypen, Costa Rica, La Caja, 8 km w. von San José, leg. SCHMIDT, im DEI.

sculpticollis HEYDEN, 1886 (*Sphenoptera*)
 Dtsch. ent. Ztschr. 30, 278

2 Syntypen, Kleinasien, Malatia, in Coll. HEYDEN und KRAATZ.

DEI: 1 Syntypus, Mesopotam., Malatia, STAUDGR. 85, in Coll. HEYDEN; 1 Syntypus, Malatie, KRAATZ.

senilis KERREMANS, 1914 (*Agrilus*)
 Arch. Nat. 79 A 8 (1913), 107

Syntypen, Formosa, Kankau, Koshun, leg. SAUTER.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kankau (Koshun), 4. 1912, leg. SAUTER.

sicelidis OBENBERGER, 1916 (*Sphenoptera*)
 Wien. ent. Ztg. 35, 251—252

2 ♂♂, Syntypen, Girgenti in Sizilien, in Coll. OBENBERGER.

DEI: 1 Syntypus, Girgenti.

siva OBENBERGER, 1916 (*Agrilus*)
 Ztschr. wiss. Ins. Biol. 1, 14

Einige Syntypen, Süd-Ostindien, Shembaganus, durch HEYNE.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

sommeri OBENBERGER, 1940 (*Endelus*)
 Casopis 37, 29—30

Syntypen, Nova Guinea.

DEI: 1 Syntypus, N. Guinea.

sorocinus KERREMANS, 1914 (*Agrilus*)
 Arch. Nat. 79 A 8 (1913), 106—107

Syntypen, Formosa, Banshoryo Distr., Sokutsu, leg. SAUTER.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Sokutsu, Banshoryo-Distr., 7. 7. 1912, leg. SAUTER.

sphaerocephala JAKOWLEFF, 1887 (*Sphenoptera*)
 Horae Soc. ent. Ross. 21, 54—55

Syntypen, Syrien, leg. LEDERER, in Coll. KRAATZ.

DEI: 1 Syntypus, Syria, Haifa.

spiridion KERREMANS, 1912 (*Agrilus*)
 Arch. Nat. 78 A 11, 114—115

Syntypen, Formosa, Kankau (Koshun), leg. SAUTER.

DEI: 2 Syntypen, Formosa, Kankau (Koshun), 4. 1912, leg. SAUTER.

staudingerina OBENBERGER, 1917 (*Psiloptera*)
 Ent. Bl. 13, 278—279

Ca. 90 Syntypen, Madagaskar, durch STAUDINGER & BANG-HAAS.

DEI: 3 Syntypen, Delagoa Bay.

strigosa JAKOWLEFF, 1887 (*Sphenoptera*)
 Horae Soc. ent. Ross. 21, 71—73

Syntypen, Turkestan, in Coll. KRAATZ.

DEI: 1 Syntypus, Samarkand.

sturanyti OBENBERGER, 1914 (*Anthaxia*)
 Col. Rundsch. 3, 132

Syntypen, Albanien, Oroschi, leg. RAMBOUSEK, in Coll. OBENBERGER, RAMBOUSEK, LEONHARD.

DEI: 1 Syntypus, Merdita, Oroschi.

subsulcata KERREMANS, 1909 (*Sphenoptera*)
 Dtsch. ent. Ztschr. 1909, 282

Syntypen, Persien, Luristan, leg. v. BODEMEYER.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, in Coll. HEYDEN.

sumatrensis KERREMANS, 1900 (*Aphanisticus*)
 Mem. Soc. ent. Belg. 7, 40

Syntypen, Sumatra, Padang oder Hindrapoera, 1884 und 1896, leg. WEYERS.

DEI: 3 Syntypen, Sumatra.

surrubrensis OBENBERGER, 1917 (*Agrilus*)
 Ent. Bl. 13, 182

Mehrere Syntypen, Costa Rica, 300', Surrubres, leg. HEYNE; ein Ex. in Coll. OBENBERGER.

DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

talyschensis OBENBERGER, 1917 (*Agrilus*)
 Wien. ent. Ztg. 36, 215—216

Syntypen, Talysch, leg. KORB, in Coll. OBENBERGER.

DEI: 1 Syntypus, Kaspia, Talysch, 1897.

temporalis OBENBERGER, 1934 (*Taphrocerus*)

Sborn. ent. odd. Nar. Mus. Praha 12, 24+51—52

Syntypen, Argentinien, Misiones, Santa Anna, leg. OGLOBLIN.

DEI: 1 Syntypus, Argentinien, Misiones Santa Anna, leg. ČERNOSVITOV.

tenebricosa bucharica OBENBERGER, 1945 (*Capnoidis*)

Acta ent. Mus. nat. Pragae 23, 18—19

Syntypen; Asie centrale: Buchara or.; Tchitchantan, leg. HAUSER; Turkestan, Monts Alexandre; Buchara occ.; Samarkande; Monts Sussamyr, Ketmen Tjube, leg. HAUSER; Tokmak.

DEI: 1 Syntypus, Samarkand..

theryi OBENBERGER, 1924 (*Taphrocerus*)

Sborn. ent. odd. Nar. Mus. Praha 2, 52+67

Syntypen, Brasilien, Sao Paulo, leg. MRÁZ.

DEI: 1 Syntypus, Sao Paulo, leg. MRÁZ.

thoracica JAKOWLEFF, 1887 (*Sphenoptera*)

Horae Soc. ent. Ross. 21, 80—81

♀♀ Syntypen, Kaukasus, Mingrelie, in Coll. KRAATZ.

DEI: 1 Syntypus, Mingrelie, in Coll. HEYDEN.

tibialis JAKOWLEFF, 1886 (*Sphenoptera*)

Horae Soc. ent. Ross. 20, 88—89

Syntypen, Tourkestan, Alai, in Coll. HEYDEN.

DEI: 1 Syntypus, Turkestan, Alai, in Coll. HEYDEN.

transversus KERREMANS, 1899 (*Brachys*)

Ann. Soc. ent. Belg. 43, 354

Syntypen, Brasilien, Goyaz, leg. PUJOL.

DEI: 1 Syntypus, Brésil, Prov. Goyas, Jatahy.

tristis KERREMANS, 1900 (*Aphanisticus*)

Mem. Soc. ent. Belg. 7, 38—39

Syntypen, Sumatra, Padang oder Hindrapoera, 1884 und 1896, leg. WEYERS.

DEI: 12 Syntypen, Sumatra.

tyndarus KERREMANS, 1912 (*Agrilus*)

Arch. Nat. 78 A 11, 115

Syntypen, Formosa, Kankau (Koshun), leg. SAUTER.

DEI: 5 Syntypen, Formosa, Kankau (Koshun), 4. 1912, leg. SAUTER.

tyrtaeus KERREMANS, 1912 (*Agrilus*)

Arch. Nat. 78 A 11, 113

Syntypen, Formosa, Kosempo, leg. SAUTER.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kosempo, 22. 5. 1912, leg. SAUTER.

uhmanni OBENBERGER, 1939 (*Leioptera*)

Arb. morph. tax. Ent. 6, 308—309

Syntypen, Costa Rica, La Caja bei San José, aus einer *Ficus*-Art gezogen, leg. SCHMIDT, im DEI.

DEI: 15 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

ukerewensis OBENBERGER, 1937 (*Aphanisticus*)

Sborn. ent. odd. Nar. Mus. Praha 15, 17—18

Syntypen, Afrika, Ukerewe.

DEI: 1 Syntypus, Ukerewe.

uncta KERREMANS, 1909 (*Sphenoptera*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1909, 277

Holotypus, Persien, Luristan, leg. v. BODEMEYER, im DEI.

ussuriensis OBENBERGER, 1914 (*Anthaxia*)

Wien. ent. Ztg. 33, 116

Syntypen, Amurgebiet, Ussuri, leg. KASSAKIEWITSCH.

DEI: 1 Syntypus, Ussuri-Geb., 1907, leg. KASAKIEWITSCH KORB.

vej dovskyi OBENBERGER, 1914 (*Anthaxia*)

Rozprawy král. české Akad. Nauk 23, Třda II, čisl. 31, 19

♂♂ Syntypen, Algier.

DEI: 1 ♂, Syntypus, Alg., Hamman Rirha?.

viduus KERREMANS, 1914 (*Agrilus*)

Arch. Nat. 79 A 8 (1913), 105

Syntypen, Formosa, Kankau, Koshun, leg. SAUTER.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Kankau (Koshun), 7. 1912, leg. SAUTER.

viridicyanea KRAATZ, 1896 (*Pseudocastalia*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 86—87

♂ Holotypus, Zanzibar, Mpuapua, leg. v. BENNIGSEN, im DEI.

viridis KERREMANS, 1900 (*Coraeus*)
Mém. Soc. ent. Belg. 7, 13–14.

Ca. 20 Syntypen, Sumatra, Hindrapoera, leg. WEYERS.
DEI: 2 Syntypen, Sumatra W. C., Indrapoera, leg. WEYERS.

vismiae OBENBERGER, 1939 (*Pachyschelus*)
Arb. morph. tax. Ent. 6, 311–312

Holotypus, Costa Rica, La Caja, 8 km w. von San José, aus Minen von *Vismia* spec., leg. SCHMIDT, im DEI.

wellmani KERREMANS, 1908 (*Psiloptera*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1908, 63

Mehrere Syntypen, Benguella, leg. WELLMAN, im DEI.
DEI: 1 Syntypus, Benguella, leg. WELLMAN.

weyersi KERREMANS, 1900 (*Agrilus*)
Mém. Soc. ent. Belg. 7, 23

Syntypen, Sumatra, Hindrapoera, 1884 und 1896, leg. WEYERS.
DEI: 2 Syntypen, Sumatra, Indrapoera, leg. WEYERS.

wiechelti KERREMANS, 1908 (*Agelia*)
Monographie des Buprestides 3, 224–225; Taf. 18, Fig. 6

33 Syntypen, Deutsch-Ostafrika, Outjo, in Coll. KERREMANS.
DEI: 1 Syntypus, DSW-Afr., Outjo.

winkleri OBENBERGER, 1914 (*Anthaxia*)
Ent. Bl. 10, 255–256

Syntypen, Syrien, Aleppo.
DEI: 1 Syntypus, Syrien, Aleppo.

xantippus KERREMANS, 1912 (*Agrilus*)
Arch. Nat. 78 A 11, 115–116

Syntypen, Formosa, Kankau, leg. SAUTER.
DEI: 2 Syntypen, Formosa, Kankau, 7. 4. 1912, leg. SAUTER.

yunnanicola OBENBERGER, 1935 (*Sambus*)
Cas. Cs. Spol. Ent. 32, 15

Syntypen, China, Yunnan.
DEI: 2 Syntypen, China, Prov. Yunnan, Vallis flumin., Soling-ho.

zarathustrae OBENBERGER, 1919 (*Sphenoptera*)
Arch. Nat. 85 A 3, 107–108

Syntypen, Persien, Ala-Dagh, Budschnurd, 1033 m, 6. 1902, leg. HAUSER.
DEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

zoufali OBENBERGER, 1914 (*Julodis*)
Col. Rundsch. 3, 112–113

Holotypus, Kaukasus, Ararat, in Coll. OBENBERGER.
DEI: Holotypus, Caucasus.

Wahrscheinlich nicht beschrieben:

aeneipes OBENBERGER (*Julodella*)

DEI: 1 Ex., Persien, Pers. Golf, Buschir., als Cotypus ausgezeichnet.

bhadrawatensis OBENBERGER (*Trachys*)

DEI: 1 Ex., India mer., Tanjore Distr., Bhadravati, als Typus ausgezeichnet.

bodemeyeri KERREMANS (*Acmaeodera*)

DEI: 3 Ex., Elburs-Gebirge, Iran, Nord-Persien, leg. v. BODEMEYER, als Typen ausgezeichnet.

bytinskii OBENBERGER (*Hoplistura*)

DEI: 1 Ex., Palestine, Bir Rechme ?, 6. 6., an *Tamarix*, leg. BYTINSKI-SALZ, als Cotypus ausgezeichnet.

bytinskii OBENBERGER (*Sphenoptera*)

DEI: 1 Ex., Palestina, Bersheba, 23. 6., an *Syrsaphila*, leg. BYTINSKI-SALZ, als Paratypus ausgezeichnet.

fastuosus OBENBERGER (*Sambus*)

DEI: 1 Ex., China, Prov. Yunnan, Vallis flumin., Soling-ho, als Cotypus ausgezeichnet.

ferganensis REITTER (*Anthaxia*)

DEI: 1 Ex., Kokand, Fergana, als Cotypus ausgezeichnet.

gebieni THÉRY (*Actenodes*)

DEI: 1 Ex., Costa Rica, 26. 2. 1924, leg. NEVERMANN, als Paratypus ausgezeichnet.

gloriosa KERREMANS (*Iridotaenia*)

DEI: 1 Ex., N. Guinea, Astrolabe-B., leg. RHODE, als Typus ausgezeichnet.

hackeri KERREMANS (*Agrilus*)

DEI: 1 Ex., N. S. W., Tweed R., W. W. F., 18. 10. 1901, als Typus ausgezeichnet.

hilaris DANIEL (*Anthaxia*)

DEI: 1 Ex., Asia Minor, Bozanti-Thal, leg. v. BODEMEYER, als Typus ausgezeichnet.

holdhausi OBENBERGER (*Julodis*)

DEI: 2 Ex., ohne Fundortangaben, als Cotypen ausgezeichnet.

leonhardi OBENBERGER (*Agrilus*)

DEI: 1 Ex., Ost Sibirien, Schilka-Gebirge, leg. v. BODEMEYER, als Cotypus ausgezeichnet.

micropoecilus OBENBERGER (*Agrilus*)

DEI: 1 Ex., Brasilien, Rondon, 24°38' B, 54°07' L, 500 m, leg. PLAUMANN, als Cotypus ausgezeichnet.

nevermanni THÉRY (*Lius*)

DEI: 2 Ex., Costa Rica, 24. 5. 1925, leg. NEVERMANN, als Cotypen ausgezeichnet.

nodieri THÉRY (*Leioptera*)

DEI: 1 Ex., Costa Rica, 16. 11. 1924, leg. NEVERMANN, als Paratypus ausgezeichnet.

obesa JAKOWLEFF (*Sphenoptera*)

DEI: 1 Ex., Persien, Luristan, leg. VON BODEMEYER, als Typus ausgezeichnet.

paulensis OBENBERGER (*Agrilus*)

DEI: 2 Ex., Brasilia, Sao Paulo, leg. MRÁZ, als Typen ausgezeichnet.

peruviana KERREMANS (*Chrysobothris*)

DEI: 1 Ex., Peru, Pozuzu, als Cotypus ausgezeichnet.

plaumanniellus OBENBERGER (*Agrilus*)

DEI: 1 Ex., Brasilien, Rondon, 24°38' B, 54°07' L, 500 m, leg. PLAUMANN, als Cotypus ausgezeichnet.

rondicus OBENBERGER (*Agrilus*)

DEI: 1 Ex., Brasilien, Rondon, 24°38' B, 54°07' L, 500 m, leg. PLAUMANN, als Cotypus ausgezeichnet.

sulcicollis KERREMANS (*Cisseeis*)

DEI: 1 Ex., S. Australien, Finke Revier, als Typus ausgezeichnet.

tananarivensis OBENBERGER (*Trachys*)

DEI: 1 Ex., Madagascar, Tananarive, 193, leg. OLSOUFIEFF, als Typus ausgezeichnet.

transvalensis OBENBERGER (*Acmaeodera*)

DEI: 1 Ex., Transvaal, Coll. OBENBERGER, als Typus ausgezeichnet.

trichelytrius OBENBERGER (*Pachyschelus*)

DEI: 1 Ex., Rio Caraguata, Mato Grosso, 3. 1953, als Cotypus ausgezeichnet.

volatris OBENBERGER (*Psilopecta*)

DEI: 1 Ex., Joko, Sd. Kamerun, HEYNE, als Paratypus ausgezeichnet.

zubaci OBENBERGER (*Trachys*)

DEI: 1 Ex., N. Guinea, als Typus ausgezeichnet.

Phylloceridae

dimidiatus SCHWARZ, 1906 (*Platocerus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 158

Holotypus, Peru, Pachitea, im DEI.

nigricollis SCHWARZ, 1902 (*Dodecacerus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1902, 154

♀ Holotypus, Peru, Chanchamayo, durch LANGE, im DEI.

ruficollis SCHWARZ, 1902 (*Platocerus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 200–201

Syntypen, Ecuador: Santa Inéz; Napo.

DEI: 1 Syntypus, Ecuador, Santa Inéz, leg. HAENSCH; 1 Syntypus, Ecuador, Napo, leg. HAENSCH.

Dicronychidae

alternatus SCHWARZ, 1906 (*Dicronychus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 370

♂♂ Syntypen, Delagoa-Bai.

DEI: 1♂, Syntypus, Delagoa Bai, leg. SCHNEIDER.

ambiguus SCHWARZ, 1903 (*Dicronychus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1903, 365—366

♂♀ Syntypen, Congo Franç., Benito.
DEI: 2 ♂♂, Syntypen, Congo Franç., Benito.

bipunctatus SCHWARZ, 1896 (*Dicronychus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 94

♂♂ Syntypen, Afrika, Niam-Niam.
DEI: 1 ♂, Syntypus, Njam-Njam.

crassipes SCHWARZ, 1905 (*Dicronychus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1905, 282—283

Syntypen, S. Thomé.
DEI: 1 Syntypus, S. Thomé.

ferrugineus SCHWARZ, 1906 (*Dicronychus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 369

♂♂ Syntypen, Deutsch Südwest-Afrika.
DEI: 1 ♂, Syntypus, D-Sw.Afr.

granifer SCHWARZ, 1896 (*Tarsalgus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 92

♂♂ Syntypen, Ost-Afrika, Dar-es-Salaam, leg. v. BENNIGSEN.
DEI: 1 ♂, Syntypus, D. Ost-Afrika, leg. v. BENNIGSEN.

pectinicornis SCHWARZ, 1896 (*Tarsalgus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 91—92

♂♀ Syntypen, Ost-Afrika, Dar-es-Salaam, leg. v. BENNIGSEN.
DEI: 1 ♂, Syntypus, Dar-es-Salaam.

prosternalis SCHWARZ, 1906 (*Dicronychus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 370

Syntypen, Kamerun, Victoria.
DEI: 1 ♀, Syntypus, Kamerun, Victoria.

schneideri SCHWARZ, 1906 (*Tarsalgus*)
Dtsch. ent. Ztschr. 1906, 370

Syntypen, Delagoa-Bai.
DEI: 1 ♂, Syntypus, Delagoa-Bai, leg. SCHNEIDER.

Dascillidae

mongolicus HEYDEN, 1889 (*Dascillus*)
Horae Soc. ent. Ross. 23, 675—676

2 ♂♂, 2 ♀♀, Syntypen, Kan-ssu, 16.—17. 6., 5.—9. 7. 1885, leg. POTANIN.
DEI: 2 Syntypen, Kan-ssu, 1885, leg. PATANIN, in Coll. HEYDEN.

Helodidae

corsicus NYHOLM, 1964 (*Cyphon*)
Opusc. ent. 29, 54, Fig. 6, 12, 18

8 ♂♂, 1 ♀, Syntypen, Korsika, teils ohne nähere Fundortangaben, teils Vizzavona.
DEI: 2 ♂♂, Syntypen, Corse, leg. CROISSANDEAU.

designandus NYHOLM, 1957 (*Cyphon*)
Ent. Tidskr. 78, 78

♀ Holotypus, Macedonia, Bitolja, Perister, 28. 7. 1909, leg. RAMBOUSEK, im DEI.

exotica CHAPIN, 1927 (*Ptilodactyla*)
Trans. Amer. Ent. Soc. 53, 246—247

♂ Holotypus, 115 ♂♂♀♀, Paratypen, USA, Melrose Park, Ill., im Rosengewächshaus, 11. 1926, leg. COMPTON; Holotypus (Cat. Nr. 40348), 66 Paratypen, im U.S.N.M.; weitere Paratypen, im Mus. Comp. Zool., Am. Mus. Nat. Hist., Acad. Nat. Sc., Philadelphia, Ill. St. Labor. Nat. Hist., Cal. Acad. Sc., British Mus. und DEI.
DEI: 1 Paratypus, Melrose Park, 3. 11. 1926, in greenhouse; 1 Paratypus, Melrose Park, bench soil rose house, 1. 12. to 17. 3. 1926, leg. COMPTON.

formosanus PIC, 1918 (*Cyphon*)
Mélanges exot. ent. 27, 5

Syntypen, Formosa.
DEI: 9 Syntypen, Formosa, Suisharyo, 10. 1911, leg. SAUTER.

friesei KLAUSNITZER, 1969 (*Cyphon*)
Beitr. Ent. 19, 840—841, Fig. 1—2

♂ Holotypus, Albanien, Borshi südlich Vlora, Sumpf am Lumi i Borshit, 14.—27. 5. 1961; 2 ♂♂, Paratypen, Borshi südlich Vlora, litorale Terrasse mit *Olea* und *Ficus*, 50—150 m, 14.—27. 5. 1961; alle Albanien-Expedition des DEI; Holotypus, 1 Paratypus, im DEI; 1 Paratypus, in Coll. KLAUSNITZER.
DEI: Holotypus, 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

fulviculus REITTER, 1898 (*Scyrtes*)
Wien. ent. Ztg. 17, 121

Zahlreiche Syntypen, Lenkoran, leg. KORB.

DEI: 1 historisches Exemplar, vielleicht Typus, Kasp. Meer-Geb., Lenkoran, 1897, leg. KORB.

klapperichi PIC, 1954 (*Ptilodaetyla*)
Bull. Soc. ent. Mulhouse 1954, 65

Zahlreiche Syntypen, China, Fukien, 18. 5. 1946, 10. 10. 1946, in Coll. KLAPPERICH und PIC.

DEI: 1 Syntypus, China, Fukien, Kuatun, 22. 5. 1946, leg. TSCHUNG SEN.

malabarensis PIC, 1938 (*Ptilodaetyla*)
Arb. morph. tax. Ent. 5, 333

Holotypus, Paratypen, Indien, Malabar, 1600 m, 26. 12. 1920. Holotypus, Paratypus, im DEI, Paratypus, in Coll. PIC.

DEI: Holotypus, 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

schwabei PIC, 1938 (*Cyphon*)
Arb. morph. tax. Ent. 5, 332—333

Holotypus, Paratypen, Chili, Puerto Puyuhuapi, an einem Gletscherfluß, 10—100 m, 27. 12. 1937, leg. SCHWABE, im DEI; Paratypus, in Coll. PIC.

DEI: Holotypus, 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

tournieri africanus KLAUSNITZER, 1972 (*Helodes*)
Ent. Nachr. 16, 70—71

♂ Holotypus, Tunis, DESBROCH., Coll. HEYDEN, im DEI.

Dryopidae

abditus HINTON, 1937 (*Cylloepus*)
Arb. morph. tax. Ent. 4, 106—108, Fig. 13—16

♂ Holotypus, 56 Paratypen, Mexico, Distr. Temascaltepec, Tejupilco, 4000 Fuß, 7. 1934, leg. HINTON; 1 Paratypus, vom gleichen Fundort, 16. 6. 1933. Holotypus, Paratypen in Coll. HINTON; 1 Paratypus, im DEI, 2 Paratypen, im U.S.N.M.

DEI: 1 ♀, Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung.

angusta HINTON, 1937 (*Sostea*)
Arb. morph. tax. Ent. 4, 94—96

Holotypus, Brazil, Sao Paulo, ex Coll. MELZER, im DEI.

DEI: Holotypus, Bras., Sao Paulo, leg. MUUS & MELZER.

clavipes HINTON, 1937 (*Pelonomus*)
Arb. morph. tax. Ent. 4, 99—100

♂ Holotypus, Brazil, Sao Paulo, 3. 11. 1924, leg. MELZER, im DEI.

DEI: ♂ Holotypus, Brasilien, S. Paulo, Est. S. Paulo, 3. 2. 1924, leg. MELZER.

doderoi BOLLOW, 1936 (*Dryops*)
Ent. Bl. 32, 156—157; Taf. 4, Fig. 3, 3a; Taf. 4, Fig. 4; Taf. 5, Fig. 3

♂ Holotypus, Neapel, 6. 9. 1869, Coll. KRAATZ, im DEI; 58 Paratypen; Italien, Neapel; Messira, Catania; Spanien, Toledo; Tanger; Marocco, Oran; im DEI und Coll. BOLLOW.

DEI: ♂ Holotypus, 3 ♂♂, 1 ♀, Paratypen, Neapel, 6. 9. 1869, Coll. KRAATZ.

foveicollis BOLLOW, 1938 (*Freyiella*)
Mitt. Münch. ent. Ges. 28, 169—172, Abb. 19—27

Holotypus, 75 Paratypen, Süd-China, Prov. Kuangtung, Ostfluß im Berggebiet Wang-lung-kum; Holotypus, im Mus. Berlin.

DEI: 3 Paratypen, China, Kuangtung, Wang-lung-kum, Berggebiet d. Lo-fau-zan, am Ostfluß, 4.—5., 12, leg. MELL S. V.

gracilis discretus BOLLOW, 1936 (*Dryops*)
Ent. Bl. 32, 156; Taf. 5, Fig. 3

♂ Holotypus, Tunis, ROLPH, im DEI; 5 ♂♂, Paratypen, Oran, Tunis.

DEI: 1 ♂, Paratypus, Oran, Coll. KRAATZ; der Holotypus befindet sich nicht in unserer Sammlung.

hintoni BOLLOW, 1940 (*Helichus*)
Mitt. Münch. ent. Ges. 30, 32—34; Abb. 246—253; Taf. 5, Fig. 5; Taf. 6, Fig. 3

Holotypus, 5 Paratypen, Kaukasus, Elisabethpol. Holotypus, Paratypen, in Coll. BOLLOW, Paratypen, im DEI und Coll. HINTON.

DEI: 1 Paratypus, Caucase, Elisabethpol, leg. BABADJANIDES.

horioni ILLIES, 1953 (*Lathelmis*)
Ent. Bl. 49, 179—180; Abb. 2, Fig. 9; Abb. 3

♂ Holotypus, Moravia, REITTER; 1 ♂, Paratypus, ohne Fundortangaben, Coll. SCHNEIDER-KELCH, im DEI; 1 ♂, Paratypus, ohne Fundortangaben, in Coll. Bayer. Zool. Staats.

DEI: ♂ Holotypus, Moravia, leg. REITTER; 1 Paratypus, ohne Fundortangaben, Coll. SCHNEIDER-KELCH.

horni HINTON, 1937 (*Cylloepus*)
Arb. morph. tax. Ent. 4, 109, Fig. 17, 18

♂ Holotypus, Mexico, Distr. de Temascaltepec, Tejupilco, unter 4000 Fuß, 7. 1934, leg. HINTON, in Coll. HINTON; 2 ♂♂, 1 ♀, Paratypen, Mexico, Sierra de Durango, 1922, Coll. SCHAUFUSS; 1 ♂, Paratypus, in Coll. HINTON; 1 ♂, 1 ♀, Paratypen, im DEI.

DEI: 1 ♂, 1 ♀, Paratypen, Sierra de Durango, 1922, leg. SCHAUFUSS.

humeralis CARTER, 1929 (*Notriolus*)

Austr. Zool. 6, 65–66; Taf. 4, Fig. 25

Holotypus, Paratypen, N. S. Wales: 18 Ex., Eccleston, Allyn River; 5 Ex., Williams River, Dungog und Dorrigo; leg. HERON. Holotypus, in Coll. CARTER.

DEI: 2 Paratypen, N.S.W., Dorrigo, leg. HERON.

konoi BOLLOW, 1940 (*Helichus*)

Mitt. Münch. ent. Ges. 30, 52–55, Abb. 279–295

♂ Holotypus, 63 Paratypen, Formosa, Anping, Haito, in Coll. FREY und im DEI.

DEI: 38 Paratypen, Formosa, Anping, 35 Ex., 22. 6. 1912, 1 Ex., 22. 5. 1912, 1 Ex., 7. 1912, 1 Ex., 5. 1911, leg. SAUTER.

leblanci PEYERIMHOFF, 1929 (*Stenelmis*)

Bull. Soc. ent. Fr. 1929, 171–172

Syntypen, Süd-Algerien, Tassile occidental, Tin-Tahart, 850 m, April.

DEI: 2 Syntypen, Tassili ouert, Tin Tahart, 24., 25. 4. 1925.

marginatus KONO, 1934 (*Grouvelleus*)

Insect. matsum. 8, 127

5 Syntypen, Shikoku, Koyadaira, 23.–29. 7. 1913, leg. GALLOIS; 1 Syntypus, Kiushu, Kumamoto, 3. 9. 1907, leg. KAWAMURA, Mus. Sapporo.

DEI: 3 Syntypen, Japan, Shikoku, Awa Kayadaira, 31. 7. 1913, leg. GALLOIS.

musgravei HINTON, 1935 (*Helichus*)

Pan-Pacif. Ent. 11, 69; Taf. 1, Fig. D

♂ Holotypus, zahlreiche Paratypen, Mexico, Distr. of Temascaltepec, Real de Arriba, 5.–7. 1933, 6000–7000 Fuß, leg. USINGER, im U.S.N.M. Paratypen, Mexico, Tejupilco, Juni, 4000 Fuß.

DEI: 1 Paratypus, Mexico, Real de Arriba, Temescaltepec, 22. 5. 1933, leg. HINTON & USINGER.

nevermanni HINTON, 1936 (*Stenelmis*)

Trans. Ent. Soc. London 85, 424–426; Taf. 1, Fig. 1; Textfig. 18–20

♂ Holotypus, Costa Rica, Reventazon, lux., 1. 11. 1934, leg. NEVERMANN, in Coll. HINTON; 12 Paratypen, vom gleichen Fundort, 11. 1931; 2. 1932; 7. und 11. 1934.

DEI: 1 Paratypus, Costa Rica, Hamburgfarm, Reventazon, Ebene Limon, lux. 29. 11. 1931, leg. NEVERMANN.

proximus HINTON, 1937 (*Cylloepus*)

Arb. morph. tax. Ent. 4, 106, Fig. 11

♂ Holotypus, Mexico, Necaxa, Puebla, leg. HEINE, im DEI.

punctatellus BOLLOW, 1936 (*Dryops*)

Ent. Bl. 32, 56–57; Taf. 1, Fig. 8, 8a; Taf. 2, Fig. 7

♂ Holotypus, 2 ♂♂, Paratypen, Turkestan, Kulias, Ak-sou-Thal, 1898, leg. HAUSER, im DEI; 1 Paratypus, in Coll. BOLLOW.

DEI: ♂ Holotypus, 1 ♂, Paratypus, Prov. Kuliab, Ak-sou-Thal, 1898, leg. HAUSER.

punctatostratus BOLLOW, 1940 (*Grouvellinus*)

Arkiv Zoologi 32 A, Nr. 13, 32–35, Abb. 61–67

♂ Holotypus, 40 Paratypen, Nord-Birma, Washaung, östlich von Myitkyina, ca. 200 m, 14. 7. 1934, Holotypus, Paratypen, im Mus. Stockholm, Paratypen, in Coll. FREY.

DEI: 2 Paratypen, mit den Angaben der Beschreibung.

punctulatus BOLLOW, 1940 (*Stenelmis*)

Arkiv Zoologi 32 A, Nr. 13, 24–26, Abb. 43–49

♂ Holotypus, 22 Paratypen, Nord-Birma, Washaung, östlich von Myitkyina, ca. 200 m, 14. 7. 1934; Holotypus, Paratypen im Riksmus. Stockholm; Paratypen, in Coll. FREY.

DEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, von BOLLOW als *punctatus* ausgezeichnet.**sauteri** KONO, 1936 (*Stenelmis*)

Arb. morph. tax. Ent. 3, 122

Holotypus, Formosa, Kankau, leg. SAUTER, im DEI.

DEI: Holotypus, Formosa, Kankau (Koshun), 7. 1912, leg. SAUTER.

sexualis HINTON, 1937 (*Cylloepus*)

Arb. morph. tax. Ent. 4, 102–106, Fig. 4–10, 12

♂ Holotypus, 80 Paratypen, Mexico, Distr. Temascaltepec, Tejupilco, 4000 Fuß, 7. 1934, leg. HINTON, in Coll. HINTON; 16 Paratypen, vom gleichen Fundort, 15.–28. 6. 1933, leg. HINTON und USINGER; 1 Paratypus vom gleichen Fundort, 5000 Fuß, Paratypen, im DEI, British Mus., U.S.N.M. und Coll. MUSGRAVE.

DEI: 3 Paratypen, Mexico, Tejupilco, Temescaltepec, 1 Ex., 15. 6. 1933, 2 Ex., 7. 1934, leg. HINTON.

similaris BOLLOW, 1936 (*Dryops*)

Ent. Bl. 32, 191–193; Taf. 4, Fig. 7+7a; Taf. 5, Fig. 8; Taf. 6, Fig. 6

♂ Holotypus, Breslau, Coll. LETZNER, im DEI. 42 Paratypen, Deutschland, Spanien, Sardinien, Österreich, Böhmen, Kärnten, Ungarn, Siebenbürgen, Kaukasus, Astrachan, Holland, Dänemark, Portugal, Türkei.

DEI: ♂ Holotypus, Breslau, LETZNER; 1 ♀, Paratypus, Karlowitz, LETZNER.

spinipes HINTON, 1934 (*Cylloepus*)

Rev. de Ent. Rio de Jan. 4, 192–193

♂ Holotypus, 69 Paratypen, Mexico, Real de Arriba, Distr. of Temascaltepec, 5.–7. 1933, 6000 Fuß, leg. USINGER & HINTON. Holotypus, im U.S.N.M.

DEI: 2 Paratypen, Mexico, Real de Arriba, Temescaltepec, 4. 6. 1933, 28. 5. 1933, leg. HINTON & USINGER.

submaculatus HINTON, 1937 (*Stenelmoides*)

Arb. morph. tax. Ent. 4, 109—111, Fig. 19—21

♂ Holotypus, 3 ♀♀, Paratypen, Brazil, Esp. Santo, 10. 1920. Holotypus, 1 Paratypus, im DEI; 2 Paratypen, in Coll. HINTON.

DEI: ♂ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, Espir. Santo, 10. 1920—11. 1921.

ungulatus HINTON, 1934 (*Linnius*)

Rev. de Ent. Rio de Jan. 4, 200—201

Holotypus, 154 Paratypen, Mexico, District of Temascaltepec, 5.—7. 1933, 6000 Fuß, leg. USINGER. 1 Paratypus, Mexico, Tejuipilco, Juni, 4000 Fuß. Holotypus, im U.S.N.M.

DEI: 7 Paratypen, Mexico, Real de Arriba, Temascaltepec, 4 Ex., 22. 5. 1933, 1 Ex., 28. 5. 1933, 1 Ex., 31. 5. 1933, 1 Ex., 2. 6. 1933, leg. HINTON & HINTON.

vicina GROUVELLE, 1896 (*Stenelmis*)

Ann. Mus. Civ. Stor. Nat. Genova (Ser. 2) 17 (= 37) (1896—97), 47—48

Syntypen, Ile d'Engano, leg. MODIGLIANI, im Mus. Genua.

DEI: 1 Syntypus, Engano, Bua-Bua, 5.—6. 1891, leg. MODIGLIANI.

Wahrscheinlich nicht beschrieben:

herthae BOLLOW, (*Esolus*)

DEI: 4 Ex., Thessalien, Pelion, als Paratypen ausgezeichnet.

Georyssidae

formosanus KONO, 1936 (*Georyssus*)

Arb. morph. tax. Ent. 3, 53—54

Holotypus, Formosa, Lambek, 2. 1908, leg. SAUTER, im DEI.

overbecki VAN EMDEN, 1934 (*Georyssus*)

Ent. Bl. 30, 198—200

7 Syntypen, Mittel-Java, Djokjakarta, 1932, leg. OVERBECK, im Mus. Dresden. 1 Syntypus, Süd-Sumatra, Wai Lima, Lampongs, 11.—12. 1921, leg. KARNY, im DEI.

DEI: 1 Syntypus, Sumatra, Wai Lima, Lampongs Nr. 1, 11.—12. 1921, leg. KARNY.

Heteroceridae

andalusicus BREIT, 1916 (*Heterocerus*)

Col. Rundsch. 5, 58—59

Syntypen: 2 Ex., ohne Fundortangaben, KRAATZ 866; 2 Ex., Sevilla, leg. MÜLLER; im Mus. Wien. Portugal: Quellar; Evora; Lissabon; leg. SCHATZMAYR, in Coll. LEONHARD und KREKICH-STRASSOLD.

DEI: 3 Syntypen, Lusitania, Evora, 5. 1910, leg. SCHATZMAYR; 1 Syntypus, Lusitania, Quellar, 5. 1911, leg. SCHATZMAYR.

fuscus KIESENWETTER, 1843 (*Heterocerus*)

Ztschr. Ent. (GERMAR) 4, 220, Fig. 11

Zahlreiche Syntypen, Deutschland.

DEI: 1 Syntypus, Deutschland, Berol.

glicki PACHECO, 1963 (*Heterocerus*)

Acta zool. mex. 6, Nr. 4, 5—6; Taf. 3, Fig. 11—16

♂ Holotypus, USA, Tex., Brownsville, 7. 4. 1959, leg. GLICK, im Inst. Biol. U.N.A.M., Mexico. Zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.

DEI: 9 Paratypen, USA, Texas, Brownsville, 7. 4. 1959, leg. GLICK.

imperator PACHECO, 1965 (*Tropicus*)

Monogr. Escuela nac. Agric. Coleg. Post-Graduad. (Chapingo, Mex.) Nr. 1, 1964, 114—115

♂ Holotypus, Brasilien, Etiquetas, Rio Caraguata, 21°41' B, 52°27' L, 400 m, 2. 1953, leg. PLAUMANN, im Chicago Nat. Hist. Mus. Paratypen, siehe Originalbeschreibung.

DEI: 1 Paratypus, Argentinien, La Paz, Entre Rios, 27. 1. 1951, leg. WITTENER.

intermuralis PACHECO, 1963 (*Heterocerus*)

Acta zool. mex. 6, Nr. 4, 3—5; Taf. 2—3, Fig. 1—10

♂ Holotypus, USA, Texas, Brownsville, 7. 4. 1959, leg. GLICK, im Inst. Biol. U.N.A.M. Mexico. Zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.

DEI: 10 Paratypen, USA, Texas, Brownsville, 7. 4. 1959, leg. GLICK.

marmota KIESENWETTER, 1850 (*Heterocerus*)

Stett. ent. Ztg. 11, 224

Syntypen, Spanien, Girona, Perpignan.

DEI: 5 historische Exemplare, vielleicht Typen, Perpignan.

stankerus PACHECO, 1963 (*Heterocerus*)

Acta zool. mex. 6, Nr. 4, 6—8; Taf. 4, Fig. 1—10

♂ Holotypus, Mexico, San Blas, Nayarit, 22. 3. 1962, leg. STANGE & PARKER, im Inst. Biol. U.N.A.M. Mexico. Zahlreiche Paratypen, siehe Originalbeschreibung.

DEI: 10 Paratypen, San Blas, Nay., 22. 3. 1962, leg. STANGE & PARKER.

Dermestidae

antoniae REITTER, 1884 (*Hadrotoma*)
Verh. nat. Ver. Brünn 22, 7

Syntypen, Lirík.

DEI: 1 Syntypus, Caspi.-M.-Gebiet, Liryk, leg. LEDER, REITTER.

apicebrunneus KALIK, 1955 (*Attagenus*)
Rev. zool. bot. afr. 52, 316–318, Fig. 29, 30

♂ Holotypus, 93 Paratypen, D.O.A., Lukuledi, ex. Coll. ERTL, im Mus. Belg. Kongo.
DEI: 1 Paratypus, D.O.A., Lukuledi, 1914, Coll. ERTL, Musée du Congo.

bellulus CHOBAUT, 1897 (*Anthrenus*)
Bull. Soc. ent. France 1897, 277–278

Syntypen, südliches Algerien: Ain Sefra, 6. 1896, leg. BLEUSE; Mecheria, 7. 1896, leg. DION; Ghardaia, 5. 1896, leg. CHOBAUT; Oase von Berriane, 9. 1897. Typen in den Sammlungen ABEILLE DE PERRIN, BEDEL, VAULOGER, CHOBAUT und Mus. Paris.

DEI: 1 Syntypus, Süd-Algerien, Ghardaia (MZAB).

bodemeyeri GANGLBAUER, 1900 (*Hadrotoma*)
In: BODEMEYER, Quer durch Kleinasien, 148–149

2 ♀♀ Syntypen, Kleinasien, Konia, leg. v. BODEMEYER.
DEI: 1 Syntypus, Asia minor, Konia, leg. v. BODEMEYER.

conradti PIC, 1927 (*Thaumaglossa*)
Ent. Mitt. 16, 247

Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI.

formosanus PIC, 1918 (*Orphinus*)
Mél. Exot. Ent. 27, 2

Syntypen, Formosa.

DEI: 1 Syntypus, Formosa, Anping, 7. 4. 1912, leg. SAUTER.

heydeni REITTER, 1881 (*Telops*)
Verh. nat. Ver. Brünn 19 (1880), 35

Syntypen, Marocco, Tanger.

DEI: 1 Syntypus, Marocco, DESBROCH., in Coll. HEYDEN.

horni PIC, 1927 (*Orphinus*)
Ent. Mitt. 16, 247

Holotypus, Paratypen, Ceylon, Anuradhapura, 1899, leg. HORN. Holotypus, im DEI; Paratypen, in Coll. PIC.
DEI: Holotypus, 4 Paratypen, Anuradhapura, 1899, leg. HORN.

klapperichi PIC, 1954 (*Tiresiomorpha*)
L' échange, Rev. Linn. 70, No 537, 11

Syntypen, China, 22. 4. 1946–1. 6. 1946, in Coll. PIC.

DEI: 1 Syntypus, China, Kuatun, Fukien, 1. 6. 46, leg. TSCHUNG SEN.

kratochvili KALIK, 1955 (*Attagenus*)
Rev. zool. bot. afr. 52, 305–307, Fig. 13, 14

♂ Holotypus, Paratypen, Cote d'Ivoire, Mandalao, leg. SKULINA, im Mus. Prag; 7 Paratypen, Sangha, Bandragava Mts., Suchan Fr., leg. SKULINA; 1 Paratypus, Haute Volta, Onagadongon.

DEI: 1 Paratypus, Mandalao, Cte d'Ivoire, leg. SKULINA.

luganensis STIERLIN, 1902 (*Dermestes*)
Mitt. schw. ent. Ges. 10, 425–426

Syntypen, Lugano.

DEI: 1 Syntypus, Lugano.

meridionalis KRAATZ, 1858 (*Trogoderma*)
Berl. ent. Ztschr. 2, 146

Syntypen, Griechenland, in der Königl. Samml.; Syntypen, Sizilien, in Coll. KRAATZ.

DEI: 1 Syntypus, Sicil., Grohm.

quadrinaculatus KRAATZ, 1858 (*Attagenus*)
Berl. ent. Ztschr. 2, 145

Syntypen, Griechenland; Syra, von Blumen, leg. ZEBE; bei Nauplia, leg. v. KIESENWETTER.

DEI: 1 Syntypus, Gracia, leg. ZEBE.

rufimembris PIC, 1927 (*Attagenus*)
Ent. Mitt. 16, 246

Holotypus, Zanzibar, im DEI.

rufiventris PIC, 1927 (*Attagenus*)
Ent. Mitt. 16, 246

Holotypus, Transvaal, leg. HARTMANN, im DEI.

rufiventris PIC, 1927 (*Thaumaglossa*)
Ent. Mitt. 16, 246–247

Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT, im DEI.

Wahrscheinlich nicht beschrieben:

sellatus L. W. SCHAUFUSS (*Anthrenus*)

DEI: 2 Ex., Callistoga, Aril., als Typen ausgezeichnet.

Byrrhidae

atrolucidus PIC, 1923 (*Pelocharops*)

Mél. Exot. Ent. 39, 3

Syntypen, Guinea, Addah, in Coll. PIC und GROUVELLE.

DEI: 1 Syntypus, Goldküste, Adah, Westafrika.

deubeli GANGLBAUER, 1900 (*Simplocaria*)

Verh. zool. bot. Ges. Wien 49 (1899), 534—535

Zahlreiche Syntypen, südöstliches Siebenbürgen, am Bucsecs, in subalpinen Wäldern unter Moos, leg. DEUBEL.

DEI: 2 Syntypen, Siebenbürgen, Bucsecs, alpin, leg. DEUBEL.

dovreensis MÜNSTER, 1902 (*Arctobyrrhus*)

Verh. zool. bot. Ges. Wien 52, 91

♂♂♀ Syntypen, Norwegen, Dovre.

DEI: 2 Syntypen, Dovre.

montanus CZWALINA, 1887 (*Byrrhus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 31, 495—496

Syntypen, Monte Rosa, unter Steinen, leg. CZWALINA.

DEI: 1 Syntypus, Mt. Rosa.

montenegrina OBENBERGER, 1916 (*Simplocaria*)

Arch. Nat. 82 A 4, 30—31

Einige Syntypen, Montenegro, auf dem Südabhang des Maglić bei Trnovičko Jezero, aus Moos gesiebt, leg. OBENBERGER.

DEI: 1 Syntypus, Montenegro, Maglić, 8. 1913, leg. OBENBERGER.

pumilio OBENBERGER, 1916 (*Limnichus*)

Arch. Nat. 82 A 4, 29—30

Syntypen, Corfu, leg. PAGANETTI.

DEI: 1 Syntypus, Corfu, leg. PAGANETTI.

striatopunctata incisa OBENBERGER, 1916 (*Syncalyptra*)

Arch. Nat. 82 A 4, 30

Syntypen, Corfu.

DEI: 1 Syntypus, Corfu, leg. PAGANETTI.

taygetanus REITTER, 1884 (*Curimus*)

Dtsch. ent. Ztschr. 28, 70

Syntypen, Griechenland, Nordmorea, leg. BRENSKE.

DEI: 1 historisches Ex., Griechenland, Morea, Hagios Wlassis, leg. BRENSKE.

Wahrscheinlich nicht beschrieben:

densepunctatus REITTER (*Limnichus*)

DEI: 1 Ex., Goldküste, Adah, als Typus ausgezeichnet.

leonhardi OBENBERGER (*Curimus*)

DEI: 1 Ex., Kephallenia, Megalo Vupo, 4. 4. 1905, leg. LEONHARD, als Typus ausgezeichnet.

skradensis OBENBERGER (*Syncalyptra*)

DEI: 2 Ex., Croatie, Skad, 7. 1913, leg. OBENBERGER, als Typen ausgezeichnet.

Zusammenfassung

Vorliegender Katalog beinhaltet die Coleopteren-Typen der Familien Rhipiceridae (8 Typen), Cebrionidae (8 Typen), Elateridae (895 Typen), Eucnemidae (9 Typen), Throscidae (3 Typen), Chelonariidae (9 Typen), Buprestidae (242 Typen), Phylloceridae (3 Typen), Diceronychidae (9 Typen), Dascillidae (1 Type), Helodidae (10 Typen), Dryopidae (26 Typen), Georyssidae (2 Typen), Heteroceridae (7 Typen), Dermestidae (16 Typen) und Byrrhidae (8 Typen), die in den Sammlungen der Abteilung Taxonomie der Insekten des Institutes für Pflanzenschutzforschung, Bereich Eberswalde (ehemals Deutsches Entomologisches Institut), aufbewahrt werden.

Summary

The present catalogue contains the types of Coleoptera of the families Rhipiceridae (8 types), Cebrionidae (8 types), Elateridae (895 types), Eucnemidae (9 types), Throscidae (3 types), Chelonariidae (9 types), Buprestidae (242 types), Phylloceridae (3 types), Diceronychidae (9 types), Dascillidae (1 type), Helodidae (10 types), Dryopidae (26 types), Georyssidae (2 types), Heteroceridae (7 types), Dermestidae (16 types) and Byrrhidae (8 types) preserved in the collections of the Department of Taxonomy of Insects in the Eberswalde branch of the Institute of Plant Protection Research (former Deutsches Entomologisches Institut).

Резюме

Данный каталог включает типы Coleoptera следующих семейств: Rhipiceridae (8 типов), Cebrionidae (8 типов), Elateridae (895 типа), Eucnemidae (9 типов), Throscidae (3 типа), Chelonariidae (9 типов), Buprestidae (242 типа), Phylloceridae (3 типа), Diceronychidae (9 типов), Dascillidae (1 тип), Helodidae (10 типов), Dryopidae (26 типов), Georyssidae (2 типа), Heteroceridae (7 типов), Dermestidae (16 типов) и Byrrhidae (8 типов), хранящиеся в коллекциях отдела таксономии насекомых при Научноисследовательском институте, Эберсвальдский филиал, (бывший Немецкий энтомологический институт).