

Katalog der in den Sammlungen des Senckenberg Deutschen Entomologischen Instituts aufbewahrten Typen – Coleoptera: Cerambycidae

HANNELORE GAEDIKE¹ und LUTZ BEHNE²

¹ Florusstraße 5, 53225 Bonn

² Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut, Eberswalder Straße 90, 15374 Müncheberg

Published on 2013-06-14

Zusammenfassung

Die Typen der Familie Cerambycidae (Coleoptera) in den Sammlungen des Senckenberg Deutschen Entomologischen Instituts werden aufgelistet. Mitgeteilt werden jeweils das Zitat der Erstbeschreibung und Angaben über das vorhandene Typenmaterial. Die Sammlungen enthalten 445 Primärtypen, davon 78 Holotypen, 29 Lectotypen und Syntypen von 338 Arten. Von 57 weiteren Arten existieren Paratypen oder Paralectotypen. Von 25 Arten sind als Typen etikettierte Tiere wahrscheinlich nicht beschrieben.

Summary

The type specimens of the family Cerambycidae (Coleoptera) in the collections of the Senckenberg Deutsches Entomologisches Institut are listed. In each case, the original description is cited and information on the extant type material is presented. The collections contain 445 primary types, including 78 holotypes, 29 lectotypes and syntypes of 338 species. Paratypes and paralectotypes of a further 57 species are present. Specimens of 25 species are labelled as types, but these species have probably not been described.

Cerambycidae

abakumovi sarkandicum DANILEVSKY, 2004, *Dorcadiion*

Les Cahiers Magellanes 36: 4

♂ Holotypus, Kazakhstan, north foothills of Dzhungarsky Alatau, 10 km SW Sarkand, 900-1100 m, 14.V.2002, leg. & Coll. DANILEVSKY; 122 Paratypen siehe Originalbeschreibung.

SDEI: 2 ♂ Paratypus, Kazakhstan, Dzhungarsky Alatau, Sarkand, 900 m, 14.V.2002, leg. M. DANILEVSKY.

accola HEYDEN, 1894, *Dorcadiion*

Dtsch. ent. Ztschr. 38, 87

♂ Holotypus, Asia minor, Mardin, in Coll. v. HEYDEN, im SDEI.

achilleae HOLZSCHUH, 1971, *Phytoecia*

Mitt. Forstl. Bundes-Versuchsanstalt Wien 94, 68-69

Holotypus, 47 Paratypen, Anatolien, Amanusgebirge, Prov. Adana, Nurdğai geçidi, 1000-1200 m, 13.-27.V. 1970, an *Achillea*, leg. Holzschuh und 15., 16.V.1969, leg. Wewalka, in Coll. Holzschuh.

SDEI: 1 Paratypus, Anatolien, Prov. Adana, Nurdag geçidi, 13.-27.V.1970, 800-1300 m, leg. HOLZSCHUH.

aculeatus meridionalis HÜDEPOHL, 1979, *Oxymerus*

Ent. Arb. Mus. G. Frey 28, 23-25, 28

♂ Holotypus, Argentinien, Chaco de Santiago del Estero, Bords du Rio Salado, Env. d' Icano, 1900, leg. WAGNER,

im Museum Paris; zahlreiche ♂ ♀ Paratypen siehe Originalsebeschreibung.
SDEI: 1 Paratypus, Paraguay, Concepcion, leg. WEISKE; 1 Paratypus, Paraguay.

acutivittis KRAATZ, 1879, *Clytus*
Dtsch. ent. Ztschr. 23, 111-112, Taf. 1, Fig. 1
Mehrere Ex. Ost-Sibirien, Amur, leg. CHRISTOPH; 1 Ex. Japan, leg. v. HILGENDORF, im Königlichen Museum (Museum für Naturkunde Berlin), Syntypen.
SDEI: 4 Syntypen, Sibirien, Amur, leg. CHRISTOPH, Coll. KRAATZ, Coll. F. MÜLLER, Coll. v. HEYDEN.

acutoides SCHWARZER, 1925, *Glenea*
Ent. Bl. 21, 151
Mehrere Syntypen, Formosa, Kosempo, 7.VI.1912, leg. SAUTER.
SDEI: 3 Syntypen, Formosa, Kosempo, 7.VI.1912, leg. SAUTER.

aestuans ubangiensis FIEDLER, 1938, *Ceroplesia*
Dtsch. ent. Ztschr. 1938, 592
Holotypus, 25 Paratypen, Afrika, Fort Sibut, Fort Crampel, Surango, Njam-Njam, Uganda, im Museum Berlin, Museum Brüssel und SDEI.
SDEI: 1 Paratypus, Nyam-Nyam, Coll. KRAATZ.

albicus AURIVILLIUS, 1907, *Phrosyne*
Dtsch. ent. Ztschr. 1907, 77-78
Mehrere Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, via SCHENKLING an AURIVILLIUS, im SDEI.
SDEI: 5 Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

albifrons HEYDEN, 1886, *Menesia*
Dtsch. ent. Ztschr. 30, 276-277
Holotypus, Amur, Suyfun-Fluss, 1885, leg. DÖRRIES, durch STAUDINGER, No. 366, in Coll. v. HEYDEN, im SDEI.

albivittis KRAATZ, 1879, *Liopus*
Dtsch. ent. Ztschr. 23, 112-113, Taf. 1, Fig. 9
Holotypus, Ost-Sibirien, Amur, leg. CHRISTOPH, im SDEI 1877.

albocinctus MELZER, 1930, *Atrypanius*
Arch. Inst. biol. S. Paulo 3, 198-199, Taf. 17, Fig. 16
Mehrere Syntypen; Estado de Sao Paulo, Capital, Santos, Guaraja, leg. MELZER; Amparo, leg. NAVARRO DE ANDRADE; Estado de Santa Catharina, Joinville, leg. SCHMITH; Estado de Minas Geraes, Mar de Hespanha, leg. ZIKAN; Estado Epirito Santo, leg. ZIKAN.
SDEI: 1 Syntypus, Est. S. Paulo, Guaraja, 9.XII.1920, leg. MELZER.

albomaculatus SCHWARZER, 1924, *Pseudonephelotus*
Treubia 5, 237

Mehrere Syntypen, Süd-Sumatra, Wai Lima, Lampongs, XI-XII.1921, leg. KARNY & SIEBERS.
SDEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, ex Museum Buitenzorg, No. 160.

alboscutellata KRAATZ, 1862, *Stenostola*
Berl. ent. Ztschr. 6, 124-125
♂ ♀ Syntypen, Griechenland (?), leg. KRÜPER.
SDEI: 1 Paralectotypus, ohne Fundortangaben, Designation: SAMA.

albovittigera HEYDEN, 1863, *Phytoecia*
Berl. ent. Ztschr. 7, 130
Mehrere Syntypen, europäische Türkei, durch FEHR, in Coll. v. HEYDEN.
SDEI: Lectotypus, Turcia, durch FEHR, Coll. v. HEYDEN, Designation: SAMA.

algerica DESBROCHERS, 1870, *Phytoecia*
Abeille 7, 126-127
3 Syntypen, Algérie (Bône), in Coll. DESBROCHERS.
SDEI: 1 hist. Ex. „*Phytoecia algerica* DESBR. Al.“, nach SAMA „forse Paratypus“.

alienus MELZER, 1932, *Probatius*
Rev. Ent. S. Paulo 2, 431-432, Taf. 6, Fig. 4
Brasilien, Estado de Minas Geraes, Passa Quatro, Fazenda dos Campos, leg. ZIKAN, Holotypus, mehrere Paratypen, in Coll. MELZER und im SDEI.
SDEI: 2 Paratypen, Brasilien, Minas, Passa Quatro, Faz. dos Campos, leg. ZIKAN.

altaica PLAVILSTSHIKOV, 1933, *Agapanthia*
Ent. Nachr. bl. Troppau 7, 113-116
Mehrere Syntypen, Sibiria, Altai centr., Ojratis, pag. Shebalino, 27.VI., 1.-21.VII.1932, leg. VALDAEV.
SDEI: 3 Syntypen, Altai centr., Shebalino, 24., 27.VI., 3.VII.1932, leg. VALDAEV.

altaicum SUVOROV, 1909, *Neodorcadion*
Rev. Russe d'Ent. 9, 89-90
Mehrere Syntypen, Altai, Anfang VII.; in der Nähe des Dorfes Altaiskaja, Anfang VI.; in der Nähe des Dorfes Bolschenarymskaja, 1906; leg. JACOBSON, Coll. SEMENOV-TIAN-SHANSKY.
SDEI: 2 Syntypen, Altai, Altaiskaja, 3.VII.1906, leg. JACOBSON, Coll. KLÄGER.

alternans SCHWARZER, 1925, *Saimia*
Ent. Bl. 21, 62
Mehrere Syntypen, Formosa: Kankau; Kosempo, X.1912; Pilam, VIII.1912; leg. SAUTER.
SDEI: Formosa, leg. SAUTER: 11 Ex. Kosempo, VI.1909/ 7.VII.1909/ 7.VII.1911/ 7.X.1911/ 7.VIII.1911/ 22.V.1912/ VI.1912; 2 Ex. Kankau (Koshun), V., IX.1912, Syntypen.

- alticollis* KRAATZ, 1879, *Grammoptera*
Dtsch. ent. Ztschr. 23, 103-104
Holotypus, Ost-Sibirien, Amur, leg. CHRISTOPH, im SDEI, Coll. KRAATZ.
- amurensis* KRAATZ, 1879, *Asemum*
Dtsch. ent. Ztschr. 23, 97
Mehrere Syntypen, Ost-Sibirien, Amur, leg. CHRISTOPH.
SDEI: 5 Syntypen, Amur, 1877, leg. CHRISTOPH, Coll. KRAATZ.
- amurensis* KRAATZ, 1879, *Agapanthia*
Dtsch. ent. Ztschr. 23, 115-116
Mehrere Syntypen, Ost-Sibirien, Amur, leg. CHRISTOPH.
SDEI: Lectotypus, Sibirien, Amur, leg. CHRISTOPH, Coll. KRAATZ, Designation: SAMA.
- amurensis* KRAATZ, 1879, *Pachyta*
Dtsch. ent. Ztschr. 23, 69-71, Taf. 1, Fig. 21-23
Mehrere Syntypen, Ost-Sibirien, Amur, leg. CHRISTOPH.
SDEI: 7 Syntypen, Sibirien, Amur, 1877, leg. CHRISTOPH, Coll. KRAATZ, Coll. F. MÜLLER, Coll. v. HEYDEN.
- amurensis* KRAATZ, 1879, *Toxotus*
Dtsch. ent. Ztschr. 23, 100-101
Mehrere Syntypen, Ost-Sibirien, Amur, leg. CHRISTOPH.
SDEI: 5 Syntypen, Sibirien, Amur, leg. CHRISTOPH, Coll. KRAATZ, Coll. v. HEYDEN.
- anancyloides* SCHWARZER, 1925, *Coptops*
Ent. Bl. 21, 61
Mehrere Syntypen, Formosa: Fuhosho, VI.1909; Hoozan, IX.1910; leg. SAUTER.
SDEI: Syntypen, Formosa, leg. SAUTER: 3 Ex. Fuhosho, VI., VII.09; 2 Ex. Hoozan, 7.IX.1908 und 1910.
- androsovi* SUVOROV, 1909, *Compsodordacion*
Rev. Russe d'Ent. 9, 93-94
Mehrere Syntypen; in der Nähe der Station Kara-Tschakat (kleine Barsuki-Steppe), Gebiet Turgai, Anfang IV.1898; in den Sand-Steppen Dzhideti, Gebiet Turgai, 7.-12.V.1904, leg. DUBJANSKY; Umgebung der Station Tshelkar (grosse Barsuki-Steppe), IV.1908, leg. ANDROSOV.
SDEI: 2 ♂ Syntypen, Kirghisien, Tshakat, distr., Steppe Basuki, Gebiet Turgai, leg. ANDROSOV, Coll. KLÄGER (als ab. *rufiscapus* Suv. bezettelt).
- angolensis* LEPESME & BREUNING, 1955, *Hypoescrus*
Bull. Soc. ent. Fr. 60, 45
♀ Holotypus, Angola, Benguella, leg. WELLMANN, Coll. KRAATZ, im SDEI.
- angulicollis* HEYDEN, 1878, *Strangalia*
In: SCHNEIDER & LEDER, Beitr. Kauk. Käferf., 323-324
2 ♂, 2 ♀ Syntypen, Persien, bei Hadschyabad, leg. LEDERER, in Coll. TÜRK.
SDEI: Lectotypus, Hadschyabad, leg. LEDERER, durch TÜRK, von SAMA festgelegt.
- angustata* MELZER, 1932, *Oreoderma*
Rev. Ent. S. Paulo 2, 423-424, Taf. 6, Fig. 2
Brasilien, Estado de Pernambuco, Tapéra, leg. PICKEL; Estado do Espírito Santo, leg. HOFFMANN; Holotypus, mehrere Paratypen, in Coll. MELZER und im SDEI.
SDEI: 1 Paratypus, Espí. Santo, X.1920-II.1921, leg. HOFFMANN.
- angustefasciatus* HEYDEN, 1884, *Anaglyptus*
Dtsch. ent. Ztschr. 28, 297-298
Holotypus, Insel Askold, Vladivostok, 1883, in Coll. v. HEYDEN, im SDEI (durch KOLTZE).
- angustisternis* GOUNELLE, 1911, *Euryptera*
Ann. Soc. ent. Fr. 80, 9-10
15 ♂, 18 ♀ Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy.
SDEI: 2 Syntypen, Brésil, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. KRAATZ.
- anticemaculatus* SCHWARZER, 1925, *Chlorophorus*
Ent. Bl. 21, 27-28
Mehrere Syntypen, Formosa: Alikang, VI.1909; Kankau, V., VI., VIII.1912; leg. SAUTER.
SDEI: Formosa, leg. SAUTER, Syntypen: 3 Ex. Kankau, Koshun, V., VI., VIII.1912; 1 Ex. Alikang, VI.1909.
- anulicornis* SCHWARZER, 1925, *Glenea*
Ent. Bl. 21, 149-150
Mehrere Syntypen, Formosa: Kosempo, VI.1911; Kankau, VII.1912; leg. SAUTER.
SDEI: Formosa, leg. SAUTER, Syntypen: 1 Ex. Kosempo, VI.1911; 1 Ex. Kankau, Koshun, VII.1912.
- apicale* SCHWARZER, 1925, *Iphra* ?
Ent. Bl. 21, 23
Mehrere Syntypen, Formosa: Fuhosho, 7.IX.; Kankau, 7.IV., IX.1912; leg. SAUTER.
SDEI: Formosa, leg. SAUTER, Syntypen: 3 Ex. Kankau, IV., V., IX.1912; 1 Ex. Fuhosho, 7.IX.
- apicalis* AURIVILLIUS, 1907, *Euniolia*
Dtsch. ent. Ztschr. 1907, 80
Mehrere Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, im SDEI.
SDEI: 1 Syntypus, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.
- apicalis* SCHWARZER, 1924, *Pterolophia*
Treubia 5, 238
Mehrere Syntypen, Süd-Sumatra, Wai Lima, Lampongs, XI.-XII.1921, leg. KARNY & SIEBERS.
SDEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

apicalis GOUNELLE, 1911, *Stenygra*

Ann. Soc. ent. Fr. 80, 123

4 ♂, 2 ♀ Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, Santa Cathrina, Espírito-Santo, Minas Geraes, im Britischen Museum, SDEI und in Coll. GOUNELLE.

SDEI: 1 Syntypus, Brasilien, Coll. KRAATZ.

apicalis SCHWARZER, 1924, *Tetraommatus*

Treubia 5, 236

Mehrere Syntypen, Süd-Sumatra, Wai Lima, Lampongs, XI.-XII.1921, leg. KARNY & SIEBERS.

SDEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, No. 17, ex Museum Buitenzorg.

arandae SCHRAMM, 1911, *Dorcadion*

Bol. Real. Soc. Esp. Hist. Nat. 11, 306-307

3 ♂, 5 ♀ Syntypen, Spanien, Sierra de Cameros, Logroño, leg. ARANDA, im Museum Madrid.

SDEI: 5 Syntypen, Sierra de Cameros, Logrono, leg. ARANDA, Coll. KLÄGER, Coll. v. HEYDEN.

araneipes SCHWARZER, 1925, *Raphuma*

Ent. Bl. 21, 28-29

Holotypus, Formosa, Kankau, IV.1912, leg. SAUTER, im SDEI (als *gracilipedes* bezettelt!).

araneipes pallida SCHWARZER, 1925, *Raphuma*

Ent. Bl. 21, 29

Holotypus, Formosa, Kosempo, 22.V.1912, leg. SAUTER, im SDEI (als *gracilipedes pallida* bezettelt!).

ardoisi SCHRAMM, 1909, *Dorcadion*

Bol. Real. Soc. Esp. Hist. Nat. 9, 296-298

Mehrere Syntypen, Spanien, Sierra de Gredos, 1900.

SDEI: 2 Syntypen, Sierra de Gredos, Avila, V.1904, leg. SCHRAMM, Coll. v. HEYDEN.

argonauta SUVOROV, 1913, *Dorcadion*

Rev. Russe d'Ent. 13, 74-75

Mehrere Syntypen, im Gouv. Eriwan, Umgebung vom Dorfe Kisilkom, leg. MALJUSCHENKO und DOBROW-LJANSKY.

SDEI: 17 Syntypen, Eriwan G., Kisilkom, leg. MALJUSCHENKO, Coll. KLÄGER (davon 8 Ex. ab. *pallescens* SUV.).

arietinum charynense DANILEVSKY, 1996 *Dorcadion*

Lambillionea 96: 610-611 (*charynensis* lapsus)

♂ Holotypus, Kazakhstan, north-east Turaigyr Mts near Charyn river, 1200 m, leg. & Coll. DANILEVSKY; 330 Paratypen vom gleichen Fundort in der Sammlung des Autors.

SDEI: 1 ♂, 1 ♀ Patatypen, Kazakhstan, Charyn Riv., 1200 m, 3.V.1994, leg. M. DANILEVSKY.

arietinum zhalanash DANILEVSKY, 1996 *Dorcadion*

Lambillionea 96: 614

♂ Holotypus, 641 Paratypen, Kazakhstan, 26 km N Zhalanash, 1300 m, 15.IV.1991, leg. & Coll. M. Danilevsky SDEI: 1 ♂, 1 ♀ Paratypen, vom gleichen Fundort.

armata var. *nigricornis* STIERLIN, 1864, *Strangalia*

Berl. ent. Ztschr. 8, 153

♂ Syntypen, Sizilien, durch PFISTER.

SDEI: 1 ♂, Sicil., Designation: SAMA (Die ursprünglich vorgenommene Auszeichnung als Holotypus ist als Lectotyphenfestlegung zu werten).

ascoldensis HEYDEN, 1884, *Atimura*

Dtsch. ent. Ztschr. 28, 298

2 Syntypen, Insel Askold, in Coll. v. HEYDEN und Coll. KOLTZE, im SDEI, Amur, 1884.

asiaticum SCHWARZER, 1925, *Neosphaerion*

Ent. Bl. 21, 22

Mehrere Syntypen, Formosa: Kosempo, IX., X.1911/ V., VI., VII.1912; Fuhosho, 7.IX.1912; Sokutsu, VII.1912; leg. SAUTER.

SDEI: Formosa, leg. SAUTER, Syntypen: 1 Ex. Fuhosho, 7.IX.; 1 Ex. Kosempo, 22.V.1912; 3 Ex. Banshoryo-Distr., Sokutsu, 22.VI., 7.VII.1912.

assimilis AURVILLIUS, 1908, *Pelargoderus*

Dtsch. ent. Ztschr. 1908, 215-216

Mehrere Syntypen, Neu-Pommern, Herbertshöhe, Neu-Lauenburg, leg. v. BENNIGSEN.

SDEI: 2 Syntypen, D. N. Guinea, Herbertshöhe, Neu-Lauenburg, Coll. v. BENNIGSEN.

atticum KRAATZ, 1873, *Dorcadion*

In: KÜSTER, Käf. Europ. 29, 72; als var. von *saulcy* THOMS. beschrieben

12 ♂ Syntypen, ohne Fundort, durch v. HELDREICH und KRÜPER.

SDEI: 5 Syntypen, ohne Fundort, Coll. KRAATZ.

auratipennis KOLBE, 1900, *Mecothyreia*

Berl. ent. Ztschr. 45, 302-303

1 ♂, West-Afrika, Mhonda; 1 ♀, Kilimandscharo, leg. v. BENNIGSEN; Syntypen.

SDEI: 1 Syntypus, Kilimandscharo, Coll. v. BENNIGSEN.

aureovittata AURIVILLIUS, 1907, *Sophronica*

Dtsch. ent. Ztschr. 1907, 81-82

Mehrere Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, im SDEI.

SDEI: 1 Syntypus, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

auricomum rubescens M. SCHMIDT, 1924, *Callichroma*

Dtsch. ent. Ztschr. 1924, 320

Mehrere Syntypen, Ecuador, Gualaquiza, Coll. B. SCHWARZER.

SDEI: 1 Syntypus, Columbien, Cauca.

- auricomum viridescens* M. SCHMIDT, 1924, *Callichroma*
Dtsch. ent. Ztschr. 1924, 320
Mehrere Syntypen, Brasilien, Para, Tapajos (n. Bat. 1870), Obidos (HOFFMANNS Stett.); Rio Jurua, Rio Purus (MOECKEL und DUHAUT Bln.); Columbien (PEHLKE, Stett., Coll. SCHW.), Esmeralda (Da.); ohne Fundortangabe, ex Coll. RICHTER Bln.
SDEI: 4 Syntypen, Columbia, Esmeralda, Coll. HORN.
- aurivilliusi* HELLER, 1912, *Paracomeron*
Ent. Mitt. 1, 174–175, Fig. 4
Mehrere Syntypen, Nova Guinea, Coll. v. BENNIGSEN.
SDEI: 1 Syntypus, Neuguinea, leg. und Coll. v. BENNIGSEN.
- aurovittatum* KRAATZ, 1873, *Dorcadion*
In: KÜSTER, Käf. Europ. 29, 81
Mehrere Syntypen, Klein-Asien, durch KINDERMANN, in Coll. MNISZECK und Coll. KRAATZ.
SDEI: 1 Syntypus, Asia minor, Coll. KRAATZ.
- australis* SCHWARZER, 1926, *Gnoma*
Senckenbergiana 8, 286–287, Taf. 4, Fig. 26, 27
♂ Holotypus, 2 ♂, 3 ♀ Paratypen, Coen Distrikt, Cape York, leg. HACKER, im SDEI, im Senckenberg-Museum und in Coll. SCHWARZER.
SDEI: 4 Paratypen, Queensland, Coen Distrikt, Cape York, leg. HACKER, Coll. HACKER.
- balcanica* HAMPE, 1870, *Pachyta*
Berl. ent. Ztschr. 14, 336
5 Syntypen, Balkan, leg. HABERHAUER.
SDEI: 3 Syntypen, Balkan, leg. HABERHAUER, Coll. KRAATZ, Coll. v. HEYDEN.
- bangi* HEYDEN, 1894, *Dorcadion*
Dtsch. ent. Ztschr. 38, 89, Taf. 1, Fig. 4
4 Syntypen, Asia minor, Kastemuni, durch STAUDINGER.
SDEI: 2 Syntypen, Kastemuni, durch STAUDINGER, Coll. KRAATZ.
- basale* KRAATZ, 1873, *Dorcadion*
In: KÜSTER, Käf. Europ. 29, 86
♂ Holotypus, Armenien, leg. STEVEN, in Coll. KRAATZ, im SDEI.
- basalis* AURIVILLIUS, 1908, *Abryna*
Dtsch. ent. Ztschr. 1908, 221–222
♀ Holotypus, Salomonen, Insel Tulagi, leg. v. BENNIGSEN, im SDEI.
- basalis* JORDAN, 1894, *Frea*
Novit. Zool. 1, 233–234
Mehrere Syntypen, Kuilu, 1892, leg. MOCQUERYS und LOANDA.
SDEI: 1 Syntypus, Loanda, Coll. KRAATZ.
- basalis* AURIVILLIUS, 1908, *Pterolophia*
Dtsch. ent. Ztschr. 1908, 222
♀ Holotypus, Salomonen, Insel Tulagi, leg. v. BENNIGSEN, im SDEI.
- basalis* SCHWARZER, 1925, *Xylotrechus*
Ent. Bl. 21, 25–26
Mehrere Syntypen, Formosa: Taihorinsho, 7.IX., VI.1911; Alikang, VI.1909; Kosempo, VI.1909/ 7.XII.1911; Fuhosho, VI.1909; Kankau, V.1912; leg. SAUTER.
SDEI: Formosa, leg. SAUTER, Syntypen: 2 Ex. Kosempo, 7.IX.1909/1912; 4 Ex. Kankau, Koshun, IV., VI.1912; 3 Ex. Taihorin, 22.VI., 22.VIII., VI.1911 (nicht Taihorinsho); 2 Ex. Alikang, VI.1909.
- beckeri* KRAATZ, 1873, *Dorcadion*
In: KÜSTER, Käfer Europ. 29, 71
1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Derbent, leg. BECKER.
SDEI: 1 Syntypus, Derbent, Coll. KRAATZ.
- bennigseni* KOLBE, 1897, *Afrocomis*
Die Käfer Dtsch. Ost-Afr., 352
Mehrere Syntypen; Khutu, Lumba-Thal, 28.XI.1894, leg. STUHLMANN; Usaramo, leg. v. BENNIGSEN; Sansibar (wohl Festland, leg. C. W. SCHMIDT).
SDEI: 1 Syntypus, Usaramo, Coll. v. BENNIGSEN.
- bennigseni* AURIVILLIUS, 1908, *Docohammus*
Dtsch. ent. Ztschr. 1908, 217, Taf. 3, Fig. 3
Holotypus, D. O. Afrika, Mpuapua, leg. v. BENNIGSEN, im SDEI, Coll. v. BENNIGSEN.
- bennigseni* AURIVILLIUS, 1908, *Monochamus*
Dtsch. ent. Ztschr. 1908, 216–217
Mehrere Syntypen, Karolinen-Inseln, Ponape, leg. v. BENNIGSEN.
SDEI: 13 Syntypen, Karolinen, Ponape, Coll. v. BENNIGSEN.
- bennigseni* AURIVILLIUS, 1908, *Memophas*
Dtsch. ent. Ztschr. 1908, 215
♀ Holotypus, Deutsch Neu-Guinea, Herbertshöhe, leg. v. BENNIGSEN; im SDEI, Coll. v. BENNIGSEN.
- bennigseni* KOLBE, 1897, *Plocederus*
Die Käfer Dtsch. Ost-Afr., 297
Mehrere Syntypen, Dar-es-Salaam, VIII.1894, leg. STUHLMANN und leg. v. BENNIGSEN.
SDEI: 1 Syntypus, Dar-es-Salaam, leg. v. BENNIGSEN, Coll. v. BENNIGSEN.
- bennigseni* AURIVILLIUS, 1908, *Rosenbergia*
Dtsch. ent. Ztschr. 1908, 217–218
Mehrere Syntypen, Deutsch Neu-Guinea, Sattelberg, leg. v. BENNIGSEN.
SDEI: 1 Syntypus, D. N. Guinea, Sattelberg.

bennigseni LAMEERE, 1912, *Xaurus*

Mém. Soc. Ent. Belg. 21, 161-162

1 ♀, Holländ. Neu-Guinea, Wendesi, leg. MEYERE, im Museum Amsterdam; 1 ♀, Deutsch-Neu-Guinea, leg. v. BENNIGSEN, durch HORN; 1 ♂, Grenze zwischen Holländ. und Deutsch-Neu-Guinea, Coll. SCHENKLING, im SDEI: Syntypen.

SDEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, D. N. Guinea, Deutsch-Holländ. Grenze, Coll. v. BENNIGSEN (nicht Coll. SCHENKLING!).

biapiculata AURIVILLIUS, 1908, *Dictamnia*

Dtsch. ent. Ztschr. 1908, 211

♀ Holotypus, Neu-Pommern, Herbertshöhe, Coll. v. BENNIGSEN, im SDEI.

bicallosus KRAATZ, 1882, *Clytus*

Dtsch. ent. Ztschr. 26, 307, 335-336

Holotypus, Samarkand, leg. HABERHAUER.

SDEI: Holotypus, Samarkand, Stdgr. 81.

bicolor GOUNELLE, 1911, *Euryptera*

Ann. Soc. ent. Fr. 80, 7-9

6 ♂, 9 ♀ Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy.

SDEI: 2 Syntypen, Brésil, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. KRAATZ.

bicolor SCHWARZER, 1924, *Glenea*

Nova Guinea 15, 60

Mehrere Syntypen, N. West Neu-Guinea: Prauwenbivak, Idenburg River, IX.1920; Pionerbivak, Mamberamo River, XII.1920; leg. v. HEURN.

SDEI: 1 Syntypus, N. Guinea Exped., Idenburg River, IX.1920, Pionerbivak, leg. v. HEURN, ex Museum Buitenzorg.

bicolor SCHWARZER, 1924, *Hoplosyllitus*

Nova Guinea 15, 58

Mehrere Syntypen, N. West New-Guinea, Pionerbivak, Mamberamo River, 1.VIII.1920, leg. v. HEURN, holländ. Grenze.

SDEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, ex Museum Buitenzorg.

bicolor KRAATZ, 1862, *Obrium*

Berl. ent. Ztschr. 6, 126

Mehrere Syntypen, Griechenland, leg. KRÜPER.

SDEI: Lectotypus, Graecia, leg. KRÜPER, Coll. KRAATZ; 1 Paralectotypus, ohne Fundortangaben, Designation: SAMA.

bicolor HEYDEN, 1886, *Pidonia*

Dtsch. ent. Ztschr. 1886, 276

Holotypus, Amur, Suyfun, in Coll. v. HEYDEN, im SDEI, 1885, leg. DÖRRIES.

bienerti HEYDEN, 1885, *Polyarthron*

Dtsch. ent. Ztschr. 29, 311-312, Taf. 4, Fig. 1

2 Syntypen, Persien, leg. BIENERT.

SDEI: 1 Syntypus, Persien, leg. BIENERT.

bifarius HEYDEN, 1889, *Clytus*

Dtsch. ent. Ztschr. 1889, 329-330

Holotypus, Asia minor, Hadjin, durch STAUDINGER, im SDEI, Coll. v. HEYDEN.

bifascianus SCHWARZER, 1925, *Eoporimimus*

Ent. Bl. 21, 147

Mehrere Syntypen, Formosa: Fuhosho, 7.VII., 7.VIII., 7.IX.; Sokutsu, 7.VII.1912; leg. SAUTER.

SDEI: Formosa, leg. SAUTER, Syntypen: 8 Ex. Fuhosho, 7.VII., 7.VIII., 7.IX.; 2 Ex. Banshoryo-Distr., Sokutsu, 22.VI., 7.VII.1912.

bifasciatus KRAATZ, 1879, *Rhopoloscelis*

Dtsch. ent. Ztschr. 1879, 113-114, Taf. 1, Fig. 10

♂ Holotypus, Ost-Sibirien, Amur, leg. CHRISTOPH, im SDEI, Coll. KRAATZ, 1877.

biforme KRAATZ, 1873, *Dorcadion*

In: KÜSTER, Käf. Europ. 29, 53

Mehrere Syntypen, Persien, bei Hadschgabad, leg. CHRISTOPH.

SDEI: 6 Syntypen, Hadschgabad, Coll. KRAATZ.

bimaculicollis SCHWARZER, 1925, *Chlorophorus*

Ent. Bl. 21, 28

Mehrere Syntypen, Formosa: Fuhosho, 7.IX.; Kosempo, 7.VIII.1911; leg. SAUTER.

SDEI: Formosa, leg. SAUTER, Syntypen: 1 Ex. Fuhosho, 7.IX.; 1 Ex. Kosempo, 7.VIII.1911.

biocellatus SCHWARZER, 1925, *Olenecamptus*

Ent. Bl. 21, 63

Mehrere Syntypen, Formosa, Kankau, IV., V., VI., VII.,

IX.1912, leg. SAUTER.

SDEI: 6 Syntypen, Formosa, Kankau, Koshun, V., VI., VII., IX.1912, leg. SAUTER.

bipunctithorax BREUNING, 1958, *Glenea*

Beitr. Ent. 8, 493

♀ Holotypus, Neu Guinea, Mamberano River, Pionerbivak, 1920, leg. v. HEURN, im SDEI.

bivittata AURIVILLIUS, 1907, *Nupserha*

Dtsch. ent. Ztschr. 1907, 83

Mehrere Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, im SDEI.

SDEI: 1 Syntypus, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

bivittata SAITO, 1980, *Pidonia*

Kontyû, Tokyo 48 (2), 291-294, Fig. 1-6

♂ Holotypus, Pilu-shenmu (near Mt. Pilushan, 2.440 m alt.), Hwalien Hsien, 8.V.1977, leg. SAITO; 209 ♂, 135 ♀ Paratypen, dito, VI.1977 und 1978, leg. FUJITA, ITOH, KUBOKI, NIISATO, ODA, SAKAINO, SCHIMOMURA

und SAITO; im National Science Museum (Nat. Hist.), Tokyo; in Coll. SAITO und andere Coll.
SDEI: 2 Paratypen, Taiwan, Hwalian Hsien (Shen-mu), 8.V.1977, leg. SAITO.

bizonatus GOUNELLE, 1911, *Rhinotragus*
Ann. Soc. ent. Fr. 80, 15-16
3 ♂, 1 ♀ Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy.
SDEI: 2 Syntypen, Brésil, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. KRAATZ.

bodemeyeri REITTER, 1903, *Callidium*
Wien. ent. Ztg. 22, 46
1 ♂ Syntypus, Kleinasiens, Bulghar-Dagh, leg. v. BODEMEYER.
SDEI: als Paralectotypus, Kleinasiens, Bulghar-Maaden, Designation: SAMA.

bodemeyeri DANIEL, 1900, *Dorcadion*
Soc. Ent. 15, 140
Mehrere Syntypen, Asia minor, leg. ESCHERICH und leg. v. BODEMEYER.
SDEI: 10 Syntypen, Asia minor, Eski-Chéhir, leg. v. BODEMEYER, Coll. KRAATZ und Coll. v. HEYDEN.

bodemeyeri REITTER, 1913, *Phytoecia*
Dtsch. ent. Ztschr. 1913, 665-666
Mehrere Syntypen, Persien, Luristan, durch v. BODEMEYER.
SDEI: 1 Syntypus, Persien, Luristan, durch v. BODEMEYER, Coll. v. HEYDEN.

boisduvali maculosa SCHWARZER, 1929, *Batocera*
Senckenbergiana 11, 367, Fig. 21
♀ Holotypus, mehrere Paratypen, Neu-Guinea, Senckenberg-Museum (Col. 79).
SDEI: 1 Paratypus, D. N. Guinea, Herbertshöhe, Coll. v. BENNIGSEN.

bothridera LAMEERE, 1903, *Macrotoma*
Mem. Soc. Ent. Belg. 11, 103
Mehrere Syntypen: Süd Madagascar, Plateau de l' Androy, im Musée Paris; Mahabo, Andrahomana, leg. ALLUAUD, im Musée de Trig.
SDEI: 1 ♂, 1 ♀ Paralectotypen, Plateau de l'Androy-Reg. d' Ambovombe, Coll. KRAATZ; Designation: QUENTIN & VILLIERS.

bougainvillei LAMEERE, 1912, *Hastertia*
Mem. Soc. Ent. Belg. 21, 163
1 ♂, 2 ♀, iles Salomon, ile Bougainville, durch HASTERT DE LUXEMBOURG; 2 ♀, Kieta, im SDEI: Syntypen.
SDEI: 2 Syntypen, D. Salomons Ins., Kieta, Coll. KRAATZ.

brachyptera DANIEL, 1899, *Acmaeops*
Col. Stud. 2, 73

Mehrere Syntypen, Turkestan, Musart am Nordfluss des Tian-Schan, durch HAUSER.
SDEI: 1 Syntypus, Thian-Schan, Musart, VI.1894, Coll. HAUSER-Coll. F. MÜLLER.

brannani SCHAUFUSS, 1870, *Dorcadion*
Nunq. otiosus 1, 64
Mehrere Syntypen, Lusitania, Mont. Estrellensis, 18.VI. 1867, 5000 ft., leg. SCHAUFUSS.
SDEI: 4 Syntypen, Lusitania, Sierra de Estrella, leg. W. SCHAUFUSS, Coll. L. W. SCHAUFUSS.

bulbifera KOLBE, 1894, *Phrystola*
Stett. ent. Ztg. 55, 40
Mehrere Syntypen, Kamerun, im Gebirge bei Buea, leg. PREUSS.
SDEI: 1 Syntypus, Kamerun, Gebirge Buea, 17.X.1891, leg. PREUSS, Coll. KRAATZ.

bytinskii HEYROVSKY, 1954, *Clytus*
Ent. Arb. Mus. Frey 5, 395-396
Holotypus, Paratypen (3 ♂, 2 ♀), Israel, Rehobot, IV.1948, leg. BYTINSKI-SALZ, in Coll. BYTINSKI-SALZ und Coll. HEYROVSKY.
SDEI: 1 Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, V.1948 (nicht IV!).

campestre GOUNELLE, 1909, *Octoplon*
Ann. Soc. ent. Fr. 77, 667
Mehrere Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, Minas Bahia, leg. GOUNELLE.
SDEI: 3 Syntypen, Brésil, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. KRAATZ.

campestris GOUNELLE, 1909, *Eburodacrys*
Ann. Soc. ent. Fr. 77, 633-634, Fig. 19
Mehrere Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, Bahia, Minas Geraes, Cidade de Condeuba, Sertao de Diamantina.
SDEI: 2 Syntypen, Brésil, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. KRAATZ.

carinicollis SCHWARZER, 1925, *Nortia*
Ent. Bl. 21, 20-21
Mehrere Syntypen, Formosa: Fuhosho, V.1909; Kosempo, XII.1911/ VI.1912; Sokutsu, V.1911/ VI.1912/ VII.1912; leg. SAUTER.
SDEI: Formosa, leg. SAUTER, Syntypen: 2 Ex. Fuhosho, V.1909/ 7.IX.; 2 Ex. Banshoryo Distr., Sokutsu, 7.VI., 7.VII.1912; 3 Ex. Kosempo, 7.VII.1911/ 7.VI.1912.

caroli LEPRIEUR, 1876, *Plocaederus*
Bull. Soc. ent. Fr. (5) 6, VIII
Syntypen, Algerien, LEPRIEUR.
SDEI: 1 Paralectotypus, Bou-Saada, LEPRIEUR, Designation: SAMA.

- catalai* VILLIERS, 1939, *Leucographus*
Bull. Soc. ent. Fr. 44, 206-207, 208, Fig. 1
♂ Holotypus, mehrere Paratypen, Madagaskar, Prov. d'Ankarampotsy und Tantamala, Region Fianarantsoa an der Ostküste, im Museum Paris.
SDEI: 1 Paratypus, Madagaskar, Foret Cote Est.
- cervae* FRIVALDSZKY, 1892, *Dorcadion*
Term. Füzetek 15, 133
Mehrere Syntypen, Hungaria, durch CERVA.
SDEI: 3 Syntypen, Hungaria, Coll. KLÄGER.
- chloe* GOUNELLE, 1911, *Callichroma*
Bull. Soc. ent. Fr. 1911, 167-168
11 Syntypen, Brasilien, Bahia, Minas, Sao Paulo, Sta Catharina, im Museum Paris, Coll. WAGNER, im SDEI und in Coll. GOUNELLE.
SDEI: 4 Syntypen, Brasilien, Bahia, leg. FRUHSTORFER; Sao Paulo, leg. METZ, Coll. KRAATZ.
- christophi* KRAATZ, 1879, *Clytus*
Dtsch. ent. Ztschr. 23, 108-109, Taf. 1, Fig. 4
Mehrere Syntypen, Ost-Sibirien, Amur, leg. CHRISTOPH.
SDEI: 8 Syntypen, Amur, 1877, leg. CHRISTOPH, Coll. KRAATZ und Coll. v. HEYDEN.
- chrysomaculata* SCHWARZER, 1925, *Glenea*
Ent. Bl. 21, 152-153
Mehrere Syntypen, Formosa: Kosempo, 7.VII.1909/ VI.1911/ 22.VI.1912; Sokutsu, 22.VI.1912; Alikang, 7.VIII.; Kankau, IV., V., 7.VI.1912; leg. SAUTER.
SDEI: Formosa, leg. SAUTER, Syntypen: 7 Ex. Kosempo, VI.1911/ 22.V., 22.VI.1912; 1 Ex. Alikang, 7.VIII.; 1 Ex. Sokutsu, Banshoryo Distr., 22.VI.1912; 13 Ex. Kankau, Koshun, 7.IV., IV., V., VI.1912 (als var. *conjuncta* SCHWARZER bezettelt).
- cinerascens* KRAATZ, 1882, *Phytoecia*
Dtsch. ent. Ztschr. 26, 337-338
Mehrere Syntypen, Samarkand, leg. HABERHAUER.
SDEI: 1 Syntypus, Samarkand, 1881, durch STAUDINGER, Coll. KRAATZ.
- cineriferum* SUVOROV, 1909, *Dorcadion*
Rev. Russe d' Ent. 9, 290-291
2 ♂, 2 ♀ Syntypen, Transkaukasien, Umgebung des Goktsha Sees, 7.V.1909, leg. MALJUZHENKO.
SDEI: 1 ♂ Syntypus, Caucasus, Goktsha, leg. MALJUZHENKO, Coll. KLÄGER.
- cingulatum* GANGLBauer, 1884, *Dorcadion*
Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 1883, 484-485
Mehrere Syntypen, Persien, durch KRAATZ und PLASON.
SDEI: 6 Syntypen, ohne Fundort, Coll. KRAATZ.
- circumcinctum* AURIVILLIUS, 1911, *Obrium*
Arch. für Zool. 7 (1), 5 (1910)
- circumdata* KRAATZ, 1882, *Phytoecia*
Dtsch. ent. Ztschr. 26, 337
Mehrere Syntypen, Samarkand, leg. HABERHAUER.
SDEI: 2 Syntypen, Samarkand, 1881, durch STAUDINGER, Coll. KRAATZ.
- circumscriptus* SCHWARZER, 1925, *Chlorophorus*
Ent. Bl. 21, 28
Mehrere Syntypen, Formosa: Kosempo, 7.IX.1909/ 7.IX.1911; Fuhosho, 7.VII.; Taihorin, 22.VI.; Sokutsu, 22.VI.1912; leg. SAUTER.
SDEI: Formosa, leg. SAUTER, Syntypen: 3 Ex. Kosempo, 7.IX.1909/1911; 1 Ex. Fuhosho, 7.VIII. (nicht 7.VII.); 1 Ex. Sokutsu, 22.VI.1912.
- colchica* REITTER, 1890, *Cortodera*
Wien. ent. Ztg. 9, 246
Mehrere Syntypen, Kaukasus, Araxesthal.
SDEI: 3 Syntypen, Caucasus, Araxesthal, leg. LEDER-REITTER, Coll. STIERLIN, Coll. F. MÜLLER, Coll. v. HEYDEN.
- complanatum* GANGLBauer, 1884, *Dorcadion*
Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 1883, 484
Mehrere Syntypen, Persien, durch PLASON.
SDEI: 1 Syntypus, Persien, Coll. KRAATZ.
- concentricale* JORDAN, 1894, *Callichroma*
Novit. Zool. 1, 166
Mehrere Syntypen, Afrika; Kuila, 1892, leg. MOCQUERYS; Loanda; im Tring Museum.
SDEI: 1 Syntypus, Loanda, Coll. KRAATZ.
- congoensis* HINTZ, 1911, *Velleda*
Wiss. Erg. Zentr. Afr. Exp. (1907/08), Zool. 3, 434
7 Syntypen, Congo Belge, Kondoué, leg. LUJA.
SDEI: 3 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
- conradti* AURIVILLIUS, 1907, *Apogaster*
Dtsch. ent. Ztschr. 1907, 78
Mehrere Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, via SCHENKLING an AURIVILLIUS, im SDEI.
SDEI: 1 Syntypus, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.
- conradti* KOLBE, 1893, *Ceroplesia*
Stett. ent. Ztg. 54, 265-266
Mehrere Syntypen, Deutsch-Ostafrika, Usambara, Derema, E.VIII.-XII.1891, leg. CONRADT.
SDEI: 1 Syntypus, Usambara, Coll. KRAATZ.
- conradti* AURIVILLIUS, 1907, *Leiopus*
Dtsch. ent. Ztschr. 1907, 82-83
Mehrere Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, im SDEI.
SDEI: 10 Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

- conradti* AURIVILLIUS, 1907, *Sophronica*
 Dtsch. ent. Ztschr. 1907, 81
 Mehrere Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, im SDEI.
 SDEI: 1 Syntypus, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.
- convexa* BROUN, 1893, *Somatidia*
 Man. N. Zeal. Col. 7, 1498
 Mehrere Syntypen, New Zealand, Maketu, Hunua Range.
 SDEI: 2 Syntypen, Auckland, Maketu, Hunua, Coll. BROUN.
- cribricollis* KRAATZ, 1882, *Dorcadion*
 Dtsch. ent. Ztschr. 26, 196
 Mehrere Syntypen, Altai, in Coll. KRAATZ und Coll. STAUDINGER.
 SDEI: 1 Syntypus, Altai, durch STAUDINGER, Coll. KRAATZ.
- cibrithorax* KOLBE, 1897, *Plocederus*
 Käf. Dtsch. Ost Afr., 297
 Mehrere Syntypen, Dar-es-Salaam, VIII.1894, leg. STUHLMANN und leg. v. BENNIGSEN.
 SDEI: 4 Syntypen, Dar-es-Salaam, leg. v. BENNIGSEN, Coll. v. BENNIGSEN.
- cuneipennis* KRAATZ, 1879, *Clytus*
 Dtsch. ent. Ztschr. 23, 110–111, Taf. 1, Fig. 5
 Holotypus, Ost-Sibirien, Amur, leg. CHRISTOPH, im SDEI, Coll. KRAATZ, 1877 (als *cuneiformis* bezettelt!).
- curticornis* GANGLBAUER, 1888, *Prionus*
 Dtsch. ent. Ztschr. 1888, 266–268
 ♂ Holotypus, Turkestan, Farab., leg. Russow, in Coll. v. HEYDEN, im SDEI.
- curvipes* HINTZ, 1911, *Nosoeme*
 Wiss. Erg. Zentr. Afr. Exp. (1907/08) Zool. 3, 426
 1 Ex. Beni (Urwald), w.v. Ruwenzori, II.1908; 6 Ex. Kondué, Congo-Belge, leg. LUJA: Syntypen.
 SDEI: 2 Syntypen, Congo-Belge, Kondué, leg. LUJA.
- debilis* GOUNELLE, 1911, *Charisia*
 Ann. Soc. ent. Fr. 80, 59–60
 10 ♂, 9 ♀ Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy.
 SDEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. KRAATZ.
- debilis* KRAATZ, 1879, *Grammoptera*
 Dtsch. ent. Ztschr. 23, 104–105
 Holotypus, Ost-Sibirien, Amur, leg. CHRISTOPH, im SDEI, Coll. KRAATZ, 1877.
- decolorata* SCHWARZER, 1925, *Cereopsius*
 Ent. Bl. 21, 59
 Mehrere Ex. Kosempo, VI., XII.1909/ 7.X.1911/ 22.VI. 1912; Sokutsu, 7.VIII.1912; 2 ♀, Pilam, VII.1912: Formosa, leg. SAUTER, Syntypen.
- SDEI: Formosa, leg. SAUTER, Syntypen: 8 Ex. Banshoryo Distr., Sokutsu, 7.VII., 7.VIII.1912; 2 Ex. Kosempo, 22.V., 22.VI.1912; 1 Ex. Pilam, VIII.1912 (als var. *annulicornis* SCHWARZER bezettelt).
- decorata* NONFRIED, 1894, *Clodia*
 Dtsch. ent. Ztschr. 1894, 214–215
 Mehrere Syntypen, N. O. Sumatra, Tebing-Tinggi, leg. SCHULTHEISS, in Coll. SCHULTHEISS.
 SDEI: 2 Syntypen, N. O. Sumatra, Tebing-Tinggi, leg. SCHULTHEISS.
- detrita* KRAATZ, 1882, *Agapanthia*
 Dtsch. ent. Ztschr. 26, 336
 Mehrere Syntypen, Samarkand, leg. HABERHAUER.
 SDEI: 1 Syntypus, Samarkand, durch STAUDINGER, 1881, Coll. KRAATZ.
- deyrollei* GANGLBAUER, 1884, *Dorcadion*
 Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 33 (1883), 482–483
 2 ♂ Syntypen, Transcaucasien, Bitlis, leg. DEYROLLE, durch KRAATZ und OBERTHÜR.
 SDEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, leg. DEYROLLE, Coll. KRAATZ.
- discicollis* HEYDEN, 1876, *Molorchus*
 Dtsch. ent. Ztschr. 20, 383–384
 ♀ Holotypus, Eichberg im Rheingau, leg. RICHTER, in Coll. v. HEYDEN, im SDEI.
- discolor* GOUNELLE, 1911, *Ommata*
 Ann. Soc. ent. Fr. 80, 34–35
 14 ♂, 22 ♀ Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy.
 SDEI: 4 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. KRAATZ.
- distinguendum* GOUNELLE, 1911, *Callichroma*
 Bull. Soc. ent. Fr. 1911, 165–167
 5 Syntypen, Brasilien, Minas Geraes, Sao Paulo, im SDEI und in Coll. GOUNELLE.
 SDEI: 1 Syntypus, Brésil, Coll. KRAATZ.
- diversenotata* SCHWARZER, 1925, *Glenea*
 Ent. Bl. 21, 152
 Holotypus, Formosa, Kosempo, 7.VI.1912, leg. SAUTER, im SDEI.
- dsungaricum* PIC, 1907, *Dorcadion*
 Echange 23, 104 (Beschreibung), weitere Angaben In: Mat. Longicorn. 6 (2), 11; 1907
 Mehrere Syntypen, Dsungaria, Borochoro, Coll. HAUSER und Coll. PIC.
 SDEI: 12 Syntypen, Dsungaria, Borochoro-Geb., VI.1905, durch LEONHARD, Coll. HAUSER (6 Ex. als var. *melancholium* PIC bezettelt).

- duplicatum* GOUNELLE, 1909, *Ibidion*
Ann. Soc. ent. Fr. 77, 677
12 Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy.
SDEI: 1 Syntypus, Brésil, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. KRAATZ.
- elegans* KRAATZ, 1873, *Dorcadion*
In: KÜSTER, Käf. Europ. 29, 73
Mehrere Syntypen, bei Sarepta, leg. BECKER und leg. CHRISTOPH.
SDEI: 7 Syntypen, Sarepta, leg. BECKER und leg. CHRISTOPH, Coll. KRAATZ.
- elegans* GOUNELLE, 1909, *Ibidion*
Ann. Soc. ent. Fr. 77, 679
5 Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy.
SDEI: 1 Syntypus, Brésil, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. KRAATZ.
- elegans* VILLIERS, 1980, *Nethinius*
Faun. Madagasc. 52, 43, 101, Fig. 273-275
♂ Holotypus, Madagascar, Ambodivoangy, XII.1945, leg. VADON, im Museum Paris, Coll. VADON; mehrere Paratypen, siehe Originalbeschreibung.
SDEI: 1 Paratypus, Madagaskar, Coll. KRAATZ.
- elegans* NONFRIED, 1894, *Pithomictus*
Dtsch. ent. Ztschr. 1894, 213-214
Mehrere Syntypen, N. O. Sumatra, Tebing-Tinggi, leg. SCHULTHEISS, in Coll. SCHULTHEISS.
SDEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, 22.VI.1884/ 11.II.1885.
- elegantula* KRAATZ, 1879, *Grammoptera*
Dtsch. ent. Ztschr. 23, 105-106
1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Ost-Sibirien, Amur, leg. CHRISTOPH, im SDEI, Coll. KRAATZ.
- erythospila* HELLER, 1912, *Trigonoptera*
Ent. Mitt. 1, 172-173, Fig. 3
Mehrere Syntypen, Nova Guinea Germanica, Coll. v. BENNIGSEN.
SDEI: 2 Syntypen, D. N. Guinea, leg. und Coll. v. BENNIGSEN.
- excellens* AURIVILLIUS, 1908, *Tmesisternus*
Dtsch. ent. Ztschr. 1908, 214, Taf. 3, Fig. 5
Mehrere Syntypen, Deutsch Neu-Guinea, Sattelberg, leg. v. BENNIGSEN.
SDEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- excellens inflatus* QUENTIN & VILLIERS, 1972, *Pixodarus*
Ann. Soc. ent. Fr. 8 (N. S.), 288
♂ Holotypus, Tanzanie, Lindi, im Museum Brüssel; Paratypen, siehe Originalbeschreibung.
SDEI: 1 ♀ Paratypus, Dar-es-Salaam, leg. v. BENNIGSEN, Coll. v. BENNIGSEN.
- excellens konduanum* SCHMIDT, 1922, *Metallichroma*
Arch. Naturg. 88, A 6, 132
Holotypus, Belg. Kongo, Kundué, leg. LUJA, im SDEI.
- excelsa* STIERLIN, 1876, *Phytoecia*
Mitt. Schweiz. ent. Ges. 4 (1874), 479
Mehrere Syntypen, ohne Fundort.
SDEI: Lectotypus, Sarepta, Coll. STIERLIN, Designation: SAMA.
- exigua* AURIVILLIUS, 1907, *Eunidia*
Dtsch. ent. Ztschr. 1907, 80
Mehrere Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, im SDEI.
SDEI: 1 Syntypus, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.
- exigua* AURIVILLIUS, 1907, *Sophronica*
Dtsch. ent. Ztschr. 1907, 81
Mehrere Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, im SDEI.
SDEI: 1 Syntypus, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.
- fairmairei* GOUNELLE, 1909, *Ibidion*
Ann. Soc. ent. Fr. 77, 680
Mehrere Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy.
SDEI: 1 Syntypus, Brésil, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. KRAATZ.
- faldermanni* GANGLBAUER, 1884, *Dorcadion*
Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 33 (1883), 493
Holotypus, Persien, durch KRAATZ, im SDEI.
- fallax* HELLER, 1935, *Demonax*
Arb. morph. tax. Ent. 2, 267, Fig. 3
Mehrere Syntypen, Salomo-Inseln, leg. MALCHER, im Museum Dresden und SDEI.
SDEI: 1 Syntypus, Salomo I., Neu Georgio, Pauru, leg. MALCHER.
- fallax* KRAATZ, 1873, *Dorcadion*
In: KÜSTER, Käf. Europ. 29, 89
Mehrere Syntypen, Rumelien, bei Saloniki, leg. RAYMOND, Türkei, durch v. FRIVALDSZKY, im Museum Berlin und in Coll. KRAATZ.
SDEI: Lectotypus, Saloniki, Coll. KRAATZ, Designation: SAMA.
- fasciata* AURIVILLIUS, 1907, *Nupserha*
Dtsch. ent. Ztschr. 1907, 83-84
Mehrere Syntypen, Togo, leg. CONRADT, im SDEI.
SDEI: 1 Syntypus, Togo, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.
- fasciata* AURIVILLIUS, 1908, *Ocularia*
Dtsch. ent. Ztschr. 1908, 79
Mehrere Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, via SCHENKLING an AURIVILLIUS, im SDEI.
SDEI: 1 Syntypus, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

- fasciata* SCHWARZER, 1925, *Pseudale*
Ent. Bl. 21, 67
Holotypus, Formosa, Fuhosho, 7.VIII., leg. SAUTER, im SDEI.
- femoralis* AURIVILLIUS, 1907, *Eunidia*
Dtsch. ent. Ztschr. 1907, 80
Mehrere Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, im SDEI.
SDEI: 1 Syntypus, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.
- ferranti* HINZ, 1913, *Isosaphanus*
Dtsch. ent. Ztschr. 1913, 196
Mehrere Syntypen, Congo Belge, Kondué.
SDEI: 1 Syntypus, Congo Belge, Kondué, leg. LUJA, Coll. KRAATZ.
- ferrugator namaensis* FIEDLER, 1938, *Ceroplesis*
Dtsch. ent. Ztschr. 1938, 589
Holotypus, 19 Paratypen, Afrika, Groß-Namaland, Namaqualand, Kubub; im Museum Berlin, Senckenberg Museum und SDEI.
SDEI: 2 Paratypen, DSWA, Kubub, Coll. v. BENNIGSEN.
- ferrugineus* KRAATZ, 1863, *Cyamophthalmus*
Berl. ent. Ztschr. 7, 100, Taf. 4, Fig. 6a
Holotypus, Andalusien, via STAUDINGER an KRAATZ, im SDEI.
- flavovittatus* AURIVILLIUS, 1908, *Paratrypanius*
Dtsch. ent. Ztschr. 1908, 223–224, Fig. 12
Mehrere Syntypen, Samoa, Apia, leg. v. BENNIGSEN.
SDEI: 1 Syntypus, Apia, Coll. v. BENNIGSEN.
- forcipiferum* KRAATZ, 1873, *Dorcadion*
In: KÜSTER, Käf. Europ. 29, 60
Mehrere Syntypen, Palästina, leg. ROTH.
SDEI: 1 Syntypus, Palästina, leg. ROTH, Coll. KRAATZ.
- formosana* SCHWARZER, 1925, *Agelasta*
Ent. Bl. 21, 61
Mehrere Syntypen, Formosa: Fuhosho, VI.1909/ 7.IX. 1910; Kosempo, VI.1909; leg. SAUTER.
SDEI: Formosa, leg. SAUTER, Syntypen: 2 Ex. Fuhosho, 7.IX., VI.1909; 1 Ex. Kosempo, VI.1909.
- formosana* SCHWARZER, 1925, *Daphisia*
Ent. Bl. 21, 153
Mehrere Syntypen, Formosa: Taihorinsho, 7.XI.; Taihorin, 7.VI.1911/ 22.VI.; Kosempo, 7.VII.1911; Pilam, VII.1912; leg. SAUTER.
SDEI: Formosa, leg. SAUTER, Syntypen: 3 Ex. Taihorin, 7.VI.1911/ 22.VI.; 2 Ex. Taihorinsho, 7.IX. (nicht 7.XI!); 1 Ex. Kosempo, 7.VII.1911; 1 Ex. Pilam, VI.1912 (nicht VII.!).
- formosana* SCHWARZER, 1925, *Glenea*
Ent. Bl. 21, 150
- Mehrere Syntypen, Formosa, Kankau, V., VI.1912, leg. SAUTER.
SDEI: 24 Syntypen, Formosa, Kankau, Koshun, 7.IV., 7.V., V., VI., VII.1912, leg. SAUTER (16 Ex. als ab. *lineatomaculata* SCHWARZER bezettelt).
- formosana* SCHWARZER, 1925, *Mesosa*
Ent. Bl. 21, 60–61
Mehrere Syntypen, Formosa, Hoozan, 7.IX.1910, leg. SAUTER.
SDEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
- formosana* SCHWARZER, 1929, *Pothyne*
Ent. Bl. 21, 146
Mehrere Syntypen, Formosa: Kosempo, 7.VII.1911; Kankau und Sokutsu, 7.VII.1912; leg. SAUTER.
SDEI: Formosa, leg. SAUTER, Syntypen: 1 Ex. Kosempo, 22.VI.1911; 1 Ex. Banshoryo-Distr., Sokutsu, 7.VII.1912.
- formosana* SCHWARZER, 1925, *Trirachys*
Ent. Bl. 21, 21
Mehrere Syntypen, Formosa: Kankau, V.1912; Kosempo, VII.1911/ VII.1912; leg. SAUTER.
SDEI: Formosa, leg. SAUTER, Syntypen: 2 Ex. Kosempo, 22.V., VII.1911; 1 Ex. Kankau, Koshun, V.1912.
- formosanum* SCHWARZER, 1925, *Obrium*
Ent. Bl. 21, 22–23
Mehrere Syntypen, Formosa, Kosempo, V., 7.VI.1912, leg. SAUTER.
SDEI: 2 Syntypen, Formosa, Kosempo, V., 7.VI.1912, leg. SAUTER.
- formosanus* SCHWARZER, 1925, *Pyrestes*
Ent. Bl. 21, 24
Mehrere Syntypen, Formosa: Fuhosho, V.1909; Kosempo, 22.V.1912; Sokutsu, 7.VII.1912; leg. SAUTER.
SDEI: Formosa, leg. SAUTER, Syntypen: 5 Ex. Kosempo, 22.V., VI.1912; 2 Ex. Banshoryo-Distr., Sokutsu, 7.VI., VII.1912; 3 Ex. Fuhosho, V.1909.
- formosanus* SCHWARZER, 1925, *Thranius*
Ent. Bl. 21, 23
Mehrere Syntypen, Formosa: Fuhosho, VI.1909; Hoozan, 7.IX.; Kosempo, 7.IX.1911/ 7.X.1911/ 22.V.1912; leg. SAUTER.
SDEI: Formosa, leg. SAUTER, Syntypen: 2 Ex. Kosempo, 7.IX.1911/ 22.V.1912; 1 Ex. Fuhosho, VI.1909; 1 Ex. Hoozan, VIII.1910.
- formosanus* SCHWARZER, 1925, *Xylotrechus*
Ent. Bl. 21, 26
Mehrere Syntypen, Formosa, Alikang, 7.X., leg. SAUTER.
SDEI: 4 Syntypen, Formosa, Alikang, 7.X., leg. SAUTER.

formosum SVOROV, 1910, *Compsodorcadiion*

Rev. Russe d'Ent. 10, 65-66

5 ♂, 1 ♀ Syntypen, Semirjetshje Gebiet, i. d. Schlucht Kop-muly des Fl. Usun-Kargaly, 15.IV.1909, leg. NIEDZWIECKI.

SDEI: 1 ♂ Syntypus, Semirjetshje, Kop-mula, Coll. KLÄGER.

formosum KRAATZ, 1870, *Dorcadion*

Berl. ent. Ztschr. 14, 411-412, Taf. 3, Fig. 4a

Mehrere Syntypen, Kaukasus, via MANKE an KRAATZ.

SDEI: 1 Syntypus, Caucausus, 5.VII.1870, Coll. KRAATZ.

frivaldszkyi KRAATZ, 1876, *Grammoptera*

Dtsch. ent. Ztschr. 20, 344

Mehrere Syntypen, bei Budapest.

SDEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Ungarn, in Coll. v. HEYDEN; 3 Paralectotypen, Pest, Designation: SAMA.

fugitivus THIEME, 1881, *Clytus*

Berl. ent. Ztschr. 25, 100-101

7 Syntypen, Amur, via STAUDINGER an THIEME.

SDEI: 2 Syntypen, Amur, leg. CHRISTOPH, 1871.

fulgidipennis GOUNELLE, 1909, *Haruspex*

Ann. Soc. ent. Fr. 77, 652-653

9 Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy.

SDEI: 1 Syntypus, Brésil, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. KRAATZ.

fulva SCHWARZER, 1925, *Atimura*

Ent. Bl. 21, 145

Mehrere Syntypen, Formosa, Kankau, VI.1912, leg. SAUTER.

SDEI: 1 Syntypus, Formosa, Kankau, Koshun, XI.1912 (nicht VI!), leg. SAUTER.

fulvonotata NONFRIED, 1894, *Merionoeda*

Dtsch. ent. Ztschr. 1894, 207-208

Mehrere Syntypen, N. O. Sumatra, Tebing-Tinggi, leg. SCHULTHEISS.

SDEI: 8 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, 29.II., 7.IX., 8.IX.1884, Coll. SCHULTHEISS.

funestum GANGLBAUER, 1884, *Dorcadion*

Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 33 (1883), 501

Mehrere Syntypen, Mytilene.

SDEI: 2 Syntypen, Mytilene, Coll. KRAATZ.

fuscicornis HEYDEN, 1863, *Phytoecia*

Berl. ent. Ztschr. 7, 130

Holotypus, Algier, im SDEI, FEISTH., RIESE, Coll. v. HEYDEN.

fuscus NONFRIED, 1894, *Trypogeus*

Dtsch. ent. Ztschr. 1894, 209-210

Mehrere Syntypen, N. O. Sumatra, Tebing-Tinggi, leg. SCHULTHEISS, in Coll. SCHULTHEISS.

SDEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 12.V.1884.

ganglbaueri KRAATZ, 1884, *Mallosia*

Dtsch. ent. Ztschr. 28, 233-234

Mehrere Syntypen, südl. Kleinasien, Malatia.

SDEI: Lectotypus, Malatia, Coll. KRAATZ, Designation: SAMA.

ganglbaueri REITTER, 1894, *Morimus*

Wien. ent. Ztg. 13, 44

Mehrere Syntypen, Bosnien.

SDEI: 1 Syntypus, Bosnien, durch LEDER-REITTER, Coll. v. HEYDEN.

gebleri KRAATZ, 1873, *Dorcadion*

In: KÜSTER, Käf. Europ. 29, 33

Mehrere Syntypen, in den Steppen der Wolga.

SDEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, Coll. KRAATZ.

genisspina SCHWARZER, 1923, *Steirastoma*

Dtsch. ent. Ztschr. 1923, 259-260

3 ♂, 1 ♀ Syntypen, Corumba, Matto Grosso, via STAUDINGER an SCHWARZER.

SDEI: 1 Syntypus, Corumba, Matto Grosso.

glabrofasciatum DANIEL, 1901, *Dorcadion*

Soc. Ent. 15, 140

Mehrere Syntypen, Asia minor, leg. ESCHERICH und leg. v. BODEMEYER.

SDEI: 24 Syntypen, Asia Minor, Biledjik, Eski Chehir, leg. v. BODEMEYER, Coll. LEONHARD, Coll. KLÄGER, Coll. v. HEYDEN (3 Ex. als var. *imparivittatum* DANIEL bezettelt).

glazunovi SVOROV, 1910, *Compsodorcadiion*

Rev. Russe d'Ent. 10, 69-70

Mehrere Syntypen, Semirjetschje-Gebiet, im Bezirk Dsharkent, am Fluß Ili, IV., V.

SDEI: 2 Syntypen, Dzungaria ross, Dsharkent, am Fluß Ili, 14.IV.1906, leg. RÜCKBEIL, Coll. KLÄGER.

globithorax radkevitshi SVOROV, 1910,
Compsodorcadiion

Rev. Russe d'Ent. 10, 61-62

Mehrere Syntypen, Ala-tau, Paßhöhe Kurdaisk, Mitte V.1907, leg. JACOBSON, Coll. SEMENOV-TIAN-SHANSKY.

SDEI: 3 Syntypen, Semiretschje Kurdai, 14.V.1907, leg. JACOBSON, Coll. KLÄGER, Coll. v. HEYDEN.

gracilis KRAATZ, 1873, *Xylosteus*

Berl. ent. Ztschr. 17, 202

1 ♂ Syntypus, Illyrien; 1 ♂ Syntypus, Griechenland; 1 ♂ Syntypus „ein nicht recht ausgefärbtes caucasisches Ex.“, ex Coll. LEDERER, in Coll. TÜRK.

SDEI: 1 Syntypus, „Karst“.

graecum KRAATZ, 1873, *Dorcadion*

In: KÜSTER, Käf. Europ. 29, 78; nom praeocc. = *olympicum*
GANGLBAUER, 1882, Wien. ent. Ztg. 1, 228
Mehrere Syntypen, Brussa, Olymp, durch v. FRIVALDSZKY;
Constantinopel, leg. PRÖMMEL; Griechenland, leg. ZEBE.
SDEI: 17 Syntypen, Asia minor, Brussa, Graecia, leg.
ZEBE, in Coll. KRAATZ, Coll. KLÄGER, (2 Ex. als var. *subalpinum* KRAATZ und 7 Ex. als ab. *obsoletum* KRAATZ
bezettelt).

grandis SCHWARZER, 1929, *Apomecyna*

Senckenbergiana 11, 375-376, Fig. 32
♀ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, D.-O.-Afrika, Amani, im
SDEI und Senckenberg Museum Frankfurt a. M.
SDEI: Holotypus, Amani, leg. ZIMMERMANN.

granulosus SCHWARZER, 1924, *Anancylus*

Treubia 5, 237
Mehrere Syntypen, Süd-Sumatra, Wai Lima, Lampongs,
XI.-XII.1921, leg. KARNY & SIEBERS.
SDEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, ex
Museum Buitenzorg.

griseopennis SCHWARZER, 1925, *Oberea*

Ent. Bl. 21, 154
Mehrere Syntypen, Formosa: Kankau, 7.IV.1912; Kosempo, 22.V.1912; Sokutsu, 7.VI.1912; leg. SAUTER.
SDEI: Formosa, leg. SAUTER, Syntypen: 3 Ex. Kosempo,
22.V.1912/ 22.VII.; 1 Ex. Kankau, Koshun, V.1912; 1 Ex.
Sokutsu, Banshoryo Distr., 7.VI.1912.

grumi SUVOROV, 1909, *Neodorcadi*

Rev. Russe d'Ent. 9, 80-82
66 ♂, 5 ♀ Syntypen, nordwestl. Mongolei, am Fluß
Namura, nördlich von Kobdo, Mitte VII.1903 und nördlich
des Gebirgsrückens Tanny-Ola, Anfang VII.1903,
Exped. von GRUM-GRZHIMAILO, Coll. SEMENOV-TIAN-
SHANSKY.
SDEI: 1 Syntypus, Kobdo, Fluß Namur, 23.VII.1903, leg.
GRUM, Coll. KLÄGER.

guldei CHOBAUT, 1905, *Tetropiopsis*

Bull. Soc. ent. France 1905, 157
♂ Holotypus, Algérie méridionale.
SDEI: Holotypus, El Kantara, 7.VII.1904, leg. GULDE.

halepense KRAATZ, 1873, *Dorcadion*

In: KÜSTER, Käf. Europ. 29, 72; als var. von *saulcyi* THOMSON
beschrieben
Mehrere Syntypen, Aleppo.
SDEI: 1 Syntypus, Aleppo, Coll. KRAATZ (als *aleppense*
KRAATZ bezettelt).

hamatus AURIVILLIUS, 1907, *Timoreticus*

Dtsch. ent. Ztschr. 1907, 79
Mehrere Syntypen, Westafrika, Bojuma, via SCHENKLING
an AURIVILLIUS, im SDEI.
SDEI: 1 Syntypus, W. Afrika, Bojuma, Coll. KRAATZ.

hauseri REITTER, 1895, *Dorcadion*

Wien. ent. Ztg. 14, 160-161
Mehrere Syntypen, Thian-Schan, im südöstlichen Turkestan, leg. HAUSER.
SDEI: 4 Syntypen, Thian-Schan, Musart, VI.1894, Coll.
HAUSER, durch LEONHARD.

heldreichi KRAATZ, 1873, *Dorcadion*

In: KÜSTER, Käf. Europ. 29, 90
Mehrere Syntypen, auf dem Parnass bei Athen, leg. v.
HELDREICH, Coll. v. KIESENWETTER.
SDEI: 2 Syntypen, Parnass, Coll. KRAATZ.

hellmanni GANGLBAUER, 1884, *Dorcadion*

Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 33 (1883), 486
Mehrere Syntypen, Persien, durch v. FRIVALDSZKY,
KRAATZ und PLASON.
SDEI: 6 Syntypen, Persien, leg. PLASON, Coll. KRAATZ.

herminae REITTER, 1890, *Mallosia*

Wien. ent. Ztg. 9, 241
Mehrere Syntypen, Araxesthal.
SDEI: 10 Syntypen, Caucasus, Araxesthal, leg. LEDER-
REITTER, Coll. KRAATZ, Coll. FRANKLIN MÜLLER, Coll.
KRAATZ, Coll. v. HEYDEN.

heteroclita GOUNELLE, 1909, *Cupanoscelis*

Ann. Soc. ent. Fr. 77, 619, Fig. 15
Mehrere Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, Umgebung
von Cidade de Condeuba, Bahia, Sertão de Diamantina, Minas.
SDEI: 1 Syntypus, Brésil, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll.
KRAATZ.

heurni SCHWARZER, 1924, *Arrhenotus*

Nova Guinea 15, 58-59, Fig. 11, 11a
Mehrere Syntypen, N. West Neu-Guinea, Prauwenbivak,
Idenburg River, XI.-XII.1920, leg. v. HEURN, Holländ.
Exped.
SDEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, ex
Museum Buitenzorg.

heydeni STIERLIN, 1864, *Clytus*

Berl. ent. Ztschr. 8, 152-153
1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Sicilien, im SDEI, Coll. STIERLIN.

heydeni KRAATZ, 1870, *Dorcadion*

Berl. ent. Ztschr. 14 (Beiheft), 161-163
1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Albas, leg. v. HEYDEN, via v. HEYDEN
an KRAATZ.
SDEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Albas, Coll. KRAATZ,
Coll. v. HEYDEN, Designation: VIVES, 1979.

heydeni BAECKMANN, 1923, *Hesperophanes*

Rev. Russe d'Ent. 18, 67-68, Fig.
1 ♀, Stadt Perovsk am Syr-Darja, 15.VII.1905, leg.
SCHELL; 1 ♀, Dzbulek, südl. von Perovsk, 9.VII.; 2 ♂, dito,
28.VII.1911; leg. KOSHANTSHIKOV; 1 ♂, dito, 25.VI.1915,

leg. PAVLOVSKIJ; im Zoologischen Museum der Akademie der Wissenschaften Leningrad und in Coll. BAECKMANN: Syntypen.
SDEI: Paralectotypus, Syr-Daria, Baigacum, 28.VII.1911, leg. KOZHANTSCHIKOFF, Designation: SAMA.

heydeni GANGLBAUER, 1888, *Phytoecia*
Dtsch. ent. Ztschr. 32, 76-77
Holotypus, Mesopotamien, Malatia, im SDEI 1885 durch STAUDINGER, Coll. v. HEYDEN.

heydeni GANGLBAUER, 1888, *Prionus*
Dtsch. ent. Ztschr. 32, 265-266
♂ Holotypus, Turkestan, Namangan, in Coll. v. HEYDEN, im SDEI 1885 durch STAUDINGER.

hilarei GOUNELLE, 1909, *Mallocera*
Ann. Soc. ent. Fr. 77, 648-649
Mehrere Ex. Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy; 1 Ex. Serra de Communaty, Pernambuco; Syntypen.
SDEI: 1 Syntypus, Brésil, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. KRAATZ.

holubi bifoliata SCHMIDT, 1922, *Phyllocnema*
Arch. Naturg. 88, A 6, 177
Mehrere Syntypen; Afrika, Mpapua, I.1899, leg. KANNENBERG, im Museum Berlin; Uhehe, Iringa, I.-III.1899, leg. GÖTZE, im Museum Berlin; Usaramo, im Museum Berlin und SDEI; Tanganjika, Kasanga, leg. SPEYER, im Museum Hamburg.
SDEI: 1 Syntypus, Usaramo, Coll. v. BENNIGSEN.

horni HELLER, 1912, *Megaceresium*
Ent. Mitt. 1, 171, Fig. 1
Mehrere Syntypen, Salomo Insel und Nova-Pommerania, penninsula Gazelle, Coll. v. BENNIGSEN.
SDEI: 2 Syntypen, H. Insel Gazelle, D. N. Guinea, Salomons Insel, Coll. v. BENNIGSEN.

hornianum PLAVILSTSHIKOV, 1958, *Dorcadion*
Fauna USSR n.F. 70, 23, 394-396
♂ Holotypus, 1 ♂, 1 ♀ Paratypen, Chinesische Dsungarei, Borochoro Gebirge, VI.1905, im SDEI und in Coll. PLAVILSTSHIKOV.
SDEI: ♂ Holotypus, 1 ♀ Paratypus, mit den Angaben der Beschreibung, leg. LEONHARD, Coll. HAUSER.

hottentotta transvaalensis FIEDLER, 1938, *Ceroplesia*
Dtsch. ent. Ztschr. 1938, 612
Holotypus, 11 Paratypen, Afrika, Transvaal, Lydenburg, Mpome, im Museum Berlin, Museum Brüssel, Senckenberg Museum, Frankfurt a. M. und SDEI.
SDEI: 1 Paratypus, Transvaal, leg. HARTMANN, Coll. KRAATZ.

hybridula REITTER, 1901, *Strangalia*
Dtsch. ent. Ztschr. 1901, 188

2 ♂, Spanien, Albas, Asturien; 1 ♂, 1 ♀, Portugal, Sierra do Gerez, in Coll. v. HEYDEN; Syntypen.
SDEI: Syntypen, Portugal: 1 Ex. Albas; 2 Ex. Sr. Gerez, Coll. v. HEYDEN.

illyricus KRAATZ, 1870, *Xylosteus*
Berl. ent. Ztschr. 14, 415
♂ Syntypen, Illyrien.
SDEI: ♂ Lectotypus, „Karst“, Designation: SAMA (Bioscience Mésogéen 10, 13; 1993).

impressicolle KRAATZ, 1873, *Dorcadion*
In: KÜSTER, Käf. Europ. 29, 47
Mehrere Syntypen, Syrien, Libanon, durch KRAATZ.
SDEI: 2 Syntypen, Syrien, durch KRAATZ-KASCH., Coll. KRAATZ.

inaequalis AURIVILLIUS, 1908, *Heteroclytomorpha*
Dtsch. ent. Ztschr. 1908, 220, Taf. 3, Fig. 7
Mehrere Syntypen, Admiralitäts-Inseln, leg. v. BENNIGSEN.
SDEI: 1 Syntypus, Admiralitäts Inseln, Coll. v. BENNIGSEN.

inderiense Suvorov, 1911, *Compsodorcadion*
Rev. Russ. d'Ent. 11, 69-70
Mehrere Syntypen, Gebiet Uralsk, Indersk-See.
SDEI: 6 Syntypen, Indersk, Coll. KLÄGER.

inermis SCHWARZER, 1925, *Ostedes*
Ent. Bl. 21, 146-147
Mehrere Syntypen, Formosa: Fuhosho, 7.VII., 7.VIII., 7.IX.; Hoozan, 1908/V., IX.1910; Alikang, 7.X.
SDEI: Formosa, leg. SAUTER, Syntypen: 5 Ex. Fuhosho, 7.VIII., 7.IX.; 2 Ex. Hoozan, IX.1910/08-10; 1 Ex. Alikang, 7.X.

infernale MULSANT & REY, 1863, *Dorcadion*
Ann. Soc. Linn. Lyon (2) 10, 158-159
Mehrere Syntypen, Persien, Coll. PELLET.
SDEI: 1 Syntypus, Persia, Coll. KRAATZ.

ingeae PEKS, 1993, *Dorcadion*
Coleoptera, Schwanfelder Col. Mitt. 1, 3-5, Abb. 1-7
♂ Holotypus, Paratypen, Türkei (Edirne): sw Keşan, 150 m, 30.4.1992, leg. PEKS, in Coll. PEKS; Paratypen, sw Keşan, 150 m, 21.1.1992, leg. RASSE.
SDEI: 2 Paratypen, mit den Angaben des Holotypus.

insignis AURIVILLIUS, 1907, *Obereopsis*
Dtsch. ent. Ztschr. 1907, 84-85
Mehrere Syntypen, Togo, leg. CONRADT, im SDEI.
SDEI: 1 Syntypus, Togo, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

insulare KRAATZ, 1873, *Dorcadion*
In: KÜSTER, Käf. Europ. 29, 62
1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Naxos, leg. KRÜPER.
SDEI: 1 Syntypus, Naxos, 10.IV.1862, leg. KRÜPER, Coll. KRAATZ.

irene GOUNELLE, 1911, Ophiostomis

Ann. Soc. ent. Fr. 80, 1-3

9 ♂, 4 ♂ Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy.

SDEI: 2 Syntypen, Brésil, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. KRAATZ.

jakovlevi SUVOROV, 1912, Neodorcadion

Rev. Russe d'Ent. 12, 70-71

Mehrere Syntypen, Alashan-Gebirge, Schlucht Chatengol, 5.-10.VI.1908, Exped. von KOZLOV, Coll. SEMENOV-TIAN-SHANSKY.

SDEI: 1 Syntypus, Gobi, Alashan, 12.VI.1908, leg. KOZLOV, Coll. KLÄGER.

jakovlevianum SUVOROV, 1911, Compsodorcadiion

Rev. Russe d'Ent. 11, 60-61

Mehrere Syntypen, Chinesisches Gebiet östlich vom See Zaisan, Ort Mai-Kaptshagai, 1.VI.1903, leg. JACOBSON; Vorgebirge des Saikan, Bach Kalmak-pai, 2.VII.1900, leg. JACOBSON.

SDEI: 2 Syntypen, See Zaisan, Mai-Kaptshagai, 1.VI.1903, Kalmak-pai, 2.VII.1910 (nicht 1900!), leg. JACOBSON, Coll. KLÄGER.

jakovlevianum zaisanense Suvorov, 1911, Compsodorcadiion

Rev. Russe d'Ent. 11, 61

Mehrere Syntypen, am südöstlichen Ufer des Zaisan Sees.

SDEI: 1 ♂, Südost-Ufer des Sees Zaisan, 2.VI.1910, leg. JACOBSON, Coll. v. HEYDEN; 2 ♂, Zaisan, 1.VI.1903, leg. GRUM: Syntypen.

javeti KRAATZ, 1873, Dorcadion

In: KÜSTER, Käf. Europ. 29, 91

Mehrere Ex. Syrien, leg. KINDERMANN, in Coll. JAVET und Coll. KRAATZ; 1 Ex. Parnass, leg. KRÜPER, in Coll. WITTE: Syntypen.

SDEI: 1 Syntypus, Syrien, leg. KINDERMANN, Coll. KRAATZ.

jordani HINTZ, 1911, Xylotrechus

Wiss. Erg. Zentr. Afr. Exp. (1907/08) Zool. 3, 431

6 Syntypen, Congo Belge, Kondué, leg. LUJA.

SDEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

kankauensis SCHWARZER, 1925, Perissus

Ent. Bl. 21, 26-27

Mehrere Syntypen, Formosa, Kankau, V., VII.1912, leg. SAUTER.

SDEI: 3 Syntypen, Formosa, Kankau, Koshun, V., VII. 1912, leg. SAUTER.

kollari KRAATZ, 1873, Dorcadion

In: KÜSTER, Käf. Europ. 29, 87

Mehrere Syntypen, bei Amasia, leg. KINDERMANN, in Coll. KRAATZ, im k.k. Naturalienkabinet in Wien.

SDEI: 2 Syntypen, Amasia, Coll. KRAATZ.

koltzei HEYDEN, 1887, Brachyta

Dtsch. ent. Ztschr. 31, 304

♀ Holotypus, Amur, Nikolajevsk, leg. GRAESER, durch KOLTZE, in Coll. v. HEYDEN, im SDEI.

korostelevi DANILEVSKY, 1985 Agapanthia

In: DANILEVSKY M. L. & MIROSHNIKOV A. I. 1985, p. 385: Zhukidrovoseki Kavkaza (Coleoptera, Cerambycidae). Opredelitel. Krasnodar: Kubanskiy Selskokhozyaistvennyy Institut, 417 pp., 10 pls.

SDEI: 1 ♂, 1 ♀ Paratypen, Transcaucasia, Nakhichevan Buzgov, 7.06.1982, leg. Danilevky.

kraatzi PIC, 1892, Stenopterus

Echange 8, 21, 22, 23

Mehrere Syntypen, Asie mineure, Smyrne.

SDEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, Coll. KRAATZ.

krueperi KRAATZ, 1859, Acanthoderes

Berl. ent. Ztschr. 3, 56-57, Taf. 3, Fig. 11

1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Acarnanien, am See von Vrachori, leg. KRÜPER.

SDEI: Lectotypus, Graecia, leg. KRÜPER, Coll. KRAATZ, Designation: SAMA.

kubanicum PLAVILSTSHIKOV, 1934, Dorcadion

Ent. Bl. 30, 120-121, 122

Mehrere Syntypen; Caucasus bor., prov. Kuban, Maikop, 27.III.1912; st. Tichoretzkaja, 15.VII.1914; st. Labinskaja, 26.IV.1930; leg. DOBROVLJANSKI; st. Ladozhskaja, 3.V.1925; prope Labinskaja, 25.IV.1925; in Coll. PLAVILSTSHIKOV.

SDEI: 1 Syntypus, Caucasus bor., Maikop, 27.IV.1912 (nicht III!).

kurda Suvorov, 1913, Dorcadion

Rev. Russe d'Ent. 13, 76

Mehrere Syntypen, im Karischen Gebiet, Sarakamysch.

SDEI: 2 Syntypen, Kars., Sarakamysch, VI.1911, leg. Suvorov, Coll. KLÄGER.

lacteomaculata SCHWARZER, 1925, Glenea

Ent. Bl. 21, 151-152

Mehrere Syntypen, Formosa: Kosempo, V.1912, Sokutsu; 7.VI.1912, leg. SAUTER.

SDEI: Formosa, leg. SAUTER, Syntypen: 1 Ex. Sokutsu, 7.VI.1912; 1 Ex. Kosempo, 7.VI.1912.

laevicollis SCHMIDT, 1922, Rhopalizus

Arch. Naturg. 88, A 6, 94

Holotypus, Kamerun, leg. CONRADT, im SDEI.

latefascia SCHWARZER, 1925, Pterolophia

Ent. Bl. 21, 65-66

Mehrere Syntypen, Formosa: Kosempo, 7.IX.1909; Kankau, IV.1912; leg. SAUTER.

SDEI: 2 Syntypen, Formosa: Kosempo, 7.IX.1909; Kankau, Koshun, IV.1912; leg. SAUTER.

- lateralis* AURIVILLIUS, 1907, *Blepisani*
Dtsch. ent. Ztschr. 1907, 85
Mehrere Syntypen, Togo, leg. CONRADT, im SDEI.
SDEI: 1 Syntypus, Togo, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.
- lateralba* SCHWARZER, 1925, *Albana*
Ent. Bl. 21, 68
♀ Holotypus, Formosa, Anping, VII.1911, leg. SAUTER,
im SDEI.
- latericum* GOUNELLE, 1909, *Periboeum*
Ann. Soc. ent. Fr. 77, 638-639
Mehrere Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy.
SDEI: 1 Syntypus, Brésil, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll.
KRAATZ.
- laterinuda quadrivitticollis* BREUNING, 1958, *Glenea*
Beitr. Ent. 8, 494
♀ Holotypus, 1 Paratypus, Neu Guinea, leg. WAHNES, im
SDEI durch FRANKLIN MÜLLER.
- lativittis* KRAATZ, 1878, *Dorcadion*
Dtsch. ent. Ztschr. 22, 219-220
Mehrere Syntypen, Sibirien, Tarbagatai, leg. HABER-
HAUER.
SDEI: 4 Syntypen, Tarbagatai, leg. HABERHAUER, Coll.
F. MÜLLER.
- latula* BROUN, 1893, *Somatidia*
Man. N. Zealand Col. 7, 1499
Mehrere Syntypen, New Zealand, Maketu.
SDEI: 3 Syntypen, Auckland, Maketu, Hunua, Coll.
BROUN.
- lederi* KRAATZ, 1878, *Dorcadion*
Dtsch. ent. Ztschr. 22, 217-218
Mehrere Syntypen, Caucasus, leg. LEDER.
SDEI: 8 Syntypen, Caukasus, leg. LEDER, Coll. KRAATZ,
Coll. KLÄGER, Coll. STIERLIN, Coll. F. MÜLLER.
- lederi* KRAATZ, 1879, *Fallacia*
Dtsch. ent. Ztschr. 23, 280
Mehrere Syntypen, Caucasus, Aksu, Borshom, Suram.
SDEI: 5 Syntypen, Caucasus, leg. LEDER. Coll. KRAATZ.
- leucogrammum* SUVOROV, 1909, *Neodorcadion*
Rev. Russe d'Ent. 9, 82-83
3 ♂, 1 ♀ Syntypen, nord-westl. Mongolei, nördl. Abhang
des Gebirgsrückens Tanny-Ola, Anfang VIII.1903,
Exped. von GRUM-GRZHIMAILO, Coll. SEMENOV-TIAN-
SHANSKY.
SDEI: 2 ♂ Syntypen, Geb. Tanny-ola, Kemtschik, 10.VIII.
1903, leg. GRUM, Coll. KLÄGER.
- libanoticum* KRAATZ, 1873, *Dorcadion*
In: KÜSTER, Käf. Europ. 29, 100
- Mehrere Syntypen; Syrien, durch EHRENBERG; Liba-
non, leg. BRÜLERIE; in Coll. MNISZECH und im Museum
Berlin.
SDEI: 1 Syntypus, Libanon, leg. BRÜLERIE, Coll. KRAATZ.
- ligata* SCHWARZER, 1924, *Cacia*
Nova Guinea 15, 58
Mehrere Syntypen, N. West Neu-Guinea, Prauwenbivak,
Idenburg River, 1920, leg. v. HEURN, Holländ. Exped.
SDEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, ex
Museum Buitenzorg.
- lineatocolle* KRAATZ, 1873, *Dorcadion*
In: KÜSTER, Käf. Europ. 29, 57; als var. von *femoratum* BRULLÉ
beschrieben
Mehrere Syntypen, bei Saloniki, leg. RAYMOND, in Coll.
v. BRUCK, v. KIESENWETTER, MÜLLER und KRAATZ.
SDEI: 2 Syntypen, Saloniki, leg. RAYMOND, Coll. KRAATZ.
Lectotype, 1 Paralectotype, Designation: SAMA.
- lineatocollis* MELZER, 1934, *Odontocera*
Arch. Inst. biol. S. Paulo 5, 220-221, Taf. 15, Fig. 14
Holotypus, Brasilien, Estado de Santa Catarina, Tereso-
polis, im SDEI 1878, leg. FRUHSTORFER.
- longipillus* PIC, 1898, *Cortodera*
Matériaux pour servir à l'étude des Longicornes, Heft 2, 50
Mehrere Syntypen, Syrie, leg. LEUTHNER.
SDEI: 12 Syntypen, Syrie, leg. LEUTHNER, durch
KRAATZ, Coll. v. HEYDEN, Coll. KRAATZ.
- longissima* AURIVILLIUS, 1907, *Oberea*
Dtsch. ent. Ztschr. 1907, 84
Mehrere Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, im SDEI.
SDEI: 2 Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, Coll.
KRAATZ.
- lucae* PIC, 1898, *Compsodorcadion*
Matériaux pour servir à l'étude des Longicornes, Heft 2, 42,
46
Syntypen, Kuldscha, in Coll. HEYDEN.
SDEI: 1 Syntypus, Kuldscha, Turkst. STAUDGR. 85.
- lugubre* KRAATZ, 1873, *Dorcadion*
In: KÜSTER, Käf. Europ. 29, 41
Mehrere Syntypen; Macedonien, leg. v. FRIVALDSZKY;
bei Salonick, leg. RAYMOND, in Coll. v. BRUCK, Coll.
v. KIESENWETTER, Coll. MÜLLER und Coll. KRAATZ.
SDEI: 1 Ex. ohne Fundort, leg. v. FRIVALDSZKY; 7 Ex.
Salonick, Coll. KRAATZ, Coll. F. MÜLLER, Coll. STIERLIN:
Syntypen.
- lujae* HINTZ, 1911, *Dityloderus*
Wiss. Erg. Dtsch. Zentr. Afr. Exp. (1907/08) Zool. 3, 433
5 Syntypen, Congo Belge, Kondué, leg. LUJA, Exped.
SDEI: 2 Syntypen, Congo Belge, Kondué, leg. LUJA.

- luteostriatus* HELLER, 1912, *Tonesisternus*
Ent. Mitt. 1, 172, Fig. 2
Mehrere Syntypen, Nova Guinea Germanica, Sattelberg,
Coll. v. BENNIGSEN.
SDEI: 1 Syntypus, D. Neuguinea, leg. v. BENNIGSEN.
- luteovittigera* PIC, 1906, *Phytoecia*
Echange 22, 4
Mehrere Syntypen, Persien, Coll. v. BODEMEYER.
SDEI: 1 Syntypus, Persien, Sultanabad, leg. v. BODEMEYER, durch LEONHARD.
- luteus australis* HÜDEPOHL, 1979, *Oxymerus*
Ent. Arb. Mus. G. Frey 28, 34, 36-37
♂ Holotypus, Argentina, Buenos Aires, Olivos, I.1977, in
Coll. HÜDEPOHL; zahlreiche ♂ ♀ Paratypen, siehe Originalbeschreibung.
SDEI: 2 Paratypen, Argentin., Prov. Buen. Aires, 21.I.
1906, leg. BRUCH.
- luteus occidentalis* HÜDEPOHL, 1979, *Oxymerus*
Ent. Arb. Mus. G. Frey 28, 34, 36
♂ Holotypus, Bolivia, Region Chapare, 400 m, XII.1949,
leg. ZISCHKA, in Coll. HÜDEPOHL; zahlreiche ♂ ♀ Paratypen
siehe Originalbeschreibung.
SDEI: 1 Paratypus, Peru.
- lutshniki* PLAVILSTSHIKOV, 1937, *Neodorcadion*
Acta Ent. Mus. Nat. Pragae 15, 33-34
Mongolie bor. occ.: république de Touva, vall. fl.
Cha-kem, 19.VI., 5 ♂, 4 ♀ durch LUTSHNIK, in Coll.
PLAVILSTSHIKOV; fl. Ulukem, village Urtshajlyk, 23.
VI.1914 und fl. Cha-kem, 21.VI.1914, 13 ♂, 9 ♀ leg.
TOMASHINSKY, in Coll. Institut Zool. Acad. Sciences de
l' URSS: Syntypen.
SDEI: 1 Syntypus, Tannu-tuva, vall. fl. Cha-kem, 23.VI.
1928.
- lydiae* PLAVILSTSHIKOV, 1929, *Dorcadion*
Col. Centr.'bl. 3, 209-212
23 ♂, 7 ♀ Syntypen, Sibiria mer. occ., Prov. Semipalatinsk,
nahe Semipalatinsk, 12., 13., 14.V.1927, Dzhana-Semej,
10.V.1928, leg. ALTYNBAJEV, in Coll. PLAVILSTSHIKOV.
SDEI: 1 Syntypus, Sibiria mer., occ., Prov. Semipalatinsk,
12.V.1927, leg. ALTYNBAJEV.
- maaki* KRAATZ, 1879, *Callidium*
Dtsch. ent. Ztschr. 23, 106-107
Holotypus, Ost-Sibirien, Amur, leg. CHRISTOPH, im SDEI
1877, Coll. KRAATZ.
- macilentum* KRAATZ, 1879, *Microrhabdium*
Dtsch. ent. Ztschr. 23, 99-100, Taf. 1, Fig. 8
Holotypus, Ost-Sibirien, Amur, leg. CHRISTOPH, im SDEI
1877, Coll. KRAATZ.
- macropus* KRAATZ, 1873, *Dorcadion*
In: KÜSTER, Käf. Europ. 29, 99
- Mehrere Syntypen, Amasia, leg. LEDERER, in Coll.
KRAATZ und Coll. MNISZECH.
SDEI: 2 Syntypen, Amasia, leg. LEDERER, Coll. KRAATZ.
- maculata* SCHWARZER, 1925, *Xoanodera*
Ent. Bl. 21, 21
Mehrere Syntypen, Formosa, Sokutsu, 7.VI.1912, leg.
SAUTER.
SDEI: 3 Syntypen, Formosa, Banshoryo Distr., Sokutsu,
7.VI., 7.VII.1912, leg. SAUTER.
- maculatus* HINTZ, 1913, *Pinacosternodes*
Dtsch. ent. Ztschr. 1913, 199
Mehrere Syntypen, Congo-Belge, Kondué.
SDEI: 1 Syntypus, Congo-Belge, Kondué, leg. LUJA, Coll.
KRAATZ.
- madoni* PIC, 1890, *Clytus*
Bull. Soc. ent. Fr. 1890, 211
Mehrere Syntypen, Palestine, leg. MADON.
SDEI: 1 Paralectotypus, Palestine, Coll. v. HEYDEN, Designation: SAMA.
- magnifica* SCHWARZER, 1925, *Saperda*
Ent. Bl. 21, 148
Mehrere Syntypen, Formosa, Kosempo, 7.VI.1912, leg.
SAUTER.
SDEI: 1 Syntypus, Formosa, Kosempo, 7.VI.1912, leg.
SAUTER.
- mali* HOLZSCHUH, 1993, *Rhopalopus*
FBVA-Berichte-Schriftenreihe der forstl. Bundesanstalt in Wien
75: 34
SDEI: 2 ♀ Paratypen, Kirgistan, Chatkalskiy Mts.
1900 m, Sary-chelek Nat. Reserve, 10.-11.07.1991, leg.
O. MEHL; Kirgistan, Dsjala-Abad Town, 18.07.1991, leg.
O. MEHL.
- malthinoides* KRAATZ, 1879, *Pseudopidonia*
Dtsch. ent. Ztschr. 23, 104, Taf. 1, Fig. 11; als var. von *alticollis*
KRAATZ beschrieben
Holotypus, Ost-Sibirien, Amur, leg. CHRISTOPH, im SDEI
1877, Coll. KRAATZ.
- marcae* LÓPEZ-COLÓN, 1997 *Plagionotus*
Lambillonea 97: 221-224
♂ Holotypus, Espana, Rivas-Vaciamadrid, Covibar,
12.VII.1993, leg. & Coll. LÓPEZ-COLÓN; 259 Paratypen
siehe Originalbeschreibung.
SDEI: 1 ♀ Paratypus, Espana, Rivas-Vaciamadrid, 9.VIII.
1991, leg. LÓPEZ-COLÓN.
- mardinensis* HEYDEN, 1894, *Phytoecia*
Dtsch. ent. Ztschr. 1894, 87-88
♂ Holotypus, Asia minoris, Mardin, in Coll. HEYDEN.
SDEI: Holotypus, Asia min., Kastomuni, PREISS.

- marginatus* SCHWARZER, 1925, *Olenecamptus*
Ent. Bl. 21, 63-64
Mehrere Syntypen, Formosa, Kosempo, 7.VII., leg. SAUTER.
SDEI: 1 ♂ Syntypus, Formosa, Kosempo, 7.XII. (nicht VII!).
- marianarum* AURIVILLIUS, 1908, *Monochamus*
Dtsch. ent. Ztschr. 1908, 216
Mehrere Syntypen, Marianen-Inseln, leg. v. BENNIGSEN.
SDEI: 11 Syntypen, Marianen, Coll. v. BENNIGSEN und Coll. KRAATZ.
- marianarum* AURIVILLIUS, 1908, *Prosoplus*
Dtsch. ent. Ztschr. 1908, 222
Mehrere Syntypen, Marianen-Inseln, leg. v. BENNIGSEN.
SDEI: 2 Syntypen, Marianen, Coll. v. BENNIGSEN und Coll. KRAATZ.
- marmorata* GAHAN, 1898, *Prosopocera*
Ann. Mag. Nat. Hist. (7) 2, 48
Mehrere Syntypen, Brit. E. Africa, Samburu, leg. BETTON.
SDEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Samburu, 30.X.-20.XI.1896, Coll. KRAATZ.
- marmorata* AURIVILLIUS, 1908, *Trigonoptera*
Dtsch. ent. Ztschr. 1908, 221, Taf. 3, Fig. 6
Mehrere Syntypen, Deutsch Neu-Guinea, Simbang und Sattelberg, leg. v. BENNIGSEN.
SDEI: 2 Syntypen, D. N. Guinea, Sattelberg, Coll. v. BENNIGSEN, Coll. KRAATZ.
- merceti* SCHRAMM, 1910, *Dorcadion*
Bol. Real. Soc. Esp. Hist. Nat. 10, 286-287
Mehrere Syntypen, Las Rozas, Sierra de Gredos, durch ARDOIS.
SDEI: 6 Syntypen, Las Rozas, Gredos, durch ARDOIS, Coll. KLÄGER.
- mingrelica* KRAATZ, 1879, *Fallacia*
Dtsch. ent. Ztschr. 23, 279-280
Holotypus, Mingrelien, leg. HABERHAUER (Gurien), in Coll. KRAATZ, im SDEI.
- minutum* KRAATZ, 1873, *Dorcadion*
In: KÜSTER, Käf. Europ. 29, 76
Mehrere Syntypen, Griechenland, bei Athen, leg. v. HELDREICH und KRÜPER.
SDEI: 6 Syntypen, Graecia, Coll. KRAATZ (als ab. *irroratum* KRAATZ bezettelt).
- mirabilis* KRAATZ, 1896, *Cyrtocerus*
Dtsch. ent. Ztschr. 1896, 155-156, Fig.
♂ Holotypus, Africa or., Mpuapua, in Coll. KRAATZ, im SDEI.
- miraculum* REITTER, 1897, *Neodorcadion*
In: KARSCH, Ent. Nachr. 23, 182-183
- Mehrere Syntypen, Mongolei, Changai-Gebirge, leg. LEDER.
SDEI: 1 Syntypus, nördl. Mongolei, Changai, leg. LEDER, Coll. v. HEYDEN.
- moesiaca* DANIEL, 1891, *Leptura*
Col. Stud. 1, 6, 27-28
Mehrere Syntypen; Serbien, leg. ZEBE, Coll. KRAATZ; Türkei, im Ung. National-Museum; Balkan, leg. v. FRIVALDSZKY, Coll. BAUDI.
SDEI: 5 Ex. Serbien, leg. ZEBE; 1 Ex. ohne Fundort, leg. v. FRIVALDSZKY; Coll. KRAATZ; Syntypen.
- moisescoi* LEPESME, 1946, *Corus*
Bull. Soc. ent. Fr. 51, 137-138
Holotypus, Usambara, leg. WEISE, im SDEI (Ex. ohne caput).
- morio* KRAATZ, 1879, *Necydalis*
Dtsch. ent. Ztschr. 23, 106
♀ Holotypus, Ost-Sibirien, Amur, leg. CHRISTOPH, im SDEI 1877, Coll. KRAATZ.
- morio* KRAATZ, 1879, *Oberea*
Dtsch. ent. Ztschr. 23, 117
♂ Holotypus, Ost-Sibirien, Amur, leg. CHRISTOPH, im SDEI, Coll. KRAATZ.
- morozovi* DANILEVSKY, 1992, *Dorcadion*
Lambillionea 92: 94-95
♂ Holotypus, Kazakhstan, Charyn valley 1300 m, 26 km to the North from Zhalanash, 15.IV.1991, leg. & Coll. DANILEVSKY; mehrere Paratypen siehe Originalbeschreibung.
SDEI: 2 ♀ Paratypen, Kazakhstan, 26 km N Zhanlanash, 1300 m, 15.IV.1991, leg. M. DANILEVSKY.
- muchei plurivittipenne* BREUNING, 1962, *Dorcadion*
Reichenbachia 1, 38
♀ Holotypus, Anatolien, Cankiri, IV.1961, leg. MUCHE, in Coll. MUCHE; 3 Paratypen, dito.
SDEI: 2 Paratypen, Anatolia, Cankiri, IV., leg. MUCHE.
- muliebris* HEYDEN, 1886, *Leptura*
Dtsch. ent. Ztschr. 30, 276
2 Syntypen, Amur, Suyfun-Fluß, durch STAUDINGER, No. 383, in Coll. v. HEYDEN, im SDEI.
- multanti* STIERLIN, 1866, *Molorchus*
Mitt. Schweiz. ent. Ges. 2, 30-31
Syntypen. Sicilien.
SDEI: ♂ Lectotypus, 1 ♀ Paralectotypus, Sicil., STIERLIN; 1 ♂ Paralectotypus, Sicilien, STIERLIN; Designation: SAMA.
- mysticus* MELZER, 1932, *Pentheochaetes*
Rev. Ent. S. Paulo 2, 433-434, Taf. 7, Fig. 8
Brasilien, Estado de São Paulo, Capital, leg. METZ; Bosque da Saude perto da Capital, leg. MELZER; Estado

do Paraná, Rio Negro, leg. FRANCISCANOS: Holotypus, mehrere Paratypen, im SDEI und in Coll. MELZER.
SDEI: Holotypus, Santos; 2 Paratypen, São Paulo, leg. METZ.

nais GOUNELLE, 1911, *Ommata*

Ann. Soc. ent. Fr. 80, 28–29
7 ♂, 3 ♀ Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy.
SDEI: 1 ♂ Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.

namaganensis HEYDEN, 1885, *Clytus*

Dtsch. ent. Ztschr. 29, 297–298
4 Syntypen, Turkestan, Namagan, durch STAUDINGER, in Coll. v. HEYDEN.
SDEI: ♂ Lectotypus, 1 ♂, 2 ♀ Paralectotypen, Turkestan, Namagan, durch STAUDINGER, Designation: SAMA.

neglecta MELZER, 1932, *Oreodera*

Rev. Ent. S. Paulo 2, 425–426, Taf. 6, Fig. 3
Holotypus, Brasilien, Estado de Para /Mathan), im SDEI.

neglectum GOUNELLE, 1911, *Callichroma*

Ann. Soc. ent. Fr. 80, 70, Fig.
8 ♂ Syntypen, Brasilien, État de Goyaz, Reg. Jatahy, im Museum Paulista, SDEI und in Coll. GOUNELLE.
SDEI: 1 Syntypus, Brésil, Ét. de Goyaz, Jatahy.

niger GRESSITT, 1984, *Tmesisternus*

Pacific Insects Monogr. 41, 106–107, Taf. 6 i
♂ Holotypus, PNG, New Guinea, E Highlands, Okapa, 1700–2000 m, 19.I.1966, leg. SEDLACEK, im Bishop Mus. Honolulu; Paratypen siehe Originalbeschreibung.
SDEI: 4 Paratypen, D. Neu Guinea, Wahnes, FRANKLIN MÜLLER.

nigra AURIVILLIUS, 1907, *Syndere*

Dtsch. ent. Ztschr. 1907, 78–79
Mehrere Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, via SCHENKLING an AURIVILLIUS, im SDEI.
SDEI: 1 Syntypus, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

nigra KIESENWETTER, 1859, *Tetrops*

Berl. ent. Ztschr. 3, 57
Mehrere Syntypen, Sardinien, durch GHILIANI.
SDEI: Lectotypus, Sardinien, durch GHILIANI, Coll. KRAATZ, Designation: SAMA.

nigrata HEYDEN, 1876, *Cortodera*

Dtsch. ent. Ztschr. 20, 318
♀ Holotypus, Hungaria, Dahl.

nigritulus KRAATZ, 1879, *Clytus*

Dtsch. ent. Ztschr. 23, 109–110
Mehrere Syntypen, Ost-Sibirien, Amur, leg. CHRISTOPH.
SDEI: 3 Syntypen, Amur, 1877, leg. CHRISTOPH, Coll. KRAATZ.

nigrofasciatus AURIVILLIUS, 1907, *Leiopus*

Dtsch. ent. Ztschr. 1907, 82
Mehrere Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, im SDEI.
SDEI: 1 Syntypus, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

nigrofasciatus AURIVILLIUS, 1908, *Tmesisternus*

Dtsch. ent. Ztschr. 1908, 214, Taf. 3, Fig. 8
Mehrere Syntypen, Deutsch Neu-Guinea, leg. v. BENNIGSEN.
SDEI: 1 Syntypus, D. Neu Guinea, Coll. v. BENNIGSEN.

nigrotriangularis HELLER, 1914, *Tmesisternus*

Dtsch. ent. Ztschr. 1914, 316
Mehrere Syntypen, Nova Guinea Germanica, ex Coll. v. BENNIGSEN, im Museum Dresden und SDEI.
SDEI: 1 Syntypus, N. Guinea, Sattelberg, leg. und Coll. v. BENNIGSEN.

nitida AURIVILLIUS, 1907, *Sophronica*

Dtsch. ent. Ztschr. 1907, 81
Mehrere Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, im SDEI.
SDEI: 1 Syntypus, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

notula GOUNELLE, 1909, *Eburodacrys*

Ann. Soc. ent. Fr. 77, 632
4 Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy.
SDEI: 1 Syntypus, Brésil, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. KRAATZ.

nuristanicus HEYROVSKY, 1936, *Purpuricenus*

Arb. morph. tax. Ent. 3, 212–213
2 ♂, 3 ♀ Syntypen; Nuristan, Gulan-Tal, 28.VI.; Brubrutz im Kti-Tal, 18.VI.; Hindukusch-Expedit., 1935; im SDEI und in Coll. HEYROVSKY.
SDEI: 3 Syntypen, Afghan., Nuristan; Gulan-Tal, 28.VI. 1935; b. Brubrutz im Kti-Tal, 18.VI.1935; Expedit. SCHEIBE (2 Ex. als f. *bisignata* und f. *rubripennis* HEYROVSKY bezettelt).

nivipictus KRAATZ, 1879, *Clytus*

Dtsch. ent. Ztschr. 23, 91 nata
Syntypen, Cilicischer Taurus, Kisbek, leg. LEDER.
SDEI: Lectotypus „Külek“, Designation: SAMA.

obscura SCHWARZER, 1925, *Abryna*

Ent. Bl. 21, 65
Mehrere Syntypen, Taihorin, 7.VIII.1911, leg. SAUTER.
SDEI: 1 Syntypus, Formosa, Taihorin, 7.VIII.1911, leg. SAUTER.

obscura SCHWARZER, 1925, *Pterolophia*

Ent. Bl. 21, 66–67
Mehrere Syntypen, Formosa, leg. SAUTER.
SDEI: 3 Ex. Taihorin, 7.VII., 22.VIII., 7.XI.1911; 13 Ex. Sokutsu, Banshoryo Distr., VI., 7.VI., 22.VI., 7.VII., 7.VIII.1912; 2 Ex. Alikang, 7.IX., 7.X.; 9 Ex. Kankau, Kos-

hun, IX.1912; 41 Ex. Kosempo, 7.IX.1909, 7.XII.1909/ 7.VII., 7.IX., 7.X., 7.XII.1911, 22.V.1912, VI.1912, 22.VII. (?); 1 Ex. Suisharyo, 7.XII.1911; 1 Ex. Hoozan, 7.IX.; 1 Ex. Fuhosho, VII.1909; Formosa, leg. SAUTER, Syntypen.

obsoletum KRAATZ, 1973, *Dorcadion*

Käfer Europas, 29. Heft: 78

Mehrere Syntypen, Brussa, Coll. KLÄGER, Coll. KRAATZ. SDEI: Lectotypus, 5 Paralectotypus, Brussa, Coll. KRAATZ, KLÄGER, Designation: SAMA.

ocellatum GOUNELLE, 1909, *Periboeum*

Ann. Soc. ent. Fr. 77, 640

Mehrere Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy. SDEI: 1 Syntypus, Brésil, Prov. Goyaz, Jatahy.

ochraceipennis KRAATZ, 1882, *Phytoecia*

Dtsch. ent. Ztschr. 26, 337

Mehrere Syntypen, Samarkand, leg. HABERHAUER. SDEI: 1 Syntypus, Samarkand, 1881, durch STAUDINGER, Coll. KRAATZ.

oertzeni GANGLBAUER, 1884, *Dorcadion*

Verh. Zool. Bot. Ges. Wien (1883) 33, 454

Mehrere Syntypen, Attika.

SDEI: 2 Syntypen, Attika, durch GANGLBAUER, Coll. KOLTZE.

olivacea AURIVILLIUS, 1908, *Trigonoptera*

Dtsch. ent. Ztschr. 1908, 221, Taf. 3, Fig. 4

Mehrere Syntypen, Deutsch Neu-Guinea, Simbang, Sattelberg, Herbertshöhe, leg. v. BENNIGSEN.

SDEI: 1 Ex. D. N. Guinea, Herbertshöhe; 1 Ex. N.-Guinea, Sattelberg; leg. v. BENNIGSEN, Coll. v. BENNIGSEN, Syntypen.

olympicum flavosuturale KRÄTSCHMER, 1987,
Dorcadion

Ent. Ztschr. 97, 340

♂ Holotypus, 3 ♂ 4 ♀ Paratypen, Türkei, Anatolien occ., Ufer Uluabat Göl, IV.1979, leg. CZIPKA, in Coll. KRÄTSCHMER; Paratypen, dito 7.IV.1986 und 19.IV.1987, in Coll. DROVENIK, PEKS und CZIPKA.

SDEI: 2 Paratypen, TR, Vil. Bursa, Ufer Uluabat Göl, 19.IV.1987, leg. DROVENIK.

optatum toropyginae DANILEVSKY, 1999, *Dorcadion*

Coleoptères 5: 22-23

♂ Holotypus, Kirgizia, left side of the Ala-Archa Narrows, 20 km S Bishkek, 1800 m, 2.V.1997, leg. & Coll. DANILEVSKY; 344 Paratypen siehe Originalbeschreibung. SDEI: 2 ♂ Paratypen, Kirgizia, Ala-Archa, 1700 m, 3.-4.V.1997, leg. M. DANILEVSKY.

orientalis natalensis FIEDLER, 1938, *Ceroplesia*

Dtsch. ent. Ztschr. 1938, 605

Holotypus, 43 Paratypen, Afrika, Natal, im Museum Berlin, Museum Brüssel, Senckenberg Museum und SDEI. SDEI: 1 Paratypus, Natal, Coll. FRANKLIN MÜLLER.

orientalis pseudocaffer FIEDLER, 1938, *Ceroplesia*

Dtsch. ent. Ztschr. 1938, 605

Holotypus, 51 Paratypen, Deutsch-Südwestafrika, Windhuk, Okahandja, Malakong, Lino Kana, Gaberones, Matabele, Kubub, Warmbad; im Museum Berlin, Museum Brüssel, Senckenberg Museum, Museum Paris und SDEI.

SDEI: 2 Ex. Südafrika, Warmbad, VI.1912, det. FRIEDRICH; 1 Ex. DSWA, Kubub, Coll. v. BENNIGSEN: Paratypen.

ottomanum HEYDEN, 1863, *Brachyteroma*

Berl. ent. Ztschr. 7, 128-129, Taf. 4, Fig. 4

♀ Holotypus, Türkei, durch MICHAELLES, im SDEI, Coll. v. HEYDEN.

palimnoides SCHWARZER, 1925, *Apalimna*

Ent. Bl. 21, 62-63

Mehrere Syntypen, Formosa; Fuhosho, VI.1909; Hoozan, 7.IX.1910; Kosempo, 7.VII.1909/ 22.V.1912; Taihorin, 7.VII.1911; leg. SAUTER.

SDEI: Formosa, leg. SAUTER, Syntypen: 9 Ex. Fuhosho, VI., VII.1909; 3 Ex. Kosempo, 7.VII.1909/ 7.VII.1911/ 22.V.1912; 2 Ex. Hoozan, 7.IX.1910; 1 Ex. Taihorin, 7.VIII.1911.

pallipennis HEYDEN, 1887, *Gymnopterion*

Dtsch. ent. Ztschr. 31, 321-322

2 ♂, 2 ♀ Syntypen, Turkestan, Issik-kul, Coll. v. HEYDEN. SDEI: Lectotypus, 2 Paralectotypen, Issik-kul, durch STAUDINGER und KRIEGHOFF, Coll. v. HEYDEN, Designation: SAMA.

papuanus HELLER, 1914, *Coptocercus*

Dtsch. ent. Ztschr. 1914, 314-315, Taf. 12, Fig. 6

Mehrere Syntypen, Nova Guinea Germanica, Sattelberg, ex Coll. v. BENNIGSEN, im Museum Dresden und SDEI.

SDEI: 1 Syntypus, N.-Guinea, Sattelberg, leg. v. BENNIGSEN.

pelionense BREIT, 1923, *Dorcadion*

Wien. ent. Ztg. 40, 145-146

Mehrere Syntypen, Balkan, Gipfelregion des Pelion in Thessalien, 2. Hälfte IV., leg. MOCZARSKI und BREIT.

SDEI: 2 Syntypen, Thessalien, Pelion.

peregrina KOLBE, 1900, *Mecothyreaa*

Berl. ent. Ztschr. 45, 302

1 Ex. West-Afrika, Mhonda; mehrere Ex. Mrogoro, Usigua, Usaramo, in Coll. v. BENNIGSEN: Syntypen.

SDEI: 2 Syntypen, Usigua, Coll. v. BENNIGSEN.

- pfisteri* STIERLIN, 1864, *Hammaticherus*
Berl. ent. Ztschr. 8, 152
Mehrere Syntypen, Sicilien.
SDEI: 2 Syntypen, Sicilien, Coll. STIERLIN.
- philemon* ADLBAUER, *Pachydissus*
Coleoptera, Schwanfelder Coleopterologische Mitteilungen 6:
169–171
Holotypus ♂, Zimbabwe, Hunyani river, S-Rhodesia,
15.VIII.1971, From Msasa Stump, A. J. Duke in Transvaal
Museum, Pretoria; Paratypen siehe Originalbeschreibung.
SDEI: 4 Paratypen, Dar-es-Salaam, leg. und Coll. v. BEN-
NIGSEN, Coll. KRAATZ.
- pilosellum* KRAATZ, 1873, *Dorcadion*
In: KÜSTER, Käf. Europ. 29, 58
Mehrere Syntypen, Mytilene, durch FAIRMAIRE.
SDEI: 2 Syntypen, Mytilene, durch FAIRMAIRE, Coll.
KRAATZ, Coll. KLÄGER.
- pilushana* SAITO, 1979, *Pidonia*
Bull. Nat. Sci. Mus. Ser. A (Zool.) 5 (3), 211–214, Fig. 1–6, 13 A–I
♂ Holotypus, Pilu-shenmu, nahe Mt. Pilushan, 2.440 m
alt., Hwalien Hsien, 8.V.1977, leg. SAITO; 351 ♂,
217 ♀ Paratypen, dito, Anfang V.–Anfang VI.1977 und
1978, leg. FUJITA, ITOH, KUBOKI, NIISATO, ODA, SAKAINO,
SHIMOMURA und SAITO; im National Science Museum
(Nat.Hist.), Tokyo, in Coll. SAITO u. a. Coll.
SDEI: 2 Paratypen, Pilu-shenmu, Hwalien Hsien, Taiwan,
16.V.1978, leg. SHIMOMURA und 4.V.1978, leg. SAITO.
- piochardi* KRAATZ, 1873, *Dorcadion*
In: KÜSTER, Käf. Europ. 29, 85
Mehrere Syntypen, asiatische Türkei, bei Samsun, Ama-
sia, auf dem Ak Dagh Gipfel bei Cadik, leg. LEDERER und
leg. KINDERMANN.
SDEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, Coll. KRAATZ.
- plagiata* AURIVILLIUS, 1911, *Androeme*
Arkiv för Zool. 7 (1), 4
Mehrere Syntypen, D. Ostafrika, Usambara, im SDEI und
im Museum Stockholm.
SDEI: 1 ♂ Syntypus, Usambara, leg. WEISE, Coll. KRAATZ.
- plasoni* GANGLBAUER, 1884, *Dorcadion*
Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 33 (1883), 491
Mehrere Syntypen, Persien, durch KRAATZ und PLASON
und 1 Ex. Caspisches Meer, bei Rasano, leg. LEDER; Syn-
typen.
SDEI: 4 Syntypen, Persien, Coll. KRAATZ.
- plasoni* GANGLBAUER, 1884, *Phytoecia*
Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 33 (1883), 571
Mehrere Syntypen, Persien.
SDEI: 1 Syntypus, Persia, leg. PLASON, Coll. KRAATZ.
- prasiniventre* GOUNELLE, 1911, *Orthoschema*
Ann. Soc. ent. Fr. 80, 76, nota
2 ♂, 3 ♀ Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, Espírito
Santo, Bahia, im SDEI und in Coll. GOUNELLE.
SDEI: 3 Syntypen, Brasilia, Bahia, leg. FRUHSTORFER,
Coll. KRAATZ.
- preissi* HEYDEN, 1894, *Dorcadion*
Dtsch. ent. Ztschr. 38, 86–87, Taf. 1, Fig. 3
1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Asia minor, Kastamuni, durch PREISS,
in Coll. v. HEYDEN; 1 ♂, dito, in Coll. PREISS.
SDEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
- preissi* HEYDEN, 1894, *Hesperophanes*
Dtsch. ent. Ztschr. 1894, 85–86
♀ Holotypus, Asia minor, Mardin, im SDEI durch STAU-
DINGER.
- prolixus* MELZER, 1931, *Ozineus*
Rev. Ent. S. Paulo 1, 7–8
11 Syntypen; Estado de São Paulo, São Sebastião, leg.
BARBIELLINI; Esatado da Bahia, São Salvador, leg. BON-
DAR; Estado de Pernambuco, Tapera, leg. PICKEL.
SDEI: 1 Syntypus, Pernambuco, Tapera, 21.IX.1928, leg.
PICKEL.
- proximus* MELZER, 1934, *Gepturges*
Rev. Ent. Rio de Janeiro 4, 100
Holotypus, 1 Paratypus, Rep. Costa Rica, Hamburgfarm,
Reventazon, Ebene Limon, leg. NEVERMANN, Turrialba,
800 m, leg. SCHILD, in Coll. NEVERMANN und Coll. MEL-
ZER.
SDEI: 1 Paratypus, Costa Rica, Turrialba, 800 m, leg.
SCHILD, Coll. NEVERMANN.
- pseudomophilus* REITTER, 1899, *Cortodera*
Dtsch. ent. Ztschr. 33, 40–41
Mehrere Syntypen, Araxesthal, bei Ordubad, leg.
KUBISCHTEK.
SDEI: 5 Syntypen, Caucasus, Araxesthal, Coll. KRAATZ,
Coll. STIERLIN, Coll. F. MÜLLER.
- pseudosulcatus* SCHWARZER, 1924, *Tmesisternus*
Nova Guinea 15, 59
Mehrere Syntypen, N. West Neu-Guinea, Pionerbivak,
VII.–VIII.1920, leg. v. HEURN.
SDEI: 2 Syntypen, N. N. Guinea, Pionerbivak, VII.–
VIII.1920, leg. v. HEURN, ex Museum Buitenzorg.
- pulchra* SCHWARZER, 1925, *Neoserixia*
Ent. Bl. 21, 148–149
Mehrere Syntypen, Formosa: Kankau, IV., V., VI.1912;
Banshoryo, V.1912; leg. SAUTER.
SDEI: Formosa, leg. SAUTER, Syntypen: 8 Ex. Kan-
kau, 7.IV., V., VI.1912; 1 Ex. Banshoryo, Shisha, V.–
VII.1912.

pumilio PLAVILSTSHIKOV, 1951, *Dorcadiion*

Sborn. trud. Zool. Mus. M. G. U. 7, 115

Mehr als 50 Syntypen, Kasachstan, Alma Ata Gebiet, Vorberge am Mittellauf des Ili, am häufigsten bei der Station Tschu; Kirgisien Frunse.

SDEI: 1 Syntypus, Dzhungar ross., St. Tshu, 27.IV.1934.

punctata SCHWARZER, 1925, *Batocera*

Ent. Bl. 21, 60

Mehrere Syntypen, Formosa, leg. SAUTER.

SDEI: 1 Syntypus, Formosa, Kosempo 7.VII.1911, leg. SAUTER.

purkynei HEYROVSKY, 1925, *Dorcadiion*

Acta Soc. Ent. „ech. 22, 45, Fig. 1, 2

Mehrere Syntypen, Mazedonien, Kajmakčalanu, 2000-2500 m.

SDEI: 2 Syntypen, Macedonia, Kajmakčalanu, 20.VII. 1925.

pusilla AURIVILLIUS, 1907, *Stathmodera*

Dtsch. ent. Ztschr. 1907, 80-81

Mehrere Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, im SDEI.

SDEI: 1 Syntypus, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

pygmaeum GANGLBAUER, 1881, *Rhagium*

Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 31, 718

Mehrere Syntypen, Caucasus.

SDEI: 1 Syntypus, Caucasus, durch GANGLBAUER, Coll. KOLTZE.

quadricostulatum KRAATZ, 1879, *Megasemum*

Dtsch. ent. Ztschr. 23, 98

2 Syntypen, Ost-Sibirien, Amur, leg. CHRISTOPH, im SDEI 1877, Coll. KRAATZ.

quadrimaculata NONFRIED, 1894, *Triginoptera*

Dtsch. ent. Ztschr. 1894, 211

Mehrere Syntypen, N. O. Sumatra, Tebing-Tinggi, leg. SCHULTHEISS, in Coll. SCHULTHEISS.

SDEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, 9.IV.1884.

quadrimaculatus AURIVILLIUS, 1908, *Tmesisternus*

Dtsch. ent. Ztschr. 1908, 214-215, Fig. 10

Mehrere Syntypen, Herbertshöhe, leg. v. BENNIGSEN.

SDEI: 1 Syntypus, D. N. Guinea, Herbertshöhe, Coll. v. BENNIGSEN.

quadrinotata SCHWARZER, 1921, *Sybra*

Ent. Bl. 21, 145

Mehrere Syntypen, Formosa: Kosempo, 7.VII.1909/ 7.VII.1911; Kankau, V., VII.1912; leg. SAUTER.

SDEI: Formosa, leg. SAUTER, Syntypen: 3 Ex. Kankau, Koshun, V., VII.1912; 1 Ex. Kosempo, 7.VII.1911.

quadriplagiata HINTZ, 1911, *Antennoeme*

Wiss. Erg. Zentr. Afr. Exped. Zool. 3, 427

6 Syntypen; Mawambi am Ituri, westl. v. Albert-See, IV.1908; Kondué, Congo Belge, leg. LUJA.

SDEI: 2 Syntypen, Congo-Belge, Kondué, leg. LUJA.

quadripustulatum KRAATZ, 1873, *Dorcadiion*

In: KÜSTER, Käf. Europ. 29, 88

Holotypus, Dardanellen, im SDEI (ohne Fundort), Coll. KRAATZ.

quadrisignatus SCHWARZER, 1925, *Micromulciber*

Ent. Bl. 21, 64

Mehrere Syntypen, Formosa: Kosempo, 7.VII.; Sokutsu, 7.VII.1912; leg. SAUTER.

SDEI: 2 Syntypen, Formosa, Kosempo, 7.VI., 7.XII.1912, leg. SAUTER.

ramalium BEDEL, 1885, *Pseudomyrmecion*

Bull. Soc. ent. Fr. (6) 5, 132

Mehrere Syntypen, Algérie, Wald von Edough, 15.V.-VII.

SDEI: 1 Syntypus, Edough, Coll. STIERLIN.

reini HEYDEN, 1879, *Toxotus*

Dtsch. ent. Ztschr. 23, 359-360; als var. von *minutus* GEBLER beschrieben

Holotypus, Japan, bei Osaka, leg. REIN, im SDEI.

ressli DEMELT, 1963, *Oberea*

Ent. Bl. 59, 150-151, Abb. 5

Holotypus, mehrere Paratypen, Asia minor sept., Kizilcahamam, leg. RESSL, in Coll. DEMELT, Coll. SCHURMANN, Coll. HEYROVSKY und Coll. LEKES.

SDEI: 1 Paratypus, Asia minor, Kizilcahamam.

ribbei KRAATZ, 1878, *Dorcadiion*

Dtsch. ent. Ztschr. 22, 220-221

Mehrere Syntypen, Sibirien, Tarbagatai.

SDEI: 4 Syntypen, Tarbagatai, leg. CHRISTOPH, durch RIBBE, Coll. KRAATZ, Coll. v. HEYDEN.

richteri BRUCH, 1908, *Trachyderes*

Rev. Mus. La Plata 15, 215-216

Mehrere Syntypen, Argentinien, Provincia, Catamarca, Andalgala, III.1907, durch VENTURI.

SDEI: 1 Syntypus, Argentinien, Prov. Catamarca, 29.III. 1907, durch BRUCH, Coll. KRAATZ.

ritae SAMA, 1985, *Exocentrus*

Lavori Soc. Ven. Sc. Nat. 10, 65-67

♂ Holotypus, Turchia, Vil. İçel: Çamlıayyla (Namrun), 1300 m, 31.V.81, leg. SAMA, im Mus. civ. Stor. nat. Verona.

Zahlreiche Paratypen siehe Originalbeschreibung.

SDEI: 1 Paratypus, Turchia-Namrun, Meselik, ex larva *Morus*, 30.VI./ 24.VII.81, leg. SAMA.

riveti GOUNELLE, 1910, *Mecometopus*

Bull. Mus. Paris 16, 16

Holotypus, Équateur, Santo Domingo de Los Colorados, alt. 510 m, 1905, leg. REVETI; 3 Paratypen, Columbien, Rio Dagua, im SDEI und in Coll. GOUNELLE (als var. *pilosa* GOUNELLE beschrieben).

SDEI: 1 ♂, 1 ♀ Paratypen, Colombie, Coll. KRAATZ (als var. *pilosa* GOUNELLE bezettelt).

robustum GANGLBAUER, 1884, *Dorcadion*

Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 33 (1883), 500

♂ Holotypus, Amasia, durch Kraatz, im SDEI (ohne Fundort), Coll. KRAATZ.

robustus HEYDEN, 1844, *Aulacopus*

Stett. ent. Ztg. 5, 15

Mehrere Syntypen, europäische Türkei.

SDEI: 2 Syntypen, Türkei, Coll. v. HEYDEN.

rubella BROUN, 1914, *Somatidia*

Bull. New Zealand Inst. 1, 254-255

12 Syntypen, New Zealand, Mount Hutt und Mc. Clennan's Bush, 1.500 ft., IV.1912, durch HALL.

SDEI: 1 Syntypus, New Zealand, Canterbury, Mt. Hult, Coll. HALL.

rubricatum GOUNELLE, 1909, *Ibidion*

Ann. Soc. ent. Fr. 77, 680-681

10 Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy.

SDEI: 1 Syntypus, Brésil, Prov. Goyaz, Jatahy.

rufa KRAATZ, 1879, *Pidonia*

Dtsch. ent. Ztschr. 1879, 101-102

♂ Holotypus, Ost-Sibirien, Amur, leg. CHRISTOPH, im SDEI, Coll. KRAATZ.

rufa GOUNELLE, 1911, *Sphecomorpha*

Ann. Soc. ent. Fr. 80, 49-50

7 ♂, 5 ♀ Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy.

SDEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.

ruficauda GOUNELLE, 1909, *Haruspex*

Ann. Soc. ent. Fr. 77, 654, Fig. 24

Mehrere Ex., Brasilien, Prov. Goayz, Jatahy; 1 Ex. Minas, Sertão de Diamantina; leg. GOUNELLE, Syntypen.

SDEI: 1 Syntypus, Brésil, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. KRAATZ.

ruficornis BROUN, 1914, *Somatidia*

Bull. N. Zealand Inst. 1, 255-256

Mehrere Syntypen, New Zealand, Pudding Hill und Mc. Clennan's Bush, nahe Methven, IV., V.1912, leg. HALL.

SDEI: 1 Syntypus, New Zealand, Canterbury, Pudding Hill, Coll. HALL.

rufipenne cankiriense BREUNING, 1962, *Dorcadion*

Reichenbachia 1, 39

Holotypus, mehrere Paratypen, Anatolien, Cankiri, IV.1961, leg. MUCHE, in Coll. MUCHE.

SDEI: 3 Paratypen, Anatolien, Cankiri, IV., leg. MUCHE.

rufobrunnea HEYDEN, 1894, *Conizonia*

Dtsch. ent. Ztschr. 1894, 88

♀ Holotypus, Asia minor, Mardin (Kastomuni, nicht Mardin!), durch PREISS, in Coll. v. HEYDEN, im SDEI.

rufogenuum REITTER, 1895, *Dorcadion*

Wien. ent. Ztg. 14, 161

Mehrere Syntypen, Thian-Schan, leg. HAUSER.

SDEI: 6 Syntypen, Thian-Schan, Musart, VI.1894, Coll. HAUSER, Coll. LEONHARD, Coll. F. MÜLLER.

rufoscapa AURIVILLIUS, 1907, *Sophronica*

Dtsch. ent. Ztschr. 1907, 81

Mehrere Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, im SDEI.

SDEI: 4 Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

rufovittatus AURIVILLIUS, 1907, *Calanthemis*

Dtsch. ent. Ztschr. 1907, 78

Mehrere Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, via SCHENKLING an AURIVILLIUS, im SDEI.

SDEI: 1 Syntypus, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

rufus var. *geniculatus* KRAATZ, 1863, *Stenopterus*

Berl. ent. Ztschr. 7, 103

Syntypen, Griechenland.

SDEI: Lectotypus, Graecia; 1 Paralectotypus, Attica, Designation: SAMA.

rusticum GOUNELLE, 1909, *Ibidion*

Ann. Soc. ent. Fr. 77, 682-683

Mehrere Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy.

SDEI: 1 Syntypus, Brésil, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. KRAATZ.

salicicola STILLER, 1934, *Caenoptera*

Mitt. Dtsch. Ent. Ges. 5, 37-38

Mehrere Syntypen, Ungarn, Szeged.

SDEI: 6 Syntypen, Hungaria, Szeged, leg. STILLER.

salomonum BREUNING, 1970, *Scituloglaucytes*

Bull. Soc. Ent. Mulhouse 26, Fig. 7

Holotypus, 7 Paratypen, Salomes, Insel Tulagi, im Museum Paris und SDEI.

SDEI: 3 Paratypen, engl. Salomons, Ins. Tulagi.

santacrusicus HELLER, 1935, *Glaucites*

Arb. morph. tax. Ent. 2, 267-268

Mehrere Syntypen, Santa-Cruz, Vanikoro, leg. MALCHER, im Museum Dresden und SDEI.

SDEI: 1 Syntypus, Sta Cruz I., Vanikoro, leg. MALCHER.

sapkaianum KRÄTSCHMER, 1987, *Dorcadion*

Ent. Ztschr. 97, 337-339

♂ Holotypus, Paratypen, Griechenland (Thraki), Sapka, 1000 m, 4.IV.1986, leg. KRÄTSCHMER, in Coll.

KRÄTSCHMER. Paratypen vom selben Fundort, in Coll. HOLZSCHUH, DROVNIK und KRÄTSCHMER.
SDEI: 2 Paratypen, G R Alexandropolis, Sapka, 1300 m, 4.IV.1986, leg. DROVNIK.

sarda GOUNELLE, 1912, *Tamenes*
Bull. Soc. ent. Fr. 1912, 133-135, Fig. 1
Holotypus, Amérique centrale, Chiriqui, im SDEI.

sareptanum KRAATZ, 1873, *Dorcadion*
In: KÜSTER, Käf. Europ. 29, 74
Mehrere Syntypen; Sarepta, leg. BECKER; bei Astrachan.
SDEI: 3 Syntypen, Sarepta, Coll. KRAATZ.

sauteri SCHWARZER, 1925, *Glenea*
Ent. Bl. 21, 150
Mehrere Syntypen, Formosa; Fuhosho, 7.VIII.; Alikang, 7.X.; Kosempo, VI.1909/ V.1912; leg. SAUTER.
SDEI: Formosa, leg. SAUTER, Syntypen: 3 Ex. Kosempo, V., 22.VI.1912; 2 Ex. Fuhosho, 7.VIII.; 1 Ex. Alikang, 7.X.

sauteri LAMEERE, 1913, *Megopis*
Arch. Naturg. 79 A, Heft 7, 175-176
♂ Holotypus, Formosa, Kosempo, VI., leg. SAUTER, im SDEI 1912.

scabricolle caramanicum DANIEL, 1903, *Dorcadion*
Münch. Kol. Ztschr. 1, 332
Mehrere Syntypen, Kleinasien, bei Bulghar-Maaden und Bulghar-Magara, E. V., leg. v. BODEMEYER.
SDEI: 2 Syntypen, Asia minor, Bulghar-Maaden, Bulghar-Magara, leg. v. BODEMEYER, durch LEONHARD, Coll. KRAATZ.

scabrosum GOUNELLE, 1909, *Gnomidolon*
Ann. Soc. ent. Fr. 77, 663-664
13 Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy.
SDEI: 1 Syntypus, Brésil, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. KRAATZ.

scabrum KRAATZ, 1882, *Callidium*
Dtsch. ent. Ztschr. 26, 115
Holotypus, Margelan, leg. HABERHAUER, in Coll. KRAATZ.
SDEI: Holotypus, Namangan.

scalaris occidentalis SCHMIDT, 1922, *Anubis*
Arch. Naturg. 88, A 6, 141
Holotypus, Angola, Benguella, leg. WELLMANN, im SDEI, Coll. KRAATZ.

schenklingi LAMEERE, 1912, *Aulacopus*
Mém. Soc. ent. Belg. 21, 140
♂ Holotypus, Uganda, im SDEI, Britisch Uganda, leg. GRAUER.

schultzei HEYDEN, 1894, *Dorcadion*
Dtsch. ent. Ztschr. 1894, 86

2 ♂, 1 ♀ Syntypen, Asia minor, Mardin, in Coll. v. HEYDEN und Coll. PREISS.
SDEI: 2 Syntypen, Mardin, durch STAUDINGER, Coll. v. HEYDEN.

schwarzeri HELLER, 1926, *Heterotaxalus*
Tijdschr. Ent. 69, 42-43, Taf. 5, Fig. 4
Mehrere Syntypen, Nova Guinea Germanica, leg. WAHNES, ex Coll. F. MÜLLER, im Museum Dresden und SDEI.
SDEI: 7 Syntypen, D. Neu-Guinea, leg. WAHNES, durch FRANKLIN MÜLLER.

scotodes continentalis PLAVILSTSHIKOV, 1936, *Leptura*
Faune de URS 21, 371-372, 564, Fig. 184, 185
Mehrere Syntypen, südl. Primorje (weitere Angaben siehe Originalbeschreibung), leg. PLAVILSTSHIKOV.
SDEI: 1 ♂ Syntypus, Ussuri, Ossinovka, 20.VIII.1917, leg. ELSKY.

scrobicolle KRAATZ, 1873, *Dorcadion*
In: KÜSTER, Käf. Europ. 29, 97
Mehrere Syntypen, Kleinasien, in Coll. MNISZECH und Coll. KRAATZ.
SDEI: 1 Syntypus, Asia minor, Coll. KRAATZ.

scutellata SCHWARZER, 1925, *Dorcadion*
Ent. Bl. 21, 66
Mehrere Syntypen, Formosa; Kosempo, 7.XII.1909/ X.1911; Alikang, 22.IX.; Kankau, VI.1912; leg. SAUTER.
SDEI: Formosa, leg. SAUTER, Syntypen: 1 Ex. Kankau, Koshun, VI.1912; 1 Ex. Alikang, 22.IX.; 1 Ex. Kosempo, X.1911.

seabrai DIAS, 1988, *Mysteria*
Rev. Bras. Ent. 32, 144-145, Fig. 16, 31, 49, 66, 80, 81
♂ Holotypus, Argentinien, La Gallareta, I.1907, im Mus. La Plata; Paratypen siehe Originalbeschreibung.
SDEI: 1 ♂ Paratypus, Esperanza (Argentina).

sellaemontis HELLER, 1912, *Pseudaelara*
Ent. Mitt. 1, 176, Fig. 5
Mehrere Syntypen, Nova Guinea Germanica, Sattelberg, Coll. v. BENNIGSEN.
SDEI: 2 Syntypen, N. Guinea, Sattelberg, leg. v. BENNIGSEN, Coll. v. BENNIGSEN.

semenovi HEYROVSKY, 1934, *Moechotypa*
„asop. Cs. Spol. Entom. 31, 172-173
15 Syntypen, Giufu-Shan, 1500-2000 m, Szechuan, in Coll. REITTER und Coll. HEYROVSKY.
SDEI: 2 Syntypen, Szechuan, Giufu-Shan, 1500-2000 m, leg. REITTER.

semenovi kuvakense DANILEVSKY, 2002, *Dorcadion*
Les Cahiers Magellanes 10(2001): 16 (kuvakensis lapsus)
♂ Holotypus, Kirgizia, East Kirgizky Ridge, Kuvaki Pass, 2300 m, 20.V.1998, leg. S. TOROPOV, Coll. DANILEVSKY;

152 Paratypen vom gleichen Fundort in der Sammlung des Autors.

SDEI: 1 ♂ Paratypus, Kirgizia, Kuvaky Pass, 2000 m, 14.IV.2000, leg. M. DANILEVSKY.

semilucens KRAATZ, 1873, *Dorcadion*

In: KÜSTER, Käf. Europ. 29, 84

Mehrere Syntypen, Mongolei, durch KINDERMANN, in Coll. MNISZECH, Coll. KRAATZ.

SDEI: 1 Syntypus, Caucasus, durch MNISZECH.

seminudum KRAATZ, 1873, *Dorcadion*

In: KÜSTER, Käf. Europ. 29, 83

Mehrere Syntypen, Kaukasus, in Coll. MNISZECH und Coll. KRAATZ.

SDEI: 2 Syntypen, Kaukasus, durch MNISZECH, Coll. KRAATZ.

semipubescens GOUNELLE, 1911, *Smodicum*

Ann. Soc. ent. Fr. 80, 127-129

1 ♂, 1 ♀, Peru, Vilcanota; 1 ♂, 1 ♀, Ocobambe, im SDEI: Syntypen.

SDEI: 1 ♂, 1 ♀ Paralectotypen, Peru, Ocobama, Coll. KRAATZ, Designation: MARTINS 1973.

semirufa KRAATZ, 1882, *Oberea*

Dtsch. ent. Ztschr. 26, 115-116

Mehrere Syntypen, um Margelan.

SDEI: 1 Syntypus, Margelan, Coll. KRAATZ.

semirufus KRAATZ, 1884, *Cleroclytus*

Dtsch. ent. Ztschr. 28, 225-226

Holotypus, Turkestan, Osch, durch STAUDINGER, im SDEI, Coll. KRAATZ.

semivelutinum SCHWARZER, 1925, *Aphrodisium*

Ent. Bl. 21, 24-25

Holotypus, Formosa, Hoozan, IX.1910, leg. SAUTER, im SDEI.

semivelutinum KRAATZ, 1873, *Dorcadion*

In: KÜSTER, Käf. Europ. 29, 82

Mehrere Syntypen, Kleinasien, durch MNISZECH.

SDEI: 2 Syntypen, ohne Fundort, Coll. KRAATZ.

sericatula GOUNELLE, 1909, *Appula*

Ann. Soc. ent. Fr. 77, 649-650, Fig. 23

Mehrere Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, São Paulo, Minas, leg. GOUNELLE.

SDEI: 2 Syntypen, Brésil, Et. de Sao Paulo, Cerqueira Cesar, Coll. VOGEL, Coll. KRAATZ.

sericatum KRAATZ, 1873, *Dorcadion*

In: KÜSTER, Käf. Europ. 29, 98

Mehrere Syntypen, Caucasus, durch HEYNE, Coll. MNISZECH.

SDEI: 2 Syntypen, Caucasus, durch HEYNE, Coll. MNISZECH-Coll. KRAATZ.

setigera SCHWARZER, 1925, *Cleomenida*

Ent. Bl. 21, 29-30

Mehrere Syntypen, Formosa: Kosempo, 7.VII.1911/ 22.V. 1912/ 7.VI.1912; Kankau, V.1912; Sokutsu, 7.VI.1912; leg. SAUTER.

SDEI: Formosa, leg. SAUTER, Syntypen: 13 Ex. Kosempo, V., 22.V., 7.VI.1912/ 7.VII.1911/ 7.XII.; 2 Ex. Kankau, Koshun, V., VI.1912; 2 Ex. Sokutsu, 7.VI.1912.

sexplagiatus MELZER, 1927, *Atelographus*

Rev. Mus. Paul. 15, pt 1, 578

Mehrere Syntypen, Brasil, Annaburg, Estado de Santa Catharina, leg. SCHMITH.

SDEI: 3 Syntypen, Est. S. Catharina, Joinville, X.1921, leg. SCHMITH, ded. MELZER.

sicula GANGLBAUER, 1885, *Leptura*

Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 35, 515-516

2 Syntypen, Sicilia, im Museum Wien und via STIERLIN an GANGLBAUER.

SDEI: 1 Syntypus, Sicilia, Coll. STIERLIN.

siculum STIERLIN, 1864, *Callidium*

Berl. ent. Ztschr. 8, 152

Mehrere Syntypen, Sicilien.

SDEI: 2 Syntypen, Sicilien, Coll. STIERLIN.

signaticornis SCHWARZER, 1925, *Linda*

Ent. Bl. 21, 154

Mehrere Syntypen, Formosa: Kosempo, V.1912; Kankau, VII.1912; Sokutsu, 7.VI.1912; leg. SAUTER.

SDEI: Formosa, leg. SAUTER, Syntypen: 1 Ex. Kankau, Koshun, VII.1912; 2 Ex. Sokutsu, Banshoryo-Distr., 7.VI., 7.VII.1912.

signaticornis SCHWARZER, 1925, *Serixia*

Ent. Bl. 21, 149

Mehrere Syntypen, Formosa, Kankau, IV., V.1912, leg. SAUTER.

SDEI: 3 Syntypen, Formosa, Kankau, Koshun, 7.IV., IV., V.1912, leg. SAUTER.

signaticornis MELZER, 1920, *Temnopsis*

Rev. Mus. Paul. 12, 421-423, Fig. 3, 4

24 Syntypen, Brasil, Passa Quatro, Sul de Minas, in Coll. ZIKAN, im Museum Paulista und in Coll. MELZER.

SDEI: 1 Syntypus, Brasil, Minas Passa Quatro, I.1918, leg. CAMPOS.

signatus SCHWARZER, 1925, *Thranius*

Ent. Bl. 21, 23-24

Mehrere Syntypen, Formosa: Fuhosho, 7.IX.; Kosempo, 7.IX.1911/ VI.1912; leg. SAUTER.

SDEI: Formosa, leg. SAUTER, Syntypen: 1 Ex. Fuhosho, 7.IX.; 2 Ex. Kosempo, 7.IX.1911/ VI.1912.

- silacea* AURIVILLIUS, 1907, *Phryneta*
Dtsch. ent. Ztschr. 1907, 80
♀ Holotypus, Togo-Amedzowe, im SDEI, Coll. KRAATZ.
- simile* KRAATZ, 1884, *Dorcadion*
Dtsch. ent. Ztschr. 28, 234
♂ Holotypus, südliches Kleinasien, Malatia, im SDEI, Coll. KRAATZ.
- simillimum* MELZER, 1932, *Alcidion*
Rev. Ent. S. Paulo 2, 224-225, Taf. 3, Fig. 6
Brasilien, Estado de São Paulo, Bosque da Saude perto da Capital, leg. MELZER; Alto da Serra, leg. Ohaus; Est. Sta. Catharina, Joinville, leg. SCHMITH; Hansa-Humboldt, leg. MALLER; in Coll. MELZER; Holotypus, mehrere Paratypen. SDEI: 1 Paratypus, Est. S. Catharina, Joinville, I.1924, leg. SCHMITH.
- similis* KRAATZ, 1879, *Grammoptera*
Dtsch. ent. Ztschr. 23, 102
1 ♂, 2 ♀ Syntypen, Ost-Sibirien, Amur, leg. CHRISTOPH.
SDEI: 3 Syntypen, Amur, Coll. KRAATZ.
- simplicarium* HEYDEN, 1885, *Callidium*
Dtsch. ent. Ztschr. 29, 296-297
Mehrere Syntypen, Turkestan, Namagan, leg. STAUDINGER.
SDEI: 3 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, 1885, Coll. v. HEYDEN.
- simplicipes* GOUNELLE, 1911, *Coremia*
Ann. Soc. ent. Fr. 80, 81-82, Fig.
1 ♀, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy; 1 ♂, Bahia, Umgebung von Condeuba; 4 Ex. N. W. Argentinien, leg. STEINBACH, im SDEI: Syntypen.
SDEI: 4 Syntypen, N. W. Argentinien, leg. STEINBACH, Coll. KRAATZ.
- simpliconica* STIERLIN, 1880, *Leptura*
Mitt. Schweiz. ent. Ges. 5, 550-551
Holotypus, Simplon, im SDEI, Coll. STIERLIN.
- singularis* KRAATZ, 1879, *Brachyclytus*
Dtsch. ent. Ztschr. 23, 107-108, Taf. 1, Fig. 6
Holotypus, Ost-Sibirien, Amur, leg. CHRISTOPH, im SDEI 1877.
- sodale* HAMPE, 1852, *Docradion*
In: WAGNER, Reise n. Persien 2, 313
Mehrere Syntypen, Kaukasus, Trans-Kaukasien, Armenien, Kurdistan und West-Persien.
SDEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, Coll. KRAATZ.
- solskyi* KRAATZ, 1879, *Pachyta*
Dtsch. ent. Ztschr. 23, 71-72, 76, Taf. 1, Fig. 15
2 Syntypen, Ost-Sibirien, Baikal-See, durch v. SOLSKY, Coll. KRAATZ.
SDEI: 1 Syntypus, Baikal, durch v. SOLSKY, Coll. KRAATZ.
- sormeooides* AURIVILLIUS, 1908, *Heteroclytomorpha*
Dtsch. ent. Ztschr. 1908, 219-220, Fig. 11, 11a
Mehrere Syntypen, Neu-Pommern, Gazelle-Halbinsel, leg. v. BENNIGSEN.
SDEI: 1 Syntypus, Gazelle-H.-Insel, Coll. v. BENNIGSEN.
- soror* KRAATZ, 1882, *Agapanthia*
Dtsch. ent. Ztschr. 26, 336-337
Mehrere Syntypen, Samarkand, leg. HABERHAUER.
SDEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, Coll. KRAATZ.
- sparsus* REITTER, 1886, *Clytus*
Dtsch. ent. Ztschr. 30, 67
Mehrere Syntypen, im Lycischen Taurus, Adalia.
SDEI: 3 Syntypen, Adalia.
- starcki* REITTER, 1888, *Cortodera*
Wien. ent. Ztg. 7, 280; als var. von *alpina* MÉNÉTRIES beschrieben
Mehrere Syntypen, Abago, leg. STARCK.
SDEI: 3 Syntypen, Caucasus occid., Abago, leg. STARCK, Coll. STIERLIN.
- stenostola* KRAATZ, 1879, *Asaperda*
Dtsch. ent. Ztschr. 23, 227-228, Taf. 2, Fig. 14, 14a
2 Syntypen, Ost-Sibirien, Amur, leg. CHRISTOPH, in Coll. KRAATZ, im SDEI 1877.
- sterni* KRAATZ, 1870, *Clytus*
Berl. ent. Ztschr. 14, 219, Taf. 3, Fig. 1
Mehrere Syntypen, aus Waldholz (zur Insektenzucht) von STERN in Frankfurt a. M., im Frühsommer 1868 gezogen, via STERN an KRAATZ.
SDEI: 4 Syntypen, Frankfurt a. M., Coll. STERN.
- striolatum* KRAATZ, 1873, *Dorcadion*
In: KÜSTER, Käf. Europ. 29, 93
Mehrere Syntypen, Türkei, durch HEYNEMANN, SALLÉ, MNISZECH, KÜSTER und KRAATZ.
SDEI: 2 Syntypen, Kaukasus, Coll. KRAATZ.
- subfasciata* SCHWARZER, 1925, *Miaenia*
Ent. Bl. 21, 148
Mehrere Syntypen, Formosa, Sokutsu, 22.VI.1912, leg. SAUTER.
SDEI: 1 Syntypus, Banshoryo Distr., Sokutsu, 1912, leg. SAUTER.
- subuniforme* SCHWARZER, 1925, *Ceresium?*
Ent. Bl. 21, 22
Mehrere Syntypen, Formosa, Kosempo, 7.VI.1912, leg. SAUTER.
SDEI: 2 Syntypen, Formosa, Kosempo, 7.IX.1909/ 22.V. 1912, leg. SAUTER.
- sulcipenne* KÜSTER, 1847, *Dorcadion*
In: KÜSTER, Käf. Europ. 8, 87-88
Mehrere Syntypen, Caucasus und Türkei.
SDEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, Coll. KRAATZ.

- sumatrana* NONFRIED, 1894, *Merionoeda*
 Dtsch. ent. Ztschr. 1894, 206-207
 Mehrere Syntypen, N. O. Sumatra, Tebing-Tinggi, leg. SCHULTHEISS.
 SDEI: 5 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, 8.IX.1884, Coll. SCHULTHEISS.
- sumatrensis* SCHWARZER, 1924, *Distenia*
 Treubia 5, 236
 Mehrere Syntypen, Süd-Sumatra, Wai Lima, Lampongs, XI.-XII.1921, leg. KARNY & SIEBERS.
 SDEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung, No. 17, ex Museum Buitenzorg.
- superbum* AURIVILLIUS, 1908, *Chloridolum*
 Dtsch. ent. Ztschr. 1908, 212
 Mehrere Syntypen, Salomon-Inseln, leg. v. BENNIGSEN.
 SDEI: 2 Syntypen, D. N.-Guinea, Salomon-Inseln, Coll. KRAATZ.
- suturale* AURIVILLIUS, 1908, *Hypatum*
 Dtsch. ent. Ztschr. 1908, 211-212, Taf. 3, Fig. 2
 Mehrere Syntypen, Westafrika, Benguella, Coll. v. BENNIGSEN.
 SDEI: 1 Syntypus, W. A., Benguella, Coll. v. BENNIGSEN.
- svorovi konyrolenum* DANILEVSKY, 1996, *Dorcadion*
Lambillionea 96: 458-459 (*konyrolenus* lapsus)
 ♂ Holotypus, 201 Paratypen, Kazakhstan, Konyrolen S, Dzhungarsky Alatau, 1250 m, 8.V.1994, leg. M. DANILEVSKY.
 SDEI: 1 ♂ Paratypus, vom gleichen Fundort.
- taihorensis* SCHWARZER, 1925, *Chlorophorus*
 Ent. Bl. 21, 27; als var. von *signaticollis* CASTELNAU & GORY beschrieben
 Mehrere Syntypen, Formosa, Taihorin, 7.VI.1911, leg. SAUTER.
 SDEI: 2 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung.
- tenebrica* BROUN, 1893, *Somatidia*
 Man. N. Zealand Col. 7, 1500
 20 Syntypen, New Zealand, Maketu, Hunua Range.
 SDEI: 4 Syntypen, Auckland, Maketu, Hunua, Coll. BROUN.
- tenebrosus* VILLIERS, 1980, *Nethinius*
 Faun. Madagasc. 52, 43, 99, Fig. 267-269
 ♂ Holotypus, Madagascar, Baie d'Antongil, 98, leg. MOCQUERYS, im Museum Paris; 1 ♂, 2 ♀ Paratypen, dito, im Museum Paris, Museum Brüssel und Museum Berlin.
 SDEI: 1 Paratypus, Madagascar, Coll. KRAATZ.
- tenuicorne* KRAATZ, 1879, *Asenom*
 Dtsch. ent. Ztschr. 23, 97 nota
- 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Krim, leg. Ribbe.
 SDEI: Lectotypus, 1 Paralectotypus, Krim, Coll. KRAATZ, Designation: SAMA.
- tesserula* var. *impunctata* HEYDEN, 1877, *Leptura*
 Dtsch. ent. Ztschr. 21, 420
 1 Syntypus, Siebenbürgen, in Coll. HEYDEN; 1 Syntypus, Caucasus, in Coll. TÜRK.
 SDEI: Lectotypus, Transylv., STENZ, Designation: SAMA.
- tianshanskii* SUVOROV, 1910, *Compsodorcadios*
 Rev. Russe d'Ent. 10, 67-69
 Mehrere Syntypen, im Semirjetshje-Gebiet.
 SDEI: 1 Syntypus, Semirjetshje, Tshulak, Coll. KLÄGER.
- tonsa* DANIEL, 1891, *Leptura*
 Col. Stud. 1, 31-32
 Mehrere Ex. Georgien, Helenendorf, im Wiener Hofmuseum; Transkaukasisch-persisches Grenzgebiet, Araxes-Thal, Coll. REITTER; 2 Ex. Cilicischer Taurus, Külek, in Coll. v. HEYDEN und Coll. nostr.; 1 Ex. aus Beirut; 2 Ex. Hyrcanien, in Coll. STAUDINGER: Syntypen.
 SDEI: 1 ♂ Paralectotypus, Külek, leg. KORB, Coll. v. HEYDEN, Designation: SAMA.
- tricolor* GOUNELLE, 1909, *Stizocera*
 Ann. Soc. ent. Fr. 77, 644-645, Fig. 22
 Mehrere Syntypen; Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy; Minas, Bahia; leg. GOUNELLE.
 SDEI: 2 Syntypen, Prov. Bahia, Coll. KRAATZ.
- trilineata* HINTZ, 1913, *Crossotofera*
 Dtsch. ent. Ztschr. 1913, 202
 Mehrere Syntypen, Congo Belge, Kondué, Kamerun, Bipindi.
 SDEI: 1 Syntypus, Congo Belge, Kondué, leg. LUJA, Coll. KRAATZ.
- tripartita* HEYDEN, 1889, *Leptura*
 Dtsch. ent. Ztschr. 1889, 329
 ♀ Holotypus, Syria, via STAUDINGER an v. HEYDEN, im SDEI.
- trisignata* var. *maroccana* HEYDEN, 1886, *Leptura*
 Dtsch. ent. Ztschr. 30, 85; nom. nov. pro *L. oblongomaculata* var. *tangeriana* HEYDEN: Dtsch. ent. Ztschr. 25, 252; 1881.
 Syntypen, Tanger.
 SDEI: Lectotypus, Marocco, DEYROLLE, in Coll. HEYDEN, Designation: SAMA.
- tristicula* KRAATZ, 1879, *Pseudopidonia*
 Dtsch. ent. Ztschr. 23, 104; als var. von *alticollis* KRAATZ beschrieben.
 Holotypus, Ost-Sibirien, Amur, leg. CHRISTOPH, im SDEI 1877, Coll. KRAATZ.

- tristiculus* KRAATZ, 1879, *Pogonocherus*
Dtsch. ent. Ztschr. 23, 115
Holotypus, Ost-Sibirien, Amur, leg. CHRISTOPH, im SDEI (ohne Fundort).
- tristriatum* Suvorov, 1913, *Dorcadiion*
Rev. Russe d'Ent. 13, 71-72
Mehrere Syntypen, Terek-Gebiet, Umgebung von Kislowodsk, E. IV. - A.V.1894, leg. Suvorov.
SDEI: 3 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, 5.V.1894, Coll. KLÄGER.
- truncatipennis* MELZER, 1934, *Adetus*
Rev. Ent. Rio de Janeiro 4, 81, Taf. 1, Fig. 4
Holotypus, 1 Paratypus, Rio de Janeiro, Manguinhos, leg. FISCHER; Rio Grande do Sul, Alto Feliz, leg. BUCK; in Coll. MELZER und im SDEI.
SDEI: 1 Paratypus, Ctr. Brasilien, Rio de Janeiro, 22.V. 1918, leg. FISCHER.
- tuberculata* NONFRIED, 1894, *Stesilea*
Dtsch. ent. Ztschr. 1894, 210-211
Mehrere Syntypen, N. O. Sumatra, Tebing-Tinggi, leg. SCHULTHEISS.
SDEI: 1 Syntypus, mit den Angaben der Beschreibung.
- tuerki* GANGLBAUER, 1884, *Dorcadiion*
Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 33 (1883), 486
Mehrere Syntypen, Persien, Hadschgabad, leg. LEDERER, durch KRAATZ und TÜRK.
SDEI: 1 Syntypus, Hadschgabad, leg. LEDERER, Coll. KRAATZ.
- turcestanicum* KRAATZ, 1881, *Dorcadiion*
Dtsch. ent. Ztschr. 25, 335
Mehrere Syntypen, Turkestan, Margelan.
SDEI: 1 Syntypus, Turkestan, Coll. KRAATZ.
- turcestanicus* HEYDEN, 1886, *Stromatium*
Dtsch. ent. Ztschr. 30, 193
♀ Holotypus, Turkestan, via KOLTZE an v. HEYDEN, im SDEI (ohne Fundort, Nr. 98).
- ugandensis* MARTINS, 1980, *Xystrocera*
Pap. Avuls. Zool. S. Paulo 33 (5), 108-109, Fig. 32
♂ Holotypus, Uganda, leg. GRAUER, Coll. v. BENNIGSEN, im SDEI.
- umbripennis* REITTER, 1890, *Cartodera*
Wien. ent. Ztg. 9, 245
Mehrere Syntypen, Araxesthal bei Ordubad.
SDEI: 1 Syntypus, Caucasus, Araxesthal, leg. LEDERER-REITTER, Coll. STIERLIN.
- umtaliensis* SCHMIDT, 1922, *Anubis*
Arch. Naturg. 88, A 6, 140
Mehrere Syntypen, Rhodesia, Umtali, leg. BODONG, im Museum Berlin und SDEI.
- SDEI: 5 Syntypen, mit den Angaben der Beschreibung, Coll. KRAATZ.
- uncinatum* GOUNELLE, 1909, *Hexoplon*
Ann. Soc. ent. Fr. 77, 659-660
Mehrere Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy.
SDEI: 2 Syntypen, Brésil, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. KRAATZ.
- uniformis* HINTZ, 1913, *Pinacosternodes*
Dtsch. ent. Ztschr. 1913, 199
Mehrere Syntypen, Congo Belge, Kondué.
SDEI: 1 Syntypus, Congo-Belge, Kondué, leg. LUJA, Coll. KRAATZ.
- urdzharicum* PLAVILSTSHIKOV, 1937, *Dorcadiion*
Acta Ent. Mus. Nat. Prague 15, 29-30, 33
Mehrere Syntypen, Kasachstan bor., Urdzhar, 16.-25.V. 1934, in Coll. du Filial de Kasachstan de l'Académie des Sciences de l'URSS und in Coll. PLAVILSTSHIKOV.
SDEI: 1 ♂ Syntypus, Dzhungaria, cass. bor., Urdzhar.
- urundiensis* QUENTIN & VILLIERS, 1970, *Dorcasomus*
Ann. Soc. ent. Fr. (N. S.) 6 (1), 32, Fig. 7, 21
♀ Holotypus, Burundi, N. Urundi, leg. GRAUER, im SDEI.
- uvarovi* Suvorov, 1911, *Compsodordcadion*
Rev. Russe d'Ent. 11, 279-280, 282
Mehrere Syntypen, Uralsk-Gebiet, Umgebung der Stadt Temir, 1.-2.IV.1908, leg. UVAROV und BORODIN.
SDEI: 3 Syntypen, Sibirien occ. mer., Temir, Uralsk, Kngul-Kul, 16., 23.IV., 3.V.1908, leg. UVAROV und BORODIN, Coll. KLÄGER.
- vadoni* VILLIERS, 1980, *Nethinius*
Faun. Madagascar 52, 40, 76-78, Fig. 212-217
♂ Holotypus, Madagascar, région de Maroantsetra, XII. 1934, leg. VADON, im Museum Paris, Coll. VADON; mehrere Paratypen, siehe Originalbeschreibung.
SDEI: 1 Paratypus, Madagascar, Coll. KRAATZ.
- vanikorana* HELLER, 1935, *Glenea*
Arb. morph. tax. Ent. 2, 268
Mehrere Syntypen, Santa-Cruz, Vanikoro, im Museum Dresden und SDEI.
SDEI: 1 Syntypus, Sta Cruz I., Vanikoro, leg. MALCHER.
- variabile* GOUNELLE, 1909, *Protosphaerion*
Ann. Soc. ent. Fr. 77, 635, Fig. 20
Mehrere Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy; Minas, Serra do Caraca, Serra et Sertao de Diamantina, São Paulo, vallée du Rio Pardo, Pernambuca, Pery-Pery, leg. GOUNELLE.
SDEI: 2 Syntypen, Brésil, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. KRAATZ.

- variabilis* SCHWARZER, 1925, *Mesopenthea*
Ent. Bl. 21, 67-68
Mehrere Syntypen, Formosa, Sokutsu, 7.VI.1912, leg. SAUTER.
SDEI: 2 Syntypen, Sokutsu, Banshoryo Distr., 7.VI.1912, leg. SAUTER.
- varicans* GOUNELLE, 1909, *Gnomidolon*
Ann. Soc. ent. Fr. 77, 662
Mehrere Syntypen, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, Bahia, Minas, São Paulo.
SDEI: 1 Syntypus, Brasilien, Prov. Goyaz, Jatahy, Coll. KRAATZ.
- variegata* AURIVILLIUS, 1907, *Hyllisia*
Dtsch. ent. Ztschr. 1907, 82
Mehrere Syntypen, Togo, leg. CONRADT, im SDEI.
SDEI: 1 Syntypus, Togo, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.
- variegatum* GANGLBAUER, 1884, *Dorcadion*
Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 33 (1883), 502-503
SDEI: 1 ♂, 1 ♀ Syntypen, Syrien, leg. STAUDINGER, Coll. KRAATZ.
- variepennis* SCHWARZER, 1925, *Camptomine?*
Ent. Bl. 21, 147-148
Mehrere Syntypen, Formosa, Kankau, VI.1912, leg. SAUTER.
SDEI: 1 Syntypus, Formosa, Kankau, Koshun, VI.1912, leg. SAUTER.
- veneficella* MARTINS, 1976, *Gorybia*
Arq. Zool. S. Paulo, 27 (3/4), 307-308, Fig. 166
♂ Holotypus, Brasil, Mato Grosso, Chapada dos Guimarães, X., im National Museum Natur. Hist. Washington; Paratypen, siehe Originalbeschreibung.
SDEI: 1 Paratypus, Brésil, Prov. Goyas, Jatahy, Coll. KRAATZ.
- verbasci* var. *viridicollis* KRAATZ, 1870, *Clytus*
Berl. ent. Ztschr. 14, 410, Taf. 3, Fig. 4a
2 Syntypen, Griechenland, in Coll. KRAATZ.
SDEI: Lectotypus, Graecia, Designation: SAMA.
- vicus* MELZER, 1931, *Ozineus*
Arch. Inst. Biol. S. Paulo 4, 68, Taf. 14, Fig. 21
Mehrere Syntypen, Bosque da Saude perto da Capital do Estado de São Paulo, in Coll. MELZER.
SDEI: 1 Syntypus, Brasilien, S. Paulo, Est. S. Paulo, 6.XI. 1921, SAUDE.
- villosa* HEYDEN, 1876, *Cortodera*
Dtsch. ent. Ztschr. 20, 318
♀ Holotypus, Hungaria, DAHL.
SDEI: Holotypus, Hung. DAHL, Nr. 346, in Coll. HEYDEN.
- vinculatus* HELLER, 1914, *Tmesisternus*
Dtsch. ent. Ztschr. 1914, 316-317, Taf. 12, Fig. 10
- Mehrere Syntypen, Nova Guinea Germanica, Kani, (recte: kant?) montes, im Museum Dresden und SDEI.
SDEI: 1 Syntypus, D. N. Guinea, Kani Geb., Coll. v. BEN-NIGSEN.
- virens amphipatris* SCHMIDT, 1922, *Philematium*
Arch. Naturg. 88, A 6, 105
1 Ex. Br. O. Afrika, Luitpoldkette, im SDEI; 1 Ex. Togo, Amedzowe, leg. HAUSER (dieses Ex. stammt vielleicht von Ikutha, Fundortzettel wahrscheinlich verwechselt!); Syntypen.
SDEI: 1 Syntypus, Afrika or., Luitpoldkette, Coll. KRAATZ.
- viridicincta* AURIVILLIUS, 1907, *Syndere*
Dtsch. ent. Ztschr. 1907, 79
Mehrere Syntypen, Dahomey, via SCHENKLING an AURIVILLIUS, im SDEI.
SDEI: 1 Syntypus, Dahomey, ex. Coll. SCHNEIDER, Coll. KRAATZ.
- vittata* AURIVILLIUS, 1907, *Ocularia*
Dtsch. ent. Ztschr. 1907, 79-80
Mehrere Syntypen, Kamerun, leg. CONRADT, via SCHENKLING an AURIVILLIUS, im SDEI.
SDEI: 1 Syntypus, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.
- volgensis* KRAATZ, 1883, *Phytoecia*
Wien. ent. Ztg. 2, 276
Mehrere Syntypen, Wolga, durch KINDERMANN.
SDEI: 1 Syntypus, ohne Fundort, durch KINDERMANN, Coll. KRAATZ.
- wewalkai* HOLZSCHUH, 1969, *Chlorophorus*
Arbgem. öst. Ent. 21, 77-78, Abb. 1
♂ Holotypus, 18 Paratypen, Türkei, Kizilcahaman, in Coll. HOLZSCHUH und leg. WEWALKA, in Coll. WEWALKA.
SDEI: 1 Paratypus, Anatolien, Kizilcahaman, 13.-16.VI. 1968, leg. HOLZSCHUH.
- wickhami rhodopus* LINSLEY, 1955, *Crossidius*
Pan-Pacif. Ent. 31, 64-65
♂ Holotypus, California, Inyo County, Convict Lake, 15.IX.1954, leg. MACKENZIE; Paratypen, siehe Originalbeschreibung.
SDEI: 1 Paratypus, California, Mammoth, 27.VIII.1946, leg. MACKENZIE.
- woltersi* BRUCH, 1925, *Prionapterus*
Physis. B. Aires 8, 207-209, Fig. 8, 10
10 ♂ ♀ Syntypen: Argentinien, Prov. Catamarca, West-abhang des Anconquija: Zarso, leg. WEISER; Arenal, leg. WOLTERS.
SDEI: 1 ♂ Paralectotypus, Sarso, 3200 m Designation: GALILEO (Rev. Bras. Ent. 31, 612; 1987).

yapensis AURIVILLIUS, 1908, *Prosoplus*

Dtsch. ent. Ztschr. 1908, 223

Mehrere Syntypen, Insel Yap, leg. v. BENNIGSEN.

SDEI: 3 Syntypen, Yap, Coll. v. BENNIGSEN.

zarcoi SCHRAMM, 1910, *Dorcadion*

Bol. Real. Soc. Esp. Hist. Nat. 10, 285-286

Mehrere Syntypen, Epila, Saragosse, durch ZARCO.

SDEI: 19 Syntypen, Epila, Saragosse, Coll. KLÄGER, Coll. v. HEYDEN (4 Ex. als ab. *curvilineatum* SCHRAMM bezettelt).

Wahrscheinlich nicht beschriebene Arten

amitina KOLBE, *Nitocris*

SDEI: Typen: 1 Ex. Pangani St., Coll. v. BENNIGSEN; 1 Ex. D. O. Afrika, Uhehe, Iringa, I.-III.1899, leg. GÖTZE, commut, Kgl. Museum Berlin.

biapicata KOLBE, *Apomecyna*

SDEI: 1 Typus, Usambara, Coll. v. BENNIGSEN.

bipunctata KOLBE, *Eremomoecha*

SDEI: 1 Typus, Usambara.

comaratus DILLON, *Pseudonepheleatus*

SDEI: 1 Typus, W. Afrika.

curtulus SCHWARZER, *Tmesisternus*

SDEI: 6 Typen, D. Neu-Guinea, leg. WAHNES, durch FRANKLIN MÜLLER.

elongatus SCHWARZER, *Cereopsius*

SDEI: 1 Typus, S. Sumatra, Wai Lima, Lampungs, XI.-XII.1921, No. 17, leg. KARNY & SIEBERS, ex Museum Buitenzorg.

flavovittata KOLBE, *Perhippopsis*

SDEI: 1 Typus, Usaramo, Coll. v. BENNIGSEN.

formosanus SCHWARZER, *Coptops*

SDEI: 3 Typen, Formosa, Paroe, Paiwan-Distr., 1912, leg. SAUTER.

franklinmuelleri SCHWARZER, *Demonax*

SDEI: 3 Typen, Queensland, leg. FRANKLIN MÜLLER.

franklinmuelleri SCHWARZER, *Glenea*

SDEI: 9 Typen, D. Neu-Guinea, leg. WAHNES, durch FRANKLIN MÜLLER.

fuscoplagiatus SCHWARZER, *Dihammus*

SDEI: 2 Typen, Nalanda, Weligama, 1899, leg. HORN.

janthipennis PIC, *Astathes*

SDEI: 5 Typen, Szechuan, Chungking, leg. REITTER.

lata SCHWARZER, *Serixia*

SDEI: 1 Typus, N. N. Guinea, Pionerbivak, VI.-VII.1920, leg. v. HEURN, ex Museum Buitenzorg.

longicornis KOLBE, *Stenopsis*

SDEI: 1 Typus, Usambara, Coll. v. BENNIGSEN.

nebulosus SCHWARZER, *Anancylus*

SDEI: 1 Typus, Malacka, leg. FRANKLIN MÜLLER.

obliquefasciata KOLBE, *Phryneta*

SDEI: 1 Typus, Usambara, Coll. v. BENNIGSEN.

pallidipenne GOUNELLE, *Bomarion*

SDEI: 1 Typus, Brésil, Prov. Jatahy.

panganica KOLBE, *Tragocephala*

SDEI: 1 Typus, Pangani St., Coll. v. BENNIGSEN.

philomenus DILLON, *Brunneochamus*

SDEI: 1 Typus, Kamerun, leg. CONRADT, Coll. KRAATZ.

sansibaricus KOLBE, *Taurotagus*

SDEI: 2 Typen, Usambara, D. Togo.

sellatus KOLBE, *Idactus*

SDEI: 1 Typus, Pangani, Coll. v. BENNIGSEN.

solutus KOLBE, *Bolbopterus*

SDEI: 1 Typus, Usambara, Coll. v. BENNIGSEN.

spiniscapus SCHWARZER, *Oosphryon*

SDEI: 1 Typus, N. Guinea, Exped. Dormanpadbivak, X.1920, leg. v. HEURN, ex Museum Buitenzorg.

subchalybeata SCHWARZER, *Epania*

SDEI: 1 Typus, Formosa, Kosempo, 7.VII.1911, leg. SAUTER.

vestita KOLBE, *Sophronica*

SDEI: 2 Typen, Dar-es-Salaam, leg. v. BENNIGSEN und Coll. v. Bennigsen.